

Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihrer Wirte.

V.

Fortsetzung.

<i>Ootetrastichus holochlorus</i>	<i>Perkinsiella vastatrix</i>	<i>Polyterus olympiac</i>	<i>Pteronidea corylus</i>
— <i>homochromus</i>	— —	<i>Praon simulans</i>	<i>Macrosiphum pisi</i>
— <i>metallicus</i>	— <i>saccharicida</i>	— <i>solitariae</i>	<i>Agriopon</i> sp.
— —	— <i>vastatrix</i>	<i>Prestwichia aquatica</i>	<i>Dytiscus marginalis</i>
— <i>pallidipes</i>	— <i>saccharicida</i>	— —	<i>Notonecta</i> sp.
— —	— <i>vastatrix</i>	— —	<i>Pelobius</i> sp.
— <i>tarsalis</i>	— <i>saccharicida</i>	— —	<i>Ranatra linearis</i>
— —	— <i>vastatrix</i>	<i>Pristomerus vulnerator</i>	<i>Evetria buoliana</i>
<i>Opinion pugatus</i>	<i>Heliophila unipuncta</i>	<i>Prophanurus alecto</i>	<i>Diatraea canella</i>
— <i>tityrri</i>	<i>Epargyreus tityrus</i>	<i>Prospaltella filicornis</i>	<i>Lecanium</i> sp.
— —	<i>Halisidota caryae</i>	— <i>leucaspidis</i>	<i>Lencaspis pinifoliae</i>
— —	<i>Synumerista albifrons</i>	<i>Protarchus testatorius</i>	<i>Trichiosoma lucorum</i>
— <i>vulneratus</i>	<i>Sehistodepressaria nervosa</i>	<i>Pseudomaloda prima</i>	<i>Aleurocanthus woglami</i>
<i>Opius caesus</i>	<i>Hydrellia nigripes</i>	— —	<i>Chrysomphalus aonidum</i>
— <i>crawfordi</i>	<i>Anastrepha striata</i>	<i>Pteryogramma acuminatum</i>	<i>Tartessus syrtidis</i>
— <i>gracillariae</i>	<i>Gracillaria desmodiella</i>	<i>Ptinobius dysphagae</i>	<i>Dysphaga tenuipes</i>
— <i>sanguineus</i>	<i>Trypeta electa</i>	<i>Rhogas atricornis</i>	<i>Heliophila subpunctata</i>
<i>Orgilus obs urator</i>	<i>Evetria buoliana</i>	— <i>bicolor</i>	<i>Polyommatus eros</i>
<i>Orthopelma luteolator</i>	<i>Rhodites rosae</i>	<i>Rhorus mesoxanthus</i>	<i>Trichiosoma lucorum</i>
<i>Pachyneuron micanus</i>	<i>Aphis avenae</i>	<i>Rhyssa persuasoria</i>	<i>Sirex noctilio</i>
<i>Parachrysocharis javensis</i>	<i>Flata affinis</i>	<i>Riella mantidea</i>	<i>Mantis religiosa</i>
<i>Paraleurocerus bicoloripes</i>	<i>Lithocolletis</i> sp.	<i>Scambus evettrivorus</i>	<i>Evetria buschnelli</i>
<i>Paranagrus optabilis</i>	<i>Dieranotropis vastatrix</i>	<i>Selio australis</i>	<i>Locusta australis</i>
— —	<i>Perkinsiella saccharicida</i>	— <i>froggati</i>	— <i>danica</i>
— <i>perforator</i>	— <i>vitiensis</i>	— <i>fulgidus</i>	<i>Chortoicetes terminifera</i>
<i>Paraphelinus xiphidii</i>	<i>Xiphidium varipenne</i>	— <i>ovi</i>	<i>Locusta danica</i>
<i>Pelecystoma luteum</i>	<i>Cochlidion limacodes</i>	— <i>pulchellus</i>	<i>Chortoicetes pusilla</i>
<i>Peleteria robusta</i>	<i>Heliophila subpunctata</i>	— <i>thortoicetes</i>	— <i>terminifera</i>
<i>Pentarthron semblidis</i>	<i>Agrotis segetum</i>	<i>Schedius kuwanae</i>	<i>Porthetria dispar</i>
— —	<i>Conchylis ambiguella</i>	<i>Smiera albifrons</i>	<i>Heliophila unipuncta</i>
— —	<i>Malacosoma neustria</i>	<i>Solindenia picticornis</i>	<i>Ceratitis capitata</i>
— —	<i>Mamestra brassicae</i>	<i>Spalangia muscae</i>	<i>Musca domestica</i>
— —	<i>Orgyia gonostigma</i>	— <i>niger</i>	— —
— —	<i>Phalera bucephala</i>	<i>Spathius trifasciatus</i>	<i>Melanophila fulvoguttata</i>
— —	<i>Polychrosis botrana</i>	<i>Spilocryptus zygaenorum</i>	<i>Zygaena meliloti</i>
— —	<i>Sembris lutaria</i>	<i>Stenomalus muscarum</i>	<i>Musca domestica</i>
<i>Perilitus epitricis</i>	<i>Epitrix cucumeris</i>	<i>Syneches thyridopterygis</i>	<i>Thyridopteryx ephemerae-</i>
<i>Perisopterus javensis</i>	<i>Porthetria dispar</i>	<i>Tachinophyto variabilis</i>	<i>formis</i>
<i>Pezomachus minimus</i>	<i>Heliophila unipuncta</i>	<i>Telenomus benefactor</i>	<i>Carpocapsa pomonella</i>
<i>Pezoporus laspeyresiae</i>	<i>Laspeyresia torenta</i>	— <i>colemanni</i>	<i>Tabanus taeniola</i>
— <i>tenthredinarum</i>	<i>Profenusa collaris</i>	— <i>dalmanni</i>	<i>Dalycoris indicus</i>
<i>Phanerotoma recurvariae</i>	<i>Recurvirostra nanella</i>	— <i>giraudi</i>	<i>Orgyia antiqua</i>
— <i>tibialis</i>	<i>Carpocapsa pomonella</i>	— <i>goniopsis</i>	<i>Aulacocetus pini</i>
<i>Phanurus flavus</i>	<i>Ornennis</i> sp.	— <i>gowdeyi</i>	<i>Goniopsis chrysocoma</i>
<i>Phygadeuon rusticellae</i>	<i>Tinea biselliella</i>	— <i>kingi</i>	<i>Anaphe infracta</i>
<i>Pimpla hawaiiensis</i>	<i>Ceratitis capitata</i>	— <i>latiusculus</i>	<i>Tabanus kingi</i>
— <i>inquisitor</i>	<i>Argiope riparia</i>	— <i>paractias</i>	<i>Biprorulus bibax</i>
— <i>nitida</i>	<i>Calamia lutosa</i>	— <i>rhopali</i>	<i>Rhopalus hyalinus</i>
— <i>taschenbergi</i>	— —	<i>Tetrastichus carinatus</i>	— —
— —	<i>Nonagria dissoluta</i> v. <i>arundineta</i>	— —	<i>Dasyneura leguminicola</i>
<i>Podagrimon shirakii</i>	<i>Paratenodera aridifolia</i>	(Fortsetzung folgt.)	
<i>Polynema bifasciatipenne</i>	<i>Oecanthus nigricornis</i>	Berichtigungen.	
— <i>consobrinus</i>	<i>Empoasca flavescens</i>	In Nr. 3 S. 14 Arbeit Prof. Jan Roubal soll	
— <i>natans</i>	<i>Calopteryx</i> sp.	es heißen: <i>Leptura</i> statt <i>Leptusa</i>	
— <i>reduvii</i>	<i>Reduviolus blackburnii</i>	In Nr. 10 S. 45, Arbeit Dr. Baudyš: im nordöst-	
<i>Polyterus caliroae</i>	<i>Eriocampoides</i> sp.	lichen Böhmen, nicht nordwestlichen.	
		In Nr. 11 S. 52, Arbeit Scheffner, bei der Tabelle:	
		<i>Aeschnidae</i> und <i>Agriionidae</i> .	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1916

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener oder gezogener Parasiten und ihre Wirte 60](#)