

Das letzte Bauchsegment flach, kahl, schwach glänzend, hinten etwa halbkreisförmig begrenzt und daselbst mit ganz leicht erhöhtem Rande.

Schwarz; rötlich bis bräunlich sind z. T. die Tarsen (aber nicht die Metatarsen) sowie die Spitze der Mandibeln; die Tibiensporne rötlichgelb. Daß der Hinterrand der Abdominalsegmente schmal bleich ist, läßt sich nur erkennen, wo die Behaarung der Hinterrandbinde abgerieben ist. Es sind 5 oder 6 weiße Hinterrandhaarbinden vorhanden, von denen die des ersten Segmentes schmaler und nicht so rein weiß wie die übrigen ist. Thoraxrücken und Scheitel grau, der Körper sonst weißlich behaart. Flügel hyalin, Geäder schwarz.

Clypeus glatt, stark glänzend, mit einer schwachen medianen Längseinsenkung und mit vereinzelten kleinen, aber ziemlich tiefen Punktgrübchen, meistens so stark behaart, daß nur mitten am Vorderrande eine kleine kahle Partie vorhanden ist; der Vorderrand gerade oder mitten fast unmerklich ausgerandet, auch seitlich ungezähnt; am Vorderrande zwar dichtere Punktierung, aber eigentlich ohne die gewöhnliche Quereinsenkung. — Labrum stark glänzend, fein und etwas gekrümmt längsgestrichelt. Scheitel dicht und kräftig punktiert, nur nahe den Augen und hinter den Ozellen etwas glänzend. — Das zweite Geißelglied ist nur um etwa $\frac{1}{3}$ seiner eignen Länge länger als das fast kugelförmige erste Geißelglied und wenig mehr als halb so lang wie das dritte Geißelglied. Letzteres ebenso wie alle folgenden Geißelglieder fast doppelt so lang wie breit. — Abdominalsegmente glatt, glänzend; das erste jedoch mit kräftiger Punktierung, die aber nicht dichter ist als daß die Zwischenräume der Gruben z. T. größer als die Gruben selbst sind; an den folgenden Segmenten ist die Punktierung feiner und kaum dichter, da aber ihre Zwischenräume nicht so glatt wie die des ersten Segmentes sind, so erscheinen diese folgenden Segmente doch nicht glänzender als das erste.

Körperlänge 8,5–10 mm. (Fortsetzung folgt.)

57. 16. 9

Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. VII.

(Fortsetzung.)

Compsilura concinnata	Callosamia promethea
— —	Diacrisia virginica
— —	Euproctis chrysorrhoea
— —	Vanessa antiopa
— —	Hyphantria cunea
— —	Porthetria dispar
Dexodes machairopsis	Vanessa urticae
Digonochaeta setipennis	Forficula auricularia
Ernestia cornivens	Mamestra persicariae
Euphorocera claripennis	Hemerocampa leucostigma
Eutachina larvarum	Melitaea didyma
— —	Vanessa jo
— —	— polychloros
— —	— urticae
Exorista blepharipoda	Aeronycta psi
— —	— tridens
— ferina	Vanessa urticae

Exorista flavicauda	Cirphis unipuncta
— griseomicans	Hemerocampa leucostigma
— inclinata	Vanessa polychloros
— leucania	Euthisanotia grata
— pyste	Pilocrocis tripunctata
Frivaldzkia distincta	Cabera pusaria
— —	— exanthemata
— —	Cidaria corylata
— —	Drepana falcataria
— —	Ematurga atomaria
— —	Sphinx pinastri
— —	Tephroclystia pinastri
Frontina aetiae	Hemerocampa leucostigma
— frenchii	— —
Gaurax anchora	Corydalis cornutus
— araneae	Argiope riparia
Geddelstia hässleri	Bubalis ekei
— —	Connoclaetes albojubatus
— —	Damaliscus lunatus
Goniocera enigmatica	Malacosoma castrensis
Hemimasicera ferruginea	Melitaea athalia
Homoeonychia rapae	Pontia rapae
Hyalomyodes triangularis	Altica bimarginata
Hyperceteina polyphyllae	Polyphylla fulle
Hypoderma gazellae	Gazella granti
Hyria tibialis	Vanessa urticae
Kirkia surcoufi	Bubalis lichtensteini
— —	— major
Leucopis nigricornis	Eriopeltis lichtensteini
Lynchia maura	Columba domestica
Macheira serriventris	Pyrameis atalanta
— —	Vanessa antiopa
— —	— jo
— —	— urticae
— —	— xanthomelas
— —	— antiopa
Masicera dubia	Crioceris asparagi
Meigenia floralis	— XIV-punctata
— —	Gastrophysa viridula
— —	Xiphocleptes albicollis
Mydaea anomala	Homorus lophotes
— torquans	Mimus modulator
— —	Pitangus sulfuratus bolivi-
— —	anus
— —	Spermophila gutturalis
Nemoraea leucania	Cirphis unipuncta
Oestromyia marmotae	Arctomys marmota
Oestrus disjunctus	Hippotragus equinus
— compositus	Bubalis lichtensteini
Panzeria minor	Calymnia trapezina
— —	Taenioecampa pulverulenta
Paroxorista blanda	Pyrameis cardui
— futilis	— atalanta
Pelatachina pellucida	Vanessa antiopa
Phora fasciata	Coccinella septempunctata
— rufipes	Sphinx convolvuli
Phormia azurea	Anthus pratensis
— —	Corvus sp.
— —	Cotyle riparia
— —	Hirundo rustica
— —	Parus ater
— —	Passer domesticus
Phorocera caesifrons	Hybernia defoliaria

<i>Phaenocera claripennis</i>	<i>Phyltraea elegantaria</i>	<i>Acloidea saitidis</i>	<i>Phidippus morsitans</i>
— <i>edwardsii</i>	<i>Vanessa antiopa</i>	— —	<i>Saitis pulex</i>
— <i>leucaniae</i>	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	<i>Aenoplex nigrosoma</i>	<i>Ametastegia glabrata</i>
— <i>parva</i>	<i>Phlyctaenia ferrugalis</i>	<i>Ageniaspis fuscicollis</i>	<i>Eulecanium caryae</i>
— <i>saundersii</i>	<i>Autographa gamma californica</i>	— <i>ruficollis</i>	— <i>cerasifex</i>
— —	<i>Ennomos magnarius</i>	<i>Agrothereutes graenicheri</i>	<i>Ceratina dupla</i>
— —	<i>Vanessa antiopa</i>	— <i>lophyri</i>	<i>Diprion abietis</i>
<i>Phryxe vanessae</i>	<i>Vanessa jo</i>	<i>Agrypon flavescens</i>	<i>Clysis ambiguella</i>
— —	— <i>urticae</i>	— —	<i>Earias chlorana</i>
— <i>vulgaris</i>	<i>Cheimatobia brunata</i>	— —	<i>Hibernia defoliaria</i>
— —	<i>Cirphis unipuncta</i>	— —	<i>Lophyrus pini</i>
— —	<i>Dryobota protea</i>	— —	<i>Panolis piniperda</i>
— —	<i>Eremobia ochroleuca</i>	— —	<i>Polychrosis botrana</i>
— —	<i>Eupithecia innotata</i>	— —	<i>Taenioecampa miniosa</i>
— —	<i>Orgyia antiqua</i>	— <i>septentrionale</i>	<i>Eupithecia actaeata</i>
— —	<i>Pyrameis atalanta</i>	— <i>tenuitarsus</i>	<i>Zygaena filipendulae</i>
<i>Plagia ruralis</i>	— <i>cardui</i>	— —	— <i>loniceræ</i>
<i>Prosphaerysa websteri</i>	<i>Apis mellifica</i>	<i>Alaptus aleurodis</i>	<i>Aleurodes aceris</i>
<i>Rondaniocestrus apivorus</i>	<i>Malacosoma disstria</i>	<i>Aleiodes burnus</i>	<i>Apatela hasta</i>
<i>Sarcophaga aldrichi</i>	<i>Ligyris gibbosus</i>	— —	— <i>lobeliae</i>
— <i>cimbicis</i>	<i>Eleodis obsoleta</i>	— <i>intermedius</i>	— <i>americana</i>
— <i>eleodis</i>	<i>Ligyris gibbosus</i>	— —	— <i>dactylina</i>
— <i>helicis</i>	<i>Helicella itala</i>	— —	— <i>hastilifera</i>
— <i>nigriventris</i>	<i>Ligyris gibbosus</i>	— —	— <i>oblinita</i>
— <i>rudis</i>	<i>Athetis</i> sp.	— —	<i>Malacosoma americana</i>
<i>Stomatomyia metallica</i>	<i>Cirina forda</i>	— <i>parasiticus</i>	<i>Diprion abietis</i>
<i>Sturmia semitestacea</i>	<i>Elasmucha griseus</i>	— <i>rileyi</i>	<i>Apatela oblinita</i>
<i>Subelytia rotundiventris</i>	<i>Pyrameis cardui</i>	— —	<i>Nephelodes violans</i>
<i>Tachina anonyma</i>	<i>Hemerocampa leucostigma</i>	— <i>terminalis</i>	<i>Cirphis unipuncta</i>
— <i>elisiocampae</i>	<i>Orgyia antiqua</i>	— —	<i>Nephelodes violans</i>
— <i>impotens</i>	<i>Zygaena filipendulae</i>	<i>Amblyteles brevipennis</i>	<i>Cirphis albilinea</i>
— <i>larvarum</i>	— <i>loniceræ</i>	— —	<i>Heliophila</i> spp.
— —	<i>Dasychira groenlandica</i>	— —	<i>Leucania</i> —
— <i>macrocera</i>	<i>Malacosoma castrensis</i>	— <i>caeruleus</i>	<i>Hemerocampa leucostigma</i>
— —	<i>Hemerocampa leucostigma</i>	— <i>camelinus</i>	<i>Pyrameis cardui</i>
— <i>mella</i>	<i>Vanessa polychloros</i>	— —	<i>Vanessa antiopa</i>
— <i>omnivora</i>	<i>Macrothylacia rubi</i>	— —	— <i>polychloros</i>
— <i>vidua</i>	<i>Vanessa jo</i>	— <i>centrator</i>	— <i>xanthomelas</i>
<i>Tricholyga major</i>	<i>Zygaena occitanica</i>	— <i>flavizonatus</i>	<i>Isia isabella</i>
— —	<i>Nezara viridula</i>	— —	<i>Cirphis unipuncta</i>
<i>Trichopoda pennipes</i>	<i>Cirphis unipuncta</i>	— —	<i>Heliophila</i> spp.
<i>Wagneria sequax</i>	<i>Alypia VIII-maculata</i>	— <i>instabilis</i>	<i>Leucania</i> —
<i>Winthemia quadripustulata</i>	<i>Brotolomia meticulosa</i>	— —	<i>Oeneis norna semidea</i>
— —	<i>Cucullia lychnitidis</i>	— <i>nanus</i>	<i>Phyciodes tharos</i>
— —	<i>Hemerocampa leucostigma</i>	— <i>nuncius</i>	<i>Acrobaris rubrifasciella</i>
— —	<i>Vanessa jo</i>	— <i>subfuscus</i>	<i>Euxoa excellens</i>
— —	— <i>urticae</i>	— <i>unifasciatus</i>	— —
— <i>xanthogastra</i>	<i>Acronycta tridens</i>	— <i>versabilis</i>	<i>Apatela oblinita</i>
— —	<i>Brachonychia sphinx</i>	— —	<i>Hoedes hypophloeas</i>
— —	<i>Catocala sponsa</i>	<i>Amorphota orgyiae</i>	<i>Polygona faunus</i>
— —	<i>Deilephila elpenor</i>	<i>Anacharis marginata</i>	<i>Hemerocampa leucostigma</i>
— —	<i>Smerinthus ocellatus</i>		<i>Baccha fascipennis</i>
— —	<i>Sphinx ligustri</i>		
<i>Wohlfartia magnifica</i>	<i>Homo sapiens</i>		
— —			
<i>Aphaniptera</i>			
<i>Pulex raptoris</i>	<i>Hystrix cristata</i>		
— —			
<i>Entomophaga</i>			
<i>Ablerus elisiocampae</i>	<i>Malacosoma americana</i>		
<i>Acerophagus fascipennis</i>	<i>Pseudococcus crawii</i>		
— <i>notativentris</i>	— sp.		
— <i>pallidus</i>	— <i>yervasantae</i>		

(Fortsetzung folgt.)

Bibliothek der Societas entomologica.

Von Herrn Bander mann ging als Geschenk ein:
Meine Erfahrungen mit der Eizucht von *Pseudophia lunaris* Schiff.

Ueberwintert *Pyrameis cardui*?

Berichtigung.

Autor: Franz Bander mann.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. VII. 23-24](#)