© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

und Zeichnung glich fast derjenigen der Zucht des Jahres 1915, also ein Rückschlag zur zweiten Zucht. Auch die männlichen Falter zeigten dasselbe Bild wie 1915, nur waren hier einige riesengroße, dunkelbraune Tiere dabei. Bei einem ♂ war der Thorax weiblich beschuppt, die Flügel bläulich seidenglänzend schillernd. Ein ♂ zeigte eine weißgraue 3 mm breite Zickzackbinde auf den Vorderflügeln (5 mm vor dem Saume), der Körper wie *dispar*-Männchen. Unterseite aller Flügel ebenfalls wie *dispar* gefärbt. Leider habe ich aus dieser Zucht sehr wenige scheckige Hybriden erzielt, so daß ich die vielen Interessenten auf nächstes Jahr (7. Zucht) vertrösten muß. Ich habe vier schöne Gelege von verschiedenfarbigen Pärchen erzielt und hoffe auf weitere gute Erfolge.

57:16.9

Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. VII.

(Fortsetzung.)

Bassus agilis	Archips infumatana
— —	— rileyana
— —	Aristotelia absconditella
— —	Pyrausta futilalis
— —	— theseusalis
— albosignatus	Syrphus ribesii
— earinoides	Tmetocera ocellana
— —	Coleophora cinerella
— —	Exartema melanum
— gibbosus	Phthorimaea operculella
— sanctus	Pholisora catullus
— —	Thanaos juvenalis
— simillimus	Eucosma strenuana
— —	Lixus scrobicollis
Bathythrix tibialis	Ametastegia glabrata
Berecyntus bakeri	Hadena devastatrix
Biomyia georgiae	Calosoma calidum
— —	— frigidum
— —	— peregrinator
— —	— sycophanta
Blastothrix longipennis	Lecanium corni
— —	— robiniarum
— sericea	Phenacoccus acericola
Blepyrus mexicanus	Pseudococcus virgatus
Brachistes tibiator	Anthonomus signatus
Brachycentrus brachycentrus	Callidium glabratum
Bracon futivus	Gelechia gallaeasteriella
— hylobii	Hylobius abietis
Bucculatriplex secundus	Bullulatrix canadensiella
Cacellus oecanthi	Oecanthus spp.
Caenocryptus newcomeri	Ametastegia glabrata
Caenopachys hartigi	Pityogenes bidentatus
— —	— quadridens
Callimome advena	Diastrophus nebulosus
— brevicauda	— —
— chrysochlora	Rhodites dichlocerus

(Fortsetzung folgt.)

Entomologische Neuigkeiten.

Ein altes, großes Haus, mitten in ausgedehntem Park der englischen Grafschaft Lincolnshire gelegen, bildet seit 24 Jahren den Ueberwinterungsplatz ungezählter Fliegen. Als im Herbst 1917 die Aufmerksamkeit eines Entomologen darauf gelenkt wurde, ergab die Inspektion Ende Oktober folgendes Bild: Beim Oeffnen der Schiebefenster zeigten sich die Fensterladen schwarz von Fliegen. Ein einziger Rahmen lieferte nach Ausräuchern einen ganzen Wassereimer voll toter Tierchen, ungefähr 6 Eimer voll die andern besetzten Fenster. Es war nur die eine Seite des Hauses in dieser Weise besucht, hingegen alle Stockwerke. Coccinellen waren ebenfalls in Menge vorhanden. Früh im November wurden die Fenster und ihre Verkleidungen, alle Fugen und Ritzen gründlich ausgeräuchert, so daß während mehrerer Tage keine Fliege zu sehen war. Anfang Dezember waren sie aber so zahlreich wie immer. Eine zweite Ausräucherung fand statt und siehe da, im Januar 1918 fand sich kein lebendes Exemplar mehr vor. Wie der Gärtner sagte, hatten sich die ungebetenen Gäste seit 24 Jahren in dieser aufdringlichen Weise eingestellt, ohne daß man ihrer Herr werden konnte. Ende Juli begann der Zuzug, der größer und größer wurde, im April verschwanden sie dann ziemlich plötzlich. Die Bestimmung ergab: *Musca corvina*, *Pollenia rudis*, *Pyrellia eriophthalma*, *Limnophora septemnotata*, *Culex pipiens*, sowie die Chalcidien *Stenomalus muscarum* und *Pteromalus deplanatus*. Die zahlreichste und unangenehmste Art war *Musca corvina.*, *Limnophora septemnotata* kam nur in den Zimmern vor, deren Außenwände mit Epheu bewachsen waren. Zimmer die mit einer dieser beiden Arten besonders besetzt waren enthielten nur wenige andere.

Bibliothek der Societas entomologica.

Von Herrn W. Fritsch ging als Geschenk ein: *Deilephila euphorbiae* ab. *cuspidata* Rebel und *zieczac* Fritsch.

Autor: W. Fritsch.

Von Herrn H. Fruhstorfer:

Monographische Uebersicht alter und neuer *Erebia*-Formen.

Eine neue palaearktische *Charaxes*-Rasse

Revision der Lycaenidengruppe *Heliophorus* auf Grund der Morphologie der Klammerorgane.

Eine neue Rasse aus der bisherigen „Gattung" *Orthomiella.*

Revision der Lycaenidengattung *Lycaenopsis* auf Grund morphologischer Vergleiche der Klammerorgane.

Erebia alecto Rediviva.

Neue *Poritia*-Rassen.

Altes und Neues über *Megisba malaya.*

Zwei neue *Opsiphanes*-Rassen.

Neue Formen einer alten *Erebia.*

Autor: H. Fruhstorfer.

Von Herrn Reuss:

Die Augenfarbe bei *Argynnis niobe* L. und *Argynnis adippe* L. Ein noch unbekanntes Unterscheidungsmerkmal.

Autor: T. Reuss.

Redaktion M. Rühl, Zürich VII. — Verlag des Seitz'schen Werkes (Alfred Kernen), Stuttgart.
Druck von H. Laupp jr. Tübingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte. YII. 48