

zoogeographische Unmöglichkeit. Uebrigens erreicht *mnemosyne* auf helvetischem Gebiet nur ganz ausnahmsweise die Höhenstufe von 2200 m, die VERITY für *excelsa* gelten läßt (Galenalp teste VORBRODT); persönlich konnte ich ihr Vorkommen nicht höher als 1800 m (Lötschental) verfolgen.

(Schluß folgt.)

57: 16. 9

Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte VIII.

(Fortsetzung.)

Apanteles elisiocampae	Malacosoma americana	Apanteles harti	Pyrausta penitalis
— congregatus	Atreus plebeja	— hemileucae	Automeris io
— —	Ampeloeca myron	—	Hemileuca maia
— —	— versicolor	— hydriæ	Calocalpe undulata
— —	Ceratomia catalpae	— javensis	Hesperia conjuncta
— —	Dolba hylaeus	— koebelei	Euphydryas editha
— —	Pholus achemon	— lacteicolor	Aeronycta hasta
— —	— pandorus	— laeviceps	Hyphantria textor
— —	Sphecodina abbotti	—	Autographa brassicae
— —	Sphinx chersis	—	Chorizagrotis agrestis
— —	— kalmiae	—	— auxilaris
— erambi	Crambus mutabilis	—	Cirphis unipuncta
— —	— triseptus	—	Euryymus eurytheme
— diacrisiae	Hemerocampa leucostigma	—	Laphygma exigua
— —	Hyphantria textor	—	— protodice
— —	Olene clintoni	lunatus	Neleucania albilinea
— diatraeae	Diatraea saccharalis	—	Papilio oregonica
— electrae	Agapema galbina	melanopus	— zolicaon
— —	Hemileuca electra	melanoseelus	Pontia rapae
— —	— nevadensis	militaris	Porthetria dispar
— —	Pseudohazis eglanterina	nemoriae	Cirphis phragmatidicola
— —	— hera	—	Heliothis obsoleta
— empretiae	Parasa chloris	—	Laphygma frugiperda
— ensiger	Crambus zeellus	nigricornis	Chlorochlamys chloroleucaria
— ephestiae	Ephestia kuehniella	nigriventris	Cleuropracha insularis
— epinotiae	Enarmonia saliciana	niteris	Eupithecia miserulata
— etiellae	Etiella schisticolor	obseurus	Haematopis grataria
— —	Psorosina hammondi	ornigis	Ctenucha brunnea
— euchaetis	Euchaetias egle	orobenae	Psilura monacha
— euphydryidis	Euphydryas phaeton	palaearctica	Feltia aeneipennis
— flaviconehae	Anthocharis genutia	—	Melitaea artemis
— —	Cirphis unipuncta	pallidocinetus	Lithocletis mariaeella
— —	Euryymus philodice	papaipema	— propinquella
— —	Plathypena scabra	paranthrenidis	Evergestis rimosalis
— flaviventris	Tetralopha subcanalis	parastichtidis	Cosymbia lumenaria
— forbesi	Cirphis unipuncta	phigaliae	Nyctobia anguillineata
— —	Polia renigera	phobetri	Papilio demodocus
— —	— stricta	phthorimaeae	Papaipema maritima
— formosus	Abraxas sylvata	plathypenae	Paranthrena robiniae
— gillettei	Cacoecia argyrosipa	podunkorum	Parastichtis bicolorago
— glomeratus	Pieris oleracea	politus	Phigalia titea
— —	— protodice	polyehrosidis	Halisidota tessellaris
— grenadensis	Cirphis latiuseula	pseudoglossae	Phthorimaea glochinella
— —	— multilinea	pyralidis	Plathypena scabra
— —	— unipuncta	—	Calpodes ares
— —	Heliothis obsoleta	—	Scolecocampa liburna
— —	Laphygma exigua	robiniae	Cacoecia rosaceana
— —	— frugiperda	rohweli	Polychrosis viteana
— —	Plathypena scabra	rufocoxalis	Epizeuxis lubricalis
— griffini	Feltia gladiaria	sarrothripae	Loxostege similalis
		schizurae	Nomophila noctuella
			Pyrausta futilalis
			Recurvaria robbiniella
			Arocercops strigifinitella
			Leucania unipuncta
			Malacosoma americana
			Nephelodes emmedonia
			Ichthyura inclusa
			Peronea permutana
			Sarrothripa revayana
			Schizura unicornis

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre
Wirte VIII. 32](#)