

einerseits in Gängen und vom Holze lebend, andererseits in Zapfen und den Samen benagend, ein verschiedenartiger, so ändert auch die Verpuppung ab. Die reifen Raupen verlassen die Zapfen und verpuppen sich an der Erde, die in dem Holz lebenden haben schon in der Jugend eine förmliche Röhre errichtet, theils aus Splint, theils aus Harz bestehend und verwandeln sich in dieser. Die Arbeit der letzteren verursacht den Ausfluss von Harz und damit am Stamme eine sogenannte Harzgalle, auch in dieser findet sich öfter die Raupe und die Puppe und ich wage die Vermuthung auszusprechen, dass der Raupe in diesem Falle auch das Harz als theilweise Nahrung dienen mag. Der Schmetterling wird in ganz Mitteleuropa in Nadelholzwäldern zu finden sein, sein wilder Flug jedoch, dann ein plötzliches unerwartetes Absitzen an einem Stamm oder an einen höhern Zweig schützen ihn vor öfterer Erbeutung. Die Flugzeit fällt in die Monate Juni und Juli, nur sehr selten und vereinzelt traf ich ihn aus den überwinterten Puppen im Mai.

Biologische Beiträge zur Käferkunde.

Von Ferdinand LIBERICH.

(Fortsetzung.)

Necydalis major L.

Die in fast alle Käferbücher übergegangene Bemerkung, der Käfer lebe wie seine Larve an Pappeln und Weiden, bedarf wegen ihrer Einseitigkeit einer Berichtigung, es existirt gewiss kein einheimischer Laubbaum, der nicht als Larvenwohnung benützt wird. In den bairischen Provinzen Oberpfalz und Oberfranken ist der Käfer zumal an Pappeln und Weiden selten, hier bewohnt er fast ausschliesslich Obstbäume und gibt den Kirschbäumen den Vorzug. Die Generation des Käfers ist mehrfachem Wechsel unterworfen, ohne dass es mir gelingen wollte, den Sachverhalt genauer zu erforschen, so erhielt ich aus einem auf meine Veranlassung abgesägten kränklichen Apfelbaum, der zahlreiche Bohrlöcher aufwies und in einem unbenützten Raum zu ebener Erde aufgestellt war, drei Jahre nacheinander mehrere Käfer männlichen und weiblichen Geschlechts, die Männchen stets 3—4 Tage früher. Je nach der vorhergegangenen Temperatur im Juni oder erst im Juli findet man in den Morgenstunden das Thier am Stamme ruhig sitzen, gewöhnlich frisch entwickelte Käfer, die sich nicht weit von ihrer Auferstehungsstelle entfernen, gegen 10 Uhr kommt Leben in das bisher träge Thier, es spreizt die Flügel und schiebt sich

zum Fluge an, während dessen man selten ein Exemplar erlangt. Bald um die Gipfel der Bäume fliegend, bald sich auf Momente an Blumen und blühenden Sträuchern niederlassend, kehrt es Abends vor Sonnenuntergang an die Baumstämme zurück, wo man es ruhig ergreifen kann. Die Männchen sind immer in Mehrzahl vorhanden und mehrere buhlen zugleich um die Gunst des Weibchens; die Begattung erfolgt im hellen Sonnenschein. Die Eierablage geschieht in längern Zwischenräumen, da die Weibchen nach langem Prüfen und Wählen um eine geeignete Stelle, nur 3—4 Eier in eine Rindenritze hineinschieben, dann wenige Minuten ruhen und an einen andern Baum fliegen, um dies Geschäft zu wiederholen. Ein solches Eierlegendes Weibchen habe ich drei Bäume nacheinander aufsuchen sehen, ohne dass die Beschaffenheit derselben ihm zu diesem Zweck günstig erschienen hätte.

Beiträge zu *Brephos nothum*

von E. Sohn.

Die Weibchen dieser Frühlingseule besitzen eine eigenthümliche Scheu, oder ich sage vielleicht besser, eine Hartnäckigkeit, sie wollen durchaus in der Gefangenschaft keine Eier absetzen, mit *B. Parthenias* habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Zu Dutzenden hatte ich die Pärchen beider Arten in Begattung von Bäumen geklopft, die Weibchen in grössern oder kleinern Gefässen untergebracht, sie bald der Sonne und dem Licht, bald ständiger Dunkelheit ausgesetzt, wiederholt mit Zucker und Aepfelschnitten gefüttert, es war unfruchtbares Bemühen. Vor einigen Jahren gelang es mir endlich befruchtete Eier zu erhalten und auch im letzten Jahre war ich mit 2 Weibchen glücklich, während andere die Eierablage versagt haben. Ich glaube, dass es von allgemeinem Interesse ist, zu vernehmen, wie ich einige Ablagen bewirkt habe. Veranlassung zu meinem Verfahren gab mir das Weib von *Biston hirtarius*, welches seine Eier in dichten Haufen auf- und übereinander legt und den unzugänglichsten Winkel in seinem Gefängniss zur Ablage wählt. Oft schon habe ich dessen Eier beim Oeffnen der Schachtel zerquetscht, weil sie zwischen den Rand der genau schliessenden Schachtel förmlich hineingezwängt waren, man wundert sich oft, wie das geschehen kann.

Auf dieses sich stets wiederholende Verfahren der *hirtarius* Weiber fussend construirte ich eine kleine Abänderung in den zu Eierablagen dienen-

den runden Apothekerschachteln. In halber Höhe derselben leime ich einen dreieckigen Karton, ähnlich dem Ausguss einer Wasserkanne ein, er ist 4 Centimeter lang und in diesen so zugerichteten Winkel legen die Weiber von *hirtarius* gerne ihre Eier. Versuche bei *nothum* und *parthenias* sind erfolglos geblieben, bis ich geradezu in die Schachtel eine dreikantige Oeffnung schnitt, das Dreieck offen ankleimte und durch die Oeffnung Weidenkätzchen zog, letztere befanden sich mit ihren untern Enden im frischen Wasser. Die Schachtel selbst habe ich an den Zweigen festgebunden und das Ganze im Vorfenster dem Licht und der Sonne ausgesetzt. An die aus dem dunkeln Dreieck hervorschendenden Kätzchen haben dann auch einige Weiber Eier in dichten Häufchen abgelegt. Die letztern sind gelblich, sehr klein und schmal oval. Die auskriechenden Räupehen erhielten Zweige von *Salix caprea* und *Populus tremula*, zogen aber stets letztere vor. Im ersten Jahre gingen mir alle ganz erwachsen zu Grunde, ich hatte lockere Erde in ihren Zwinger gebracht, aber sie benutzten gegen mein Vermuthen dieselbe nicht und starben theils halb verpuppt auf der Erde. Im heurigen Jahre nahm ich aus dem Walde einen stark angefaulten Holzstrunk mit nach Hause, brachte denselben im Zwinger unter und hoffte, dass die Raupen in die feuchte Holzerde sich eingraben würden. Dem war aber nicht so, sie gruben einen kurzen Gang in das morsche Holz und verwandelten sich in diesem. Erst später bemerkte ich, dass das Eingangsloch in diesen Gang übersponnen, also geschlossen war. In einigen Monaten hoffe ich, dass die Schmetterlinge ihre Auferstehung feiern werden.

Literaturbericht.

Systematisches Verzeichniss der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. Zugleich ein Käfer-Verzeichniss der Mark Brandenburg. Zusammengestellt von J. Schilsky. Berlin 1888. Nicolaische Verlagsbuchhandlung. 160 S.

Nachdem seit mehreren Jahren schon das Verzeichniss der Käfer Deutschlands von Dr. G. Kraatz im Buchhandel vergriffen war, hat sich Herr J. Schilsky auf Anregung des Herrn Dr. G. Kraatz zur Herausgabe des nun vorliegenden systematischen Verzeichnisses entschlossen, und seine schwierige Aufgabe mit Sachkenntniss und grosser Genauigkeit gelöst. Als Grundlage der systematischen Anordnung hat der Katalog von Heyden-

Reitter-Weise gedient, ohne sich streng an die darin herrschende Nomenclatur zu binden, indess dient zur leichten Orientirung in demselben die überaus reiche Zugabe der Synonymie, die nahezu erschöpfend gegeben wurde. Ebenso neu, als originell ist die Darstellung des Verbreitungsbezirkes für jede einzelne Art, die auf den ersten Blick südliches, nördliches, östliches oder westliches Vorkommen erkennen lässt; die in der Mark Brandenburg vorkommenden Spezies sind noch eigens mit einem Sternchen bezeichnet. Von der Verlagsbuchhandlung wurde auf saubere Ausstattung in jeder Beziehung Gewicht gelegt, und kann das Buch mit gutem Gewissen jedem Coleopterologen zur Anschaffung bestens empfohlen werden.

* * *

Leitfaden der Zoologie für Studirende der Naturwissenschaften und der Medizin von Dr. Ernst Schäff, Assistent des zoolog. Instituts an der kgl. landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin. Mit 101 Abbildungen. Stuttgart. E. Schweizerbart. 1888. Gr. 8. VIII und 213 S. Preis 3 Mk.

In einer etwas eigenthümlichen, aber bei längerem Durchlesen fesselnden Weise führt uns der Verfasser in seine 9 Thierkreise, deren erster mit den Urthieren beginnt, um stufenweise die Entwicklung von den einfachsten bis zu den zusammengesetzten Formen zu durchlaufen. Die beigefügten Zeichnungen sind mehr originell, als künstlerisch ausgeführt, immerhin wird das Buch als Repetitionsmittel und Nachschlagebuch gute Dienste für Studirende leisten.

Mittheilung.

Als Geschenk für die Bibliothek des Vereins sind eingegangen:

von Herrn Dr. Frederick Brendel in Peoria (Illinois)

Bulletin of the Scientific Association Peoria Illinois. 1887.

Flora Peoriana by Frederick Brendel, welche hiemit bestens verdankt werden.

Zürich-Hottingen.

Fritz Rühl.

Anmeldungen neuer Mitglieder.

Folgende Herren:

Emil Milker in Gera.

Julius Altorfer in Zürich.

Zoologisches Institut der Universität Tübingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Sohn E.

Artikel/Article: [Beiträge zu Breplios nothum 76-77](#)