© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

15. Januar 1889. № 20. III. Jahrgang

Societas entomologica.

Journal de la Société entomologique internationale.

Toutes les correspondances devront être adressées à Mr. le président **Fritz Rühl** à **Zurich-Hottingen.** Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Organ für den internationalen Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vorstand desselben Herrn **Fritz Rühl** in **Zürich-Hottingen** zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins sind freundlich ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

Organ for the International-Entomological Society.

All letters for the Society are to be directed to Mr. **Fritz Rühl** at **Zürich-Hottingen.** The Hon. members of the Society are kindly requested to send origina contributions for the scientific part of the paper.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. 5 fl. 8 Mk. — Die Mitglieder geniessen das Recht, alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen kostenfrei zu inseriren. — Das Vereinsblatt erscheint monatlich zwei Mal (am 1. und 15.).

Descriptions d'Hyménoptères nouveaux appartenant à la famille des Chrysides par Henri Tournier de Genève.

Le remarquable travail de monsieur Frey-Gessner, touchant les Chrysides Suisses, [1]) vient à peine de paraître, que déjà, je dois décrire de nouvelles formes de ces insectes. Il semble que nos contrées, ne peuvent pas se décider à nous confier toutes les richesses qu'elles abritent et qu' elles ne nous les cédent, que sujet après sujet, afin de nous obliger à des recherches minutieuses. Quoique ayant été empêché de m'occuper d'entomologie, pendant une partie de l'année 1887 et celle de 1888 je n'ai pourtant pas pu m'abstenir totalement de chasser de temps à autre aux environs de mon habitation; mes récoltes furent mises de côté et ce n'est que depuis le premier Décembre 1888, qu'il m'a été permis de reprendre mes études favorites, sur l'entomologie. Quelle ne fût pas ma surprise, en étudiant les Chrysides de mes chasses, de constater que j'avais capturé des espèces non seulement nouvelles pour notre faune, mais encore pour la science; je m'empresse donc d'en donner les descriptions, heureux que je suis d'enrégistrer ce petit butin a l'actif de nos richesses locales.

J'y joindrai quelques notes et descriptions touchant d'autres espèces Européennes.

Omalus auratus Dahlb.: variété Obscurus Tourn.

Long. 3¼ mill. Cette jolie varieté, paraît fort rare, je ne l'ai vue dans aucune des collections que j'ai pu visiter. Elle a la taille de *l'Elampus pygmaeus* Schenck. La tête, le pro et le mesothorax, l'écusson, les cuisses et les tibias, sont d'un vert foncé, légèrement olivâtre la face de la tête, surtout au dessus de la cavité faciale est d'une teinte cuivre foncé; les antennes, le postécusson le métathorax, le ventre et les tarses sont noirs; le dessus de l'abdomen est brun avec des reflets violets très foncés, tournant par place au noir. La cavité faciale est très finement coriacée presque lisse; le reste de la tête est très grossièrement et densément ponctué, à l'exception de l'occiput, qui à partir des ocelles jusqu' au bord postérieur de la tête est presque lisse ou n'offre que quelques points épars. Le prothorax est assez fortement et densément ponctué latéralement, surtout aux angles antérieurs, le disque est presque lisse, il n'offre que quelques points fins, mal définis et inégalement distribués; le mésothorax est assez grossièrement et inégalement ponctué, la ponctuation est plus dense aux bords latéraux et au bord postérieur; le scutellum est fortement, très densément et grossièrement ponctué; le postscutellum est obtus, arrondi au milieu, mais son extrémité qui est nettement définie postérieurement par une carène bien marquée, se présente en cône arrondi au bout. Premier segment de l'abdomen court, sans ponctuation appréciable; le deuxième, deux fois aussi long que le premier, obsolétement ponctué sur le disque, lisse aux côtes latéraux; troisième segment aussi long que le deuxième, offrant sur le disque une ponctuation si fine, qu' elle n'est visible que sous un certain jour et avec un fort grossissement, l'extrémité de ce segment est légèrement incisée et au dessus de l'incision, elle offre quelques points bien visibles, quoique peu profonds.

Peney; deux exemplaires, en Juillet 1888 sur une plante de fenouil. Chez l'un deux qui est une ♀ la tarrière est bien visible.

a suivre.

[1]) Frey-Gessner Fauna insectorum helvetiae Hymenoptera. Chrysididae. Mittheil. d. Schweiz. Ent. Ges. 1887 vol. VII, Nr. 8.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Descriptions d'Hyménoptères nouveaux appartenant à la famille des Chrysides par Henri Tournier de Genève. 153