© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

ist um Salzburg und auf dem Gaisberg bis 1000 m nicht selten; fliegt auch an der Straße von Obertauern bis Tweng in 1100—1400 m Höhe, dort Stücke mit besonders breiten kurzen Flügeln. Jedenfalls auch anderwärts im Lande nicht selten. In der Größe schwanken die ♂♂ stärker als die ♀♀ (25 bis 28½ mm gegen 29—31 mm).

56. paphia L.

Ist eine der häufigsten Arten im Lande; Umgebung der Stadt Salzburg, sehr häufig auf dem Gaisberge bis zum Plateau 1286 m; dann im Bluntantale und auf dem Untersberg bis etwa 1500 m. Die ♂♂ sind oberseits in der Zeichnung sehr konstant, die Farbe tief gelbbraunrot mit manchmal mehr ins Gelbe gehender lichterer Tönung, Unterseite der Vorderflügel hochgelb, mit mehr minder breitem, grünem apex, die Hinterflügel bis zur Nymphalidenaugenreihe grün, dann scharf abgesetzt im Saumteil lebhaft rosa oder violett, die Silberbinden mehr minder breit, die inneren kurzen zur Reduktion neigend. Das männliche Geschlecht neigt mehr zum Albinismus als das weibliche, besonders teilweise, asymmetrische Albinismen vorkommend (so ein sonst normaler, lichter ♂ aus dem Bluntantale Juli 1917 mit ganz weißen Vorderflügelspitzen und weißem Fleck am Außenwinkel des linken Hinterflügels.) Die ♀♀ sind oberseits ockergelb, diese Grundfarbe durch schwärzliche Beschuppung mehr minder, besonders auf den Hinterflügeln oft vollständig ins olivenfarbene getrübt, die schwarze Zeichnung stets derb, die besonders die Mittelflecke der Vorderflügel oft so groß, daß sie ein förmliches Band bilden. Unterseits sind die Hinterflügel sattgrün bis auf den schmalen lilafarbenen Saum, die Silberbinden stets breit und wohlausgebildet. Ein ♀ aus dem Bluntantale Juli 1917 tritt aus der Serie durch mehr orangefarbene Oberseite hervor. Die dichrome ♀ ab. valesina Esp. bevorzugt feuchte Stellen im Hochgebirge (Bluntantal, Roßfeld am Göll etwa 1600 m); die schwarzgrüne Verdunkelung der Oberseite erfaßt manchmal die Hinterflügel vollständig, die Vorderflügel bis auf zwei beinweiße Zellflecke am Vorderrande außerhalb des Discus. Unterseits sind die Tiere auf den Vorderflügeln bleich ockerig mit rötlichem Schimmer und breitem grünem apex, auf den Hinterflügeln von den normalen grünlichen ♀♀ kaum verschieden; einem oberseits besonders einheitlich verdunkelten valesina-♀ vom Roßfelde am Göll fehlen die Nymphalidenaugen der Hinterflügelunterseite vollständig. Sie könnte als ab. *subcaeca* benannt werden, wenn sich diese Erscheinung öfter finden sollte.

Die Anführung von pandora Schiff. im Catalogus faunae Salisburgensis von Dr. Storch und im Schulprogramm des Gymnasiums von 1857 wurde schon von Richter als irrtümlich bezeichnet und auf Verwechslung mit valesina Esp. zurückgeführt und zeigt nur, wie wenig kritisch jener Catalogus zusammengestellt wurde. Er bildet daher auch keine brauchbare Grundlage einer neuen Zusammenstellung und ich sehe sowohl von seiner als jenes Schulprogrammes Benützung gänzlich ab, auch auf die Gefahr hin, die eine oder andere darin richtig angeführte Art so lange ausschalten zu müssen, bis die Liebenswürdigkeit anderer gegenwärtiger Salzburger Sammler diesen Anfangsversuch eines neuen Verzeichnisses mit zuverlässigen Daten ergänzt.

(Fortsetzung folgt.)

57:16.9

Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte X.

(Fortsetzung.)

Pachyneuron aphidivorum Ashm. Aphis brassicae L.
Id. p. 47
— coccorum L. Eulecanium coryli
Id. p. 69
— micans How. Siphonophora granaria Kirby
Id. p. 58
— siphonophorae Ashm. Diaeretus chenopodiaphidis Ashm.
— — — Ephedrus incompletus Prov.
Proc. Hawaiian entom. Soc. Vol. 5 p. 425
Paracopidosomopsis floridanus Ashm. Autographa brassicae
Journ. Morphol. Vol. 36 p. 1
Paracrias crassipunctatus Beq. et Roub. Roubaudia pruinosa
— — — — rufescens var. pallida
— roubaudiarum — — — bisetosus
— — — — — rufescens
Ann. Sc. nat. Zool. (10) Vol. 7 p. 231
Paranagrus osborni Full. Peregrinus maidis Ashm.
— perforator Perkins Aloha impomoeae Kirk.
Proc. Hawaiian entom. Soc. Vol. 5 p. 449
Parasierola gallicola Kieffer Cryptoblabes gnidiella Mill.
— — — Ephestia elutella Hb.
— — — Myelois ceratoniae Zell.
— — Tinetocera ocellana
— — — Tortrix viridana L.
Boll. Lab. zool. gen. agrar. Portici Vol. 17 p. 78
Periclistus caninae Htg. Cynips eglanteriae Htg.
— — — — rosarum Gir.
Meddel. Soc. Fauna Flora fennica Häft 48 p. 134
Peridesmia phytonomi Gahan Phytonomus posticus Gyl.
Journ. econ. Entom. Vol. 17 p. 625
Perilampidea larium Wolcott Baccha clavata
Journ. Dept. Agric. Porto Rico Vol. 7 p. 60
Perilissus luteolator Gr. Caliroa varipes Kl.
Meddel. Soc. Fauna Flora fennica Häft 49 p. 65
Perissopterus mexicanus How. Coccus hesperidum L.
Ann. R. Scuola sup. Agric. Portici (2) Vol. 18 No. 5 p. 68
— pulchellus — Aulacaspis pentagona Targ.
Id. p. 73
Perithous divinator Rossi Coelocrabro cinxius Dbm.
— mediator F. Saperda scalaris
Meddel. Soc. Fauna Flora fennica Häft 49 p. 64

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pezomachus rusticus Först. Tortrix viridana L.
Boll. Lab. zool. gen. agrar. Portici Vol. 17 p. 59
Phaenodiscus aeneus Dalm. Aulacaspis rosae Bouché
— — — Eulecanium persicae Fab.
Ann. R. Scuola sup. Agric. Portici (2) Vol. 18 No. 5 p. 69
Phaeogenes cacoeciae Vier. Cacoecia argyrospila
Canad. Entom. Vol. 56 p. 66
— invisor Thbg. Tortrix viridana L.
— — — Yponomeuta padellus L.
Abh. nat. Ver. Bremen Bd. 25 p. 410
— stimulator Grav. Ellopia fasciaria
— — — Hyponomeuta padellus L.
— — Tortrix viridana L.
Boll. Lab. zool. gen. agrar. Portici Vol. 17 p. 71
Entom. monthly Mag. (3) Vol. 11 p. 27
Phanurus opacus How. Icerya purchasi Mask.
Ann. R. Scuola sup. Agric. Portici (2) Vol. 18 No. 5 p. 61
— promachivorus Gahan Promachus yesonicus
Proc. U. S. nat. Mus. Vol. 65 Art. 4 p. 21
Phygadelon scaposus Thoms. Rhacodineura antiqua
Trans. entom. Soc. London 1924 p. XV
Physcus testaceus Masi Lepidosaphes ulmi L.
Ann. R. Scuola sup. Agric. Portici (2) Vol. 18 No. 5 p. 79
Phytodiaetus coryphaeus Grav. Tortrix viridana L.
— segmentator — — — —
Boll. Lab. zool. gen. agrar. Portici Vol. 17 p. 59
Entom. monthly Mag. (3) Vol. 11 p. 26
Pimpla alternans Pontania leucaspis Tischb.
— — — viminalis L.
Zoologica Bd. 24 Heft 61 p. 613
— — var. kolthoffi Aur. Apanteles brassicae L.
— — — — — — glomeratus —
Meddel. Soc. Fauna Flora fennica Häft 49 p. 64
— examinator F. Abraxas grossulariata L.
— — — Agrotis plecta L.
— — — Anthonomus pomorum L.
— — Arctia cervini Fallou
— — Cacoecia piceana L.
— — Carcina quercana F.
— — Cucullia argentea Hufn.
— artemisiae —
Cymatophora octogesima Hb.
Dicranura vinula L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Evetria buoliana Schiff.
Fumea casta Pall.
Hyponomeuta cognatellus Hb.
— evonymellus L.
— malinellus Z.
— padellus L.
Lasiocampa trifolii L.
Lymantria monacha L.
Malacosoma neustria L.
Metriostola vacciniella Z.
Oeonistis quadra L.
Ornix turquilella
— — — Pachytelia unicolor Hufn.
— — Phragmatobia fuliginosa L.
— — — Psyche viciella var. stetinensis
Pimpla examinator F. Sesia scoliaeformis Bkh.
Henig
— — Sterrhopteryx hirsutella Hb.
— — — Thaumetopoea processionea L.
— — — Tortrix viridana L.
Boll. Lab. zool. gen. agrar. Portici Vol. 17 p. 62
— flavicoxis Thoms. Tortrix viridana L.
— gallicola Gir. Pontania capreae —
— graminellae Schrk. Tortrix viridana —
— instigator F. — —
Id. p. 59
— — — Lixus anguinus L.
Id. p. 143
— maculator F. Argyresthia nitidella
— — — Coleophora tiliella
— — — Depressaria intermediella
— — — Endopira leplastriana
— — — Eurymene dolabaria
— — — Gelechia epilobiella
— — — Gonopteryx rhamni
— — — Gracillaria stigmatella
— — — Hyponomeuta padellus
— — — Lithocolletis cavella
— — — Malacosoma neustria
— — — Nephopteryx vaciniella
— — — Noctua brunnea
— — — Odonestis potatoria
— — — Psyche nitidella
— — — Tortrix chlorana
— — — — laevigana
— — — — piceana
— — — pruinana
— — — — ribeana
— — — — viridana L.
Id. p. 63
— nigriscaposa Thoms. — — —
Id. p. 59
nucum Ratz. Balaninus nucum
— — — Carpocapsa splendana
— — — Clepsis rusticana
— — — Coccix strobilella
— — Ephippiphora faeneana
Epiblema penkleriana
— Eupaecilia ciliana
Eupithecia linariata
— — — Gelechia anthyllidella
— — — inopella
— — Glyphypteryx haworthana
— — — Recurvaria nanella
— Tinetocera ocellana
— — Tortrix sorbiana
— — — — viridana L.
Id. p. 67
— roborator F. Pontania viminalis L.
Zoologica Bd. 24 Heft 61 p. 617
— rufata Gm. Acidalia triliniaria
— — — Drepana falcula
— — — Ennomos tiliaria
— — Gonopteryx rhamni
— — — Malacosoma neustria

(Fortsetzung folgt.)

Redaktion M. Rühl, Zürich VII. — Verlag Alfred Kernen, Stuttgart.
Druck von H. Laupp jr in Tübingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Societas entomologica

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Rühl Maria [Marie]

Artikel/Article: Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte X. 35-36