


rakter aufwies und von den uns vorliegenden Mand-  
schurei-Exemplaren, den Typen und Cotypen von  
*stubbendorfi* Elwes subspecies *siegfriedi* Bryk aus  
Taipinglin stark abwich, veranlaßten wir den Über-  
sender, uns weiteres Material davon zu beschaffen,  
um feststellen zu können, ob es sich um ein kon-

im allgemeinen reicher gezeichnet als die uns vor-  
liegenden Typen und Cotypen von *siegfriedi* Bryk,  
die durch das Fehlen des Mittelzweifels charakteri-  
siert sind. Unter den ♂ von *diabolicus* kommen auch  
vereinzelt solche Stücke vor, aber auch Exemplare,  
die so luxuriös gezeichnet sind, wie das unter Fig. 3



stantes Rassemersmal oder nur um eine individuelle  
Aberration handelt. Uns liegen nunmehr von den  
Fundorten Maoreschan und Gaolindsy, beide an der  
ostchinesischen Bahn zwischen den Stationen Pro-  
graniznaja und Charbin, im Juni d. J. gefangene  
34 ♀ und 50 ♂ vor, die nicht nur eine gute Über-  
sicht über die Variabilität gestatten, sondern uns auch  
berechtigen, eine Rasse abzutrennen, die den Namen  
*diabolicus* führen soll. Von den 34 ♀ sind nicht  
weniger als 29 von ausgesprochenem melaina- bis um-  
bratilis-Charakter, während nur 5 helle Grundfarbe  
zeigen, für diese Rasse also als „inversa“ n. c. zu  
bezeichnen sind. Die ♂ sind außerordentlich variabel,

abgebildete ♂, das vor allem durch die ringförmige  
Verbindung der beiden Zellflecke schon an ein „glac-  
ialis“ erinnert. ♂ und ♀ weisen bis auf vereinzelte  
Ausnahmen eine erheblich geringere Flügelgröße auf,  
als die Exemplare aus Taipinglin.

Fig. 1 Type ♂

Fig. 2 Type ♀

Fig. 3 Type ♂ inversa

Fig. 4 Type ♀ inversa.

Typen in Coll. Eisner, Dahlem, Cotypen in Coll.  
Eisner und Museum für Naturkunde, Berlin.

57 16.9

## Liste neuerdings beschriebener und ge- zogener Parasiten und ihre Wirte X.

(Fortsetzung.)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Pimpla rufata Gm. | Nephopteryx vacciniella  |
| — — —             | Pieris napi              |
| — — —             | rapae                    |
| — — —             | Platypteryx lacertinaria |
| — — —             | Psilura monacha          |
| — — —             | Psyche viciella          |
| — — —             | Sphinx ligustri          |
| — — —             | Spilosoma menthastri     |
| — — —             | Thecla quercus           |

Pimpla rufata Gm.

Tortrix laevigana  
viridana L.

Vanessa c-album

Boll. Lab. zool. gen. agrar. Portici Vol. 17 p. 65

vesicator Ratz. • Euura amerinae L.  
venusta Zadd.

Pontania capreae L.

leucaspis Tischb.

Zoologica Bd. 24 Heft 61 p. 605

vesicator Bremi

Id. p. 615

Platygaster alnicola Ashm.

Cecidomyia serrulata

antennariae

antennaria

Proc. U. S. nation. Mus. Vol. 63, Art. 15 a p. 137

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Rühl Maria [Marie]

Artikel/Article: [Liste neuerdings beschriebener und gezogener Parasiten und ihre Wirte X. 48](#)