

Societas entomologica.

Journal de la Société entomologique
internationale.

Toutes les correspondances devront être adressées à Mr. le président **Fritz Rühl** à **Zürich-Hottingen**. Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr
kostenfrei zu inseriren. — Das Vereinsblatt erscheint

Organ für den internationalen
Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vorstand desselben Herrn **Fritz Rühl** in **Zürich-Hottingen** zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins sind freundlich ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

5 fl. — 8 Mk. — Die Mitglieder genießen das Recht,

Organ for the International-Entomolo-
gical Society.

All letters for the Society are to be directed to Mr. **Fritz Rühl** at **Zürich-Hottingen**. The Hon. members of the Society are kindly requested to send original contributions for the scientific part of the paper.

alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen

Descriptions d'Hyménoptères nouveaux appartenant à la famille des Chrysidés par Henri Tournier de Genève.

V.

Notozus viridis Nov. spec.

Long 6 à 8 mill. Cette espèce ne se rapproche d'aucune de celles qui me sont connues. Entièrement d'un beau vert émeraude brillant, sans reflets bleus ou dorés. Antennes noires avec le scape vert doré; pointe du postscutellum noir; cuisses et tibiais vert émeraude; genoux légèrement dorés; tarses jaune rouille clair; segments du ventre vert émeraude, avec une très fine carène au milieu du bord postérieur de chacun, rouge doré. Article 1 du funicule des antennes, moitié, aussi long que 2, subégal à 3. Tête densément et fortement ponctuée, ponctuation plus fine et moins serrée sur l'occiput; cavité faciale, finement ridée; pro et mesothorax assez fortement; mais peu densément ponctués, surtout sur le disque où la ponctuation laisse entre elle des intervalles lisses et brillants, la ponctuation est un peu plus forte et plus serrée près des bords latéraux. Scutellum grossièrement et densément ponctué sur les côtés, moins densément au milieu où les points laissent entre eux des intervalles lisses et brillants. Postscutellum assez proéminent, subparallèle sur les côtés, arrondi au bout, à peu près de la forme de celui que l'on observe chez *N. longicornis* Tourn. grossièrement densément ponctué réticulé. Abdomen à premier segment court, assez finement et peu densément ponctué sur le milieu, plus fortement et plus densément sur les côtés, 2^e segment trois fois aussi long que le premier, ponctué de même; 3^e segment des $\frac{3}{4}$ environ aussi long que le 2^e, à ponctuation plus forte, beaucoup plus serrée, surtout vers les bords latéraux et postérieurement, où les points sont plus gros et subconfluents; partie

postérieure tronquée, incisée au bout en un demi-cercle un peu fermé, cette incision est surmontée d'un empatement en forme de croissant un peu fermé, bords latéraux avant l'incision, bisinué, le sinus antérieur faible et allongé, le postérieur un peu plus court et plus accentué; extrême bord du segment, couleur jaune colle forte, transparent. Segment du ventre très densément et assez fortement ponctué chagriné. Ecaillettes des ailes vertes; ailes très claires, hyalines. 1 ♂ 1 ♀ de Sarepta. Le ♂ est d'une taille un peu inférieure à celle de la ♀, il est plus étroit et de forme plus parallèle.

(à suivre.)

Kurze Diagnosen neuer Trichopterygier.

Von Dr. Karl Flach.

Phenidium turgidulum n. sp.

Dem formicetorum Kr. sehr nahe verwandt, kastanienbraun, merklich kleiner, kürzer gebaut, mehr von der Gestalt des turgidum Thoms., hauptsächlich unterschieden durch kleinere flachere Augen (nur 10—12 Ocellen von unten sichtbar).

L. 0,88—0,9 mm. Caucasus.

Phenidium Penzigi n. sp.

Dem vorigen nahe verwandt, aber von anderer Gestalt, Halschild so breit als die Decken, diese nach hinten stark verengt. Augen rudimentär (8 Ocellen).

L. 0,9 mm. Asia m., Cypern.

Ptilium verans n. sp.

Von caesum und affine durch den starken Glanz, kurze Behaarung und die Länge der nach vorn convergirenden geraden Seitenfurchen unterschieden; diese sind länger als die Mittellinien, alle sehr tief und schmal.

L. 0,54 mm. Corsica

Actidium Reitteri n. sp.

Zwischen concolor und Baudieri in der Form

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Descriptions d'Hyménoptères nouveaux appartenant à la famille des Chrysidés par Henri Tournier de Genève. 1](#)