

ten deutlich breit ausgezogen, hinter dem Schildchen etwas gedrückt.

1,7—1,8 mm.

10 subviolaceus Müll.

Er. pars.

Baiern, Rheinpfalz, Bosnien, Steyermark.

12. Die abwechselnden Intervalle stärker erhaben und dichter behaart, so dass die Flügeldecken weissstreifig erscheinen; diese hinter dem Schildchen kaum gedrückt und hinten weniger oder nicht vorgezogen. Halsschild meistens auch etwas kürzer. L. 1,8 mm.

var. bosniacus Apfelb. in litt.

Slavonien, Bosnien.

11. Behaarung der Oberseite entweder fehlend oder sehr sparsam und reif- oder schuppenartig. Im Uebrigen das Thier dem vorigen gleich. Die Erhebungen der Intervalle an der Schulter deutlicher, am Ende verschwindend. Flügeldecken hinter dem Schildchen deutlich gedrückt. Oberseite stark glänzend, metallisch oder schwarz. Ob eigene Art?)

L. 1,8 mm. var. auronitens Apfelb. in litt.

Krain, Bosnien.

1. Die der Naht zunächst gelegenen Intervalle sind hoch und rund gekielt, das 4. und 6. stark erhaben, die Käfer hoch gewölbt, metallisch, langbeinig, mit durch dichte und feine Punktirung metallglänzendem Halsschild, auf welchem die 2 Schrägeindrücke vor den Hinterecken sehr deutlich sind. Beine dunkel, Fühler mit rothen Anfangsgliedern. Stirne mit einem Höckerehen (nach Kolenat fronte trisulcata; vielleicht das andere Genus); sonst kommt diese Eigenschaft dem Genus Lareynia zu. Das mir vorliegende Stück zeigt diese Furchen nicht.

L. 1,8 mm. Caucasus. 10 somcheticus Kolenat.

(Schluss folgt.)

Une chasse au *Bombus alpinus* Lin.

(E. Frey-Gessner.)

II.

Mons. Camille Rosset, chanoine au Gr. St. Bernard, eût la bonne chance d'attraper un mâle, une femelle, et une trentaine d'ouvrières près du chalet la Pierre. — Moi-même, je me rendis à plusieurs reprises au même endroit, mais une fois seulement, je fus assez heureux pour capturer deux ouvrières.

Au val de Bagnes, près de l'Hôtel Mauvoisin (Gétroz), je pris une ouvrière; mais la neige venant à tomber m'empêcha de poursuivre ma chasse; dans une autre excursion au même lieu, et malgré le beau temps, je rencontrai beaucoup de Bourdons, sans voir un seul individu de l'espèce alpinus.

De Zinal dans le Val Annivier, Mr. H. Simon de Stuttgart me rapporta un beau mâle, mais mes

propres recherches dans la même localité, une, trois et cinq années plus tard restèrent sans succès.

Toutes ces captures ont été faites dans la région supérieure des Rhododendrons.

Mons. A. Humbert présenta au Musée de Genève une belle ouvrière prise au Riffelberg près de Zermatt, et je trouve dans ma collection un *Bombus alpinus* femelle avec l'étiquette: 20. Juillet 86. Gemmi. Cet individu a été récolté dans cet endroit par Mons. Paul, sur les pentes entre le col de la Gemmi et le glacier de Lämmern.

En chassant aux Hyménoptères sur une pente couverte de beaux Rhododendrons, près d'Andermatt, mon compagnon me raconta qu'à l'endroit même où nous étions, un entomologiste renommé (malheureusement j'ai oublié son nom), avait une fois trouvé le *Bombus* en question; pour moi, je n'y ai jamais rencontré cette espèce parmi le grand nombre de Bourdons que j'ai récoltés en diverses excursions dans cette localité.

Quant au Simplon, Messieurs les religieux de l'Hospice m'ont affirmé n'avoir jamais observé le *B. alpinus* L. qu'ils connaissent fort bien d'après les indications de leurs confrères MM. les Chanoines Rosset et Fabre du Mt. St. Bernard.

Voilà tout ce que je sais relativement aux localités où l'on peut trouver ce précieux insecte. Combien de fois, pour m'en procurer un certain nombre, ai-je exploré les différentes parties des hautes Alpes, parcourant soit les stations déjà connues, soit d'autres vallées où, par analogie, j'espérais trouver de nouveaux habitats de ce Bourdon!

Nous voici enfin arrivés au commencement d'une de mes nouvelles recherches, à mes excursions de 1888.

(à suivre.)

Briefkasten der Redaktion.

H. J. L. 1) Carab. *Estreicheri* kommt hier nicht vor, es ist mir unbekannt gewesen, dass er bei Ilmen heimisch ist, ich kenne ihn nur aus Südrussland. 2) Exemplare mit schwarzen Beinen habe ich bis jetzt nicht gesehen. 3) Als Einführung in das Studium der Hymenopterologie wird Taschenberg „Die Hymenoptern“ sowohl was die Uebersicht als Billigkeit betrifft, zu empfehlen sein. 4] Die Redaktion der Schweiz. Entom. Gesellschaft ist in den Händen des Dr. Stierlin in Schaffhausen. 5] Die Publikationen derselben erscheinen unter dem Titel: „Mittheil. der Schweiz. Entom. Gesellschaft. 6] Die Mittheilungen können erworben werden durch die Mitgliedschaft oder durch Bezug aus dem Commissionsverlag von Huber & Comp. in Bern. 7] Zur Zeit enthalten diese die Bestimmungs-Tabellen der Schweiz. Diptera und Hymenoptera.

Finis.

H. H. K. Der Autor zu *Anatolica integra* ist E. Reitter, Beschreibung in „Hor. Soc. Ent. Ross.“ T. XXI 1887.

H. A. B. Die Säcke der Adela-Raupen ähneln sehr denen der Nemotois Spez., ich will mich nicht an deren Bestimmung wagen.

H. S. L. Manuscript dankend erhalten, Druck keinesfalls vor Nr. 10. Mehrere unterbrochene Fort-

setzungen müssen endlich erledigt werden dazu vorher lange hier befindliche Aufsätze.

H. R. B. Dankend erhalten.

H. W. C. Ihre Beobachtungen stimmen ganz zu den meinigen, von kompetenter Seite besitze ich seit drei Wochen eine Arbeit darüber, die jedenfalls in Nr. 8 oder 9 erscheint. Wünschen werde ich Rechnung tragen.

H. C. H. und **O. H.** Dankend erhalten.

Vereins-Nachrichten.

Von der Schwedischen Entomologischen Gesellschaft zu Stockholm mit einer freundlichen Einladung zum Schriftenaustausch beehrt, wurde derselben mit Vergnügen entsprochen, und auch Jahrgang III der

Societas Entomologica gleichzeitig im Umtausch gegen den vorjährigen Jahrgang der Entom. Gesellschaft übersandt.

Zürich-Hottingen, April 1889.

Fritz Rühl.

Anmeldungen neuer Mitglieder.

Folgende Herren:

Grützner, Rektor, Falkenberg, Schlesien.

Friedr. Schneider, Buchhändler, Eschweiler b. Aachen.

Ormay Sándor, Professor, Nagy Szeben, Ungarn.

Karl Sajó, Professor, kgl. Phylloxera-Versuchsstation

Ackerbau-Ministerium, Budapest.

Georges Meyer-Daréis, London.

Linnæa, Naturhistor. Institut, Berlin.

Abzugeben

im Tausch gegen gewünschte europäische Schmetterlinge:

Phegea, Ancilla 50 Exemplare, Irorella, Lutarella, Quadra, Rubricollis, Jacobacae 100 Exemplare, Russula, Plantaginis, Hospita, Dominula, Caja, Purpurata, Lubricipeda, Heeta 30 Exemplare, Asella, Gonostigma, Chrysorrhoea 50 Exemplare, Dispar 30 Exemplare, Detrita 10 Paare, Quercus 10 Paare, Rubi 10 Paare, Potatoria 10 Paare, Quercifolia, Pavonia 10 Paare, Lacertinaria, Dromedarius, Palpina, Velitaris 20 Paare, Bucephala, Anachoreta, Cartula, Pigra, Or, Flavicornis, Caeruleocephala, Coryli 20 Exemplare, Aceris 20 Exemplare, Megacephala 20 Exemplare, Tridens, Psi, Auricoma 15 Exemplare, Rumicis 15 Exemplare, Orion, Coenobita, Signum 50 Exemplare, Exclamationis 10 Exemplare, Ypsilon 10 Exemplare, Segetum 10 Exemplare, Advena 50 Exemplare, Nebulosa 50 Exemplare, Contigua 50 Exemplare, Dissimilis, Pisi, Brassicac, Monoglypha, Lucipara, Leucostigma 10 Exemplare, ab. Fibrosa 10 Exemplare, Ochracea Arundinis, Pallens, L. album, Pyramidea, Stabilis, Macilenta, Circellaris, Citrago 15 Exemplare, Flavago 15 Exemplare, Socia, Sphinx 10 Exemplare, Fasciana, Derivalis, Pruinata, Papilionaria, Perocharia 40 Exemplare, Humiliata, Emarginata, Immorata, Fumata, Immutata, Remutaria, Ornata, Pendularia, Punctaria, Pusaria, Autumnaria, Bilunaria, Tetralunaria, Bidentata, Pennaria, Elinguaria, Dolobrararia, Prunaria, ab. Sordiatata, Luteolata, Parallelaria, Notata, Liturata, Leucophaearia, Aurantaria, Marginaria, Defoliaria, Aescularia, Pedaria, Hispidarius 30 Exemplare, Hirtarius, Stratarius 10 Exemplare, Betularius 40 Exemplare, Cinctaria, Repandata, Consortaria, Crepuscularia, Consonaria, Luridata, Atomaria, Punctularia, Piniarius, Brunneata, Purpuraria, Cervinata, Limitata, Prunata, Populata, Variata, Truncata, Didymata, Vespertaria, Fluctuata, Dilutata, Caesiata, Sociata, Albicillata, Alehemillata, Obliterata, Trifasciata, Corylata.

Otto Stertz, Breslau, Nicolai, Stadtgraben 7.

Gegen Tausch oder baar abzugeben: Eier von Saturnia. pyri 50, S. spini 40, S. carpini 15, End. versicolora 30, Agl. tau 20 Pfg. per Dutzend.

Raupen von: Las. populifolia 1 Mark, Ap. crataegi 5, Arct. caja 6, Synt phegea 5, Pent. morio (gross) 5 Pfg. per Stück.

Thais Polyxena und var. Casandra 100 Stück exlarva 1889. Billig. **C. Kelecsényi**, Tavarnok, Hungaria via N.-Tapolesány.

Batrisus Ormayi, Reitt.

Tausch gegen Raritäten europäischer Coleopteren gleichen Wertes (10 Mark). Vorrath bescheiden.

Prof. **Ormay Sándor**
in Nagy-Szeben, Ungarn
(Transsilvania).

Raupen von Callimorpha dominula, frisch gesammelt, hat abzugeben gegen andere Raupen oder Puppen **Jakob Seiler**, Buchbinder, Liestal (Schweiz).

Syrische Coleopteren in Anzahl bietet Unterzeichneter zu sehr billigem Preise an.

Ferner offerire für Museen etc. eine grössere Anzahl **syrischer Reptilien** und **Amphibien**, darunter Seltenheiten, wie: Acanthodactylus Syriacus Bttgr., Cyclophis Rothi Jan., Microclaps Mülleri Bttgr., Cyclophis coronella Schl., Chalcides Guentheri Bigr., Euneces Schneideri Daud. Ausführliche Liste wird auf Wunsch gesandt, auch über kleinasiatische und afrikanische Schlangen etc.

Carl Schneider,
Eschweiler bei Aachen.

Nehme schon jetzt Bestellungen an auf Eier nachstehend verzeichneter Arten:

Sphinx ligustri	1 Dtzd.	10 Pf.
Smerinthus		
ocellata	2	15 "
Deileph. euphorbiae	2	15 "
Saturnia pyri	1	35 "
spini	1	30 "
Raupen von Apatura		
Iris	à Stück	40 "

Porto nicht inbegriffen.

Grützner Rektor,
Falkenberg, Oberschlesien.

Im Tausche gegen Insecten oder Thierschädel abzugeben: Ein kleiner photographischer Apparat für Touristen, fast neu, sammt allem Zubehör. Preis 40 Mark.

Adresse in der Expedition des Blattes zu erfragen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Rühl Fritz

Artikel/Article: [Briefkasten der Redaktion. 26-27](#)