

# Societas entomologica.

Journal de la Société entomologique  
internationale.

Toutes les correspondances devant être adressées à Mr. le président **Fritz Rühl** à **Zürich-Hottingen**. Messieurs les membres de la société sont priés d'envoyer des contributions originales pour la partie scientifique du journal.

Jährlicher Beitrag für Mitglieder 10 Fr. = 5 fl. = 8 Mk. — Die Mitglieder genießen das Recht, alle auf Entomologie Bezug nehmenden Annoncen kostenfrei zu inseriren. — Das Vereinsblatt erscheint monatlich zwei Mal (am 1. und 15.).

Organ für den internationalen  
Entomologenverein.

Alle Zuschriften an den Verein sind an den Vorstand desselben Herrn **Fritz Rühl** in **Zürich-Hottingen** zu richten. Die Herren Mitglieder des Vereins sind freundlich ersucht, Originalbeiträge für den wissenschaftlichen Theil des Blattes einzusenden.

Organ for the International-Entomological Society.

All letters for the Society are to be directed to Mr. **Fritz Rühl** at **Zürich-Hottingen**. The Hon. members of the Society are kindly requested to send original contributions for the scientific part of the paper.

## Macrolepidopteren-Ausbeute auf dem Stifser-Joch im Sommer 1888.

Von Hermann Dürck, Cand. med.  
(Fortsetzung.)

*Lycaena* var. *Aegidion*. In sehr schönen Exemplaren an der Strasse von 2000—2300 m. nicht selten.

*Lyc. Optilete*. Auf 2000 m. ziemlich häufig in einer sehr schönen Form, nur einmal fing ich ein Exemplar über 2200 m. Die var. *cyparissus* ist mir nicht vorgekommen.

*Lyc. Baton*. Ein Exemplar über dem weissen Knott.

*Lyc. Pheretes*. Selten, nur 3 Exemplare (1 ♂) zwischen Trafoi und dem weissen Knott 1700 bis 1800 m.

*Lyc. Orbitulus*. An den Vorhügeln der Rötelspitz und über der Tartscher Alm nicht selten. 2400 m.

*Lyc. Astrarehe*. Die typische Stammform traf ich nur einmal auf 2000 m. Häufig dagegen fand ich in derselben Höhe die var. *aestiva*.

*Lyc. Eumedon*. Bis 2300 m. aufsteigend, häufig. Der Falter liebt die Nähe feuchter Stellen, Quellen etc., wo ich ihn Abends nach Sonnenuntergang häufig sitzend fand.

*Lyc. Corydon*. Ueber dem weissen Knott in kleinen Exemplaren nicht häufig.

*Lyc. Donzelii*. Von diesem Falter, welcher gewissermassen eine der Spezialitäten des Stifser Jochs bildet, gelang es mir im Laufe meines Aufenthaltes einige 70 gute Stücke zu erbeuten. Das Gros derselben ist in einer Höhe von 2000 m. gefangen. Der tiefste Fundort war etwas unter Trafoi 1500 m., wo ich 3 Exemplare fing. Unter den Pflanzen scheint er eine nicht selten vorkommende *Ranunculus* Art zu bevorzugen, welche auch die Nährpflanze der Raupe sein dürfte.

*Lyc. minima*. Nicht selten um 2000 m. \*)

*Lyc. Semiargus*. Neben der häufigen Stammform kommt vereinzelt eine Abart *montana* Stdgr. um den weissen Knott vor.

*Lyc. Arion*. Von dieser *Lycaena* kommt eine sehr dunkle alpine Form am weissen Knott bis 2100 m. vor. (Auch von Wocke erwähnt.)

*Melitaea Cynthia*. In schönen sehr weissen Exemplaren am vorderen Grat 2300—2400 m., ferner an der Rötelspitz 2300 m. und bei Santa Maria bis 2500 m.

*Mel. var. Merope*. Sehr häufig um und über Franzeshöhe 2000—2500 m. und höher. Eine sehr schöne Abnormität (*Nigrino*) fing ich an der Rötelspitz 2500 m.

*Mel. Phoebe*. Nicht selten um den weissen Knott.

*Mel. Dietyntna*. Gemein, bis 2000 m.

*Mel. Athalia*. Sehr häufig, bis 2100 m. Ich fing auch einige recht hübsche Varietäten, darunter eine ab. *Corythalia*.

*Mel. var. varia*. Gemein von 1900—2300 m. besonders kurz über Franzeshöhe.

*Argynnis Pales*. Mehrmals über Franzeshöhe und an der Roetelspitz 2400 m.

*Arg. Amathusia*. Zwei Exemplare auf 2000 m.

*Arg. Aglaja*. Bis über den weissen Knott häufig.

*Arg. ab. Eris*. Unterhalb Trafoi 1500—2000 m. ziemlich häufig.

(Fortsetzung folgt.)

## Une chasse au *Bombus alpinus* Lin.

(E. Frey-Gessner.)

III.

Comme on le voit, jusqu' alors mes ressources étaient insuffisantes pour satisfaire aux nombreuses

\*) Die von Wocke in seiner „Fauna des Stifser Jochs“ (Zeitschrift des schles. Entom. Vereins 1875, 76, 77) erwähnte *Lycaena Sebrus* konnte ich nicht finden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Dürck Hermann

Artikel/Article: [Macrolepidopteren-Ausbeute auf dem Stilfser-Joch im Sommer 1888. 31](#)