

von A. Flavia gefunden, sonst gab es noch zahlreiche *Erebia Mnestra*, *Euryale*, var. *Adyte*, *Melampus*, *Lyc. Eros*, *Pheretes*, *Orbitulus* und einzelne *Plus. bractea*, denen sich an den Felsen vor Bergün noch einzelne *Geometriden* anschlossen.
(Fortsetzung folgt.)

Petites excursions en 1891.

Par E. Frey-Gessner.

(Suite.)

A huit heures et demi nous quittâmes le sommet, à neuf heures trois quart nous prenons notre déjeuner au chalet: une bouteille de bon vin blanc, du fromage de Gruyères et du pain, et à dix heures vingt-cinq nous nous mîmes en route pour descendre dans la direction de Châtel St-Denis. Le tenancier du chalet nous demandait quatre francs et j'ajoutai les 50 centimes habituels. C'était bien un autre prix qu'à Anzeindaz, mais il faut réfléchir, nous n'avions pas une omelette ici, mais une chambre beaucoup plus propre et agréable qu'à Anzeindaz.

La descente était d'abord à peu près comme la montée, avec des *Aconites* visités par des *B. Gerstaeckeri*, surtout beaucoup de terrain humide à traverser, puis des pentes boisées jusqu'enfin au fond du ravin le sentier nous conduisit à travers le ruisseau dans le bon chemin. Sur ce versant méridional du Moléson un jeune collectionneur de papillons de la connaissance de M. Ch. Blachier a trouvé cette année (1891) à la fin du mois de Juin quelques exemplaires du *Polyommatus Amphidamus* Esp.; que ce papillon ne se présenta pas à mes yeux ce jour-ci, le 11 Septembre, n'est point étonnant. A une heure trente nous étions arrivés à Châtel St-Denis, une heure après à Palézieux et le soir à la maison à Genève; moi très-content d'avoir trouvé si près un habitat du *Bombus Gerstaeckeri*.

4. Les Rochers de Naye (2045 m.).

La section genevoise du Club alpin suisse avait fixé pour une de ses promenades du dimanche le 13 Septembre; on devait monter les Rochers de Naye par le contrefort de Sonchaux.

Mr. Alexandre Yersin avait trouvé dans son temps sur les alpages des Rochers de Naye le *Stenobothrus apicarius* Zett. Il y a une douzaine d'années j'arrivai moi-même un soir à Veytaux dans l'intention d'aller à la recherche de cet *Orthoptère* dont je ne connaissais pas encore d'autre habitat en Suisse; mais une pluie torrentielle

m'obligea à retourner à Genève. Quelques années plus tard, dans une de mes nombreuses excursions dans le haut Jura aux environs de Genève, je trouvai un seul individu mâle de cette espèce en montant le Reculet, à 1500 m. d'altitude à peu près.

Je profitai donc de l'occasion que m'offrait le Club alpin pour tenter de nouveau la visite des Rochers de Naye. Le temps fut splendide toute la journée et la vue magnifique. Quant aux insectes, je voyais sur les fleurs quelques *Bourbons*, *Bombus mastrucatus* Gerst., *Soroensis* Linn. var. *Proteus* Gerst., *variabilis* Schmdk., et ce qui me vexait le plus, des *Bombus Gerstaeckeri* Mor. sur les nombreux *Aconitum napellus* qui croissaient dans les pentes du versant ouest de la crête à une altitude de 1800 m. environ. Pourquoi j'étais vexé? C'est que je n'avais pas de flacon à cyanure dans ma poche! En partant de bon matin dans l'obscurité je l'avais laissé à la maison sur la cheminée.

Le samedi prochain après-midi par une journée aussi belle que le dimanche passé j'étais de nouveau en route pour les Rochers de Naye; ma fille m'accompagnait. Nous avions l'intention de coucher dans ce grand hôtel En Caux, qui est indiqué sur la carte détaillée feuille No. 465 de l'atlas suisse; mais comme assez souvent dans ma vie, il fallut modifier mon itinéraire. A Territet au guichet du funiculaire je demandais deux billets jusqu'au bout. Bon! A Glion tout le monde descend, je m'informe au sujet de la continuation jusqu'en Caux. „La voie n'est pas encore construite.“ — Pourtant sur cette même feuille No. 465 la ligne est marquée comme si elle était en activité. „Et l'hôtel En Caux?“ „Il est en construction.“ „Ah!“ On nous explique, qu'En Caux il existe bien une petite auberge, mais qui est occupée en ce moment par les ingénieurs du chemin de fer aux Rochers de Naye. On téléphone pour demander s'il y a de la place pour deux touristes. Point de réponse. Nous attendons une demi-heure dans une buvette en nous régaland d'un demi-litre de bon vin Vaudois. Point de réponse. Eh bien! allons en avant! Aux Avants il y a un grand hôtel, et là-haut, à 972 mètres d'altitude nous serons plus près des Rochers qu'En Caux; et nous y arriverons bien encore avant la tombée de la nuit. Donc au lieu de monter la route d'En Caux, nous nous dirigeons à gauche où un indicateur nous fait voir: les Avants. — Le chemin est très agréable, il monte

insensiblement en longeant le profond ravin du Chanderon. Nous montons et montons toujours; mais où est donc le chemin aux Avants? Nous sommes déjà au niveau du grand hôtel, que nous voyons vis à vis, séparé de nous par le profond ravin. Nous n'aimons point à descendre pour avoir à remonter de l'autre côté. Voici un homme! Non, c'est un montagnard bien jeune dont le chapeau garni de fleurs prouve qu'il vient d'en haut. „Où ce chemin conduit-il?“ „Au Col de Jaman.“ „Est-ce qu'on peut loger là-haut?“ „Mais oui, il y a une bonne auberge.“ „Merci bien, bon voyage.“ Au lieu d'aller coucher aux Avants, allons donc directement au Col de Jaman; à 1516 mètres s. m. nous serons encore plus près de notre but pour le lendemain.

(A suivre.)

Einige kurze lepidopterologische Mittheilungen.

Von Fritz Rühl.

(Schluss.)

So viel von Zürich, und ich erlaube mir, an unsere Mitglieder die Bitte zu richten, aus ihren Faunengebieten zu Handen des Blattes Beobachtungen über das Auftreten von zwei Generationen in diesem Jahre einzusenden.

Unser Mitglied Hr. Tomala in Budapest theilt mir mit, dass er von unserm Mitglied Hrn. Damry in Sassari Puppen heuriger Generation von *Pap. Hospiton* bezogen hat, deren Entwicklung also im Mai nächsten Jahres zu erwarten stand, aber — schon am 18. August heurigen Jahres hatte sich der erste *Hospiton* entwickelt. Derselbe Hr. Tomala hat im Ofener Gebirge eine *Parn. Mnemosyne* gefangen, der beigefügten guten Zeichnung nach ein ♂; dieses Exemplar zeigt Rippe 2 der Hinterflügel gegabelt, der Ursprung der Rippe ist normal, die Gabelung nimmt nur den Aussenrand ein. Herr Damry hat eine neue *Zygaena* entdeckt in Sardinien, welche P. Mabille als *Zyg. sardea* in *Soc. Ent. de France* beschrieben hat, der Beschreibung nach (gesehen habe ich kein Exemplar) würde ich sie für eine Varietät von *carniolica* halten. Unser Mitglied Herr Jak. Seiler in Liestal theilt mir als Merkwürdigkeit mit, dass er heuer Raupen von *Pleret. matronula* aus dem Ei gezogen hat, welche (sein Brief vom 28 August meldet mir den totalen Untergang der Zucht) bis zum August bereits die fünfte Häutung gemacht hatten, gewiss also ein beredtes Zeugnis für deren schnelles Wachstum in unserm heurigen heissen Jahrgang. *Lygris testata*, sonst nie vor Ende September bei

Zürich gefangen, fliegt bereits seit 25. August. Es fiel mir sehr auf, im Albulathal, wenn auch in geschützter Lage, Col. Edusa, die natürlich in den Alpen nur eine Generation hat, schon im ersten Drittel des Juli vorzufinden; seit Jahren traf ich sie dort nie vor Ende Juli, um Zürich flog sie, wie bereits erwähnt, in der zweiten Hälfte des August, eigenthümlich, dass *Edusa* meines Wissens mir noch nie in erster Generation um Zürich begegnet ist.

Der Güte unsers Mitgliedes Mons. F. Pouly-Steinlen à Lausanne verdanke ich die exakt ausgeführte und colorirte Photographie einer Aberration von *Deileph. hippophaës* Esp. Das Stück ist jedenfalls ein *Unicum*. Fühler, Kopf, Thorax, Hinterleib bieten keine auffallenden Momente, den Umstand, dass die Hinterleibssegmente viel stärker schwarz abgetheilt erscheinen, als bei *hippophaës*, ziehe ich nicht in Betracht, ich setze das auf Rechnung einer zu starken Coloratur. Auffallend aber ist ein grosser lichter Punkt, mehr gelblich angeflogen, sonst von der Färbung des lichten Mittelfeldes, er steht nur auf der linken Vorderflügelseite, oberhalb des dunkel-olivengrünen Wisches zwischen Rippe 6 und 7 am Vorderrand. Auf dem rechten Vorderflügel fehlt dieser sehr in die Augen springende abnorme Punkt, dagegen tritt auf Rippe 5 in dem lichten Aussenrandstheil ein kleiner weisser und kurzer Strich auf. Die bei normalen *hippophaës* trübrotthe Mittelbinde der Hinterflügel ist bei der Aberration safrangelb, gegen den Vorderrand dunkler gelb, der bei *hippophaës* stets vorhandene weisse Fleck am Innenwinkel fehlt hier ganz. Den Mittheilungen des glücklichen Besitzers dieser auffallenden Aberration entnehme ich Folgendes: Die Raupe dieses Schmetterlings wurde von ihm mit mehreren andern Raupen von *D. hippophaës* im Juni 1891 an den Ufern der Rhone zwischen St. Maurice und den Bädern von Lavey (Kantone Waadt und Wallis) an *Hippophaës rhamnoides* gefunden und mit dieser Pflanze erzogen. Im Juni 1891 entwickelte sich diese Aberration, gleichzeitig mit den übrigen *hippophaës*, die alle normal ausgefallen sind. Das rothe Band der Hinterflügel ist fast allen *Deilephila*-Arten gemeinsam, von *D. euphorbiae* und *D. gallii* sind sehr seltene einzelne Stücke mit gelbem Band der Hinterflügel bekannt, von *D. hippophaës* kenne ich kein zweites solches Exemplar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Frey-Gessner E.

Artikel/Article: [Petites excursions en 1891. 92-93](#)