

nach 14 Tagen die jungen Raupchen ergaben, welche gerne die jungen zarten Stengel des Heracleum verzehrten. Durch ein Missgeschick kamen alle Raupchen bis auf 2 um und auch die letzten beiden gingen noch kurz vor der Verpuppung zu Grunde, weil ich krank wurde und daruber die Futterung vergass. Im Fruhjahr 1892 erhielt ich allerdings durch Hrn. Direktor W. Petersen wieder einige Eier von einem frisch gefangenen ♂, aber die Raupchen kamen fruher aus, als ich Futter herbeischaffen konnte, mussten am Hungertuch nagen: ich erhielt nur einen einzigen Schmetterling, ein ♂ schon im Juli. Meine Versuche, damit ♂♂ anzulocken, waren vergebens; sie mussten dies sein, da um diese Zeit in Freiheit entwickelte ♂♂ noch nicht vorhanden sind. Ausser den erwahnten Zuchtversuchen meinerseits sind solche hier meines Wissens noch nicht angestellt worden. Im Herbst 1892 endlich hat Herr von Haecks in der Vorstadt ein ♂ am Fenster gefangen und ich glaube, dass mit meiner Mittheilung nun alle Zweifel an dem Vorkommen von *Das. templi* in hiesiger Fauna verschwinden mussen.

Lycaena Corydon ab. *Sohni* n. ab.*)

Alis antieis, postieisque subtus ino cellatis:

Ein Parchen dieser eigenthumlichen Aberration hatte Herr Otto Sohn in Dusseldorf die Gute mir zur Beschreibung zu ubersenden, ich benenne die Ab. zu Ehren des Entdeckers: Es fehlt auf der Unterseite der Vorderflugel nicht nur die auswarts des Mittelmondes bei normalen *Corydon* stets auftretende Augenbinde, die gewohnlich im oberen Theil aus 4 einen schwachen Bogen bildenden, schwarzen, weissgekernten Augenpunkten und 3 solchen etwas wurzelwarts geruckten besteht, sondern es fehlen auch die beiden Basalpunkte. Auf den Hinterflugeln fehlt beim ♂ jede Spur der Mittelbinde, es ist nur der Mittelmond und die normale Saumbinde vorhanden, beim ♀ indess 2 Augenpunkte, einer am Vorderrand und einer in der Mitte und zwar so, dass gerade der Mittelmond zwischen beiden liegt. Eigenthumlich ist der Umstand, dass beide Exemplare am rechten Hinterflugel verkruppelt sind.

Im Juli bei Engelberg in der Schweiz gefangen.

*) Zu der in No. 23 beschriebenen *Pheretes* Aberr. theilt mir Herr Bau in Berlin mit, dass er im vorigen Jahr ein gleiches Exemplar ♂ bei Ronte (Tyrol) gefangen habe. Herr Benteli in Bern besitzt sie aus dem Wallis; es ist diese Form also auch weiter verbreitet. Fritz Ruhl.

Literaturbericht.

Materialien zu einer Lepidopterenfauna Galiziens nebst systematischen und biologischen Beitragen von Thadd. Garbowski. Wien 1893. in Commission bei F. Tempsky, Buchhandler der kais. Academie der Wissenschaften.

Die letzthin bereits erwahnte Arbeit liegt nun vor mir. Schon die Einleitung „Physiographisches“ zeigt, dass der Autor das von ihm betretene Gebiet vollstandig beherrscht; namentlich sind die geologischen, botanischen und geographischen Notizen von grosstem Interesse. ebenso die vergleichenden barometrischen Messungen. Der spezielle Theil der Fauna ist mit besonderer Sorgfalt behandelt: durch werthvolle, grossentheils personliche Untersuchungen und Beobachtungen gewinnt dieser Abschnitt ungemein. Die ubersichtliche Anordnung der Arten aber lasst zu wunschen ubrig; aus mir unerklarlichen Grunden findet sich am Schluss der behandelten *Rhopaloceren* z. B. noch ein Verzeichniss mit dem Vermerk: Ausser den genannten leben in Galizien noch folgende *Rhopaloceren* etc. und dies Verzeichniss ist sehr reichhaltig. Eine Menge Namen des Staudinger Katalogs sind ausgemerzt, durch andere ersetzt, ja die ganz alten, halb vergessenen Genera-Namen wieder hervorgesucht. Neu ist die Einfuhrung der Bezeichnung: „forma“ neben den bereits bestehenden und aufrecht erhaltenen ab. und var. Wohl hat der geehrte Autor diese Neuerung zu motiviren versucht; ob es ihm gelingt diese Bezeichnung einzufuhren, weiss ich nicht.

Fur Faunisten und jeden Lepidopterologen, der sich dafur interessirt, wie es ausserhalb seiner vier Grenzplahle aussieht, ist die sonst sehr gediegene und fleissige Arbeit bestens zu empfehlen. F. R.

Vereins-Bibliothek.

Von Herrn J. W. Tutt in London sind als Geschenk eingegangen:

Secondary Sexual Characters in Lepidoptera by J. W. Tutt.

Stray Notes on the Noctuae by J. W. Tutt.

Von Herrn C. von Hornuzaki in Czernowitz sind folgende von ihm verfasste Abhandlungen als Geschenk eingegangen:

Beschreibung einiger neuen Tagfalter-Varietaten aus der Bukowina und den Nachbargebieten.

Zur systematischen Begrenzung der Gattungen *Satyryx* Latr. und *Epinephele* Hb.

Lepidopterologische Beobachtungen in der Bukowina. Ein neuer Beitrag zur Kenntniss der in der Bukowina einheimischen Coleopteren.

Vom Wiener Entomolog. Verein als Geschenk:
Der III. Jahresbericht 1892.

Der Empfang wird dankend bestätigt.
Fritz Rühl.

Vereinsnachrichten.

Einer freundlichen Einladung von «The American Entomological Society» in Philadelphia zum Schriftenaustausch wurde mit Vergnügen entsprochen.

Fritz Rühl.

Briefkasten der Redaktion.

Hr. A. v. C. Nach approximativer Schätzung, die sicher nicht zu hoch gegriffen ist, wird mein Werk etwa eine Million nur ganz zuverlässiger Ausgaben in dieser Beziehung enthalten, begreiflich, dass ich da keine Notizen über diese machen konnte; ich erinnere mich nicht mehr.

Hr. K. S. Von Nr. 1 an folgt eine ganze Serie interessanter coleopterologischer Artikel.

Hr. C. von H. Dankend erhalten. Die früher gesandten Artikel werden in Nr. 1 beginnen.

Hr. B. Ein sehr seltener Fall.

Meinem Ansuchen um zuverlässige Local-Faunen wurde von verschiedenen Seiten durch Zusendung von solchen so bereitwillig entsprochen, dass ich hiemit öffentlich gerne meinen Dank ausspreche.

Fritz Rühl.

Anmeldungen neuer Mitglieder.

Herr Dr. Hermann Dürk, Assistent am patholog. Institut der Universität München.

Dr. med. L. Müller, Berlin.

Beruhard, Bernina Häuser (Schweiz).

Anzeigen.

Societas Entomologica,

Jahrg. I—VII complet, so viel überhaupt erschienen, sofort abzugeben für 40 Mk. baar.

Josef Schernhammer, Wien XV, Märzstr. 32.

Habe abzugeben:

Prof. Dr. Thomé's **Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz**, Band I und II mit 320 Tafeln in Farbendruck, eleg. geb. (neu); im Tausch gegen Schweizer Lepidopteren pr. 24 Mk. Doublettenliste erbeten an: Viktor Treudt, Sparkassenbeamter, in Graz (Steiermark), Schmiedgasse 2.

Kräftige Puppen von *Pleret. matronula*.

Habe nach dem 1. April d. J. abzugeben à Stück 3 Mk., Porto 20 Pf., Versandt gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Bestellungen nehme schon jetzt entgegen. Abzugeben im Tausch gegen europ. Cicind., Carabie., Cerambyc., besonders *Clytus*, *Rosalia*, *Purpuricen*, *Dorcadion* etc., Buprestidae u. s. w., Heft 1—25 vom grossen Lindenberg'schen Handbuch der Briefmarkenkunde, sowie 4 Jahrgänge der Hietmann'schen illustr. Briefmarkenzeitung, ebenso schöne exot. Falter, wie *Charax. Fabius*, *Moori*, *sangarida*, *Pap. ceylonica*, *Anchises*, *Mylotes*, *Pieris Neomba* etc.

Wilhelm Gruner, Spremberg, Lausitz.

Habe abzugeben Eier von *Catoc. fraxini* Dtzd. 20 Pf., 100 St. 1 Mk. 20 Pf., Raupen von *Bx. rubi* Dtzd. 80 Pf.

Empfehle Reisetaschen von grossem Format, mit getrennten Taschen und Fächern für alle Utensilien zum Köderfang, aus Ledertuch 5 Mk. oder aus Leder 8 Mk. gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung. Julius Kaser, Falkenberg, Oberschlesien.

Von *Drurya Antimachus*,

der wunderbarsten Papilioform der Erde, haben wir einige gute, weniger schöne ♂♂ zu 50—75 Mk. per Stück per Cassa abzugeben.

O. Staudinger & A. Bang-Haas,
Blasewitz-Dresden.

Abzugeben Eier von *Catoc. fraxini* und von *nupta* und *elocata*, letztere beiden gemischt. 50 St. 75 Pf., 100 St. 1 Mk. 25 Pf.


F. Hoffmann, Lehrer,
Kirchberg bei Koppitz, Schlesien.


Offenire *Melanarg. Suwarovius* 50 Pf., *Zyg. pilosellae* var. *sareptensis* 1 Mk., *Hyp. Thrips* 2 Mk. 50 Pf., *Agrot. isaudica*, var. *rossica* 6 Mk., *Helioph. Cora* 10 Mk., *Agrot. basigramma* 5 Mk., *Mam. Leineri*, var. *cervina* 4 Mk., *Sat. Heydenreichii*, var. *nana* 60 Pf., *Col. Erate* ♂ 50 Pf., *Pol. var. margellanica* 1 Mk. 50 Pf., *Th. mirabilis* 1 Mk. 50 Pf., *Sat. Josephi* 1 Mk. 50 Pf., *lehana* 4 Mk. 50 Pf., *Kaufmanni* ♂ 4 Mk., *Lyc. Amor* 80 Pf., *Jolas* var. *gigantea* 5 Mk., *Icarus* var. *turanica* 80 Pf., *Pier. Leucodice* var. *altensis* 70 Pf., *Pol. Solskyi* 1 Mk. 50 Pf., *Lim. Lepechini* ♂ 6 Mk., ♂ 15 Mk., *Mel. sibina* 80 Pf., *Par. Eversmanni* ♂ 1 Mk., *Epin. Lyaon* var. *turanica* ♂ 40, ♀ 60 Pf., *Häberhaueri* 1 Mk., *naubidensis* 1 Mk.


H. Kreye, Hannover.

Seidene Fangnetze.

Das beste Fangnetz wird hergestellt aus seidener Müllergaze Nr. 000. Vorzüge gegenüber andern: Falter werden nicht beschädigt — Unzerreissbarkeit — einmalige Ausgabe.

 **Zugeschnittenes Netz** für 1 Ring von 30 cm. Durchmesser 3 Mk. 60 Pf. (4½ Fr.)

 **Vierth. Stahlring**, nichts gelörhet, unübertrefflich solid, exakt und leicht, passend an jeden Stock, 1 Mk. 60 Pf. (2 Fr.)

 **Completes Seidenetz**, fertig zum Gebrauch, 5 Mk. 60 Pf. (7 Fr.). Bei Voreinsendung des Betrages erfolgt Zusendung **überallhin** franco.

Graf-Krüst, Gais, Schweiz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Rühl Fritz

Artikel/Article: [Vereins-Bibliothek 190-191](#)