

## Neue Madagassische Cleriden.

Diagnosen von A. Kewert in Wernsdorf.

### 1. *Pallenis nigricollis*.

Coeruleus, prothorace nigro subtiliter punctato, elytris fortiter punctatoseriatis, postice haud punctatis, pectore, abdomine, palpis, antennis pedibusque nigris. 5 mmtr.

### 2. *Pallenis unicolor*.

Coeruleus, cyanescens, nitidus, elytris punctatoseriatis, palpis antennis pedibusque nigris. 5 – 6 mmtr.

### 3. *Pallenis 4 signatus*.

Angustus, niger, splendens, scutello griseopubescente, quatuor elytrorum maculis niveis, mesosterno et metasterno in lateribus albomaculatis 4,75 mmtr.

### 4. *Stenocylidrus 7 punctatus*.

Supra niger, scutello albo, prothorace postice in medio longitudinale alba linea signato, elytris striatopunctatis, postice alboerinitis singulariterque rotundatis, utroque tribus punctis niveis et in dorso duabus transversis vittis rufis signato; subtus rufescens: ultimo palporum articulo labialium oblongo et pugioniforme parum curvato in latere externo excavato; palpis totis rufis. 7,5 mmtr.

### 5. *Stenocylidrus flavilabris*.

Linearis, niger, scutello niveo, elytrorum utroque tribus punctis niveis signato et in apice griseocrinito rotundato que. Labrum, palpi ultimique abdominis segmentum et primi antennarum duo articuli flavi vel rufescentes. 6 mmtr.

### *Pseudopallenis* nov. gen. (Περίδωξ)

A genere „*Pallenis*“ excepta coleopterorum parva magnitudine divergens elytris paullo deplanatis, post humeros vix contractis, singulis prope scutellum in dorso nituberculatis, pone medium fascia eburnea unifasciatis, punctorum seriebus post fasciam extinctis.

### 6. *Pseudopallenis humerallosus*.

Angustus, niger, splendens, elytris fascia flavescente eburnea fasciatis, antice in utroque unicallosis, tibiis mediis-posterioribusque flavis. 3 mmtr.

### *Aplinoclerus* nov. gen. (Απλίνος, gen. col.)

A genere „*Dizocolletus*“ divergens triangulari extremo articulo palporum omnium. Elytra antice angustissima latitudine mesosterni sensim fortiterque ad posteriorem partem dilatata.

### 7. *Aplinoclerus dezocolletoides*.

Niger, griseis singulis et longis erectis crinibus in omnibus corporis partibus crinitus, elytris abdomineque antice angustissimis, postice fortiter dilatatis,

antice feriato punctatis, post medium flava fascia curvata in medio interrupta signatis. 6 mmtr.

### 8. *Eburifera coerulea*.

Angusta, coerulea, antennis palpis pedibusque flavis vel rufotestaceis, elytris antice striatopunctatis, postice irregulariter punctatis, scutello albo 6,2 mmtr.

### 9. *Eburifera analis*.

Angusta, nigra, pilosa, capite prothoraceque densepunctatis, scutello niveo, elytris antice dense seriatopunctatis, postice irregulariter densepunctatis, utroque duabus maculis eburneis et posteriore quidem commaforme signato, postice griseocrinitis, abdominis tribus ultimis segmentis, coxis etiam femorumque initiis flavotestaceis, palpis brunneotestaceis, antennis tarsisque brunneis. 6,5 mmtr.

### 10. *Eburifera Klugei*.

Angusta, rufa, nigro capite, prothorace nigromaculato, scutello niveo, elytrorum utroque duabus maculis eburneis, et anteriore quidem punctiforme, posteriore commaforme signato et prope scutellum nigro, deinde duabus maculis magnis macula commaforme dimidiatis, nigris oblongisque maculato, postice griseo crinito. Femora nigromaculata, 8 mmtr.

### 11. *Eburifera variegata*.

Angusta, capite, prothoraceque nigris et densepunctatis, elytris impunctatis antice rubrotestaceis, postice nigris, quatuor maculis eburneis punctiformibusque. 2 ante et 2 post medium signatis, subtus rubrotestacea. Femora nigro apicata. Segmenta abdominis nigra. Scutellum album. 6 mmtr.

### 12. *Eburifera obscuripes*.

Linearis, nigra, pedibus fuscis, femorum initiis flavis, tarsis tiliarumque exitiis rufescentibus, abdominis ultimo segmento rufescente, quatuor elytrorum non punctatorum maculis punctiformibus eburneis, scutello albo. 6 mmtr.

### 13. *Eburifera 4 punctata*.

Linearis, nigra, metallica, quatuor eburneis elytrorum maculis punctiformibus, scutello albo, antennis, palpis pedibusque flavis. 6 mmtr.

### 14. *Eburifera impunctata*.

Linearis, nigra, vix metallescens, elytris immaculatis impunctatis glabrisque, scutello albo, pedibus palpis antennisque flavorufescentibus, ultimo abdominis segmento rubrotestaceo. 8 mmtr.

### 15. *Eburifera unifasciata*.

Nigra, glaberrima, fere nitida, antennarum primis ultimisque articulis brunneis, fascia flava et angusta elytra dimidiante. 5 mmtr.

**Sikorius nov. gen.** (Sikora nom. propr.)

Oculi fortissime prominentes, antice excisi. Antennae articulis 11 in oculorum excavatione insertae, articulis 3 ultimis communiter in fortem clavam unitis. Palporum ultimus articulus triangularis, fere planatus. Prothorax nec antice nec postice coarctatus, vix in lateribus arcuatus. Tarsi breves 4 articulis.

**16. Sikorius Sikorae.**

Niger, elytris coerulescentibus, palpis antennis pedibusque flavis. Prothorax profunde et dilate punctatus, nitidus. Elytra profunde densissimeque usque post medium seriatopunctata, ad finem vix rufescentem impunctata, glabra. 3 mmtr.

**Spinolarius n. gen.**

Antennae 11 articulis serratis non clavatae. Oculi integri. Tarsi tenues, quatuor articulis, duobus mediis lamellatis. Femora posteriora ad abdominis finem praelongata. Palporum ultimi articuli fere cylindracei et acuti. Prothorax quadripartitus, sicut in genere „Enoplium“ et „Ichnea“.

**17. Spinolarius hizonatus.**

Niger, nitidus, oculis pallidis. Antennae serratae flavescens articulis 8, 9 et 10<sup>o</sup> obscurefuscis. Elytra antice punctata, postice nitidissima, duobus flavis fasciis transversis signata. Initia femorum flavescens. 3 mmtr.

**De quelques genres de Blattes.**

Par HENRI DE SAUSSURE.

(Fin.)

**Tribu des Prosoplectiens.**

*Chorisonenridae*, Brunner de Wattenwyl,  
*Nouv. Syst. d. Blattaires.*

## GENRE HEMIPTEROTA, n.

Habitus generis *Ceratinopterae*, Br. — Vertex vix prominulus. Pronotum majusculum, corneum transverse parabolicum. Elytra cornea, polita abdominis longitudine vel breviora, in modo generis *Chorisonerae* venosa, venis longitudinalibus 2, haud punctato-striata. Alae rudimentariae. Femora subtus inermia. Cerei longiusculi. Pedes robusti. — Feminarum lamina supraanalis trigonalis, apice incisa; ultimum segmentum ventrale apice minute compressum. Sunt. *Chorisonerae* elytris et alis abbreviatis.)

1. **H. punctipes**, n. Fulvo-testacea; elytris ♂ abdominis apicem liberantia. L. 8, 7 mm. — Peru.

**Tribu des Panchloriens.**

## GENRE ACHROBLATTA, n.

Caput obtectum. Antennae subgraciles. Pronotum coriaceo-rugulosum, margine postico quam anticus multo magis arcuato, marginibus lateralibus haud deflexis. Elytra et alae in modo generis *Panchlorae* venosa; illa subcoriacea, parallela. Femora subtus spina apicali nulla. Lamina supraanalis transverse quadrata, incisa vel bilobata. — Insecta picta, pallide colorata, generi *Panchlorae* affinia.

1. **A. luteola**, Blanch. (*Paratropes histrio*, Sss.) — America tropicalis.

## GENRE CAPUCINA, n.

Corpus deplatum. Caput minutum, reconditum. Pronotum et elytra ampla, rugulosa, pubescentia, Pronotum subplanum, transverse fusiforme margine postico arcuato, disco cucullato. Elytra longa ac latissima, apice late rotundata, sulco anali valde arcuato. Femora inermia. Abdomen latum, obtuse serratum. Lamina supraanalis ♂ prominula, transversa, subquadrata, incisa. Cerei deplanati, breves. — Generi *Zetoborae* affine Genus.

1. **C. cucullata**, n., Fulvo-brunea; abdomine luteo-marginato: pronoto minute granuloso ac punctato. ♂ L. 30; latit. pronoti 16,5 mm. — *America centrali.*

**Tribu des Blaberiens.**

## GENRE ARCHIMANDRITA, n.

Corpus latum, deplanatum. Caput obtectum. Pronotum maximum, ellipticum, haud distincte cucullatum. Elytra letissima, coriacea, apice late rotundata, longa vel abbreviata, Lamina supraanalis apice haud attenuata, margine postico arcuato, inciso. Cerei longiusculi. Femora 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> spina geniculari brevi instructa, subtus inermia; 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> subtus utrinque spina apicali armata. Cerei longiusculi. — Genus americanae meridionali proprium.

1. **A. marmorata**, Stoll. (*Blabera dicoidalis*, Serv.).  
2. **A. deplanata**, Sss., Mém. Mex. Blatt. (*Blabera*).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Societas entomologica](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Kuwert August Ferdinand

Artikel/Article: [Neue Madagassische Cleriden. 66-67](#)