©Zoologische Staatssammlung München;download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

SPIXIANA	4	3	317	München, 1. November 1981	ISSN 0341-8391

Camposimyia als neuer Name für Camposia

(Diptera, Chironomidae)

Von Friedrich Reiss

Zoologische Staatssammlung München

Bei der Zusammenstellung aller nominellen Chironomidengattungen durch Herrn Patrick Ashe, University of Dublin, zeigte sich, daß der für die südchilenische Chironomidenart *echinata* eingeführte Gattungsname *Camposia* (Reiss 1972) präokkupiert ist. Der Name *Camposia* wurde erstmals von Desmarest (1823: 259) für eine Gattung der Crustacea (Reptantia) benutzt.

Ich schlage daher *Camposimyia* nom. nov. für *Camposia* Reiss, 1972 nec *Camposia* Desmarest, 1823 vor.

Literatur

Desmarest, A. G. 1823: Malacostracés. – Dictionaire des Sciences naturelles **28:** 138–425, Straßburg, Paris

Reiss, F. 1972: Die Tanytarsini (Diptera, Chironomidae) Südchiles und Westpatagoniens. Mit Hinweisen auf die Tanytarsini-Fauna der Neotropis. – Stud. neotrop. Fauna **7:** 49–94

Anschrift des Verfassers:
Dr. Friedrich Reiss, Zoologische Staatssammlung
Maria-Ward-Str. 1b, D-8000 München 19

Angenommen am 29. 6. 1981

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Spixiana, Zeitschrift für Zoologie

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: 004

Autor(en)/Author(s): Reiss Friedrich

Artikel/Article: Camposimyia als neuer Name für Camposia (Diptera, Chironomidae) 317