

5932
51

Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde

Herausgegeben vom
Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart

Serie A (Biologie), Nr. 312

Stuttgart 1978

Bemerkenswerte Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae) aus der Sammlung Lindner

Von Benno Herting, Ludwigsburg

Herr Professor Dr. ERWIN LINDNER wird am 7. April 1978 neunzig Jahre alt. Er hat in seinem langen und auch heute noch arbeitsamen Leben für die Diptero- logie Unschätzbare geleistet. Das von ihm herausgegebene Werk über „Die Flie- gen der paläarktischen Region“ ist weltbekannt. Als Hauptkonservator am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart hat er die reichhaltigste Dipte- rensammlung aufgebaut, die in der Bundesrepublik existiert. Im folgenden ist ein kleiner Teil seiner Funde zusammengestellt. Die Raupenfliegen gehören nicht zu seinem Spezialgebiet, doch hat er sie ebenso wie alle anderen Fliegen gesam- melt. Seine große Erfahrung ermöglichte es ihm, das Bessere vom Gewöhnlichen zu unterscheiden und in einer beschränkten Quantität doch eine bedeutende Ar- tenzahl zusammenzubringen. Es sind hier nur Funde aus Europa und der Türkei angeführt. Über die von Prof. LINDNER in Ostafrika gesammelten Tachiniden (darunter 32 neue Arten und 5 neue Gattungen) hat L. MESNIL (1959) in Nr. 23 dieser Zeitschrift berichtet.

1. Subfam.: Exoristinae

- Exorista unicolor* Stein: 1 ♂, 1 ♀, Gruz bei Dubrovnik (Dalmatien), Mai 1924.
- E. nympharum* Rond. (*bifida* Hert.): 1 ♀, Tolva, Prov. Huesca (Süd-Pyrenäen), 5. VI. 1961.
- E. tubulosa* Hert.: 1 ♂, Lunz am See (Niederösterreich), 24. VII. 1940.
- Chaetogena obliquata* Fall.: 1 ♂, Messelstein bei Donzdorf, 740 m (Schwäbische Alb), 24. V. 1931.
- C. media* Rond.: 1 ♂, 1 ♀, Akschehir, Steppe (Türkei), 21. VI. 1934.
- C. filipalpis* Rond.: 2 ♂, Verwall, Konstanzer Hütte, 1760 m (Tirol), 13. — 15. VII. 1944.
- Phorinia aurifrons* Rob.-Desv.: 1 ♀, Gruz bei Dubrovnik (Dalmatien), Mai 1924.
- Meigenia grandigena* Pand.: 2 ♂, Schrecksee bei Hinterstein, 1800 m (Allgäuer Alpen), 28. VII. 1923; 1 ♂, Nebelhorn, 2220 m (Allgäu), 7. — 10. VIII. 1950.
- M. majuscula* Rond.: 1 ♂, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 17. VI. 1934; 1 ♂, Blasienberg bei Kirchheim am Ries (Ostwürttemberg), 11. VIII. 1947. Erster und bisher einziger Nachweis dieser südlichen Art in Deutschland.

- Perichaeta unicolor* Fall.: 1 ♂, Blasienberg bei Kirchheim am Ries, 540 m (Ost-württemberg), 8. VIII. 1947.
- Istochoeta (Hyperecteina) cinerea* Macq.: 1 ♀, Akschehir (Türkei), 8. VI. 1934.
- I. subcinerea* Borisova: 1 ♂, Platamon (Nord-Griechenland), 7. — 15. VI. 1968.
- Ligeria angusticornis* Loew: 1 ♀, Akschehir (Türkei), 12. VI. 1934.
- Admontia podomyia* Br. & Berg.: 1 ♂, Federsee, 580 m (Oberschwaben), 16. VI. 1919; 1 ♀, Lech am Arlberg, 1440 m (Vorarlberg), 31. VII. 1942; 1 ♂, Hermann Barth-Weg, Wetterstein (Bayerische Alpen), 22. VIII. 1946; 1 ♂, 1 ♀, Nebelhorn, 2220 m (Allgäuer Alpen), 7. — 10. VIII. 1950; 1 ♂, München, Botanischer Garten, 13. VII. 1954.
- A. cepelaki* Mesn.: 1 ♀, Pic d'Arsinol bei Evolène, 3000 m (Wallis), Juli 1929; 4 ♂, Ötztaler Alpen, Vernaghütte, 2700 m (Tirol), 20. VII. 1953.
- Lomacantha parra* Rond.: 1 ♂, Rio Genil, Prov. Granada (Andalusien), 19. — 23. V. 1961.
- Ethilla barbatula* Rond.: 1 ♀, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 19. VI. 1934; 1 ♀, Cefalù (Sizilien), 30. V. 1956.
- Winthemia variegata* Meig.: 1 ♀, Stuttgart, Kräherwald, 12. VI. 1955.
- Phebellia strigifrons* Zett. (*lapponica* Ringd.): 1 ♂, Zermatt, Schwarzsee, 2580 m (Wallis), 12. VII. 1965. Erster Nachweis dieser borealen Art im Alpengebiet.
- P. nigripalpis* Rob.-Desv. (*agnata* Rond.): 1 ♂, Hirrlingen bei Tübingen, 6. V. 1949; 1 ♂, Ummendorfer Ried (Oberschwaben), 27. V. 1949; 1 ♂, Taormina (Sizilien), 20. V. 1956; 1 ♂, San Jeronimo, Rio Monachil, 2000 m (Sierra Nevada, Andalusien), 20. V. 1961; 1 ♂, Hirschberg bei Bietigheim (Nord-württemberg), 31. VII. 1973.
- Nilea anatolica* Mesn.: 2 ♀, Sultan Dagh bei Akschehir, 1500 m (Türkei), 14. VI. 1934. Die Art wurde von MESNIL (in LINDNER, 1954) nach diesen zwei Exemplaren beschrieben.
- Tlephusa diligens* Zett.: 1 ♂, Lago di Loppio bei Rovereto (Trentino, Norditalien), 11. VII. 1958.
- Gymnophryxe inconspicua* Vill.: 1 ♂, Akschehir, Steppe (Türkei), 21. VI. 1934.
- Pseudoperichaeta palesoidea* Rob.-Desv.: 1 ♀, Zermatt, Sunnegga, 2300 m, 15. VII. 1965.
- Chaetina setigena* Rond.: 1 ♂, Abano Terme, Prov. Padua (Italien), IX. 1957.
- Drino atropivora* Rob.-Desv.: 1 ♀, Cefalù (Sizilien), 30. V. 1956.
- Thelyconychia solivaga* Rond.: 1 ♂, Alassio, Riviera (Italien), Ende IX. 1950.
- Carcelia dubia* Br. & Berg.: 1 ♂, Magstadt bei Stuttgart, 3. VII. 1931; 1 ♂, Vinuesa, Prov. Soria (Spanien), 30. IX. 1954; 2 ♂, Rio Genil, Prov. Granada (Spanien), 19. — 23. V. 1961.
- Eocarcelia susurrans* Rond.: 2 ♂, Calvi (Corsica), 23. V. 1967.
- Alsomyia capillata* Rond.: 1 ♂, Alagna Valsesia, Penninische Alpen, 1200—1800 m, 27. — 30. VII. 1959.
- Clemelis pullata* Meig.: 1 ♂, Val Triqueut bei Sion (Wallis), 10. VII. 1929; 1 ♂, Evolène (Wallis), 11. VII. 1929; 1 ♂, Ötztaler Alpen, Windach-Tal, 1600 m (Tirol), 16. VII. 1931; 1 ♀, Nebelhorn, 2220 m (Allgäuer Alpen), 7. — 10. VIII. 1950.
- Prosopaea nigricans* Egg.: 2 ♂, Abano Terme, Prov. Padua (Italien), IX. 1957; 1 ♂, La Mancha, Ruidera östl. Manzanares (Spanien), 20. V. 1971.
- Cyzenis jucunda* Meig.: 1 ♂, Welzheimer Wald (Württemberg), 9. IV. 1928.

- Ceromasia rubifrons* Macq.: 1 ♂, Val Triquet bei Sion (Wallis,) 10. VII. 1929; 1 ♂, Lago di Loppio bei Rovereto (Trentino, Norditalien), 11. VII. 1958.
- Allophorocera pachystyla* Macq.: 1 ♂, Lechtaler Alpen, Wolfratshäuser Hütte am Grubigstein, 1760 m (Tirol), 14. VII. 1931; 1 ♀, Glocknerhaus am Großglockner, 2100 m (Hohe Tauern, Kärnten), 14. VII. 1941; 1 ♀, Trafoi (Südtirol), 13. VIII. 1956.
- Thelymorpha marmorata* Fabr.: 1 ♂, Verwall, Konstanzer Hütte, 1760 m (Tirol), 13. — 17. V. 1944; 1 ♂, Ötztaler Alpen, Vernagthütte, 2700 m (Tirol), 20. VII. 1953.
- Frontina laeta* Meig.: 1 ♂, Stuttgart-Rohr, Schmellbachtal, 21. VIII. 1930; 1 ♂, Lunz am See (Niederösterreich), 3. VIII. 1940.
- Hebia flavipes* Rob.-Desv.: 1 ♂, Stuttgart, Kräherwald, 16. IV. 1967; 1 ♂, Stuttgart, Feuerbacher Wald, 7. IV. 1974.
- Spallanzania hebes* Fall.: 1 ♀, Abano Terme, Prov. Padua (Italien), IX. 1957.
- S. multisetosa* Rond.: 1 ♂, San Jeronimo, Rio Monachil, 2000 m (Sierra Nevada, Spanien), 23. V. 1961.
- Onychogonia flavipes* Zett.: 1 ♂, Alpe Arbey bei Evolène, 1800 m (Wallis), 17. VII. 1929; 1 ♂, Kreuzeck bei Garmisch, 1640 m (Bayerische Alpen), 11. VI. 1930; 1 ♂, Obergurgl, Ötztal, 1920 m (Tirol), 19. VII. 1931; 1 ♂, Zug am Arlberg, Lechtaler Alpen, 1530 m (Vorarlberg), 25. VII. 1942; 1 ♂, Lech am Arlberg, 1440 m (Vorarlberg), 31. VII. 1942; 1 ♂, Verwall, Konstanzer Hütte, 1760 m (Tirol), 13. — 15. VII. 1944.
- O. cervini* Bigot: 1 ♂, Pic d'Artsinol bei Evolène, 3000 m (Wallis), 15. VII. 1929; 1 ♂, Grubigstein bei Lermoos, Lechtaler Alpen, 2210 m (Tirol), 15. VII. 1931; 1 ♀, Nebelhorn, 2220 m (Allgäuer Alpen), 7. — 10. VIII. 1950.
- Redia asiatica* Rohd.: 3 ♀, Akschehir, Steppe (Türkei), 21. VI. 1934.
- Gonia capitata* DeGeer: 1 ♂, Seiser Alp, 2200 m (Südtirol), Juli 1914; 1 ♂, Perouse bei Leonberg (Württemberg), 26. VI. 1930; 3 ♀, Abano Terme, Prov. Padua (Italien), IX. 1957.
- G. ornata* Meig.: 1 ♀, Pico de Veleta, Sierra Nevada, 2700 m (Spanien), 20. V. 1961.
- G. cilipeda* Rond.: 1 ♀, Taormina (Sizilien), 21. V. 1956; 1 ♂, Insel Vulcano, 1. — 2. VI. 1956.

2. Subfam.: Echinomyiinae

- Nowickia rondanii* Giglio-Tos: 2 ♂, San Jeronimo, Rio Monachil, 2000 m (Sierra Nevada, Spanien), 23. VI. 1961.
- N. reducta* Mesn.: 1 ♂, Alagna Valsesia, Penninische Alpen, 1200—1800 m (Italien), 27. — 29. VII. 1959.
- Cnephaotachina danilevskii* Ports.: 1 ♀, Sultan Dagħ bei Akschehir (Türkei), 17. VI. 1934.
- Peleteria prompta* Meig.: 1 ♂, Lechtaler Alpen, Wolfratshäuser Hütte am Grubigstein, 1760 m (Tirol), 14. VII. 1931; 1 ♂, Großglockner, 3000 m (Kärnten), 19. — 31. VII. 1937; 1 ♂, 1 ♀, Dürrenstein bei Lunz, 1870 m (Niederösterreich), August 1940; 1 ♀, Dolomiten, Sella-Joch, 1930 m (Italien), 8. VII. 1958; 1 ♂, Obergurgl im Ötztal, 1920 m (Tirol), 3. — 6. VIII. 1962; 1 ♂, Zermatt, Schwarzsee, 2580 m (Wallis), 12. VII. 1965; 1 ♀, Zermatt, Riffelalp, 2220 m (Wallis), 21. VII. 1965.

- P. abdominalis* Rob.-Desv.: 1 ♂, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 16. VI. 1934.
- Sarromyia nubigena* Pokorny: 1 ♂, Verwall, Darmstädter Hütte, 2400 m (Tirol), 15. — 18. VII. 1944.
- Germaria angustata* Zett.: 1 ♀, Norderney (Deutsche Nordseeküste), 1. — 14. VIII. 1948.
- Nemoraea pellucida* Meig.: 1 ♀, Ufer des Ombla bei Dubrovnik (Dalmatien), 12. V. 1924.
- Linnaemyia vulpina* Fall.: 1 ♀, Federsee (Oberschwaben), 26. VIII. 1921; 1 ♂, Val Triqueut bei Sion (Wallis), 10. VII. 1929.
- L. impudica* Rond.: 1 ♂, Stuttgart-Rohr, Schmellbachtal, 21. VII. 1930.
- L. tessellans* Rob.-Desv. (*pudica* Rond.): 1 ♂, Blanes, Prov. Gerona (Costa Brava, Spanien), 13. — 15. V. 1961.
- L. helvetica* Hert.: 1 ♂, Zermatt-Ried, 1820 m (Wallis), 28. VI. 1972.
- Ernestia laevigata* Meig.: 1 ♂, Stuttgart, Wildpark, 30. V. 1922; 1 ♂, Plochingen (Württemberg), 29. IV. 1930.
- Fausta nemorum* Fabr.: 1 ♀, Stuttgart, Kräherwald, 25. VI. 1944.
- Eurithia monticola* Mesn.: 1 ♂, Zermatt, Furi, 1880 m (Wallis), 24. VI. 1972.
- E. fucosa* Mesn.: 1 ♂, 1 ♀, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 27. VI. 1934.
- E. gemina* Mesn.: 2 ♂, Aggenstein bei Pfronten, 1980 m (Allgäuer Alpen), 18. VI. 1932. Die Art wurde von MESNIL (in LINDNER, 1972) nach diesen Exemplaren beschrieben.
- E. suspecta* Pand.: 1 ♂, Obergurgl, Ötztal, 1920 m (Tirol), 19. VII. 1931.
- E. vivida* Zett.: 1 ♂, 1 ♀, Obergurgl, Ötztal, 1920 m (Tirol), 22. VII. 1931; 1 ♀, Verwall, Konstanzer Hütte, 1760 m (Tirol), 13. — 15. VII. 1944; 3 ♂, Schönwald bei Triberg, 800 m (Schwarzwald), Ende Juni 1965.
- E. conjugata* Zett.: 1 ♀, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 23. VI. 1934.
- E. connivens* Zett.: 1 ♀, Stuttgart-Degerloch, 23. VII. 1930; 1 ♀, Stuttgart-Rohr, Schmellbachtal, 27. VIII. 1932.
- Macquartia praefica* Meig.: 1 ♀, Hirschegg im Kleinen Walsertal, 1120 m (Allgäuer Alpen), August 1935.
- M. tessellum* Meig.: 3 ♂, Akschehir, Steppe (Türkei), 17. — 21. VI. 1934; 1 ♂, Las Canteras, Tenerife (Kanarische Inseln), 8. X. 1964.
- Loewia phaeoptera* Meig.: 1 ♀, München, Nymphenburger Park, 17. VIII. 1939; 1 ♂, Obersee bei Lunz, 1100 m (Niederösterreich), 4. IX. 1975.
- Trichactia pictiventris* Zett.: 3 ♀, Lunz am See (Niederösterreich), 21. VII. und 3. VIII. 1940, 4. IX. 1975.
- Ceromyia nigrohalterata* Vill.: 1 ♂, Stuttgart, Kräherwald, 12. V. 1957.
- C. flaviseta* Vill.: 1 ♂, Stuttgart, Rotwildpark, 21. V. 1933.
- Actia infantula* Zett.: 1 ♀, Taormina (Sizilien), 21. V. 1956.
- A. pilipennis* Fall.: 1 ♂, Taormina (Sizilien), 22. V. 1956.
- Peribaea apicalis* Rob.-Desv.: 1 ♀, Abano Terme, Prov. Padua (Italien), IX. 1957.
- Siphona maculata* Staeg.: 1 ♀, Stuttgart, Kräherwald, 18. V. 1970.
- S. confusa* Mesn.: 1 ♀, Locarno-Brione (Tessin), 5. V. 1971.
- S. pauciseta* Rond. (*delicatula* Mesn.): 1 ♂, Cannosa (Dalmatien), 19. V. 1924.
- S. silvarum* Hert.: Stuttgart, Kräherwald, 1 ♀, 9. VIII. 1970; 1 ♂, 1. VIII. 1971; 1 ♀, 29. VII. 1975; 1 ♀, 10. IX. 1975.

- S. rossica* Mesn.: 1 ♂, Stuttgart, Kräherwald, 8. VI. 1958.
Clausicella suturata Rond.: 1 ♂, Taormina (Sizilien), 22. V. 1956; 1 ♂, Marineporto (Corsica), 31. V. 1967.
Rhinotachina modesta Meig.: 3 ♂, 2 ♀, Calvi (Corsica), 23. — 25. V. 1967.
R. acanthophora Rond.: 1 ♂, Akschehir (Türkei), 5. VI. 1934.
R. golanensis Kugler: 1 ♂, Dubrovnik (Dalmatien), Mai 1924. Die Art wurde erst 1970 aus Palästina beschrieben.
Bithia sprete Meig.: 1 ♀, Kirchheim am Ries (Ostwürttemberg), 10. VIII. 1947.
Aphria longirostris Meig.: 1 ♂, Val Triqueut bei Sion (Wallis), 10. VII. 1929.
A. longilingua Rond.: 1 ♀, Garda (Norditalien), 10. — 11. VII. 1958.
A. latifrons Vill.: 1 ♂, San Jeronimo, Rio Monachil, 2000 m (Sierra Nevada, Spanien), 20. V. 1961.
Microphthalma europaea Egg.: 1 ♂, Insel Vulcano (Süditalien), 1. — 2. VI. 1956; 5 ♂, 1 ♀, Kusadasi (Türkei, Westküste), 17. — 24. V. 1968.

3. Subfam.: Dexiinae

- Dexia vacua* Fall.: 1 ♂, Stuttgart, Rotwildpark, 10. VIII. 1924.
Billaea pectinata Meig.: 1 ♂, Sierre (Wallis), 9. VII. 1929; 1 ♂, Val Triqueut bei Sion (Wallis), 10. VII. 1929; 1 ♂, Akschehir, Steppe (Türkei), 21. VI. 1934.
B. adelpha Loew (*subrotundata* Rond.): 1 ♂, Taormina (Sizilien), 22. V. 1956.
B. triangulifera Zett.: 1 ♂, Stuttgart, Kräherwald, 23. V. 1948.
Estheria (Deximorpha) petiolata Bousd.: 1 ♂, 1 ♀, Evolène (Wallis), 12. VII. 1929.
E. (D.) nigripes Vill.: 1 ♀, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 25. VI. 1934; 1 ♂, Insel Rhodos (Griechenland), Juni 1962.
E. (Myostoma) microcera Rob.-Desv.: 1 ♂, San Jeronimo, Rio Monachil, 2000 m (Sierra Nevada, Spanien), 20. V. 1961.
E. nigella Mesn.: 1 ♀, Sierra de Gredos, Prov. Avila (Spanien), 27. V. 1961.
Zeuxia nigripes Macq.: 1 ♂, Taormina (Sizilien), 21. V. 1956.
Z. sicardi Vill.: 1 ♂, Sierra de Gredos, Prov. Avila (Spanien), 27. V. 1961.
Eriothrix prolixa Meig.: 1 ♂, Luegsteinwand bei Oberaudorf/Inn (Bayerische Alpen), 18. V. 1920.
E. monticola Egg.: 1 ♂, Lechtaler Alpen, Wolfratshäuser Hütte am Grubigstein, 1760 m (Tirol), 14. VII. 1931; 1 ♂, Hohe Tauern, Großglockner, 2300 m (Kärnten), 19. — 31. VII. 1937; 3 ♂, Kanzelwand am Ossiacher See, 1400 m (Kärnten), 4. VII. 1941; 1 ♂, Lech am Arlberg, 1500 m (Vorarlberg), 31. VII. 1942; 1 ♂, Nebelhorn, Seealp, 1630 m (Allgäuer Alpen), 15. VII. 1949; 1 ♂, Ötztaler Alpen, Vernagthütte, 2700 m (Tirol), 20. VII. 1953; 1 ♂, Zermatt, Sunnegga, 2300 m (Wallis), 18. VII. 1965.
Blepharomyia piliceps Zett.: 1 ♀, Verwall, Konstanzer Hütte, 1760 m (Tirol), 13. — 15. VII. 1944.
B. amplicornis Zett.: 1 ♂, Stuttgart, Katzenbachsee, 29. IV. 1923; 1 ♂, 1 ♀, Daumen, 2280 m (Allgäuer Alpen), aus *Biston alpinus*, Wirt im August 1950, Fliegen am 22. V. 1951.

- Campylochaeta fuscinervis* Stein, 1 ♂, Stuttgart, Feuerbacher Wald, 7. V. 1956; 1 ♀, Neuffen (Schwäbische Alb), 21. IV. 1948.
- C. inepta* Meig.: 1 ♀, Zastlermoos am Feldberg, 1000—1500 m (Schwarzwald), 24. VII. 1966.
- Thelaira solivaga* Harris: 1 ♂, Garda (Norditalien), 11. VII. 1957.
- T. leucozona* Panz.: 2 ♂, Penninische Alpen, Alagna Valsesia, 1200—1800 m (Norditalien), 27. — 30. VII. 1959.
- Stomina iners* Meig.: 1 ♀, Akschehir, Steppe (Türkei), 21. VI. 1924.
- Rhamphina pedemontana* Meig.: 1 ♂, Sierra Guadarrama nördl. Madrid (Spanien), 2. VI. 1961; 1 ♀, Zermatt, Riffelalp, 2220 m (Wallis), 17. VII. 1965.
- Ramonda delphinensis* Vill.: 1 ♂, Zermatt, Riffelalp, 2220 m (Wallis), 21. VII. 1965.
- R. jugorum* Vill.: 1 ♀, Ledtaler Alpen, Leutkirchner Hütte bei St. Anton, 2260 m (Tirol), 20. VII. 1944.
- Periscepsia carbonaria* Panz.: 2 ♂, Akschehir, Tal, 1500 m (Türkei), 6. VI. 1934; 1 ♂, Alassio (Riviera, Italien), Juni 1938.
- Wagneria gagatea* Rob.-Desv. (*succincta* Meig.): 1 ♂, 1 ♀, Stuttgart, Feuerbacher Wald, 8. V. 1948; 2 ♀, gleicher Ort, 30. V. 1965, 2. VII. 1967; 1 ♂, 1 ♀, Stuttgart, Kräherwald, 25. V. 1969, 18. V. 1970.
- W. alpina* Vill.: 1 ♂, Alpe La Nivaz bei Evolène, 2000 m (Wallis), 21. VII. 1929; 1 ♂, Zermatt, Sunnegga, 2300 m (Wallis), 15. VII. 1965; 1 ♂, Zermatt, Riffelalp, 2220 m (Wallis), 21. VII. 1965.
- Athyrcia impressa* Wulp: 1 ♂, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 6. VI. 1934.
- Cyrtophleba ruricola* Meig.: 1 ♀, Akschehir Tal, 1500 m (Türkei), 11. VI. 1934; 1 ♀, Zermatt, Triftschlucht, 1620 m (Wallis), 14. VII. 1965.
- Chaetovoria antennata* Vill.: 1 ♂, Zermatt, Schwarzsee, 2580 m (Wallis), 12. VII. 1965.

4. Subfam.: Phasiinae

- Heliozeta belluo* Fabr.: 1 ♂, Stuttgart-Degerloch, 23. VII. 1930; 1 ♂, Stuttgart, Rotwildpark, 28. VI. 1931; 1 ♀, Polykastron (Nordgriechenland), 5. V. 1968.
- Ectophasia crassipennis* Fabr.: 1 ♀, Neustadt bei Waiblingen (Württemberg), 29. VIII. 1927; 2 ♀, Stuttgart-Degerloch, 31. VII. 1929; 1 ♀, Stuttgart-Rohr, Schmellbachtal, 21. VIII. 1930; 1 ♀, Bonifatio (Corsica), 4. VI. 1967.
- E. oblonga* Rob.-Desv.: 1 ♀, Blasienberg bei Kirchheim am Ries (Ostwürttemberg), 11. VIII. 1947.
- Gymnosoma globosa* Fabr.: 1 ♀, Stuttgart-Rohr, Schmellbachtal, 21. VIII. 1930; 1 ♀, Böblinger Wald bei Stuttgart, 19. VIII. 1934.
- G. inornata* Zimin: 1 ♀, Platamon (Nordgriechenland), 7. — 15. VI. 1968.
- G. costata* Panz.: 1 ♀, Ufer des Ombla bei Dubrovnik (Dalmatien), 12. V. 1924.
- G. nudifrons* Hert.: 1 ♀, Stuttgart-Rohr, Schmellbachtal, 21. VIII. 1930; 1 ♀, Platamon (Nordgriechenland), 7. — 15. VI. 1968.
- G. dolycoridis* Dupuis: 1 ♂, Sultan Dagh bei Akschehir (Türkei), 27. VI. 1934.
- G. clavata* Rohd. (*verbekei* Mesn.): 1 ♂, Abano Terme, Prov. Padua (Italien), IX. 1957; 1 ♂, Calvi (Corsica), 24. V. 1967.
- Phasia (Alophora) aurigera* Egg.: 1 ♂, Stuttgart, Kräherwald, 25. IX. 1937; 1 ♀ am gleichen Ort, 18. IX. 1954.

- P. subcoleoprata* L.: 1 ♂, Akschehir (Türkei), 8. VI. 1934.
P. pusilla Meig.: 1 ♀, Calvi (Corsica), 4. VI. 1967.
Dionaea setifacies Rond.: 1 ♀, Sion (Wallis), 9. VII. 1929.
Leucostoma tetraptera Meig.: 1 ♀, Riccione bei Rimini (Italien), 20. VIII. 1963.
Labigaster nitidula Meig.: 3 ♀, Insel Vulcano (Süditalien), 1. — 2. VI. 1956.
Cylindromyia brevicornis Loew: 1 ♂, Blasienberg bei Kirchheim am Ries (Ost-
 württemberg), 8. VIII. 1947; 1 ♂, Ipf bei Bopfingen am Ries, 9. VIII. 1947.
C. bicolor Ol.: 1 ♂, Abano Terme, Prov. Padua (Italien), IX. 1957.
C. intermedia Meig.: 1 ♂, Gruz bei Dubrovnik (Dalmatien), Mai 1924; 1 ♀,
 Gardasee (Norditalien), 10. — 11. VII. 1956; 1 ♂, Alassio, Riviera (Nord-
 italien), IX. 1950; 1 ♀, Isola d'Ischia bei Neapel (Italien), 1. — 9. IX. 1970.
C. auriceps Meig.: 1 ♂, Sion (Wallis), 9. VII. 1929; 1 ♂, Akschehir (Türkei),
 17. VI. 1934.
C. interrupta Meig.: 1 ♂, Stuttgart-Degerloch, 23. VII. 1930; 1 ♂, Böblinger
 Wald bei Stuttgart, 19. VIII. 1934.
C. pusilla Meig.: 1 ♂, Gardasee (Norditalien), 11. VII. 1958.
Evibrissa obscuripennis Meig.: 1 ♀, Ossiacher See (Kärnten), Juli 1941; 1 ♂,
 Stuttgart, Feuerbacher Wald, 14. IX. 1963.
Besseria zonaria Loew: 2 ♂, Insel Vulcano (Süditalien), 1. — 2. VI. 1956.

S u m m a r y

A list is given of 141 Tachinid species collected by Prof. E. LINDNER in various parts of Europe and in Turkey. Common species are omitted.

Anschrift des Verfassers:

Dr. B. Herting, Staatl. Museum f. Naturkunde, Arsenalplatz 3, D-7140 Ludwigsburg