


Tinodes waeneri pollensa n.ssp. von Mallorca

Hans MALICKY

Bei der Durchsicht meines Trichopterenmaterials von Mallorca fiel mir auf, daß die Männchen von Tinodes waeneri L. ganz andere Parameren als Tiere anderer Herkunft haben. Bei der Nominatform besteht eine Paramere aus einem starken, in weitem, flachen Bogen gekrümmten langen Dorn, aus dem subbasal ein gabelförmiger Fortsatz entspringt, der mehr als die Hälfte des Dornes erreicht. Bei den Tieren von Mallorca entspringt hingegen an der Ventralseite des Dorns in etwa 1/5 und in etwa 3/4 seiner Länge je ein kurzer, starker Fortsatz. Die anderen Merkmale sind gleich.


Holotypus ♂ und mehrere Paratypen: Mallorca, Pollensa, 5.10.1981,
leg.& coll.Malicky

Parameres of Tinodes waeneri, lateral:
ssp. pollensa nominate form
from Mallorca from Sardinia



X X X X X X X X X X X X X X X X X

BENTHOS SAMPLING



Let's go away - I think there is someone living downthere !

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Trichoptera Newsletter](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Malicky Hans

Artikel/Article: [Tinodes waeneri pollensa n. ssp. von Mallorca. 37](#)