

Bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Zeitraum 1996-2000 in Thüringen (Orthopteroidea: Ensifera, Caelifera)

HEIKO SPARMBERG, Erfurt

Remarkable records of grasshoppers in Thuringia between 1996 and 2000

Die folgende Liste zu einigen Funden gefährdeter Heuschrecken Thüringens erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll aber zumindest einem breiten Kreis an Interessenten für diese Artengruppe zusätzliche Informationen vermitteln und gleichzeitig Ansporn zur Erhebung weiterer Daten geben.

Die Fundliste knüpft an die erste Veröffentlichung von SPARMBERG (1995) an. Es wurde darauf geachtet, daß nur Funddaten erfahrener Sammler Eingang fanden. Im angegebenen Zeitraum bereits publizierte bzw. im Druck befindliche Arbeiten zur Heuschreckenfauna Thüringens wie SCHMIDT (1996 - 2000), WALLASCHECK (1996), SAMIETZ & WALLASCHECK (1996), SPARMBERG (1997), ABDORF (1997) wurden nicht in die folgende Tabelle aufgenommen.

Die Gefährdungsangaben zur Roten Liste Thüringens (RT) entsprechen KÖHLER (1992) und die Nomenklatur INGRISCH & KÖHLER (1998). Soweit nachvollziehbar wurden Biotoptypen und Häufigkeiten im Erfassungsjahr zu den Arten mit angeben.

Abkürzungen in der Tabelle:

Individuenhäufigkeit: e Einzelfund
 v vereinzelt (<10)
 h häufig (10-50)
 sh sehr häufig (>50)

Sammler: G Malte Gemeinhardt, Erfurt
 K Andreas Kopetz, Erfurt
 S Heiko Sparmberg, Erfurt
 SchE Erwin Schmidt, Rastenberg
 Sch Klaus Schmidt, Barchfeld
 W Andreas Weigel, Wernburg
 Wo Kathrin Worschech, Altenburg

MTB	Fundort	Jahr	Leg.	Bemerkung
Langfühlerschrecken (Ensifera)				
Sichelschrecken (Phaneropteridae)				
<i>Phaneroptera falcata</i> (PODA) – RT 3				
4533/3	Borxleben, Limberg	2000	G	Silikatmagerrasen, Trockengebüsch; 3 Ex.
4632/1	Bendeleben, Weinberg	1996	S	Halbtrockenrasen, Obstwiese; e
4731/1	Bliederstedt, Mittleres Helbetal	1996	S	Weidetrift; v
4731/1	Großenehrich, Mühlbachtal	2000	S	Trockenrasen; v
4734/2	Wiehe, Kiesgrube	1996	G	Ruderalflur, Kiesgrube; 3 Ex.
4833/1	Frohndorf, Hänge zum Speicher	1996	S	Keuper-Trockenrasen; v
4833/4	Kleinbrembach, Weinberg	1996	S	Keuper-Trockenrasen; h
4834/2	Hardisleben, Lobehügel	1998	S	Keuper-Trockenrasen; e

MTB	Fundort	Jahr	Leg.	Bemerkung
4834/2	Rastenberg, Kapellenberg/ Schlittenberg	1998	S	Keuper-Trockenrasen; e
4834/2	Schafau, Steilhang an der B 176	1998	S	Kalk-Trockenrasen; e
4931/2	Erfurt, Mittelhausen	1996	S	Ruderalfläche; e
4931/4	Elxleben, GLB Steinberg	1998	S	Keuper-Trockenrasen; e
4932/3	Erfurt-Nord, Kieswerk	1996	G	Ruderalflur; 1 Ex.
4932/4	Wallichen, Grammhänge	2000	K	Keuper-Trockenrasen; h
4936/3	Stuednitz, Saaletal, Frauenprießnitzer Tal, Tautenburger Tal	2000	G	gebüschreiche Kalk-Halbtrockenrasen; sh
4939/2	Rusendorf, Tagebaurestloch	1996	Wo	Hochstaudenvegetation; e
4939/4	Zechau, NSG Zechau	1997	Wo	Lichtungen, Wegrain; h
4940/1	Haselbach, Tagebau-Restloch III	1999	S	verbuschte Hänge; h
4940/1	Ruppersdorf, Kippe, Halde 2	1998	Wo	trockene Ruderalflur; h
4940/4	Windischleuba	1999	Wo	Auenwiesen; h
5039/2	Starkenberg	1996	Wo	südexponierter Hang; h
5039/4	Gimmel/Graicha	1996	Wo	ruderaler Feldwegrain; h
5039/4	Südlich Meucha	1997	Wo	Hochstaudenvegetation; h
5040/2	Altenburg	1998 1999	Wo	Hausgarten, Stadtzentrum; e Bahndamm; h
5040/2	Zschechwitz	1998	Wo	verbuschter Halbtrockenrasen; e
5332/1	Dörnfeld a.d.H., Eierberg	2000	S	Zechsteinkalk-Trockenrasen; h
5335/1	Krölpa, NSG „Pinsenberg“	2000	W	1 Ex.
Leptophyes punctatissima (BOSC) – RT P				
5040/2	Altenburg	1998	Wo	Hausgarten; e
Barbitistes serricauda (FABRICIUS) – RT P				
4928/4	Hütscheroda, Hippelloch	2000	W	NP „Hainich“; e
Barbitistes constrictus (BRUNNER) – RT P				
5535/4	Schlegel, Kulmberg	1996	K	e
Isophya krausii (BRUNNER) – RT 3				
4827/4	Treffurt, Sülzenberg	1998	Sch	verbuscher Magerrasen; e
4936/3	Stuednitz, Frauenprießnitzer Tal	2000	G	mesophiler Saum; 1 Ex
4936/3	Stuednitz, Tautenburger Tal	2000	G	gebüschreiche Kalk-Halbtrockenrasen; v
5229/1	Struth-Helmershof, Tal des „Kalten Wassers“	1998	G	Bergwiese; 1 Ex.
5326/2	Dermbach, NSG Wacholdertrift	1997	Sch	Kalk-Magerrasen; e (Larve)
5332/1	Dörnfeld a.d.H., Eierberg	2000	S	Zechsteinkalk-Trockenrasen; h
Laubheuschrecken (Tettigoniidae)				
Conocephalus discolor THUNBERG – RT 1				
4734/2	Wiehe, Schloßteich	1996	G	Feuchtwiese; 2 Ex.
Conocephalus dorsalis (LATREILLE) – RT 2				
4633/3	Heldrungen, Unstrut	1999	G	Rohrglanzgras-Röhrriech; v
4734/1	Wiehe, Schwunke	1996	G	Feuchtwiese, Grabenränder; v
4734/2	Wiehe, Schloßteich	1996	G	Feuchtwiese; e
4831/4	Haßleben, Ortsrand	1999	G	Feuchtwiese; h
4833/3	Vogelsberg, Lossaaue	1998	S	Teichrand; e
5133/4	Böttelborn, Böttelborner Tal	1996	G	Großseggenried; v
Decticus verrucivorus (L.) – RT 3				
4834/2	Hardisleben, Lobehügel	1998	S	Trockenrasen; v
4931/4	Elxleben, GLB Steinberg	1996	G	Keuper-Trockenrasen; e
4939/4	Zechau, NSG Zechau	1999	Wo	Ufersaum, Seggen-Binsen; h
5332/1	Dörnfeld a.d.H., Eierberg	2000	S	Zechsteinkalk-Trockenrasen; h
Platycleis albopunctata (GOEZE) – RT 3				
4533/3	Borxleben, Limberg	2000	G	Silikatmagerrasen; v
4833/4	Kleinbrembach, Weinberg	1996	S	Keuper-Trockenrasen; v
4931/4	Kühnhausen, Kippelhorn	1997	K	Keuper-Trockenrasen; v

MTB	Fundort	Jahr	Leg.	Bemerkung
4936/3	Stuednitz, Saaletal	2000	G	Kalk-Halbtrockenrasen, Felsfluren; h
4939/2	Falkenhain, Tagebau Phönix Nord	2000	Wo	Lückige Ruderalvegetation; sh
5335/1	Krölpa, NSG „Pinsenberg“	2000	W	h
Metrioptera bicolor (PHILIPPI) – RT 2				
4731/1	Bliederstedt, Mittleres Helbetal	1996	S	Kalk-Halbtrockenrasen; v
4833/3	Vogelsberg, Tieftal u. Stöllbornertal SW	1998	S	Keuper-Trockenrasen, Schaftrift; h
4833/4	Ellersleben, 300 m SW	1998	S	Halbtrockenrasen; v
4833/4	Kleinbrembach, Weinberg	1996	S	Keuper-Trockenrasen; v
4834/2	Hardisleben, Lobehügel	1998	S	Keuper-Trockenrasen; sh
4834/2	Rastenberg, Kapellenberg	1998	S	Trockenrasen; h
4931/4	Erfurt-Kühnhäuser	1997	S	Uferböschung an Gera; h
4931/4	Kühnhäuser, Kippelhorn	1997	K	Keuper-Trockenrasen; v
4931/4	Elxleben/Kühnhäuser, Hügelkette Kippelhorn, Hühnerbiel, Marolsberg, Steinberg, Ringelberg	1998	S	Keuper-Trockenrasen; v-h
4940/1	Haselbach, Tagebau-Restloch III	1999	S	Ruderaler, Grubenbahn; v
5032/1	Erfurt, Möbisburg, Rhodaer Grund	1998	S	Kalk-Halbtrockenrasen; h
5131/1	Rehestädt, Deponie	1999	G	Ruderalflur; h
5230/3	Frankenhain, Bahndamm	1999	G	thermophiler Saum; h
Maulwurfsgrillen (Gryllotalpidae)				
Gryllotalpa gryllotalpa (L.) – RT P				
4633/3	Heldrungen, Kiesgrube	1996	G	Kiesgrubengelände; l Ex.
4939/2	Falkenhain	1998	Wo	Gartenanlage; h
4939/4	Lucka, Ortsrand	1996-2000	Wo	Gartenanlage, Rainbach, sh
4939/4	Meuselwitz, OT Zipsendorf	1996-1998	Wo	Gartenanlage; sh
4939/4	Rositz	1996-1998	Wo	Gartenanlage; sh
5026/3	Dippach, Werraue (Rohrlache)	1998	G	Feuchtgrünland; h
5140/2	Goßnitz	2000	Wo	Vorgarten; e
5335/1	Krölpa, NSG „Pinsenberg“	2000	W	l Ex. unter Stein
Ameisengrillen (Myrmecophilidae)				
Myrmecophila acervorum (PANZ.) – RT P				
4932/4	Wallichen, Grammhänge	2000	K	Halbtrockenrasen; v
4. Grillen (Gryllidae)				
Gryllus campestris L. – RT 3				
4430/4	Niedersachswerfen, Borntal	1999	G	Halbtrockenrasen; sh
4431/3	Steigerthal, Pfaffenköpfe u. Steinberg	1998	S	Gipskarst, Trockenrasen; h
4632/1	Bendeleben, Weinberg	1996	S	Halbtrockenrasen, Obstwiese; e
4632/1	Rottleben, Spatenberg	1998	K	Keuper-Trockenrasen; v
5126/2	Frauensee	2000	Sch	10 Fundorte, > 300 Rufer
Kurzfühlerschrecken (Caelifera)				
Dornschröcken (Tetrigidae)				
Tetrix subulata (L.) – RT 2				
4430/1	Appenrode, Rüsselsee	1997	G	schlammiges Teichufer; l Ex.
4528/1	Wintzingerode, Bodenstein	1999	S	Teichufer (Silberteich); v
4631/3	Oberspier, Bachtal NE	2000	S	Wiesengrund, Obstwiese; e
4633/3	Heldrungen, Unstrut-Altarm	1999	G	Schlammfläche; h
4633/3	Heldrungen, Unstrutniederung	1999	G	feuchte Hochstaudenflur; sh
4730/3	Allmenhausen, Igelsee SW	2000	S	wechsellässiges Teichufer; e
4730/3	Allmenhausen, Oberholz SW	2000	S	Waldteich; e
4730/4	Wolferschwenda, Teich	2000	S	Teichufer; e
4734/1	Wiehe, Schwunke	1996	G	Feuchtwiese, Grabenränder; h

MTB	Fundort	Jahr	Leg.	Bemerkung
4734/2	Wiehe, Schloßteich und Umfeld	1996	G	Feuchtwiesen, Grabenränder: sh
4833/1	Frohdorf, Speicher	1996	S	Stauwurzel; v
4833/3	Vogelsberg, Lossaaue	1998	S	Teichrand; e
4834/2	Hardisleben, Hirschbach	1998	S	Teichufer; e
4927/4	Krauthausen	2000	Sch	Sumpfbgebiet; h
4932/1	Alperstedt, Wüstung Neuendorf	1999	G	Hochstaudenflur; 1 Ex.
4932/3	Erfurt-Nord, Kieswerk	1996	G	Kiesgrubenufer, Spülfläche; h
4939/2	Falkenhain, Tagebau Phönix Nord	2000	Wo	Verlandungszone; h
4939/2	Rusendorf, Tagebaurestloch	1999	Wo	Aschespülfläche; h
4939/4	Zechau, NSG Zechau	1999	Wo	Ufer; h
4940/1	Ruppersdorfe, Kippe, Halde 2	1998	Wo	Feuchtwiese; sh
4940/1	Windischleuba	2000	Wo	Rodungsfläche, Teichnähe; e
4940/2	Haselbach, Kammerforst	1999	S	Gräben, Tagebaugelände; h
5026/2	Unterellen	2000	Sch	Teich; v
5026/3	Dippach, Werraue	1996	G	Feucht- und Frischwiesen; sh
5026/3	Dankmarshausen	2000	Sch	NSG Rhäden; h
5031/4	Molsdorf, Palmberg, Autob.-kreuz	2000	S	neuer Teich, Ufer; h
5039/2	Gölnitz	1997	Wo	Teichufer, h
5039/4	Grimmel/Graicha	1996	Wo	Feuchtes Grünland; h
5040/1	Lödla	1997	Wo	nasser Acker; sh
5040/1	Lossen	1997	Wo	Feuchtwiese; h
5040/1	Schlöplitz, Teiche	1996	Wo	Ödland; h
5040/2	Altenburg	1996	Wo	Feuchtwiese; h
5040/3	Nöbden	1996	Wo	Feuchtfächen; h
5041/1	Altenburg, Leinawald, Talsperre Schömbach	1997	Wo	Verlandungszone; h
5126/3	Vacha, Werraue	1998	S	Grabenrand; v
5126/4	Merkers, Werraue	1998	S	Teichufer; v
5127/1	Kupfersuhl	2000	Sch	v
5127/1	Kupfersuhl	2000	Sch	Feuchtwiese; h
5127/2	Waldfisch	1998	Sch	>100 Indiv.
5127/3	Hämbach, Kalihalde	1998	S	Entwässerungsgraben; v
5127/3	Leimbach, Karrenwiese	1998	Sch	v
5127/3	Unterrohrn, Kleiner Werraaltarm	1998	Sch	> 150 Indiv.
5127/4	Bad Salungen, Erlensee	1998	S	nasse Auewiese; h
5131/2	Rudisleben, Kiesgrube	1996	G	Ruderalfur, Kiesgrubengelände; 1 Ex.
5132/2	Elleben, GLB Loh und Teiche	1997	S	Teichrand; v
5226/4	Hartschwinden/Felda	1997	Sch	Frischwiesen; h
5332/2	Dörnfeld/Königsee, Feldweiher	2000	S	Wechselnasses Ufer; v
5337/2	Wenigenauma, Jämmertal	2000	W	mehrfach in Bodenfallen und Handfang
5338/1	Triebes, FND „In den Seewiesen“	1999	W	mehrfach auf Feuchtwiese
<i>Tetrix creperoi</i> (BOLIVAR)				
4939/2	Falkenhain, Tagebau Phönix Nord	2000	Wo	Verlandungszone; e
4939/2	Rusendorf, Tagebau-Restloch	1999	Wo	Asche-Spülfläche; e
<i>Tetrix undulata</i> (SOW.) – RT 3				
4430/3	Hörningen, Sattelköpfe	1997	S	Gipskarst, Trockenrasen, v
4430/4	Petersorf, Roßmannstal	1998	S	Heide, Sandtrockenrasen, e
4431/3	Steinberg w Steigertal	1998	S	Gipskarst, Trockenrasen; e
4633/3	Heldrunen, Unstrut	1999	G	Schlammfläche; 2 Ex.
4940/2	Haselbach, Kammerforst	1999	S	Gräben, Tagebaugelände; h
4940/2	Haselbach, Kammerforst	1997	Wo	besonnte Waldlichtung, e
5026/3	Dippach, Werraue (Rohrlache)	1996	G	Feuchtgrünland; v
5126/4	Kieselbach, Heide	1998	S	Sand-Trockenrasen; v
5127/3	Hämbach, Kalihalde	1998	S	Haldenfuß; v
5127/4	Witzelroda, Heide	1998	S	Sandheide/Trockenrasen; v
5128/4	Kleinschmalkalden	1996	S	Rinderweide; v

MTB	Fundort	Jahr	Leg.	Bemerkung
5132/2	Riechheim, Spielberg	1998	G	Kalksteinbruch, feuchter Sohlenber.; 1 Ex.
5431/2	Neustadt, Steinbruch am Rotkopf	2000	G	Ruderalflur; 1 Ex.
Feldheuschrecken (Acrididae)				
<i>Stethophyma grossum</i> (L.) – RT 3				
4533/3	Borxleben, Rohrteich	2000	G	Hochstaudenflur; 2 Ex.
4831/4	Haßleben, Schmale Gera	1997	G	Hochstaudenflur; 1 Ex.
5127/3	Bad Salzungen, Bahngelände	1999	Sch	Sumpf, sh
5127/3	Leimbach, Teichwiesen	2000	Sch	v
5127/3	Leimbach, Karrenwiese	1999	Sch	> 1000 Indiv.
5127/4	Bad Salzungen, Erlensee	1998	S	nasse Auewiese; h
5127/4	Breitungen, NSG Breitungsee	2000	Sch	> 200 Indiv.
5226/4	Dermbach, Altabach	1999	G	Quellbereich, Frischwiese; 2 Ex., sh
5337/2	Wenigenauma, Jammertal	2000	W	
<i>Oedipoda caerulescens</i> (L.) – RT 1				
4533/3	Borxleben, Limberg	2000	G / S	Silikat-Magerrasen; ca. 40 Ex.
4631/1	Sondershausen, Halde	1997	K	Abraumhalde; h
4832/1	Tunzenhausen, Drachenschwanz	2000	SchE	Keuper-Trockenrasen
4833/4	Kleinbrembach, Weinberg	1996	S	Keuper-Trockenrasen; v
4939/2	Mummsdorf	1996	Wo	Grubenbahngleise; h
4939/2	Meuselwitz, Tagebau Rusendorf	1996	Wo	Grubenbahn; h
4939/2	Falkenhain, Tagebau Phönix Nord	1998	Wo	Bodenhalde, Ruderalfläche; h
4940/1	Haselbach, Tagebau-Restloch III	1999	S	trocken-sandige Ruderale; sh
4940/3	Fichtenhainichen	1997	Wo	aufgelassene Sandgrube; h
4940/3	Rositz	1996	Wo	zwischen Bahngleisen; e
<i>Sphingonotus caeruleus</i> (L.) – RT 1				
4631/1	Sondershausen, Halde	1997	K	Salzhalde; h
4734/3	Bachra, Steinbruch Katzenberg	2000	SchE	Kalk-Schotterflur
4931/4	Elxleben, GLB Steinberg	1998	S	Aschehalde; h
4939/2	Rusendorf, Tagebaurestloch	1996	Wo	Gleisanlage; e
4939/2	Mummsdorf	1996	Wo	Grubenbahn; e
4939/4	NSG Zechau	1997	Wo	Erosionsfläche;
4940/1	Haselbach, Tagebau-Restloch III	1999	S	trocken-sandige Ruderale; sh
5139/1	Ronneburg, Abraumhalde	2000	S	trockene Ruderale; h
<i>Chrysochraon dispar</i> (GERMAR) – RT 1				
4734/1	Wiehe, Schwunke	1996	G	Feuchtwiese, Grabenränder
4734/2	Wiehe, Schloßteich und Umfeld	1996	G	Feucht- und Frischwiesen, Grabenränder; h
4831/4	Haßleben, Ortsrand	1999	G	Feuchtwiese; 4 Ex.
4832/3	Alperstedt, Wüstung Mossendorf	1996	G	Feuchtwiesenbrache, Grabenränder; v
4940/1	Haselbach, Tagebau-Restloch III	1999	Wo	feuchte Ruderale; e
5040/2	Altenburg, Hellwiese	1996	Wo	Feuchtwiese; h
5338/1	Triebes, FND „In den Seewiesen“	1999	W	Feuchtwiese; v
<i>Euthystira brachyptera</i> (OCSKAY) – RT P				
4940/1	Haselbach, Tagebau-Restloch III	1999	S	trockene Ruderale; h
5033/3	Gutendorf, Erfurter Tal	1999	G	trockene Nadelholzschonung / Halbtrockenrasen; 5 Ex.
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (CHARPENTIER) – RT 1				
4430/3	Hörningen, Sattelköpfe	1997	S	Gipskarst, Trockenrasen; v
4431/3	Steigerthal, Pfaffenköpfe	1998	S	Gipskarst, Trockenrasen; v
5332/1	Dornfeld a.d.H., Eierberg	2000	S	Kalk-Trockenrasen; h
5332/1	Pennewitz, so exponierter Hang	2000	S	Pferdekoppel, Sand-Trockenrasen; sh
5332/2	Garsitz, Ortsrand	2000	S	Halbtrockenrasen; v
5332/3	Garsitz, Mönchsstuhl	2000	S	Kalk-Trockenrasen; h
5335/1	Krölpa, NSG „Pinsenberg“	2000	W	2 Ex.
<i>Stenobothrus nigromaculatus</i> (HERRICH-SCHÄFER) – RT 2				
4531/4	Kelbra, Schloßberg	1998	K	Halbtrockenrasen; h
<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (RAMBUR) – RT 3				

MTB	Fundort	Jahr	Leg.	Bemerkung
4430/3	Hörningen, Sattelköpfe	1997	S	Gipskarst, Trockenrasen; v
4431/3	Steigerthal, Pfaffenköpfe u. Steinberg	1998	S	Gipskarst, Trockenrasen; h
4731/1	Bliederstedt, Mittleres Helbetal	1996	S	Weidetrift; v
4931/4	Elxleben, GLB Steinberg	1998	S	Keuper-Trockenrasen; h
5126/4	Kieselbach, Heide	1998	S	Heide/Trockenrasen; h
5127/3	Tiefenort, Herzgraben	2000	Sch	lichter Kiefernwaldrand; sh
5127/4	Witzelroda, Heide	1998	S	Heide/Trockenrasen; h
5226/2	Weilar	2000	Sch	v
5332/1	Dörmfeld a.d.H., Eierberg	2000	S	Zechsteinkalk-Trockenrasen; h
5536/3	Birkenhügel, Bergwiese sw	2000	S	magere Bergwiese; sh
<i>Stenobothrus crassipes</i> (CHARPENTIER) – RT P				
4531/4	Kelbra, Schloßberg	1998	K	Halbtrockenrasen, h
<i>Gomphocerus rufus</i> (L.) – RT 3				
4528/1	Wintzingerode, Bodenstein	1999	S	Kalkschotter am Bodenstein; v
4827/3	Treffurt	2000	Sch	ehemaliger Bahndamm; v
4834/2	Schafau, Steilhang an der B 176	1998	S	Kalk-Trockenrasen; h
4928/2	Craula, westlich Alter Berg	2000	Sch	Kalk-Magerrasen; e
4936/3	Stuednitz, Saaletal, Frauenprießnitzer Tal, Tautenburger Tal	2000	G	Kalk-Halbtrockenrasen, Felsfluren; sh
4939/2	Rusendorf, Tagebau-Restloch	1996	Wo	Waldlichtung; e
4940/1	Haselbach, Tagebau-Restloch III	1999	S	trockene Ruderale, Wegen; v
5229/1	Schnellbach, Brückenberg	1998	G	trockener Waldrand; v
5229/1	Schnellbach, Mönchstein	1998	G	Blockschutthalde; 10 Ex.
5326/2	Dermbach, OT Glattbach	1998	Sch	Wacholdertrift; sh
<i>Myrmelottix maculatus</i> (THUNBERG) – RT 3				
4430/1	Mauderode, Weide am Ortsrand	1997	S	Halbtrockenrasen, Weide; v
4430/3	Hörningen, Sattelköpfe	1997	S	Gipskarst, Trockenrasen; v
4430/4	Harzungen, Halbenberg	1999	G	bodensaurer Magerrasen, Calluna-Heide; sh
4430/4	Petersorf, Roßmannstal	1998	S	Heide, Sand-Trockenrasen; v
4431/3	Steigerthal, Pfaffenköpfe u. Steinberg	1998	S	Gipskarst, Trockenrasen; v
4533/3	Borxleben, Limberg	2000	G / S	Silikatmagerrasen; sh
5026/2	Untereilen, Böller	2000	Sch	Heide; v
5126/4	Kieselbach, Heide	1998	S	Sandheide/Trockenrasen; v
5127/4	Witzelroda, Heide	1998	S	Sandheide/Trockenrasen; v
5128/4	Kleinschmalkalden	1996	S	Rinderweide; v
5139/3	Haselbach/Ronneburg, Sturmberg	2000	W	1 Ex. Bodenfalle, Kiesgrube
5230/4	Frankenhain, Borzelberg	1999	G	trockene Wegböschung; v
5335/1	Krölpa, NSG „Pinsenberg“	2000	W	
5336/1	Weira, Weiraer Wald	1998	G	trockener Wegrand; h
<i>Chorthippus mollis</i> (CHARPENTIER) – RT 3				
4533/3	Borxleben, Limberg	2000	G	Silikatmagerrasen; h
4731/1	Bliederstedt, Mittleres Helbetal	1996	S	Weidetrift; sh
4731/1	Großenehrich, Mühlbachtal	2000	S	Trockenrasen; sh
4831/1	Lützensömmern, Pfützenberg	1997	G	Kiesgrube, Kalk-Halbtrockenrasen; v
4833/1	Frohndorf, Hänge zum Speicher	1996	S	Trockenrasen; h
4833/3	Vogelsberg, Stollbornertal	1998	S	Trockenrasen, Schaftrift; sh
4833/4	Kleinbrennbach, Weinberg	1996	S	Keuper-Trockenrasen; sh
4931/4	Elxleben/Kühnhäusen, Hügelkette Kippelhorn, Hühnerbiel, Marolsberg, Steinberg, Ringelberg	1996	S	Keuper-Trockenrasen; sh
4932/1	Stotternheim, Bahndamm	1999	G	trockene Ruderalflur; v
4932/3	Erfurt Nord, Teichmannshof	1997	S	Bahnanlage; v
4932/4	Wallichen, Grammehängen	2000	K	Keuper-Trockenrasen; sh

MTB	Fundort	Jahr	Leg.	Bemerkung
5131/1	Rehestädt, Deponie	1999	G	Ruderalflur (trockener Standort); v
5138/2	Ronneburg, Gessental, Tabaksberg	1999	W	Bodenfalle; 2 Ex.
<i>Chorthippus montanus</i> (CHARPENTIER) – RT 3				
4727/4	Lengenfeld unterm Stein	2000	S	Feuchtwiede; h
4734/1	Wiehe, Schwunke	1996	G	Feuchtwiese, Grabenränder; v
4734/2	Wiehe, Schloßteich und Umfeld	1996	G	Feucht- und Frischwiesen, Grabenränder; h
4932/1	Stotternheim, am Klingegraben	1998	G	Feuchtwiesenbrache; 2 Ex.
5237/4	Merkendorf, Weidetsperre, N	2000	W	Ufer; 2 Ex.
5436/2	Heinrichsruh, Schleizer Dreieck	1997	W	Sumpfwiese; h

Literatur

- ASSHOFF, R. (1997): Die Heuschreckenfauna (Insecta: Ensifera et Caelifera) des ehemaligen Landkreises Stadtroda (Thüringen). - Thür. Faun. Abh. **IV**: 92-111.
- INGRISCH, S. & G. KÖHLER (1998): Die Heuschrecken Mitteleuropas. - Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 629, Westarp Wissenschaften, Magdeburg.
- KÖHLER, G. (1992): Rote Liste der Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) Thüringens. - in: Rote Liste Thüringens. - Naturschutzreport 5: 66-69.
- SAMIETZ, J. & M. WALLASCHECK (1996): Die Bedeutung von Schieferbrüchen im Thüringer Mittelgebirge für die Heuschreckenfauna (Orthopteroidae: Ensifera, Caelifera). - Thür. Faun. Abh. **III**: 70 - 83.
- SCHMIDT, K. (1996): Vorkommen, Lebensraumsprüche und Gefährdungssituation der Säbeldornschröcke, *Tetrix subulata*, im Wartburgkreis (SW-Thüringen). - Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen **11**: 101-110.
- (1997): Vorkommen, Häufigkeit und Lebensraumsprüche des Kleinen Heidegrashüpfers, *Stenobothrus stigmaticus*, im Wartburgkreis (SW-Thüringen). - Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen **12**: 3-15.
- (1998): Zum Vorkommen und zur Bestandssituation der Feldgrille () in SW-Thüringen unter besonderer Berücksichtigung des Wartburgkreises. - Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen **13**: 79-87.
- (1999): Aktuelle Vorkommen der Maulwurfsgrille, *Gryllotalpa gryllotalpa* (L.), in Südwest-Thüringen. - Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen **14**: 65-70.
- (2000): Die Kurzflüglige Schwertschröcke, *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), im Wartburgkreis (SW-Thüringen). - Veröff. Naturhist. Mus. Schleusingen **15**: (im Druck).
- SPARMBERG, H. (1995): Bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Zeitraum 1980 -1995 in Thüringen (Orthopteroidae: Ensifera, Caelifera). - Thür. Faun. Abh. **II**: 92-98.
- (1997): Nachweise von Heuschrecken und Ohrwürmern (Insecta: Orthoptera et Dermaptera) an den Rückstandshalden der Kaliindustrie. - Thür. Faun. Abh. **IV**: 83 - 91.
- WALLASCHECK, M. (1996): Beitrag zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) des Dün/Thüringen. - Thür. Faun. Abh. **III**: 84-112.

Anschrift des Verfassers:

Dipl.-Ing. Heiko Sparmberg
Dinkelweg 11
D-99092 Erfurt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Thüringer Faunistische Abhandlungen](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Sparmberg Heiko

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Zeitraum 1996-2000 in Thüringen \(Orthopteroidea: Ensifera, Caelifera\) 173-179](#)