

Beitrag zur Kenntnis der Molinietalia-Gesellschaften im Becken Liptovská kotlina (N-Slowakei)

– Emilie Balátová-Tulácková, Edita Urvichiarová –

Zusammenfassung

In der submontanen Stufe des Beckens Liptovská kotlina (Meereshöhe 480–700 m) wurden in den sechziger Jahren fünf Assoziationen der Ordnung *Molinietalia* festgestellt und analysiert. Sie sind durch das *Scirpetum sylvatici* (2 Subassoziationen), *Cirsietum rivularis* (5 Subassoziationen), *Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum*, *Lysimachio vulgaris-Filipenduletum* und *Filipendulo-Geranietum palustris* (5 Subassoziationen) vertreten. Neu beschrieben werden das *Cirsietum rivularis geranietosum palustris* und das *Filipendulo-Geranietum palustris phalaridetosum arundinaceae*. Drei seltene Subassoziationen: das *Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum petasitetosum hybridi*, das *Lysimachio vulgaris-Filipenduletum caricetosum acutiformis* und das *Filipendulo-Geranietum palustris caricetosum paniculatae* kommen auch in den österreichischen Nordostalpen vor.

Ein Vergleich mit den Aufnahmen derselben Syntaxa (Assoziationen, Subassoziationen), die RUŽIČKOVÁ an anderen Stellen 7–9 Jahre später aufgenommen hat (RUŽIČKOVÁ 1986), ergibt in der Struktur desselben Syntaxons keine wesentlichen Unterschiede in Bezug zur pflanzensoziologischen Klassifikation.

Abstract

Eight associations, in the sense of the Zürich-Montpellier school, were distinguished within the moist meadows in the lower submontane belt of the Liptovská kotlina Basin, between the Vysoké Tatry (High Tatra) and Nizké Tatry (Low Tatra) Mountains.

Molinietalia associations (*Calthion* alliance) are represented by five associations: *Scirpetum sylvatici*, *Cirsietum rivularis*, *Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum*, *Lysimachio vulgaris-Filipenduletum* and *Filipendulo-Geranietum palustris*. The *Scirpetum sylvatici* occurs in two subassociations, and the associations *Cirsietum rivularis* and *Filipendulo-Geranietum palustris* in five subassociations each. The subassociations *Cirsietum rivularis geranietosum palustris* and *Filipendulo-Geranietum palustris phalaridetosum arundinaceae* are newly recognized. Three other, rarely occurring subassociations, viz. *Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum petasitetosum hybridi*, *Lysimachio vulgaris-Filipenduletum caricetosum acutiformis* and *Filipendulo-Geranietum palustris caricetosum paniculatae* are also known from the NE Alps in Austria.

As seen from comparison of our relevés with those described by RUŽIČKOVÁ (1986) 7–9 years later, no important differences in the structure of these syntaxa (associations, subassociations) were registered, with respect to their phytosociological classification.

Einführung

Die Aufnahmen, die in dieser Arbeit präsentiert werden, wurden noch vor dem Bau der Talsperre „Liptovská Mara“ durchgeführt. Sie beziehen sich vorwiegend auf die untere submontane Stufe des westlichen, etwas wärmeren Teiles des Beckens Liptovská kotlina und stammen meistens aus den Jahren 1965–67. Sieben bis neun Jahre später (1972–76) führte Frau RUŽIČKOVÁ Wiesenuntersuchungen im selben Gebiet durch (RUŽIČKOVÁ 1986), die sich zum Teil auch auf die Naß- und Feuchtwiesen bezogen. So bietet sich die Möglichkeit, nicht nur die Artenzusammensetzung der drei verbreitesten Assoziationen (*Scirpetum sylvatici*, *Cirsietum rivularis* und *Filipendulo-Geranietum palustris*) zu ergänzen, sondern auch eventuelle Änderungen in ihrer Artenzusammensetzung im Laufe der Zeit festzustellen. Hier ist zu betonen, daß die Aufnahmen aus der Zeit stammen, als die Eutrophierung der Umwelt noch nicht so stark wirksam war, wie es heute der Fall ist.

Methoden

Die untersuchten Bestände wurden nach den Prinzipien der Zürich-Montpellier-Schule analysiert und ausgewertet, unter Benutzung der siebenstufigen kombinierten Skala für Artmächtigkeit nach BRAUN-BLANQUET (BRAUN-BLANQUET 1951, MÜLLER-DOMBOIS & ELLENBERG 1974). Die angeführten Artenkombinationen umfassen die Arten mit Stetigkeit IV–V. Die Feuchtezahlen wurden nach ELLENBERG (1974) berechnet, wobei die Artmächtigkeit in Deckungswerte nach BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ übergeführt wurden: 0,2, 0,4, 2, 10, 20, 30, 40 (s. BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ in RYCHNOVSKÁ et kol. 1987). Die Meereshöhen wurden in den physiographischen Karten auf ± 5 m genau abgelesen.

Naturverhältnisse

(bearbeitet nach Angaben von FUSÁN 1972, RUŽIČKOVÁ 1986
und aus dem Klimaatlas der Tschechoslowakei)

Das Becken Liptovská kotlina (Meereshöhe 480–1000 m) befindet sich zwischen den Gebirgen Vysoké Tatry und Nízke Tatry. In nordwestlicher und westlicher Richtung wird es von den Gebirgen Chočské vrchy und Velká Fatra (bei Ružomberok) begrenzt. Štrbský chrbát bildet seine Ostgrenze.

Das Becken wird vom innerkarpatisch unregelmäßig verbreiteten Flysch gebildet. Im Untergrund befinden sich mesozoische Formationen: Brekzien und Konglomerate, die stellenweise, zum Beispiel in der Umgebung der Ortschaften Východná und Hybe, in Kalksandstein übergehen. Der Flysch bildet im Becken die obersten Schichten; er besteht aus sich regelmäßig abwechselnden Sandsteinen und Schiefern. Der südliche und nordwestliche Rand des Beckens wird von grauen feinsandig-schieferartigen Letten-Schichten breit gesäumt, die auch im nördlichen Teil des Beckens vorkommen. Quartärsedimente gibt es oft im östlichen Teil, und zwar in Form von fluvioglazialen Ablagerungen. Entlang des Flusses Váh gibt es auch Terrassenschotter und Auenaufschwemmungen.

Das Klima des Beckens ist kontinental geprägt. Die nördlich liegende Hohe Tatra wirkt hier als Regenfänger, die südliche Niedere Tatra verhindert das Einströmen warmer Luftmassen aus dem Süden. In der Lufttemperatur gibt es größere Unterschiede zwischen dem wärmeren südwestlichen und dem kühleren nordöstlichen Teil des Beckens. In den niedrigeren Lagen (bis ca. 700 m) liegt die mittlere jährliche Lufttemperatur zwischen 5,1 und 6,4 °C; die mittlere jährliche Niederschlagssumme beträgt um 710–755 mm (s. auch Tabelle 1).

Tabelle 1: Klimaverhältnisse des Untersuchungsgebietes

A = Niederschläge in mm B = mittlere Lufttemperatur in °C

Meteorologische Station	Meereshöhe m	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I XII	IV I
A Ružomberok	496	43	38	41	51	78	86	97	84	64	58	57	43	737	460
Liptovský Mikuláš	576	40	36	39	47	76	86	94	82	63	53	51	44	711	448
Liptovský Hrádok	648	41	36	43	51	83	88	95	83	65	57	57	45	744	465
Východná	755	52	42	39	51	74	86	93	83	61	60	59	54	754	448
B Liptovský Hrádok	648	-5,3	-3,8	0,9	6,0	11,4	14,2	16,0	15,2	11,5	6,5	1,3	-2,6	5,9	12,4
Východná	755	-5,7	-4,4	-0,3	4,7	10,3	13,5	15,3	14,1	10,6	5,7	0,6	-3,1	5,1	11,4

Übersicht der untersuchten Gesellschaften

Aus dem Becken Liptovská kotlina sind mehrere Gesellschaften aus den Klassen *Phragmitetea*, *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*, *Molinio-Arrhenatheretea* und *Festuco-Brometea* bekannt. RUŽIČKOVÁ (1978, 1980, 1986) beschreibt Gesellschaften von *Carex acutiformis*, von *Carex rostrata* und von *Carex paniculata*, das *Caricetum fuscae*, *Valeriano simplicifoliae-Caricetum davallianae*, *Scirpetum sylvatici*, *Cirsietum rivularis*, *Trollio-Cirsietum (rivularis)*, *Deschampsia cespitosa* – *Carex leporina*-Gesellschaft, *Filipendulo-Geranium palustris*, *Trisetum flavescens*-Gesellschaft, *Lolio-Cynosuretum*, *Anthoxantho-Agrostietum* und *Salvio verticillatae-Brachypodietum*. Es kommen noch einige von uns untersuchten Gesellschaften hinzu: *Caricetum gracilis*, *Caricetum paniculatae* und ein zum *Caricion davallianae* vermittelndes *Caricetum rostratae* (Sukzessionsstadium). Einige der oben angeführten Assoziationen wurden von URVICHIAŘOVÁ (1975 Mskr.) in synökologischer Hinsicht untersucht.

Die von uns untersuchten *Molinietalia*-Assoziationen und Subassoziationen nehmen im pflanzensoziologischen System folgende Stellung ein:

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937

Molinietalia Koch 1925

Calthion Tx. 1937 em. Bal.-Tul. 1978

Calthenion (Tx. 1937) Bal.-Tul. 1978

Scirpetum sylvatici Ralski 1931

caricetosum (fuscae) Knapp 1945

typicum Knapp 1945

Cirsietum rivularis Nowiński 1927

caricetosum gracilis Bal.-Tul. in Rybníček et al. 1984

caricetosum davallianae (Bosáčková 1970) Španíková 1983

geranietosum palustris subass. nova

chaerophylletosum hirsuti Vigo et Carreras 1984

typicum Bal.-Tul. 1977

Filipendulenion (Lohmeyer in Oberd. et al.) Bal.-Tul. 1978

Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum Niemann, Heinrich et Hilbig 1973

petasitetosum hybridi Bal.-Tul. et Hübl 1985

Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978

caricetosum acutiformis Bal.-Tul. et Hübl 1979

Filipendulo-Geranium palustris Koch 1925

caricetosum paniculatae Bal.-Tul. et Hübl 1985

phalaridetosum arundinaceae subass. nova

menthetosum longifoliae Bal.-Tul. 1985

typicum Knapp 1948

urticetosum dioicae Bal.-Tul. 1979

Nähere Angaben zu den untersuchten Gesellschaften

Die Feuchtwiesen der Ordnung *Molinietalia* sind im Becken Liptovská kotlina nur mit den Gesellschaften des *Calthion* vertreten. In den niedrigeren Lagen (bis ca. 700 m ü.M.) sind es vornehmlich *Scirpetum sylvatici*, *Cirsietum rivularis* und *Filipendulo-Geranium palustris*. Aus höheren Lagen nennt RUŽIČKOVÁ (1978, 1986) das *Trollio-Cirsietum (rivularis)* und die an kalziumarme Böden gebundene *Deschampsia cespitosa-Carex leporina*-Gesellschaft, die wohl eine Vikariante des aus dem herzynischen Florengebiet beschriebenen *Polygono-Cirsietum palustris* darstellt.

1. *Calthenion*-Gesellschaften

1.1 *Scirpetum sylvatici* Ralski 1931

Das *Scirpetum sylvatici*, gekennzeichnet durch die Dominanz von *Scirpus sylvaticus*, gehört zu den häufigen, wenn auch kleinflächig entwickelten Gesellschaften des Beckens. Im Unterschied zum *Cirsietum rivularis* bevorzugt es die von Sickerwasser gespeisten nassen Standorte

(Feuchtezahlen: 7,6–8,6), meist mit niedrigerer Bodenazidität. Deswegen finden wir es hauptsächlich in den Auen der oberen Bachläufe und in Quellbereichen (s. auch NEUHÄUSLOVÁ-NOVOTNÁ & NEUHÄUSL 1972, ŠPÁNIKOVÁ 1982).

Unsere meistens von URVICHIAŘOVÁ erfaßten Aufnahmen stammen aus den Höhen von 545–650 m (Mittel 612 m), die von RUŽIČKOVÁ (1986) aus 500–650 (740) m (Mittel 613 m).

An der Artenzusammensetzung des von uns untersuchten *Scirpetum sylvatici* beteiligen sich neben dem dominierenden *Scirpus sylvaticus* und *Caltha palustris* mehrere *Molinietalia*-Arten. Von diesen sind zu nennen: *Lychnis flos-cuculi*, *Cirsium rivulare* (Diff. Art der karpatischen geographischen Rasse) und *Filipendula ulmaria*. Bei RUŽIČKOVÁ (1986) tritt noch *Equisetum palustre* dazu. Von den Klassenkennarten sind es vor allem *Rumex acetosa*, *Alopecurus pratensis*, *Poa trivialis* und *Cardamine pratensis*, bei RUŽIČKOVÁ (l.c.) auch *Festuca pratensis*. Von den Begleitern macht sich hauptsächlich *Mentha aquatica* bemerkbar.

Aus dem Becken Liptovská kotlina sind zwei Subassoziationen des *Scirpetum sylvatici* bekannt:

a) *Scirpetum sylvatici caricetosum (fuscae)* Knapp 1945: Subass. Diff. Arten: *Carex nigra*, *C. panicea*, *Eleocharis palustris* agg., *Pedicularis palustris*, *Eriophorum angustifolium* (Tab. 2, Aufn. 1–7; Aufn. 1–2: Variante von *Carex acutiformis*, Aufn. 3–5: Variante von *Carex flava*, Aufn. 6–7: Variante von *Carex davalliana*).

b) *Scirpetum sylvatici typicum* Knapp 1945: Ohne Subass. Diff. Arten (Tab. 2, Aufn. 8–12; Aufn. 10: Fazies von *Carex acutiformis*).

Im Kontakt zum *Scirpetum sylvatici* stehen andere Gesellschaften des *Calthion*. Die Assoziation besiedelt meistens humusarme Gleyböden; RUŽIČKOVÁ (1986) nennt für das *Scirpetum sylvatici caricetosum fuscae* auch Anmoor. Die vorwiegend lehmig-tonigen bis lehmigen Böden sind im Oberboden schwach sauer bis schwach alkalisch, mit einem geringen Ca-Gehalt, meistens in Form von CaCO_3 . Der Boden ist einen beträchtlichen Teil des Jahres vernäßt, besonders im Winter und in den Frühlingsmonaten, wo das Grundwasser eine Höhe bis +10 cm erreichen kann (URVICHIAŘOVÁ 1975 Mskr.).

1.2 *Cirsietum rivularis* Nowiński 1927

Diese Gesellschaft ist eine Vikariante des *Angelico-Cirsietum oleracei* mit Verbreitungsschwerpunkt in den Karpaten, wo sie auf kalkreichen, periodisch vernäßten Böden mit $\pm$ ausgeglichenem Wasserregime vorkommt. Aus dem karpatischen Florenbereich greift das Areal des *Cirsietum rivularis* in die Nebengebiete, in westlicher Richtung in die Alpen (OBERDORFER 1983) und auch in die Pyrenäen (cf. CARRERAS et VIGO 1984) über.

Im Becken Liptovská kotlina wurde das *Caricetum rivularis* von uns in 510–590 m Höhe registriert (RUŽIČKOVÁ 1986 fand es bei 510–710 m ü.M.). Es handelt sich um die karpatische geographische Rasse mit Vorkommen von *Valeriana simplicifolia*.

Die Assoziation ist im Untersuchungsgebiet durch die Präsenz von *Cirsium rivulare* und eine Reihe von Unterverbands-, Verbands- und Ordnungskennarten gekennzeichnet. Von diesen sind zu erwähnen: *Geum rivale*, *Myosotis scorpioides* (RUŽIČKOVÁ l.c.), *Caltha palustris*, *Filipendula ulmaria*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum palustre*, *Lychnis flos-cuculi*. Auch die Klassenkennarten sind reichlich vertreten, vor allem durch *Ranunculus acris*, *Festuca rubra*, *F. pratensis*, *Poa pratensis* (RUŽIČKOVÁ l.c.), *Rumex acetosa*, *Lathyrus pratensis* und *Trifolium pratense* (*Arrhenatheretalia*-Art). Von den Begleitern machen sich vor allem die *Scheuchzeria-Caricetea fuscae*-Arten (*Carex nigra*, *C. panicea*, *Valeriana simplicifolia*, *Juncus articulatus*) und die *Potentillion anserinae* (= *Agropyro-Rumicion*)-Arten (*Ranunculus repens*, *Lysimachia nummularia*, *Agrostis stolonifera*) stärker bemerkbar. Auch *Briza media* und *Mentha aquatica* kommen oft vor, von den Moosen vor allem *Calliergonella cuspidata*.

Es wurden insgesamt fünf Subassoziationen des *Cirsietum rivularis* unterschieden:

a) *Cirsietum rivularis caricetosum gracilis* Bal.-Tul. in Rybníček et al. 1983: Subass. Diff. Art: *Carex gracilis* (Tab. 3, Aufn. 1). Die einzige, in der Váh-Aue liegende Lokalität war am Untersuchungstag (6.8.1965) schwach überschwemmt.

b) *Cirsietum rivularis caricetosum davallianae* (Bosáčková 1970) Špáníková 1983: Subass. Diff. Arten: *Carex davalliana*, *Eriophorum latifolium*, *Carex hostiana*, *C. flava* agg., *Parnassia palustris* (Tab. 3, Aufn. 2–5; Aufn. 2–3: Variante von *Molinia caerulea*, Aufn. 5: Variante von *Geranium palustre*). In allen Fällen handelt es sich um Auenlagen.

c) *Cirsietum rivularis geranietosum palustris* subass. nova: Subass. Diff. Arten: *Geranium palustre*, *Valeriana officinalis*. Nomenklatorischer Typus: RUŽIČKOVÁ 1986, Tab. 15, Aufn. 13. Diese Subassoziation, die im Untersuchungsgebiet hauptsächlich von RUŽIČKOVÁ untersucht wurde (s. RUŽIČKOVÁ 1986, Tab. 15, Aufn. 8 und 13–14), ist an Auenlagen gebunden. Das betrifft auch unsere einzige Aufnahme (Tab. 3, Aufn. 6).

d) *Cirsietum rivularis chaerophylletosum hirsuti* Vigo et Carreras 1984: Subass. Diff. Art: *Chaerophyllum hirsutum* (Tab. 3, Aufn. 7). Unsere einzige Aufnahme stellt eine Variante von *Geranium palustre* dar.

e) *Cirsietum rivularis typicum* Bal.-Tul. 1977: Ohne Subass. Diff. Arten (Tab. 3, Aufn. 8–9). In beiden Fällen handelt es sich um eine Fazies von *Carex acutiformis*, ohne Präsenz der zum *Violion caninae* neigenden Arten. Am Untersuchungstag (6.8.1965) war die Bodenoberfläche überflutet; Wasserhöhe: +1 bis +2,5 cm).

Im Kontakt des im Durchschnitt bis 110–145 cm hohen Bestandes des *Cirsietum rivularis* wurden beobachtet: *Valeriano simplicifoliae*-*Caricetum davallinae* (Tab. 3, Aufn. 1,6 und 9), ein *Menyanthes trifoliata*-Bestand (Tab. 3, Aufn. 4) und eine zum *Arrhenatherion* vermittelnde Ausbildung der Assoziation (Tab. 3, Aufn. 2).

Als Bodentypen kommen Gley oder Anmoor vor. Der Oberboden besteht meistens aus dunkelbraunem, schwach strukturiertem Ton bis lehmigem Ton; der G-Horizont befindet sich nach RUŽIČKOVÁ (1986) in 14–30 cm Tiefe. Die Bodenreaktion ist neutral bis schwach alkalisch, die Feuchtezahlen liegen zwischen 7,2 und 8,0.

Vergleichen wir die synthetische Tabelle unserer Aufnahmen mit denen von RUŽIČKOVÁ, die sich im Durchschnitt auf eine niedrigere Höhenlage beziehen (560 m gegenüber 670 m ü.M.), sehen wir, daß es in der Artenzusammensetzung keine wesentlichen Unterschiede gibt (Tab. 3, zwei letzte Spalten). Auffallend ist nur ein geringeres Vorkommen der *Scheuchzeria*-*Caricetea fuscae*- und *Arrhenatheretalia*-Arten in den Aufnahmen von RUŽIČKOVÁ.

2. Filipendulenion-Gesellschaften

Artenarme, eine Höhe bis von 200 cm erreichende Hochstaudenfluren, die oft aus *Calthenion*-Wiesen nach Unterbrechung der Mahd entstehen können, sind im Untersuchungsgebiet mit drei Assoziationen vertreten: *Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum*, *Lysimachio vulgaris-Filipenduletum* und *Filipendulo-Geranietum palustris*.

2.1 *Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum* Niemann, Heinrich et Hilbig 1973

Das *Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum* wurde von uns an einem Ort registriert, und zwar an einem Bachufer bei der Ortschaft Krmeš in der Subassoziation *petasitetosum hybridi* Bal.-Tul. et Hübl 1979. Diese Subassoziation kommt auch in den österreichischen Nordostalpen vor (BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ & HÜBL 1979, 1985). Im Becken Liptovská kotlina zeigt sie folgende Artenzusammensetzung:

Datum: 5.8.1965; Gesamtdeckungsgrad (Krautschicht): 100%, Moose: 0%. Meereshöhe: 570 m. Feuchtezahl: 7,9, Artenzahl: 14.

Kennarten von Ass., U.Verband: *Chaerophyllum hirsutum* 1, *Filipendula ulmaria* 4.

Subass. Diff. Arten: *Petasites hybridus* 2, *Aegopodium podagraria* 2.

Ordnungskennarten: *Symphytum officinale* +, *Cirsium rivulare* +, *Angelica sylvestris* r.

Klassenkennarten (incl. *Arrhenatheretalia*): *Poa trivialis* +, *Dactylis glomerata* +, *Centaurea jacea* ssp. *pseudophrygia* +, *Alchemilla vulgaris* agg. r.

Übrige Arten: *Galium aparine* 3, *Festuca cf. gigantea* r, *Carex* sp. r.

Tabelle 2: *Scirpetum sylvatici* Ralski 1931

Wz. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Stetigkeit	
Meereshöhe (ca. m ü.M.)	585	585	635	640	640	690	565	685	685	545	660	545	Tab. 2, 12 Aufn.	1986
Aufnahmefläche (m ²)	16	16	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
Gesamtdeckungsgrad (%)	96	96	85	95	90	90	95	90	90	85	85	85		
Artenzahl der Krautschicht	16	18	38	40	37	32	34	28	30	23	28	24		
Feuchtezahl	8,9	8,9	8,5	8,3	7,6	7,6	7,6	8,6	8,0	8,8	8,8	8,6		
<u>Assoziations- und U. Verbandskennarten</u>														
<i>Scirpus sylvaticus</i> (dom.)	3	4	5	3	3	3	4	4	4	3	4	5	V	V
<i>Myosotis scorpioides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.	.	+	V	V
<i>Geum rivale</i>	.	.	r	.	r	1	+	r	+	r	r	r	IV	I
<u>Substr. und Var. Diff. Arten</u>														
<i>Carex nigra</i>	+	1	1	2	+	+	r	.	.	.	.	.	III	III
<i>Carex panicea</i>	.	+	+	1	1	1	.	.	r	.	.	.	III	III
<i>Eleocharis palustris</i> agg.	+	1	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II	I
<i>Pedicularis palustris</i>	.	.	r	.	.	r	.	.	.	.	.	.	I	I
<i>Carex stellulata</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.
<i>Carex flava</i> agg.	.	.	+	1	+	.	.	.	.	.	.	.	II	I
<i>Carex davalliana</i>	.	.	.	.	.	r	1	.	.	.	.	.	I	I
<i>Eriophorum angustifolium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
<u>Verbandskennarten</u>														
<i>Caltha palustris</i>	.	.	1	r	.	2	1	.	+	+	.	+	III	V
<i>Crepis peludosa</i>	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I	II
<u>Ordnungskennarten</u>														
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	.	.	+	.	r	+	+	r	r	.	r	.	IV	IV
<i>Cirsium rivulare</i>	.	.	.	r	r	.	+	+	1	+	r	+	IV	IV
<i>Equisetum palustre</i>	.	.	+	.	.	.	r	r	.	r	+	1	III	V
<i>Cirsium palustre</i>	.	.	+	+	.	.	r	r	.	r	+	1	III	I
<i>Polygonum bistorta</i>	.	.	.	1	2	+	.	.	.	r	r	.	III	.
<i>Ranunculus auricomus</i>	.	.	.	+	+	r	.	.	+	r	.	.	III	.
<i>Deschampsia cespitosa</i>	+	+	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	II	.
<i>Juncus conglomeratus</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I	II
<i>Sanguisorba officinalis</i>	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	I	I
<i>Dactylorhiza maculata</i>	.	.	.	r	.	+	.	.	.	.	.	.	I	I
<i>Galium uliginosum</i>	.	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	I	III
<i>Symphitum officinale</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	I	I
<i>Colchicum autumnale</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I	I
<i>Angelica sylvestris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I	.
<i>Juncus effusus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III
<i>Dactylorhiza majalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Cirsium cernuum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Cirsium oleraceum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<u>Übergr. Filipendulenion-Arten</u>														
<i>Filipendula ulmaria</i>	.	.	.	1	+	r	+	+	+	+	r	.	IV	III
<i>Lysimachia vulgaris</i>	+	+	.	+	.	+	r	+	.	.	r	.	III	III
<i>Lythrum salicaria</i>	1	1	.	.	.	.	.	.	.	r	r	r	III	I
<i>Geranium palustre</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	r	.	.	I	.
<i>Valeriana officinalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<u>Übergr. Molinion-Arten</u>														
<i>Cuccia pratensis</i>	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.
<i>Carex tomentosa</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I	.
<i>Molinia caerulea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I	.
<u>Klassenkennarten</u>														
<i>Rumex acetosa</i>	.	.	r	r	+	+	r	+	+	r	r	+	V	II
<i>Alopecurus pratensis</i>	+	r	+	r	3	.	+	+	+	.	.	1	IV	.
<i>Poa trivialis</i>	.	.	1	+	1	2	+	.	1	1	+	1	IV	III
<i>Cardamine pratensis</i>	+	+	r	+	r	.	r	1	.	r	.	.	IV	I
<i>Lathyrus pratensis</i>	.	.	r	+	.	r	1	+	1	r	.	.	III	III
<i>Ranunculus acris</i>	.	.	.	+	+	r	+	+	+	.	.	.	III	III
<i>Holcus lanatus</i>	.	.	1	.	1	1	1	.	1	.	.	.	III	II
<i>Vicia cracca</i>	.	.	.	r	r	.	+	r	.	.	.	+	III	.
<i>Prunella vulgaris</i>	.	.	r	r	r	.	.	+	.	.	.	.	II	II
<i>Poa pratensis</i> :angustif. ¹	.	.	+	1	.	1	.	.	.	.	r	II	II	II
<i>Cerastium holosteoideus</i>	.	.	.	+	1	.	2	.	.	.	.	.	II	II
<i>Festuca pratensis</i>	.	.	.	.	1	1	.	+	.	.	.	.	II	IV
<i>Festuca rubra</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	II
<i>Plantago lanceolata</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I	I

Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Stet.
Übergr. Arrhenatheretalia-													
-Arten													
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	.	.	+	r	+	.	.	+	+	.	.	r	III I
<i>Trifolium pratense</i>	.	.	.	r	2	1	+	.	1	.	r	.	III I
<i>Deucus carota</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
<i>Phleum pratense</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Centaurea pseudophrygia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Begleiter²													
Magnocaricetalia-Arten													
<i>Galium palustre</i>	+	1	r	+	.	.	+	.	.	.	+	+	III III
<i>Carex acutiformis</i>	2	2	.	3	.	.	.	.	.	4	r	.	III II
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	.	r	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I .
Agropyro-Rumicion-Arten													
<i>Potentilla anserina</i>	+	+	+	.	.	.	.	r	.	r	r	+	III I
<i>Juncus inflexus</i>	.	.	.	+	+	+	1	.	.	+	+	.	III .
<i>Carex hirta</i>	.	.	1	+	+	1	.	.	1	.	.	r	III .
<i>Rumex crispus</i>	+	+	.	.	.	.	.	r	.	.	r	r	III .
<i>Lysimachia nummularia</i>	.	.	.	+	.	.	.	r	1	.	.	.	III IV
<i>Ranunculus repens</i>	.	+	.	r	.	.	.	.	.	r	.	.	III III
<i>Agrostis stolonifera</i>	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I I
<i>Trifolium hybridum</i>	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	I I
Scheuchzerio-Cariceten													
fuscae-Arten													
<i>Juncus articulatus</i>	r	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	II III
<i>Valeriana simplicifolia</i>	.	.	r	1	.	.	1	.	.	.	.	.	II II
Arten mit Telloptimum													
in d. Violion caninae													
<i>Potentilla erecta</i>	.	.	+	+	r	.	.	+	.	.	.	.	III I
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	.	1	.	1	1	1	.	1	.	.	.	III I
<i>Luzula campestris</i>	.	.	.	r	.	.	.	r	+	.	.	.	II .
<i>Briza media</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II .
Übrige Begleiter													
<i>Mentha aquatica</i>	.	.	+	+	.	.	r	r	+	+	+	+	IV IV
<i>Polygonum hydropiper</i>	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	II .
<i>Lycopus europaeus</i>	.	.	1	.	.	.	.	.	.	r	+	+	II I
<i>Ranunculus polyanthemus</i>	.	.	r	.	r	+	r	r	.	.	r	1	III .
<i>Juncus tenuis</i>	.	.	.	.	+	1	.	.	+	.	.	.	II .
<i>Crucjata glabra</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	1	I I
<i>Salix cinerea</i>	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	r	.	I I
<i>Epilobium parviflorum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV .
<i>Mentha longifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II .
<i>Aegopodium podagraria</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I .
Bryophyta													
<i>Calliergon cordifolium</i>	+	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	II .
<i>Calliergonella cuspidata</i>	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	II III
<i>Climacium dendroideum</i>	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	+	II I
<i>Leptodictyum riparium</i>	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I .
<i>Plagiomnium affine</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II .
<i>Campylium stellatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II .
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II .

Einmal /A/ oder einmal bis zweimal /B/ vorkommende Arrhenatheretalia-Arten:

A Tab.2 : Aufn.5: *Trisetum flavescens* +, *Galium mollugo* agg. r; Aufn.8: *Leucanthemum vulgare* r; Aufn.9: *Avenochloa pubescens* +, *Geranium pratense* r

B Tab. in Ružičková 1986 : *Dactylis glomerata*, *Geranium pratense*, *Achillea millefolium*, *Campanula patula*, *Vicia sepium*, *Arrhenatherum elatius*, *Heracleum sphondylium*, *Trifolium dubium*, *Cynosurus cristatus*, *Bellis perennis*

Einmal /A/ oder einmal bis zweimal /B/ vorkommende Begleiter und Moose:

A Tab.2 : Aufn.2: *Carex riparia* +, Aufn.3: *Epilobium palustre* r, *Ranunculus flammula* r; Aufn.5: *Carex leporina* 2, *Carex hostiana* 1, *Juncus compressus* +; Aufn.6: *Carex vesicaria* +; Aufn. 7: *Trifolium campestre* r; Aufn.8: *Tussilago farfara* r; Aufn.9: *Stellaria graminea* r; Aufn.10: *Urtica dioica* r; Aufn.11: *Polygonum amphibium* r, *Senecio* sp. r; Aufn.12: *Rorippa* sp. r.

B Tab. in Ružičková 1986 : *Equisetum fluviatile*, *Scutellaria galericulata*, *Plantago major*, *Potentilla reptans*, *Blysmus compressus*, *Epilobium palustre*, *Triglochin palustre*, *Eriophorum latifolium*, *Carex hostiana*, *Taraxacum palustre*, *Grepis mollis*, *Hypericum tetrapetrum*, *Glechoma hederacea*, *Ajuga reptans*, *Primula elatior*, *Stellaria graminea*, *Tussilago farfara*, *Medicago lupulina*.

Lokalitäten:

1-2.1.1. Ptázká Lupča, Alluvium des Ptáčká-Baches südlich der Gemeinde. 13.9.1966.
3-5. Borice, Alluvium des Dámenovka-Baches, südlich der Ortschaft. 15.8. und 5.6.1967.
6. Javčina Lehota, Alluvium des Dámenovka-Baches nördlich der Ortschaft. 20.7.1967.
7. Ptázká Lupča, Alluvium des Ptáčká-Baches. 5.7.1968. 8-9. Javčina Lehota, Alluvium des Dámenovka-Baches nördlich vom Erlenwald. 20.7. und 19.7.1967. 10. Alluvium des Javčanka-Baches nördlich der ehemaligen Gemeinde Paludza (heute Talpěre Lip-tovská Hora). 6.6.1967. 11. Váh-Aue nordwestlich der Gemeinde Králová Lehota. 6.7.1967. 12. 4.10. Aufn.10.

² Nicht identisch mit *Foa angustifolia* L.

Tabelle 3: *Cirsietum rivularis* Nowiński 1927

Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Stetigkeit
Meereshöhe (ca.m ü.M.)	510	680	690	690	570	690	550	540	540	
Aufnahmefläche (m ²)	25	25	24	25	20	20	207	16	24	
Gesamtdeckungsgrad (%)	98	100	98	98	98	100	100	98	98	
Krautschicht (%)	98	90	55	98	97	98	100	98	98	
Moosschicht (%)	5	90	50	10	15	80	0	0	1	
Artezahl der Krautschicht	49	53	61	53	72	45	35	22	25	
Feuchtezahl	7,5	7,9	7,8	7,2	7,2	8,0	6,8	7,3	7,7	
So b. 3. 9. Aufl.										
Reizková 1986										
15. Aufl.										
<u>Assoziations- und U. Verbandskennarten</u>										
<i>Cirsium rivulare</i>	3	3	3	4	3	1	2	2	2	V
<i>Geum rivale</i>	.	+	1	+	+	1	.	.	.	IV
<i>Myosotis scorpioides</i>	.	.	+	1	.	+	1	.	.	III
<u>Subass. und Var. Diff. Arten</u>										
<i>Carex gracilis</i>	5	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Carex davalliana</i>	.	4	3	1	r	+	.	.	.	III
<i>Eriophorum latifolium</i>	.	2	+	r	r	+	.	.	.	IV
<i>Carex hostiana</i>	.	2	1	+	+	.	.	.	.	III
<i>Carex flava</i> agg.	.	+	+	+	2	1	.	.	.	III
<i>Farnassia palustris</i>	.	+	.	.	r	.	.	.	.	II
<i>Geranium palustre</i>	.	.	+	.	+	3	2	.	.	III
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	.	.	.	.	.	.	2	.	.	I
<u>Verbandskennarten</u>										
<i>Caltha palustris</i>	+	.	2	3	.	2	2	+	1	IV
<i>Crepis paludosa</i>	.	.	1	1	.	2	+	.	.	III
<i>Scirpus sylvaticus</i>	.	+	.	.	.	3	+	.	.	II
<u>Ordnungskennarten</u>										
<i>Deschampsia cespitosa</i>	1	+	1	2	+	+	.	1	+	V
<i>Equisetum palustre</i>	.	+	1	+	+	+	2	+	+	V
<i>Ichnis flos-cuculi</i>	+	.	+	1	+	+	+	.	.	IV
<i>Dactylorhiza majalis</i>	.	+	+	+	r	+	.	.	.	III
<i>Colchicum autumnale</i>	.	.	.	r	2	.	1	.	.	III
<i>Galium uliginosum</i>	r	.	+	.	.	1	.	.	.	II
<i>Symphytum officinale</i>	r	.	.	.	r	.	.	+	.	II
<i>Crepis succisifolia</i>	.	+	+	.	+	.	.	.	.	II
<i>Juncus conglomeratus</i>	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II
<i>Angelica sylvestris</i>	.	.	.	.	1	.	.	+	.	II
<i>Juncus effusus</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I
<i>Cirsium canum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
<i>Sanguisorba officinalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Ranunculus auricomus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Dactylorhiza maculata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<i>Cirsium oleraceum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<u>Übergr. Filipendulion-Arten</u>										
<i>Filipendula ulmaria</i>	.	r	.	r	1	1	.	+	r	IV
<i>Lysimachia vulgaris</i>	r	.	+	+	.	.	.	.	.	III
<i>Valeriana officinalis</i>	.	.	.	.	+	r	.	.	.	II
<i>Lythrum salicaria</i>	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<u>Übergr. Molinion-Arten</u>										
<i>Molinia caerulea</i>	r	2	+	.	.	.	.	.	.	II
<i>Carex flacca</i>	.	+	1	.	1	.	.	.	.	II
<i>Succisa pratensis</i>	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II
<i>Carex tomentosa</i>	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I
<u>Klassenkennarten</u>										
<i>Ranunculus acris</i>	+	2	2	+	2	+	2	1	+	V
<i>Festuca rubra</i>	2	.	2	2	1	3	3	1	2	V
<i>Rumex acetosa</i>	+	.	+	+	+	+	1	1	.	IV
<i>Festuca pratensis</i>	1	.	+	.	1	.	2	+	.	V
<i>Lathyrus pratensis</i>	+	.	.	3	1	2	2	2	1	IV
<i>Cerastium holosteoidees</i>	+	r	+	+	+	.	.	.	.	III
<i>Prunella vulgaris</i>	+	+	1	1	1	.	.	.	.	III
<i>Poa trivialis</i>	+	.	1	3	+	+	.	.	.	II
<i>Poa pratensis</i> (angustif.) [*]	3	.	.	.	+	.	2	3	3	III
<i>Plantago lanceolata</i>	.	+	+	+	+	r	.	.	.	III
<i>Trifolium repens</i>	.	+	+	+	+	.	.	.	.	III
<i>Cardamine pratensis</i>	.	.	+	.	.	1	1	.	.	II
<i>Holcus lanatus</i>	.	.	.	.	+	+	2	.	.	II
<i>Vicia cracca</i>	r	.	.	.	1	.	.	.	.	II
<i>Alopecurus pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Stet.
<u>Übergr. Arrhenatheretalia-Arten</u>										
Trifolium pratense	r	+	2	2	+	r	1	.	.	IV II
Carum carvi	r	.	r	+	+	.	+	.	.	III II
Leucanthemum vulgare	.	+	+	+	+	.	.	.	.	III .
Alchemilla vulgaris agg.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	III .
Lotus corniculatus	.	r	r	+	.	.	.	.	.	III I
Rhinanthus minor	.	1	2	+	+	.	.	.	.	III II
Centaurea pseudophrygia	+	.	.	+	.	.	.	.	.	II II
Cynosurus cristatus	.	+	1	1	.	.	.	.	.	II I
Achillea millefolium	r	.	.	.	.	.	.	.	.	II I
Phleum pratense	r	.	.	.	.	.	+	.	.	II II
Geranium pratense	r	.	.	.	.	.	.	+	.	II .
Leontodon hispidus	.	r	.	.	+	.	.	.	.	II .
Dactylis glomerata	.	.	.	.	r	.	1	.	.	II II
Taraxacum officinale	.	.	.	.	+	.	.	r	.	II .
Heracleum sphondylium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<u>Begleiter</u>										
<u>Scheuchzerio-Caricetea</u>										
<u>Iuscae-Arten</u>										
Carex nigra	+	+	1	1	+	2	1	+	r	V III
Carex panicea	1	3	2	2	3	2	1	+	.	V III
Valeriana simplicifolia	+	1	+	+	+	2	.	.	.	V III
Juncus articulatus	+	2	1	+	+	+	.	.	.	IV III
Eriophorum angustifolium	+	+	2	1	.	+	.	r	.	III .
Triglochin palustre	+	.	+	+	.	1	.	+	.	III .
Epilobium palustre	r	.	.	.	.	+	.	.	.	II .
Blysmus compressus	.	1	2	.	.	.	.	.	.	II .
<u>Agropyro-Rumicion-Arten</u>										
Ranunculus repens	3	+	+	2	+	+	.	1	1	V IV
Agrostis stolonifera	1	+	+	1	+	1	1	.	.	IV II
Lysimachia nummularia	+	r	.	.	+	+	2	1	1	IV IV
Trifolium hybridum	+	.	+	1	.	.	.	.	.	II I
Carex hirta	+	.	r	.	2	.	.	.	.	II I
Juncus inflexus	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II .
Potentilla reptans	r	.	.	.	r	.	.	.	.	II I
<u>Phragmito-Magnocaricetea-Arten</u>										
Phragmites australis	1	.	.	.	2	2	.	.	.	III I
Eleocharis palustris	+	+	.	.	.	.	1	+	.	III II
Galium palustre	+	.	.	.	.	r	.	r	+	III II
Carex acutiformis	1	.	.	.	.	.	.	4	5	II II
<u>Arten mit Teilontium</u>										
<u>in d. Violion caninae</u>										
Briza media	+	2	2	3	1	1	1	.	.	IV IV
Anthoxanthum odoratum	.	+	1	2	1	.	2	.	.	III II
Potentilla erecta	.	+	1	+	+	.	.	.	.	III II
<u>Übrige Begleiter</u>										
Ventha aquatica ?	1	+	.	+	r	+	.	+	2	V III
Medicago lupulina	.	+	+	+	+	.	.	.	.	III I
Frimula elatior	.	r	r	+	+	.	.	.	.	III II
Juncus tenuis	+	r	.	.	+	.	.	.	.	II .
Veronica chamaedrys	.	.	+	.	r	+	.	.	.	II I
Linum catharticum	.	.	.	.	r	+	.	.	.	II II
Crucista glabra	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II II
Polygonum amphibium	.	.	.	.	.	.	.	+	1	II .
Aegopodium podagraria	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II .
Epilobium parviflorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Bromus hordeaceus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Glechoma hederacea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
<u>Bryophyta²</u>										
Calliergonella cuspidata	1	5	3	1	2	2	.	.	+	IV
Thuidium recognitum	.	+	1	2	1	.	.	.	.	III
Mnium affine	.	+	2	1	.	4	.	.	.	III
Climacium dendroides	.	.	+	+	+	.	.	.	.	III
Bryum pseudotriquetrum	.	.	1	+	2	.	.	.	.	II
Cirriphyllum piliferum	.	.	.	+	+	.	.	.	.	II

¹ Einmal /A/ oder einmal bis zweimal /B/ vorkommende Arrhenatheretalia-Arten:

A Tab.3 : Aufn.5: Euphrasia rostkoviiana +, Heracleum sphondylium r, Pimpinella major r, Crepis biennis r

B Tab. in Ružicková 1986 : Galium mollugo agg., Trifolium dubium, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Avenochloa pubescens

² Meistens einmal /A/ oder einmal bis zweimal /B/ vorkommende Begleiter und Moose:

A Tab.3 : Aufn.1: Galium verum r; Aufn.2: Epipactis palustris +, Pinguicula vulgaris 1, Ranunculus flammula +, Danthonia decumbens +, Veronica officinalis r, Alnus glutinosa +, Fissidens adianthoides +; Aufn.3: Equisetum fluviatile +; Aufn.4: Ajuga reptans +, Trifolium campestre +, Hypnum pratense +; Aufn.5: Petasites hybridus 1, Trifolium montanum +, Luzula campestris agg. r, Galium aparine +, Plantago major r, Sonchus sp. +, Salix rosmarinifolia r; Aufn.6: Equisetum fluviatile 2, Menyanthes trifoliata +; Aufn.7: Carex paniculata +, Carex vulpina +; Aufn.9: Salix purpurea r, Salix sp. r, Brachythecium mildeanum +.

B Tab. in Ružicková 1986: Carex paniculata, Carex diandra, Carex rostrata, Carex vulpina, Poa palustris, Lycopus europaeus, Salix purpurea, Taraxacum palustre, Dactylorhiza maculata, Agrostis tenuis, Ajuga reptans, Potentilla anserina, Melilotus officinalis.

Ichalitäten:

1. Liptovská Teplá, östlich der Gemeinde liegendes Alluvium. 6.8.1965. 2. Alluvium zwischen den Ortschaften Bodice und Pavčina Lehota. 5.8.1965. 3. Pavčina Lehota, Quell-Lage südlich der Ortschaft. 7.8.1965. 4. Ibidem, aber auf dem anderen Bachufer. 7.8.1965. 5. Alluvium des Kláňanka-Baches zwischen Krmčův und Zubeľ. 3.8.1965. 6. Wie Aufn.3. 7. Liptovská Štiavnica, Alluvium des Štiavnica-Baches. Die von Ružicková 1986 übernommene Aufnahme. 25.6.1973. 8.-9. Alluvium bei der ehemaligen Ortschaft Parížovce /heute Talsperre Liptovská Mara/. 6.8.1965.

⁴) Nicht identisch mit *Poa angustifolia* L.

2.2 *Lysimachia vulgaris*-*Filipenduletum* Bal.-Tul. 1978

Dieser Assoziation, die durch das Vorkommen von *Lysimachia vulgaris* (bei Fehlen von *Geranium palustre*) und die dominierende *Filipendula ulmaria* gekennzeichnet ist, kann man Aufnahme 7 in der von RUŽICKOVÁ (1986) publizierten Tabelle 21 (Seite 74) zuordnen. Sie wurde von der Autorin auf einem quelligen Hang (Neigung 15° S) bei der Ortschaft Ižipovce (600 m ü.M.) aufgenommen. Es handelt sich um die kalzikole Subassoziation *caricetosum acutiformis* Bal.-Tul. et Hübl 1979, beschrieben aus dem Wiener Wald und den nordöstlichen Alpen (BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ & HÜBL 1979, 1985). RUŽICKOVÁ (l.c.) führt folgende Artenzusammensetzung an:

Datum: 29.6.1974; Gesamtdeckungsgrad (Krautschicht): 100%, Moose: 0%. Feuchtezahl: 7,5, Artenzahl: 16.

Kennarten von Ass., U.Verband: *Lysimachia vulgaris* 1, *Filipendula ulmaria* 5.

Subass. Diff. Art: *Carex acutiformis* 2.

Verbands- und Ordnungskennarten: *Caltha palustris* 1, *Scirpus sylvaticus* +, *Myosotis scorpioides* +, *Cirsium rivulare* 1, *Colchicum autumnale* +, *Deschampsia cespitosa* +, *Equisetum palustre* +.

Klassenkennarten (incl. Arrhenatheretalia): *Cardamine pratensis* +, *Rumex acetosa* +, *Galium mollugo* 2.

Übrige Arten: *Primula elatior* 1, *Cruciata glabra* +, *Salix cinerea* +.

2.3 *Filipendulo*-*Geranietum palustris* Koch 1925

Das kontinental getönte *Filipendulo*-*Geranietum palustris* wurde im Becken Liptovská kotlina von uns sowie von RUŽICKOVÁ (1986) an mehreren Stellen festgestellt und analysiert. Unsere Aufnahmen stammen aus Höhen von 540–630 m, jene von RUŽICKOVÁ aus 525–690 m. Die Gesellschaft kommt hier längs der Wasserläufe sowie in den Hangquell-Bereichen vor. Sie ist meistens durch die Dominanz von *Filipendula ulmaria* und Vorkommen von *Geranium palustre* (oft als Kodominante) gekennzeichnet. Von den Verbands kennarten s.l. kommen öfters *Lythrum salicaria* (*Filipendulenion*-Art), *Caltha palustris*, *Scirpus sylvaticus*, *Crepis paludosa* und *Cirsium oleraceum* vor, von den Ordnungskennarten sind es *Angelica sylvestris*, *Equisetum palustre* und *Cirsium rivulare*. Die Klassenkennarten sind hauptsächlich durch *Poa trivialis*, die Begleiter durch *Carex acutiformis*, *Valeriana simplicifolia* (Diff. Art der karpatischen geographischen Rasse), *Lysimachia nummularia* und *Galium aparine* vertreten. Die letztgenannte Art weist, zusammen mit *Aegopodium podagraria*, auf die Gefahr der Ruderalisierung der Gesellschaft hin.

Insgesamt fünf Subassoziationen des *Filipendulo-Geranium palustre* wurden unterschieden:

a) *Filipendulo-Geranium palustre caricetosum paniculatae* Bal.-Tul. et Hübl 1985: bis jetzt bekannt nur aus den österreichischen nordöstlichen Alpen. Subass. Diff. Arten: *Carex paniculata*, *Peucedanum palustre* (Tab. 4, Aufn. 1). In diese Subassoziation kann man auch Aufn. 3 aus der von RUŽIČKOVÁ (1986) publizierten Tabelle 21 eingliedern. Diese Aufnahme stammt aus der Umgebung des Ortes Úložisko (Meereshöhe 525 m).

b) *Filipendulo-Geranium palustre phalaridetosum arundinaceae* subass. nova: Subass. Diff. Arten: *Phalaris arundinacea*, *Symphitum officinale*, *Calystegia sepium* – Tab. 4, Aufn. 2–3. Nomenklatorischer Typus: Tab. 4, Aufn. 3. (Aufn. 2 stellt eine trockenere Variante von *Galium mollugo* dar). Eine ähnliche Ausbildung findet man auch in der Arbeit von ZACHARIAS et al. (1988) aus SO-Niedersachsen.

c) *Filipendulo-Geranium palustre menthetosum longifoliae* Bal.-Tul. 1985: Subass. Diff. Art: *Mentha longifolia*. Die einzige Aufnahme (Tab. 4, Aufn. 4) wurde von RUŽIČKOVÁ (1986) übernommen. Die Subassoziation war bis jetzt nur aus Mittelböhmen bekannt (BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ 1985, 1991).

d) *Filipendulo-Geranium palustre typicum* Knapp 1948: Häufige Subassoziation, ohne Subass. Diff. Arten (Tab. 4, Aufn. 5–6).

e) *Filipendulo-Geranium palustre urticetosum dioicae* Bal.-Tul. 1979: Subass. Diff. Arten: *Urtica dioica*, *Eupatorium cannabinum*, *Impatiens noli-tangere* (Tab. 4, Aufn. 7–8). Diese Arten weisen auf die Eutrophierung der Standorte hin. Schreitet diese weiter fort, kommt es zur allmählichen Degradation der Assoziation.

Im Kontakt des *Filipendulo-Geranium palustre* wurde meistens das *Cirsietum rivularis* notiert, bei den Aufnahmen 7–8 war es ein *Phragmites australis*-Bestand, bei Aufnahme 3 eine Weide.

Die untersuchten Bestände wachsen auf Gleyböden, die im obersten Teil des Bodenprofils aus graubraunem strukturiertem Lehm oder lehmigem Ton bestehen. Die Bodenreaktion ist nach RUŽIČKOVÁ (1986) schwach sauer bis neutral. Das Grundwasser hält sich einen beträchtlichen Teil des Jahres im Oberboden; auf einigen unserer Flächen gab es sogar Anfang August 1965 eine schwache Überflutung (Aufnahmen 6–8). Die Feuchtezahlen liegen zwischen 7,4 und 8,0.

Zur Stabilität der Struktur der untersuchten Syntaxa

Es bietet sich die Möglichkeit, unsere Tabellen der Feuchtwiesen-Gesellschaften mit den Tabellen von RUŽIČKOVÁ (1986) zu vergleichen, und zwar *Scirpetum sylvatici*, *Cirsietum rivularis* und *Filipendulo-Geranium palustre*.

In dem an Sickerwasser gebundenen *Scirpetum sylvatici* wurden in beiden Fällen zwei Subassoziationen unterschieden: *typicum* und *caricetosum fuscae*, welche dieselbe Struktur aufweisen (Vorkommen von denselben pflanzensoziologischen Gruppen, zum Teil auch innerhalb der Begleiter). Die Aufnahmen von RUŽIČKOVÁ stammen aber im Durchschnitt von etwas nasser Standorten (höhere Stetigkeit von *Caltha palustris*, *Equisetum palustre* und *Galium uliginosum*, niedrigere einiger *Molinio-Arrhenatheretea*-, *Arrhenatheretalia*- sowie der zum *Violion caninae* neigenden Arten; s. die zwei letzten Spalten in Tabelle 2).

Auch die Struktur des *Cirsietum rivularis* und des *Filipendulo-Geranium palustre* ist in beiden Fällen ähnlich (siehe letzte zwei Spalten in Tabellen 3 und 4). Hier beziehen sich aber die Aufnahmen von RUŽIČKOVÁ auf die im Durchschnitt trockeneren Standorte. Deswegen gibt es in den von ihr untersuchten Beständen des *Cirsietum rivularis*, die vorwiegend aus niedrigeren Lagen stammen (mittlere Seehöhe 560 m ü.M. gegenüber 607 m), weniger *Scheuchzeria-Caricetea fuscae*-Arten. In Bezug zu den Subassoziationen entsprechen die Aufnahmen von RUŽIČKOVÁ den vier von uns beschriebenen Einheiten, und zwar *geranietosum palustre*, *chaerophylletosum hirsuti*, *caricetosum davallianae* und *typicum*. Ihre Aufnahmen des *Filipendulo-Geranium palustre* stimmen mit drei Subassoziationen überein, die vorwiegend auf

Tabelle 4: Filipendulo-Geranietum palustris W.Koch 1926

Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	Stetigkeit
Meereshöhe (ca. m ü.M.)	630	540	550	630	640	630	630	630	
Aufnahmefläche (m ²)	20	15	15	207	16	16	20	20	
Gesamtdeckungsgrad (%)	100	98	100	100	99	98	99	99	
Krautschicht (%)	100	98	100	100	99	98	99	99	
Moosschicht (%)	1	2	0	0	0	0	0	0	
Artenzahl der Krautschicht	25	37	28	14	32	22	29	27	
Feuchtezahl	6,0	7,4	7,9	7,8	8,0	7,5	7,8	7,9	Tab. 4, 8 Aufn. Muziková 1986 7 Aufn.

Assoziations- und
U. Verbandskennarten

Geranium palustre	3	4	2	3	4	.	2	+	V	V
Filipendula ulmaria	2	2	4	4	3	5	4	5	V	V
Lysimachia vulgaris	1	2	+	1	.	.	3	2	IV	V
Lythrum salicaria	+	.	r	.	+	1	+	+	IV	III
Epilobium hirsutum	.	+	.	.	.	.	+	+	II	.
Chaerophyllum hirsutum	.	.	.	+	.	.	+	+	II	I
Valeriana officinalis	.	+	1	.	.	.	.	.	II	I
Thalictrum aquilegifolium	.	1	.	.	.	.	.	.	I	.

Subass. Diff. Arten

Carex peniculata	+	.	.	.	.	.	.	.	I	I
Peucedanum palustre	+	.	.	.	.	.	.	.	I	.
Phalaris arundinacea	.	2	3	.	.	.	+	.	II	.
Symphytum officinale	.	+	1	.	.	.	.	.	II	.
Calystegia sepium	.	2	.	.	.	.	.	.	I	.
Mentha longifolia	.	.	.	2	.	+	.	.	II	II
Urtica dioica	.	.	.	+	+	.	+	+	III	II
Eupatorium cannabinum	r	.	.	.	.	.	+	+	II	.
Impatiens noli-tangere	.	.	.	.	.	.	+	+	II	.

Verbandskennarten

Caltha palustris	2	.	+	1	r	+	2	1	V	V
Scirpus sylvaticus	+	.	+	+	.	2	1	.	IV	III
Crepis paludosa	3	.	r	.	1	.	+	1	IV	III

Übergr. Calthenion-Arten

Cirsium oleraceum	.	1	r	.	.	r	+	+	IV	I
Myosotis scorpioides	.	.	.	.	+	+	+	+	III	III
Senecio rivularis	1	.	.	.	.	+	1	r	III	.
Cirsium cenum	.	.	+	.	.	.	.	.	I	.
Trollius altissimus	.	.	.	.	2	.	.	.	I	.
Geum rivale	.	.	.	.	+	.	.	.	I	I

Ordnungskennarten

Angelica sylvestris	+	+	+	.	1	+	+	+	V	.
Equisetum palustre	3	+	+	.	1	2	2	.	V	III
Cirsium rivulare	+	.	+	+	1	1	.	.	IV	III
Dactylorhiza majalis	r	.	.	.	.	.	.	.	I	.
Ranunculus auricomus	.	+	.	.	.	.	.	.	I	.
Colchicum autumnale	.	.	+	.	.	.	.	.	I	II
Deschampsia cespitosa	.	.	.	.	.	+	.	.	I	II
Polygonum bistorta	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.
Juncus conglomeratus	.	.	.	.	.	r	.	.	I	.
Juncus effusus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Cirsium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Sanguisorba officinalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
Lychnis flos-cuculi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I

Übergr. Molinion-Art

Molinia caerulea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr. der Aufnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	Stet.
Klassenkennarten									
<i>Poa trivialis</i>	r	+	.	.	+	1	1	1	IV III
<i>Lathyrus pratensis</i>	2	+	+	+	.	.	.	.	III III
<i>Ranunculus acris</i>	+	+	.	.	+	.	.	.	II .
<i>Poa pratensis (angustifolia)</i> ¹	+	+	.	.	+	.	.	.	II .
<i>Vicia cracca</i>	.	+	.	.	r	.	.	.	II II
<i>Rumex acetosa</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	I II
<i>Cerastium holosteoides</i>	.	.	r	.	.	.	.	.	I .
<i>Alopecurus pratensis</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	I II
<i>Festuca pratensis</i>	.	.	.	.	r	.	.	.	I .
<i>Festuca rubra</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	I .
<i>Cardamine pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	III
Übergr. Arrhenatheretalia-Arten¹									
<i>Dactylis glomerata</i>	.	1	.	+	+	.	.	.	II II
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	.	r	.	.	r	+	.	.	II I
<i>Heracleum sphondylium</i>	.	+	r	.	.	.	.	.	II I
<i>Galium mollugo</i>	.	1	.	.	.	.	.	.	I II
Begleiter²									
Phragmito-Magnocaricetes-Arten									
<i>Carex acutiformis</i>	3	+	2	3	2	.	1	+	V III
<i>Phragmites australis</i>	2	1	.	.	.	.	.	.	II .
<i>Galium palustre</i>	.	.	.	.	.	.	+	+	II .
<i>Equisetum fluviatile</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	II
Scheuchzerio-Caricetes									
Tuscae-Art									
<i>Valeriana simplicifolia</i>	3	.	.	.	1	+	r	2	IV II
Agropyro-Rumicion-Arten									
<i>Lysimachia nummularia</i>	.	+	.	.	+	r	+	+	IV .
<i>Ranunculus repens</i>	.	.	.	.	r	+	2	+	III .
Übrige Begleiter									
<i>Galium aparine</i>	2	1	1	.	.	.	2	1	IV .
<i>Mentha aquatica</i> ?	+	+	.	.	.	r	.	+	III .
<i>Aegopodium podagraria</i>	.	2	r	2	.	.	.	.	II II
<i>Solanum dulcamara</i>	.	.	.	.	r	.	+	+	II
<i>Primula elatior</i>	.	+	1	.	.	.	.	.	II III
<i>Ajuga reptans</i>	.	.	1	.	r	.	.	.	II II
<i>Lycopus europaeus</i>	.	.	.	.	.	.	+	+	II .
<i>Salix cinerea</i>	.	.	.	.	+	.	+	2	II II
<i>Cruciata glabra</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	II

¹Einmal vorkommende Arrhenatheretalia-Arten

Aufn.2: *Vicia sepium* +, *Centaurea pseudophrygia* r; Aufn.5: *Campanula patula* r; Tab.in Ružičková: *Vicia sepium*, *Phleum pratense*.

²Einmal vorkommende Begleiter und Moose:

Aufn.1: *Carex nigra* +, *Calliergonella cuspidata* r; Aufn.2: *Trifolium medium* +, *Asarum europaeum* 1, *Agropyron caninum*, *Astrantia major* +, *Pulmonaria mollissima* +, *Campanula rapunculoides* +, *Eurhynchium swartzii* 1; Aufn.3: *Glechoma hederacea* +, *Salix caprea* r, *Salix* sp. r; Aufn.5: *Carex* cf. *gracilis* +, *Stellaria alsine* r, *Rumex crispus* r, *Carex hirta* r, *Melandrium rubrum* +; Aufn.6: *Agrostis stolonifera* +; Aufn.7: *Salix purpurea* 1; Tab.in Ružičková: *Equisetum sylvaticum*, *Veronica chamaedrys*, *Potentilla erecta*, *Epilobium angustifolium*.

Lokalitäten:

1.Kurort Lúčky, Alluvium nahe der Thermalquelle. 5.8.1965. 2.Alluvium nördlich der ehemaligen Ortschaft Parizovce (heute Talsperre Liptovská Mara). 5.8.1965. 3.Lúčky, Alluvium des Teplianka-Baches südlich der Gemeinde. 6.8.1965. 4.Andice, Bachau nördlich der Ortschaft. Die von Ružičková 1986 übernommene Aufnahme. 30.7.1974. 5.Rodice, Alluvium des Dmenovka-Baches südlich der Ortschaft. 5.8.1965. 6.-8.Wie Aufn.1.

¹ Nicht identisch mit *Poa angustifolia* L.

Grund unseres Materials beschrieben wurden: *caricetosum paniculatae*, *typicum* und *menthetosum longifoliae*. Der Hauptunterschied beruht auf einem schwächeren Vorkommen einiger Feuchtwiesepflanzen, vor allem von *Angelica sylvestris*, *Senecio rivularis* und *Cirsium oleraceum*, sowie einiger die Eutrophierung anzeigenden Arten wie *Potentilla anserina*, *Rumex crispus* und *Galium aparine* in den Aufnahmen von RUŽIČKOVÁ.

Wie schon angeführt, bezieht sich dieser Vergleich zwar auf dasselbe Gebiet, aber auf verschiedene Lokalitäten und verschiedene Zeitabschnitte. Es geht aus ihm eindeutig hervor, daß die Struktur der untersuchten pflanzensoziologischen Einheiten im Rahmen des Beckens Liptovská kotlina den entsprechenden Standorteigenschaften völlig entspricht und daß sie im Laufe von zehn Jahren stabil bleibt, wenn die Bestände gemäht werden und das Gebiet nicht anderen stärkeren Einflüssen (z.B. intensiver Beweidung, starker Düngung oder Entwässerungsmaßnahmen) ausgesetzt ist.

Literatur

- BALÁTOVÁ-TULÁČKOVÁ, E. (1985): Feuchtwiesen des Landschaftsschutzgebietes Kokořínsko (Mittelböhmen). – Tuexenia 5: 217–231. Göttingen.
- (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). – Folia Geobot. Phytotax. 26: 1–79. Praha.
- , HÜBL, E. (1979): Beitrag zur Kenntnis von Feuchtwiesen und Hochstaudengesellschaften Nordost-Österreichs. – Phytocoenologia 6: 259–286. Stuttgart.
- , – (1985): Feuchtwiesenbiotope aus den nordöstlichen Alpen und aus der Böhmisches Masse. – Angew. Bot. 29. Wien.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie. 3. Aufl. – Wien.
- CARRERAS, J., VIGO, J. (1984): Sobre la vegetació de l'aliança Calthion als Pirineus Catalans. – Collect. Bot. 15: 119–131. Barcelona.
- ELLENBERG, H. (1974): Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. – Scripta Geobot. 9. Göttingen.
- FUSÁN, O. (1972): Geológia. – In: LUKNIŠ M. (red.): Slovensko, Príroda: 19–123. Bratislava.
- MUELLER-DOMBOIS, D., ELLENBERG, H. (1974): Aims et methods of vegetation ecology. – New York.
- NEUHÁUSLOVÁ-NOVOTNÁ, Z., NEUHÁUSL, R. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Scirpetum silvatici in der ČSR (Tschechoslowakei, westlicher Teil). – Preslia 44: 335–346. Praha.
- OBERDORFER, E. (1983): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. 2. Aufl. Teil III. – Pflanzensoz. 10. Jena.
- RUŽIČKOVÁ, H. (1978): Trollio-Cirsietum Kuhn 1937 v Liptovskej kotline. – Biológia 33: 307–314. Bratislava.
- (1980): Spoločenstvá zväzu Caricion davallianae Klika 1934 v Liptovskej kotline. – Ibidem 35: 275–284.
- (1986): Trávne porasty Liptovskej kotliny. – Biol. Práce 86 (2): 1–138. Bratislava.
- RYCHNOVSKÁ, M. et kol. (1987): Metody studia travinných ekosystémů. – Praha.
- SYROVÝ, S. (red.) (1958): Atlas podnebí Československé republiky. – Praha.
- ŠPÁNIKOVÁ, A. (1982): Pflanzengesellschaften mit Scirpus silvaticus in der Slowakei. – Biológia 37: 503–512. Bratislava.
- URVICHAROVÁ, E. (1972): Lúčne, slatinné a pasienkové spoločenstvá Liptovskej kotliny a prilahlých pohorí. Manuskript; zum Teil Dissertation Univ. Bratislava.
- VESECKÝ, A. et al. (1958): Atlas podnebí Československé republiky. – Tabulky. Praha.
- ZACHARIAS, D., JANSEN, C., BRANDES, D. (1988): Basenreiche Pfeifengras-Streuwiesen des Molinietum caeruleae W. Koch 1926, ihre Brachestadien und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in Südost-Niedersachsen. – Tuexenia 8: 55–78. Göttingen.

RNDr. Emilie Balátová-Tuláčková, DrSc.
Minská 14
CS-61600 Brno

RNDr. Edita Urvichiarová
Obvodný úrad životného prostredia
CS-05001 Revúca

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Tuexenia - Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [NS 12](#)

Autor(en)/Author(s): Balatova-Tulackova Emilie,
Urvichiarova Edita

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Molinietalia-](#)

Gesellschaften im Becken Liptovská kotlina (N-Slowakei)
209-222