

Nomenklatorische Korrektur einiger Syntaxon-Namen

– Walter Gutermann, Ladislav Mucina –

Zusammenfassung

Nomenklatorische Korrekturen (nach dem Artikel 43 des Codes der pflanzensoziologischen Nomenklatur) einiger Syntaxon-Namen aus den Klassen *Bidentetea tripartiti*, *Festuco-Brometea*, *Koelerio-Corynephoretea* und *Puccinellio-Salicornietea*, die wegen falsch angewandter Artnamen notwendig waren, werden begründet und durchgeführt. Die Problematik des Namens *Agropyro dumetori-Artemisietum absinthii* Br.-Bl. ex Kielhauser 1954 nom. invers. wird erörtert. Für einige der Namen wird die noch ausstehende Typisierung vorgenommen.

Abstract

Ten syntaxa names (belonging to the classes of *Bidentetea tripartiti*, *Festuco-Brometea*, *Koelerio-Corynephoretea* and *Puccinellio-Salicornietea*) were corrected in accordance with the Code of Phytosociological Nomenclature (Art. 43), resulting from a critical evaluation of several mis-applied species names. The problems with the name *Agropyro dumetori-Artemisietum absinthii* Br.-Bl. ex Kielhauser 1954 nom. inv. were discussed.

Im Folgenden wird die Korrektur einiger Namen von Syntaxa aus den Klassen *Bidentetea tripartiti*, *Festuco-Brometea*, *Koelerio-Corynephoretea* und *Puccinellio-Salicornietea* nach dem Art. 43 des Codes der pflanzensoziologischen Nomenklatur (BARKMAN et al. 1986) vorgenommen. Alle diese Korrekturen sind sippentaxonomisch bedingt. Wo es notwendig erschien, wurden gleichzeitig auch einige Namen typisiert (laut Art. 16 des Codes). Die Definition von Synonymen (Syn., Syntax. Syn.), inkludierten syntaxonomischen Inhalten (Inkl.) und Pseudonymen sind von MUCINA (1993) ausführlich behandelt.

Artemisia salina

Von SOÓ (1927) verstand unter „*Artemisia salina*“ die später meist als *A. monogyna* bekannte Art, für die bereits FRITSCH (1893) den prioritätsberechtigten Namen *A. santonicum* L. eingeführt hatte. LEONOVA (1969) hat den Namen dementsprechend lectotypisiert; er bezeichnet die pontisch-pannonische Sippe des *Artemisia maritima*-Komplexes (PERSSON 1974). *Artemisia salina* Willd. s. str. ist dagegen ein Synonym von *A. maritima* L. subsp. *maritima*, und bezieht sich auf eine ihrer binnenländischen Populationen.

Artemisietum santonicum von Soó 1927 corr. hoc loco
(*Puccinellio-Salicornietea*)

Ursprüngliche Namensform: *Artemisietum salinae* von Soó 1927 (Art. 43)

Syn.: „*Artemisieto-Festucetum pseudovinae*“ de Soó 1947 (Art. 2b), *Artemisio-Festucetum pseudovinae pannonicum* Soó 1963 (Art. 34)

Syntax. Syn.: *Statici-Artemisietum monogynae* Topa 1939, *Artemisietum monogynae* Wenzl 1943

Inkl.: „*Festucetum pseudovinae Artemisia-monogyna*-Subassoziation“ von Soó 1936

Originaldiagnose: VON SOÓ (1927)

Atriplex hastata

Seit HANSEN & PEDERSEN (1968) ist bekannt, daß die von der Insel Öland beschriebene Linnésche Pflanze nicht die „*Atriplex hastata*“ der mitteleuropäischen Autoren darstellt, sondern der südschändisch-baltischen *A. calotheca* (Rafin.) Fries entspricht. Die formale Lectotypisierung von *A. hastata* L. (1753) in diesem Sinn hat TASCHEREAU (1972) vorgenommen

(vgl. auch GUSTAFSSON 1976, TASCHEREAU 1985). Der Komplex von „*A. hastata* auct.“ wurde von PEDERSEN (1968) auf mehrere Arten aufgeteilt, die aber heute mit Ausnahme einiger nord(west)europäischer Küstensippen wieder zu einer mäßig polymorphen Art zusammengefaßt werden. Der älteste Name dafür ist *A. prostrata* Bouch. ex DC. (1805) (vgl. GUSTAFSSON 1976, TASCHEREAU 1985); eine weitergehende Gliederung (etwa in Unterarten, wie dies RAUSCHERT 1974 vorgeschlagen hatte) ist beim gegenwärtigen Kenntnisstand dieser Sippe wenig sinnvoll.

Xanthio-Atriplicetum prostratae Passarge 1964 corr. hoc loco

(*Bidentetea tripartiti*)

Ursprüngliche Namensform: *Xanthio-Atriplicetum hastatae* Passarge 1964 (Art. 43)

Originaldiagnose: PASSARGE (1964: 72–73)

Atriplicetum prostratae Wenzl 1934 corr. hoc loco

(*Puccinellio-Salicornietea*)

Ursprüngliche Namensform: *Atriplicetum hastati* Wenzl 1934 (Art. 43)

Inkl.: *Atriplex hastatum*-Bestände Bojko 1932 (Art. 3c)

Nomenklatorischer Typus: WENZL (1934: 125, Aufn. 45), Lectotypus hoc loco designatus.

Atriplici prostratae-Chenopodietum crassifolii Slavnić 1948 corr. hoc loco

(*Puccinellio-Salicornietea*)

Ursprüngliche Namensform: „Asocijacija *Chenopodium-Atriplex salina*“ Slavnić 1948 (Art. 43)

Originaldiagnose: SLAVNIĆ (1948: 13–14)

Bidenti-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tx. 1960 corr. hoc loco

(*Bidentetea tripartiti*)

Ursprüngliche Namensform: *Bidenti-Atriplicetum hastatae* Poli et J. Tx. 1960 (Art. 43)

Originaldiagnose: POLI & TÜXEN (1960)

Chenopodio-Atriplicetum prostratae Br.-Bl. et De Leeuw 1936 corr. hoc loco

(*Bidentetea tripartiti*)

Ursprüngliche Namensform: „*Chenopodieto-Atriplicetum hastatae*“ Br.-Bl. et De Leeuw 1936 (Art. 43)

Nomenklatorischer Typus: BRAUN-BLANQUET & DE LEEUW (1936: 389, die Aufnahme aus Nees, Ameland), Lectotypus hoc loco designatus.

Agropyron dumetorum

In den Aufnahmen KIELHAUSERS (1954: Tab. 4) aus dem Oberinntal taucht ein „*Agropyron dumetorum*“ (Charakterart des „*Artemisieto-Agropyretum*“) auf, das dem „*Agropyron littorale*“ (= *Elymus athericus* (Link) Kerg.) aus dem Engadin bewußt gegenüber gestellt wird. Damit sind höchstwahrscheinlich die an Trockenstandorten nicht selten auftretenden Populationen schwach begrannter Formen von *Elymus repens* (L.) Gould gemeint, die in Tirol als „*Triticum repens* var. *dumetorum* (Hoffm.) Schreb. (DALLA TORRE & SARNTHEIN 1906) bzw. als „*Agropyron* [*repens* subsp.] *dumetorum* (Hoffm.) Richt.“ (FRITSCH 1922) bekannt sind. Ohne Autopsie ist das Kielhausersche „*Agropyron dumetorum*“ aber nicht sicher zu identifizieren, da im Inntal außer *E. repens* auch weitere Sippen bekannt sind. Zudem ist die korrekte Anwendung des Epithets „*dumetorum*“ im obigen Sinne nicht über allen Zweifel erhaben.

Agropyro dumetorum-Artemisietum absinthii Br.-Bl. ex Kielhauser 1954 nom. inv.

(*Festuco-Brometea*)

Ursprüngliche Namensform: „*Artemisieto-Agropyretum* Br.-Bl. 1919“ (KIELHAUSER 1954)

Syn.: *Artemisio-Agropyretum* Br.-Bl. 1919 (Art. 2b, 43)

Nomenklatorischer Typus: KIELHAUSER (1954: 665, Tab. 4, Aufn. 1), Lectotypus hoc loco design.

Festuca duriuscula, Festuca glauca & F. cinerea

Der Name „*Festuca duriuscula*“ wurde in verschiedenen Regionen Europas für eine Reihe steifblättriger Sippen des *F. ovina*-Aggregats verwendet. Er bezieht sich jedoch gemäß dem Typus auf eine *F. rubra*-Sippe (KERGUÉLEN 1975: 171). *F. duriuscula* wurde in Böhmen

mehrfach für *F. pallens* Host verwendet [im übrigen Mitteleuropa verstand man darunter zu-
meist die von KRAJINA (1930) als „*F. trachyphylla*“ abgetrennte Art].

Desgleichen wurde für *F. pallens* fälschlicherweise der Name *F. glauca* Lam., der sich auf ein
engräumigen Endemiten der Küste Südostfrankreichs bezieht, oder der Name *F. cinerea*
Vill. verwendet (so KOLBEK 1975), der seinerseits eine Art der Kalkalpen Südostfrankreichs
bezeichnet (vgl. KERGUÉLEN & PLONKA 1989).

Alyso saxatilis-Festucetum pallentis Klika ex Čerovský 1949 corr. hoc loco
(*Festuco-Brometea*)

Ursprüngliche Namensform: „Assoziation *Festuca duriuscula-Alyssum saxatile*“ Čerovský 1949 (Art. 43)
Syn.: „ass. *Festuca duriuscula-Alyssum saxatile*“ Klika 1941 (Art. 3f). *Allio-Sempervivetum vachauense*
Knapp 1944 (Art. 1, 34), *Festucetum scabrifoliae* Zielonkowski 1973 (Art. 29), *Alyso saxatilis-Festucetum*
pallentis Hübl et Holzner 1977 (Art. 31), *Aurinio saxatilis-Festucetum pallentis* Flaschberger 1988
(Art. 1, 31)

Syntax. Syn.: *Allio montani-Festucetum pallentis* Zielonkowski in Linhard et Stückl 1972

Asperulo glaucae-Festucetum pallentis Preis in Klika 1939 corr. hoc loco
(*Festuco-Brometea*)

Ursprüngliche Namensform: „*Festuca duriuscula* sp.-*Asperula glauca*-Assoziation“ Klika 1939 (Art. 43)
Originaldiagnose: KLIKA (1939); bezüglich des nomenklatorischen Typus siehe KOLBEK (1975)

Festuco pallentis-Caricetum humilis Sillinger 1930 corr. hoc loco
(*Festuco-Brometea*)

Ursprüngliche Namensform: „Asociace *Festuca glauca-Carex humilis* (*Glauceto-Caricetum humilis*“ Sil-
linger 1930 (Art. 43)

Syn.: *Caricetum humilis* Podpěra 1928 (Art. 36), *Caricetum humilis praecarpaticum* (Klika 1931) Soó 1945
(Art. 29, 34)

Pseudonym: *Diantho-Seslerietum* sensu Niklfeld 1964 p.p. (*caricetosum humilis*)

Originaldiagnose: SILLINGER (1930: 28–33)

Nomenklatorischer Typus: MAGLOCKÝ (1979: 86–90, Tab. 26, Aufn. 7), Neotypus hoc loco design.

Der Neotypus wurde aus dem Gebiet der Erstbeschreibung (Tematínske kopce in der Westslowakei) aus-
gewählt. SILLINGER (1930) brachte nur Stetigkeitstabellen.

Koeleria albescens

Die für die Graudünen charakteristische Art ist von der aus Frankreich beschriebenen
K. albescens DC. verschieden, wenn auch nahe verwandt. Nach UJHELYI (1961, 1969) und
CONERT (1987) muß sie *K. arenaria* (Dumort.) Ujh. heißen. Beide Sippen zählen zum For-
menkreis von *K. glauca* (Schrad.) DC. s. lat.

Koelerion arenariae R. Tx. 1937 corr. hoc loco
(*Koelerio-Corynephoretea*)

Ursprüngliche Namensform: *Koelerion albescens* R. Tx. 1937 (Art. 43)

Syn.: *Bromion tectorum* Soó von Bere 1940 (Art. 8, 36), *Bromion tectorum* Soó ex Felföldy 1942 (Art. 36)

Syntax. Syn.: *Psammo-Vulpion* Pignatti 1954, *Sileno conicae-Cerastion semidecandri* Korneck 1974

Originaldiagnose: TÜXEN (1937: 58–60)

Nomenklatorischer Typus: TÜXEN (1937: 58–60), „*Tortuleto-Phleetum* (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) Tx.
1937“, Holotypus

Weitere Informationen zu syntaxonomischen Verwandtschaft dieses Verbandes finden sich bei MUCINA
& KOLBEK (1993).

Rorippa islandica

Seit den Untersuchungen JONSELLs (1968, 1969) ist bekannt, daß *Rorippa islandica*
(Gunn.) Borb. s. str. und *R. palustris* (L.) Bess. zwei scharf getrennte Arten sind. Erstere ist eine
in Mitteleuropa seltene arktisch-alpine Art, letztere die allgemein verbreitete Sippe, die auch
den Kärtner Gesellschaftsaufnahmen von KUTSCHERA (1966) zugrunde liegt.

Rorippo palustris-Myosotetum Kutschera 1966 corr. hoc loco

Ursprüngliche Namensform: „*Rorippa islandica-Myosoton* (= *Malachium aquaticum*-Ass.“ Kutschera 1966 (Art. 43)

Syn.: *Bidentio-Myosotetum aquaticae* Wieser 1977 (Art. 1, 3b)

Nomenklatorischer Typus: KUTSCHERA (1966: Tab. auf Seiten 88–89, Aufn. 7), Lectotypus hoc loco designatus.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des Projektes Nr. P7180-BIO „Pflanzengesellschaften Österreichs“ (Leiter: G. GRABHERR) entstanden und wurde von Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Wien, Österreich) gefördert.

Literatur

- BARKMAN, J.J., MORAVEC, J., RAUSCHERT, S. (1986): Code of phytosociological nomenclature. Code der pflanzensoziologischen Nomenklatur. Code de nomenclature phytosociologique. 2ⁿ edition – 2. Auflage – 2^{ème} édition. – Vegetatio 67: 145–195. Dordrecht.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1961): Die inneralpine Trockenvegetation. – Gustav Fischer, Jena: 273 S.
- , DE LEUW, W.C. (1936): Vegetationsskizze von Ameland. – Nederl. Kruidk. Arch. 46: 359–393. Amsterdam.
- CONERT, H.J. (1987): Koeleria. – In: HEGI, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 3. Aufl. Band I. Teil 3 : 261–277. Paul Parey, Berlin.
- DALLA TORRE, K.W. von, SARNTHEIN, L. Graf von (1906): Flora der gefürsteten Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und des Fürstenthumes Liechtenstein. VI. Band., Teil 1. – Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck: 563 S.
- FRITSCH, C. (1893): *Artemisia Santonicum*. – In: Kerner, A.: Schedae ad floram exsiccata austro-hungaricam. VI: 93–96. Vindobona.
- FRITSCH, K. (1922): Exkursionsflora für Österreich und die ehemals österreichischen Nachbargebiete. 3. Aufl. – Gerold, Wien: 824 S.
- GUSTAFSSON, M. (1976): Evolutionary trends in the *Atriplex prostrata* group of Scandinavia. – Opera Bot. 39: 1–63. Lund.
- HANSEN, A., PEDERSEN, A. (1968): Chenopodiaceernes og Amaranthaceernes udbredelse i Danmark. – Bot. Tidskr. 63: 205–288. København.
- JONSELL, B. (1968): Studies in the north-west European species of *Rorippa* s.str. – Symb. Bot. Upsal. 19(2): 1–222 + 11 plates. Uppsala.
- JONSELL, B. (1969): *Rorippa islandica* und *R. palustris* – zwei scharf getrennte Arten der Alpenländerflora. – Ber. Geobot. Inst. ETH, Stift. Rübel 39: 52–55. Zürich.
- KERGUÉLEN, M. (1975): Les Gramineae (Poaceae) de la flore françaises. Essai de mise au point taxonomique et nomenclaturale. – Lejeunia N.S. 75: 1–343. Liège.
- , PLONKA, F. (1989): Les Festuca de la flore de France (Corse comprise). – Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., Numéro speciale 10: 1–368. Dignac.
- KIELHAUSER, G.E. (1954): Die Trockenrasengesellschaften des Stipeto-Poion xerophilae im oberen Tiroler Inntal. – Angew. Pflanzensoziol., Festschrift Aichinger, Sonderh. 1: 646–666. Wien.
- KLIKA, J. (1939): Die Gesellschaften des Festucion vallesiaca-Verbandes in Mitteleuropa. – Stud. Bot. Cech. 2: 117–157. Praha.
- KOLBEK, J. (1975): Die Festucetalia valesiaca-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 1. Die Pflanzengesellschaften. – Fol. Geobot. Phytotax. 10: 1–57. Praha.
- KRAJINA, V. (1930): Genus *Festuca*. – In: DOMIN, K.: Schedae ad Floram Cechoslovacam exsiccata n. 116–129. Acta Bot. Bohem. 9: 184–220. Praha.
- KUTSCHERA, L. (1966): Ackergesellschaften Kärntens als Grundlage standortgemäßer Acker- und Grünlandwirtschaft. – Bundesversuchsanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein, Irnding: 194 S.
- LEONOVA, T.G. (1969): *Artemisia*. – In: VUL'F, E.V. (Edit.): Flora Krima 3(3): 210–223.
- MAGLOCKÝ, Š. (1979): Xerothermná vegetácia v Považskom Inovci. – Biol. Práce 15(3): 1–132. Bratislava.
- MUCINA, L., (1993): Nomenklatorische und syntaxonomische Definitionen, Konzepte und Methoden. – In: MUCINA, L., GRABHERR, G., ELLMAUER, T. (Edit.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil I. Gustav Fischer, Jena.

- , KOLBEK, J. (1993): Koelerio-Corynephoretea. – In: MUCINA, L., GRABHERR, G. & ELLMAUER, T. (Edit.): Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Teil I. Gustav Fischer, Jena.
- PASSARGE, H. (1964): Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes I. – Gustav Fischer, Jena: 324 S.
- PEDERSEN, A. (1968): Nogle kritiske Danske Atriplex-arter. – Bot. Tidsskr. 63: 289–303. København.
- PERSSON, K. (1974): Biosystematic studies in the *Artemisia maritima* complex in Europe. – Opera Bot. 35: 1–188. Lund.
- POLI, E., TÜXEN, R. (1960): Über Bidentetalia-Gesellschaften Europas. – Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 8: 136–144. Stolzenau/Weser.
- RAUSCHERT, S. (1974): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands (IV). – Feddes Repert. 85: 641–661. Berlin.
- SILLINGER, P. (1930): Vegetace Tematinských kopců na západním Slovensku. – Rozpr. II. Tř. České Akad., 40(13): 1–46. Praha.
- SLAVNIĆ, Ž. (1948): Slatinska vegetacija Vojvodine. – Arh. Poljopriv. Nauke Tehn. 3(4): 1–80.
- SOÓ, R. von (1927): Geobotanische Monographie von Kolozsvár (Klausenburg). – A Studium Könyvkiadó, Budapest: 151 S.
- TASCHEREAU, P.M. (1972): Taxonomy and distribution of *Atriplex* species in Nova Scotia. – Can. J. Bot. 50: 1571–1594.
- (1985): Taxonomy of *Atriplex* species indigeneous to British Isles. – *Watsonia* 15: 183–209.
- TÜXEN, R. (1937): Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschland. – Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. Nieders. 3: 1–170. Hannover.
- UJHELYI, J. (1961): Data on the systematics of the subsectio *Glaucæ* of sectio *Bulbosæ* of the genus *Koeleria*. – Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung., Pars Bot., 53: 207–224. Budapest.
- (1969): Data to the systematics of the sections *Bulbosæ* and *Caespitosæ* of the genus *Koeleria*. VIII. – Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung., Pars Bot., 61: 165–188. Budapest.
- WENZL, H. (1934): Bodenbakteriologische Untersuchungen auf pflanzensoziologischer Grundlage. I. Das Vorkommen von *Azotobacter chroococcum* in den Hygrophyten-, Halophyten- und Steppengesellschaften am Neusiedler See. – Beih. Bot. Centralbl., Abt. A 54: 73–147. Dresden.

Dr. Walter Gutermann
Abteilung für Areal- und Vegetationskunde,
Institut für Botanik, Universität Wien,
Rennweg 14,
A-1030 Wien, Österreich

Univ.-Prof. Mag. DDr. Ladislav Mucina,
Arbeitsgruppe Populationsbiologie,
Institut für Pflanzenphysiologie,
Universität Wien,
Althanstraße 14,
A-1091 Wien, Österreich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Tuexenia - Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [NS_13](#)

Autor(en)/Author(s): Gutermann Walter Eckard, Mucina Ladislav

Artikel/Article: [Nomenklatorische Korrektur einiger Syntaxon-Namen 541-545](#)