

Szerző a LIMPRICHT-féle herbarium vizsgálatá alapján megállapítja, hogy az *Amblystegium trichopodium*, Kochii és *curvipes* ugyanabba az alakkörbe tartozik. Az *A. Hausmannii* legfeljebb csak formája az *A. leptophyllum*-nak, az utóbbi pedig egy xerophilus formája az *A. riparium*-nak, melytől való tényleges elkülönítése még bizonyításra szorul. Az *A. Juratzkanum* s az *A. radiale* (P. B.) MITTEN *sensu* LIMPR. között valóságos különbségeket a LIMPRICHT-herbariumban nem lehetett megállapítani. Az *A. hygrophilum* a LIMPRICHT-herbariumban többféle mohából áll és egyáltalában többjelentésűnek látszik CARDOT és GROUT szerint az *A. radiale* (P. B.) *originalis* példánya *A. hygrophilum*-mal azonos.

Une graminée nouvelle de la flore constantinopolitaine.

Par Mr. G. V. Aznavour (Constantinople).

(Pl. num. II.)

En examinant, dernièrement, une petite collection botanique, faite par un élève de l'«Etablissement Saint-Joseph» (des Frères des Ecoles Chrétiennes), à Cadikeuy, j'ai trouvé, parmi les plantes qui la composaient, un échantillon d'un *Alopecurus* ayant le faciès et les dimensions de l'*A. utriculatus* Pers.

L'étude de ce spécimen, quoique incomplet, m'a amené à reconnaître que je ne trouvais en présence d'une espèce nouvelle.

Bien qu'on n'ait pu m'indiquer la station de cette graminée, j'ai eu la chance, en herborisant dans les lieux voisins de Cadikeuy¹⁾, — localité aux environs de laquelle le susdit échantillon avait été cueilli, — d'en trouver quelques nouveaux exemplaires, complets et bien conditionnés; ce qui m'a permis de mieux connaître les caractères de l'espèce. Depuis lors, — et il n'y a pas longtemps, — j'ai rencontré la même espèce dans quelques nouvelles localités: ces dernières situées sur la côte européenne du Bosphore.

Cette plante ne semble pas être de celles qui poussent en grand nombre dans un même lieu (*gregariae*); mais, il est fort possible qu'elle croisse, isolée ou presque, dans bon nombre d'autres localités de cette région. Le fait que cette espèce n'ait pas été jusqu'ici remarquée par moi s'explique par sa grande ressemblance à notre très vulgaire *A. utriculatus*, pour lequel je l'aurai peut-être prise en passant, si jamais je l'ai précédemment rencontrée quelque part.

Voici la description de cette plante:

Alopecurus neglectus SPEC. NOV. (Sect. *Eualopecurus* GRISEB. *Spic.* II., p. 465 p. p. ASCH. et GR. *Syn.* II., p. 129).

¹⁾ Village placé sur le littoral asiatique de la mer de Marmara, faisant face à Stamboul.

Annuus, radice fibrosa, culmis tenuibus, erectis vel ascendentibus, *superne pube brevi patula velutinis*; foliis linearibus, tenuissime scabriusculis, inferioribus angustioribus longioribusque: vaginis glabris, striatis, inferioribus cylindricis, superiore supra medium utriculato-inflata; ligula brevi, truncata; panicula spiciformi ovata vel oblonga, ramis *unispiculatis*; glumis subaequalibus, ad vel ultra tertiam partem usque connatis, lanceolatis, acutis, compressis, carinatis, submembranaceis, albidis, viridi-trinerviis, inferne fere ultra medium pubescentibus, praeterea ad nervos et ad carinam subsericeo-villosis, superne praeter carinam apicem versus plus minusve ciliatam subglabris; glumella glumis subbrevis, lanceolata, acuta, glabra, albida, apice viridi, inferne ad $\frac{1}{3}$ usque marginibus connata, prope basin aristata; arista fere ad tertiam partem geniculata, spicula 2—2 $\frac{1}{2}$ -plo longiori, supra genu scabrida; palea nulla; antheris oblongis, flavidis aut virescentibus; caryopsis oblonga, acutiuscula.

Hab. — Bord des trottoirs, décombres: à Haïdar-Pacha et à Moda (non loin de Cadikeny); à Pancaldi et Chichli (près de Péra); à Couroutchehmi et Arnaoutkeuy (Bosphore). — Fl et Fr. = avril — juillet. *Souvent en compagnie de l'A. utriculatus.*

Tiges hautes de 1 à 3 décim. Feuilles inférieures à limbe long de 5—10 cm, à peine large de 1 mm; les supérieures raccourcies, larges de 2 mm et plus; partie renflée de la gaine supérieure longue de 2—3 cm sur 4—6 mm de large. Panicule de 12—25 mm de long, de 6—8 mm de large, 1 $\frac{1}{2}$ à 3 fois aussi longue que sa plus grande largeur. Épillets longs de 3.5—4 mm, larges de 1.2—1.5 mm. Anthères longues d'environ 2 mm. Caryopse de 2.5 × 1 mm.

Très voisin de l'**A. anthoxanthoides** Boiss., dont il se distingue par la panicule à *rameau portant un seul épillet* (non 3—4-spiculés); par les *épillets près de deux fois moindres* (non longs de 7 mm et plus); par la glumelle un peu plus courte que les glumes, *soudée seulement dans son tiers inférieur* (non jusqu'aux $\frac{2}{3}$); et enfin, par la tige *pubescente dans sa partie supérieure*.

Port des formes grêles de l'*A. utriculatus* PERS. (de la Sect. *Tozzelia* ENDL.), lequel diffère amplement de l'espèce ci-dessus décrite, — sans parler des autres caractères, — par les glumes *connées dans leur moitié inférieure, subcoriaces et renflées en bosse sur le dos jusqu'au delà du milieu, vertes et brusquement contractées au-dessus, tantôt entièrement glabres, tantôt un peu ciliées inférieurement sur la carène, parfois aussi sur les nervures.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Aznavour G. V.

Artikel/Article: [Une graminée nouvelle de la flore constantinopolitaine.
277-278](#)