

old. — Kövessi F., A növényi szörök nitrogén-assimilálási képességről, p. 95.  
old. — Botanikai Közlemények X. (1911) 5—6. füzet (Heft), p. 96. —  
Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1910. évi állapotáról.  
(Bericht über den Bestand des Ungarischen National-Museums i. J. 1910.), p.  
97. old. — Külöldi botanikai dolgozatok ismertetése. — Referate über ausländische  
botan. Arbeiten. — T. Ciesielski, Quomodo fiat ut mox proles masculina,  
mox feminina oriatur apud plantas, animalia et homines? p. 98. old. —  
G. Roth, Die aussereuropäischen Lanbmoose, p. 99. old. — J. Podpera,  
Kvetená Hané, (Flora der Hanna), p. 100. old. — C. Warnstorff, Sphagnales —  
Sphagnaceae (Sphagnologia universalis), p. 104. old. — Gyűjtemények.  
— Sammlungen, p. 109. old. — Személyi hírek. — Personalnachrichten, p.  
111. old. — Meghalt. — Gestorben, p. 113. old.

Mellékelve ... Beigelegt Tafel No. I—V. sz. tábla.

### Megjegyzések néhány keleti növényfajról.

#### Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.

Irta: Dr. Degen Árpád (Budapest).  
Von: Dr. Degen Árpád (Budapest).

#### LXVIII. *Silene Regis Ferdinandi* DEGEN et URUMOFF n. sp.

(Cum icone: tab. I.)

E sectione, «*Stenophyllae*» Boiss. Flor. or. I.: 576.

Perennis, e rhizomate lignoso pluricaulis, caulinis spithameis vel ultra, unifloris, sub nodis viscosis, paribus foliorum 4-nis  
obsitis; foliis infimis anguste lanceolatis,  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  cm. longis,  
 $1\frac{1}{2}$ —2 mm. latis, acuminatis, margine seabridis ceterum glabris,  
caulinis brevioribus, angustioribus, e basi dilatata subulatis;  
floribus solitariis e longissimis (4— $4\frac{1}{2}$  cm. longis); calyce ad  
3·4—3·6 cm. longo, anguste infundibuliformi, glabro, pallide  
viridi, nervis 10 intensius viridibus percurso, dentibus late ovatis,  
hyalino marginatis, margine puberulis cum aliis acutioribus, paullo  
patentibus alternantibus; petalis albo-luridis vel viridescentibus  
ungue e calyce longe (5 mm.) exerto, lamina profunde biloba,  
corona bifida: carpophoro  $2\frac{1}{2}$  cm. longo, apicem versus incrassato;  
capsula (immatura) ovata, calyce inclusa.

Hab. in rupestribus graminosis calcareis montis Pirin (Perim-Dagh) Macedoniae supra pagum Pirin, alt. c. 2100 m., ubi plan-  
tam hanc speciosissimam d. 19. Sept. 1910 detexit cl. dom.  
KELLERER, qui eam in hortum regium Sofianum transplantavit,  
ibidemque coluit.

Species floribus longissimis peculiaris, a *S. Waldsteinii* GRB.  
(*S. clavata* HAMPE non MOENCH, *S. macropoda* VEL.) foliis margine  
excepto glabris nec sebris, floribus sesquilonioribus, ut videtur  
semper solitariis, calyce apice inter nervos non venulozo. — a  
*S. Orphanidis* Boiss. floribus sesquilonioribus, calycis basi a pari  
foliorum supremo remoto, petalis exauriculatis, foliis caulinis  
internodio multo (2—3-plo) brevioribus, nec longioribus — differt.

Dicamus speciem hanc pulcherrimam in honorem S. M. FER-  
DINANDI I. REGIS BULGARORUM, fautoris rei botanicae Augusti.



*Silene Regis Ferdinandi* Deg. et Vr.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Degen Árpád von

Artikel/Article: [Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemerkungen  
über einige orientalische Pflanzenarten. 2](#)