

C. variegata LAM. f. *floccosa* SCHLOSS et VUK. H. Čabulja : VK. Vlačna, Ošljar.

Crepis setosa L. Drsnica selo.

**C. neglecta* L. Ugyanott.

**C. chondrilloides* JACQ. H. Medved.

Hieracium bifidum KIT. ssp. *bifidum* KIT. H. Medved. Čabulja : Ošljar.

H. bifidum KIT. H. ssp. *pseudopraecox* ZAHN. Čabulja planina.

H. Neireichii A. KERN. H. Čabulja : Ošljar.

H. Waldsteinii TAUSCH. ssp. *plumulosum* A. KERN. H. Ledenicapotok.

H. villosiceps N. P. ssp. *villosiceps* N. P. H. Čabulja : VK. Vlačna.

H. Tommasinii RCHB. ssp. *Tommasinii* N. P. H. Čabulja planina.

H. cymosum L. H. ssp. *sabinum* SEB. et M. Čabulja planina.

H. Pavichii HEUFF. H. Medved.

H. Bauhini SCHULT. ssp. *magyaricum* N. P. B. Dervent.

H. Bauhini SCHULT. ssp. *cattarense* N. P. H. Čabulja planina.

Leontodon saxatilis (TEX). H. Čabulja : Ledenicapotok.

**Taraxacum laevigatum* DC. H. Čabulja : VK. Vlačna.

**T. alpinum* HOPPE. Ugyanott.

Tragopogon orientalis L. H. Medved.

Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

A *Wolffia arrhiza* Wimm.-nek egy második hazai előfordulási helyéről.

Ueber einen zweiten Standort von *Wolffia arrhiza* Wimm. in Ungarn.

Folyóiratunk IX. kötetjének 6. oldalán tettem említést arról, hogy boldogult SIMONKAI LAJOS dr. ezt a fajt Pancsova mellett fedezte fel; most már abban a helyzetben vagyok, hogy egy második Horvátországban fekvő újabb termőhelyéről tegyek jelentést. 1910. év augusztus hó 8 án sikerült hazánkknak ezt a legapróbb virágos növényét a Fiume felett fekvő grobniki tóban felfedeznem, ahol részint szabadon úszott a víz tükrén, hol

Auf Seite 18 des IX. Jahrganges dieser Zeitschrift berichtete ich über die durch weil. DR. L. SIMONKAI erfolgte Entdeckung dieser Art bei Pancsova in Ungarn; ich bin nun in der Lage über einen zweiten in Kroatien liegenden Standort berichten zu können. Am 8. Aug. 1910 entdeckte ich diese kleinste Phanerogame unseres Landes zahlreich im Grobniker See ober Fiume, wo sie theils frei auf der Wasseroberfläche flutend, theils aber auf *Fonti-*

pedig az ott tenyésző *Fontinalis antipyretica* és *Acrocladium cuspidatum* mohok ágacskaikhoz tapadva fordult elő. A gyűjtött példák igen nagy számának megvizsgálása azt derítette ki, hogy itt is, mint a mérsékelt földöv egyéb helyein is, csak meddő állapotban fordul elő.

nalis antipyretica und *Acrocladium cuspidatum* Zweigen haftend angetroffen wurde. Die Untersuchung einer grossen Zahl der dort gesammelten Exemplare ergab, dass sie auch hier, wie allerorts in der gemässigten Zone, nur steril vorkommt.

Degen.

Brassica armoracioides Czern. Fiume mellett.

Brassica armoracioides Czern. bei Fiume.

Ezt az Európán több kikötőjében meghonosodott (Rotterdam ex HOECK, Ank. IV : 2 : Borkum, SEEM. ex HOECK l. c. IX : 196), de néha még messze a szárazföld belső részében tekvő helyekre is elhurcolt (Deventer ex HOECK, Bernburg HERM. ex HOECK l. c. VIII : 388) gyomot 1910. évi aug. hó elején megtaláltam Fiume mellett, a vasúti sínek mentén.

Dieses an manchen Hafenorten Europas (Rotterdam : HOECK, Ank. IV : 2) Borkum (SEEM.) Mannheim (LUTZ ex HOECK l. c. IX : 196), aber auch oft weit in den Continent (Deventer ex HOECK Bernburg : HERM. ex HOECK l. c. VIII : 388) verschleppte Unkraut habe ich Anfangs August 1910 längs der Bahngeleise bei Fiume angetroffen.

Degen.

Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr.

F. KERN rektor úr (Breslau) lapunk egyik separatumból (Magy. Bot. Lap. X. 1911 : 338.) látva, hogy e moha a Magas-Tátrában eddigelé csak 3 helyről ismeretes, egy negyedik termőhelylyel toldotta meg azáltal, hogy részemre egy példát volt szíves küldeni — amiért e helyen is őszinte köszönetemet fejezem ki, — amelynek schedája így hangzik:

Aus einem Separate der Ung. Botan. Bl. X. 1911 : 338 sah Herr Rector F. KERN (Breslau), dass dieses Moos bis jetzt nur von 3 Standorten der Hohen-Tátra bekannt ist; er hat diese Zahl dadurch vermehrt, dass er mir gefälligst ein Exemplar von einem 4. Standorte sandte, wofür ich ihm auch hier verbindlichst danke; die Scheda lautet:

«*Aulacomnium turgidum* Schw. Tátra: zwischen Granitblöcken auf dem obersten Gipfel der Sziloka bei Jaworina; c. 6940' — 11. 7. 85. KERN»

Ugyanitt, miként szíves sorában írja (in litt. ad me 1911. 11. XII.), *Conostomum boreale*-t is gyűjtött.

Ebendort hat Herr F. KERN — wie er in einem Brief erwähnt (1911. 11. XII.) — auch *Conostomum boreale* gesammelt.

Győffy.

Plagiobryum demissum (H. et H.) Lindb. auf dem Durlberg.

A Magas-Tátra ezt a ritkább, csinos kis moháját egy újabb termőhelyről közölhetem. Gyűjtöttem a Vordere Kupferschächtental végében lévő «Durlberg» (Kopa Bielska) déli, a «Weisse Seen» felé tekintő oldalán, fekete humuszon fű között, 1330 m. t. sz. f. m.-ban 1911. VIII. 7-én.

Ez a termőhely alacsony tengerszínfeletti magasságánál fogva érdemel különösebb fel említést, amennyiben eddigi lelőhelyei 1780—2019 m. magasságban fekszenek.

Dieses echte Hochalpenmoos sammelte ich auf folgenden neuen Standort in der Hohen-Tátra: Vordere Kupferschächtental, an der südlichen, gegen die «Weisse Seen» liegenden Seite des «Durlberges» auf schwarzem Humus zwischen Gräsern, 1330 M. ü. d. M. 7. VIII. 1911.

Dieser Standort ist wegen seiner niedrigen Lage bemerkenswert, denn die bisher bekannten liegen alle in einer Höhe von 1780—2019 M.

Győffy.

A Scolopendrium újabb tátrai termőhelye.**Neuerer Standort des Scolopendrium in der Hohen-Tátra.**

A Bélai mézhavasok e ritka páfrányának termőhelyeit (cf. M. B. L. X. 1911: 345—6.) újból megtoldhatom egygyel. Gyűjtöttem Molendoa-kutató-sáim közben a Greiner északi-keleti gerince sziklás végén lévő «Schallwand (Glosna Skale)» alatti sziklafal, az u. n. «Opalona turnia» tövében, mely sziklatorony a Kémpental és a Weisseifenbach közt fekszik a «Bednarski Regiel» felső végét alkotva: bőven, 1240 m. t. sz. f. m.-ban, 1911. X. 13.

Diesen in der Tátra so seltenen Farn sammelte ich auf dem Zsdjarer Teil der Bélaer Kalkalpen, an einem bisher noch nicht bekannten Standorte, u. zw. auf dem nordöstlichen Ausläufer des Greiner's und der «Schallwand (Glosna Skale)», auf der s. g. «Opalona turnia», ober dem «Bednarski Regiel», welche turmförmige, mächtige Felswand zwischen den Tälern Kémpental und Weisseifenbach liegt: hier reichlich, 1240 M. ü. d. M. 1911. 13. X.

Győffy.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése**Referate über ungarische botan. Arbeiten.**

Tuzson J. Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai. (Grundzüge der entwicklungsgeschichtlichen Pflanzengeographie Ungarns). — Math. term. értes. XXIX. 4. füzet (Heft) p. 558—589. Budapest 1911.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 79-81](#)