

Sium lancifolium M. B. Magyarországon.

Sium lancifolium M. B. in Ungarn.

Irta: } Wagner János (Budapest).
Von: }

A *Sium lancifolium*-ot tulajdonképen BARTH JÓZSEF evang. lelkész fedezte fel hazánkban és 1904. VII/20-án, Csicsóholdvilág mellett gyűjtött példája megvan DR. DEGEN A. úrnak, e lap kiadójának és szerkesztőjének a herbáriumában. Szinte meglepő, hogy BARTH érdekes fölfedezéséről semmiféle irodalmi adatunk nincsen. BARTH növénye különben úgy került a kezembe, hogy a Deliblaton gyűjtött és a hazai békakorsótól eltérő *Sium*-ot meghatároztam és összehasonlítottam.

A deliblái kinestári homokpusztának déli határszélein, nyirkos, árnyékos helyeken pld. égeresben termő, igen karesú, öles *Sium*-példányai az oroszországi típustól különböznek és pedig legfőképen abban, hogy a gallérkák levélkéi az ernyőeskénél kétszerte hosszabbak, miáltal sajátságos üstökös virágzatot formálnak, holott a típuson az ernyőeskék murvalevei a kocsánykáknál jóval rövidebbek, átlag csak félakkorák. A *Sium lancifolium*-nak ezen bizonyára a deliblái homokpusztán kiformalódott fajváltozatát f. *banaticum*¹⁾ névvel jelölöm. Vele megszapordott egygyel ismét az orosz

Sium lancifolium wurde in Ungarn zuerst von dem ev. Pfarrer J. BARTH entdeckt. Ein von ihm bei Csicsóholdvilág in Siebenbürgen gesammeltes Exemplar befindet sich nämlich im Herbarium des Herrn A. v. DEGEN, dem Verleger und Redacteur dieser Zeitschrift. Dass uns von diesem Funde bisher niemand berichtete, ist sehr auffallend. BARTH's Pflanze kam zufälligerweise in meine Hände, als ich eine bei Deliblat (Südungarn) gesammelte und von dem bei uns verbreiteten *Sium latifolium* verschiedene Pflanze mit getrocknetem Material verglich.

Unsere an der Südgrenze der ärarischen Sandsteppe auf feuchtem Boden besonders in lichterem Erlenwäldern gedeihende, sehr schlanke, manns hohe *Sium*-Art ist aber auch von dem russischen *Sium lancifolium* verschieden, hauptsächlich durch die sehr verlängerten Blätter der Hüllchen, die durchschnittlich noch einmal so lang sind, als die Döldchen, während diese an der typischen Pflanze nur halbsolang sind als die Döldchen. Dadurch bekommt die ganze Inflorescens ein grünschopfiges Aussehen.

Da hier nur solche Exemplare vorkommen, auch auf

¹⁾ *Sium lancifolium* M. B. forma *banaticum*: a typo differt involucelli foliolis umbellula longioribus. Hab. in Hungaria meridionali pr. Deliblat.

eredetű növényeknek a száma hazánkban.

sonnigeren Stellen, ist dies jedenfalls ein auf diesem Standorte erworbenes Merkmal, und unsere Pflanze ist an diesem vom Typus sehr leicht zu unterscheiden. Ich bezeichne sie mit dem Namen: f. *banaticum*¹⁾ und mit ihr erhält die Zahl der mit Russland gemeinschaftlichen Arten in unserem Lande wieder einen Zuwachs.

«Tolnavármegye flórájához.»

Zur Flora des Komitates Tolna.

Irtta: } Hollós László dr. (Szekszárd).
Von: }

A főnti czímen a «Botanikai Közlemények» 1911. évfolyamában a 89—108. lapokban 735 faj virágos növényt soroltam fel. Azóta állandóan Tolnavármegyében, Szekszárdon tartózkodom és mivel célom lakóhelyem vidékének gombáit összegyűjteni, természetesen a gombás virágos növényeket is keresem. Gombakeresés közben szedtem az alatt felsorolt virágos növényeket, melyek csaknem mind olyanok, aminőket a megyében eddig nem találtam és kevés kivétellel Dr. DEGEN ÁRPÁD úrnál voltak meghatározás vagy felülvizsgálat céljából.

Szekszárd vidékéről 800 fajnál több, meghatározott gomba fekszik gyűjteményemben. Mivel azonban hozzávetőleges becslésem szerint még a fele sincs megszedve az itt előforduló gombáknak és mivel apró közleményekkel nem akarom szétforgácsolni mykologiai kutatásom eredményét, egyelőre a gombákat nem közlöm, csak a Szekszárd környékén újabban talált virágos növényeket sorolom fel a következőkben:

Melica nutans L. Bati erdő.

Poa angustifolia L. A vásártér szélén.

P. palustris L. A Sárvíz mellett.

Festuca gigantea (L.) VILL. A Haramia kút felé.

F. arundinacea SCHREB. Az alsó temetőben.

Bromus ramosus HUDS. Böven a Haramia-kút felé.

Br. commutatus SCHRAD. A Sárvíz mellett.

Carex silvatica HUDS. A Bükkben és Haramia-kút mellett.

C. remota L. A Haramia-kút mellett.

C. vulpina L. A vásártér szélén.

C. riparia CURT. A Sárvíz mellett és a csatári réten.

C. flacca SCHREB. var. *erythrostachys* SCHUR. A vám mellett.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Wagner Janos [Hans]

Artikel/Article: [Sium lancifolium M.B. Magyarországon. 56-57](#)