

Beitrag zur Inselflora Dalmatiens.

Adatok a dalmát szigetek flórájához.

Von: } † Louis Keller (Wien).¹⁾
Irrta: }

Seit dem Erscheinen von VISIANIS Flora Dalmatica wurde Dalmatiens Festland und Inselgebiet mehrfach durchforscht; auch wurden viele Gattungen und Arten kritisch bearbeitet, sowie neue Arten und Hybriden aufgestellt. Dabei fasste man mehr das Festland ins Auge; erst in der letzteren Zeit wendete man den dem Gestade näher liegenden Eilanden, wie auch in neuester Zeit den ferner gelegenen kleinen, oft unbevölkerten Inseln grössere Aufmerksamkeit zu.

Seit einem Zeitraume von ungefähr fünf Jahren wurde mir von Fachlehrern der Insel Lesina und Curzola, wie auch der Halbinsel Sabioncello eine bedeutende Anzahl von Blütenpflanzen zur Bestimmung eingeschickt.²⁾ Diese bearbeitete ich kritisch im k. k. naturhistorischen Hofmuseum, zu welchem Zwecke mir in der lebenswürdigsten Weise Herr Custos DR. A. VON ZAHLRUCKNER die Bibliothek und das Herbar zur Verfügung stellte und wofür ihm an dieser Stelle der besondere Dank ausgesprochen sei.

Im Nachfolgenden sind alle eingesandten Arten in der Reihenfolge der Flora Dalmatica aufgezählt, abgesehen davon, ob sie im vorgenannten Werke angeführt sind oder nicht. Die von neuen Standorten herrührenden oder nicht in dem Werke enthaltenen Arten sind mit vorgesetzten * erkenntlich gemacht.

Die kurz mit «Lesina» und «Curzola» bezeichneten Pflanzen rühren aus der näheren oder weiteren Umgebung der Hauptorte der beiden Inseln her.

Die bei der Bearbeitung benützte Literatur ist am Schlusse der Arbeit ersichtlich gemacht.

Polypodiaceae.

- 10 *Ceterach officinarum* WILLD. sp. pl. V. 136. — *Asplenium Ceterach* L. sp. pl. ed. II. 1538. — Vis. Fl. Dalm. I. 36. — LUERSS. Farnpfl. 287.

Lesina: im Steinritzen, 20 m. s. m. — Curzola: auf Mauern zwischen Steinen.

Die Lappen sind an vorliegenden Exemplaren ganzrandig, manche Lappen nähern sich der Form *crenata* MOORE.

¹⁾ Herr LOUIS KELLER ist während der Drucklegung dieser seiner bedeutendsten Arbeit am 7. Juli l. J. gestorben. Red.

²⁾ Der weitaus grösste Teil der mir zur Bestimmung übergebenen Pflanzensammelte Herr MARINO MAROEVIĆ, Fachlehrer in Ragusa, früher in Lesina.

- 26 *Aplenium Adiantum nigrum* L. sp. pl. ed. II.
 ssp. *onopteris* L. sp. pl. ed. I. 1081.
 var. *acuta* BORY in Farnpfl. v. Lueress. (1889) 271. —
 Vis. Fl. Dalm. I. 41.
 Curzola: in Gebüsch.

Gramineae.

- 38 *Sorghum vulgare* PERS. Syn. I. 101. — *Andropogon arundinaceus* β . *vulgaris* HACKEL in ENGL. u. PRÄNTL Nat. Pflanzenf. II. 2. 28. — Vis. Fl. Dalm. I. 48.
 Lesina: auf bebautem Boden, 3 m. s. m.
- 46 *Andropogon pubescens* VIS. Pl. rar. Dalm. 3. im. Erg. Bl. zur Bot. Zeit. 1829, Band I. — Vis. Fl. Dalm. I. 51, t. 2.
 *Lesina: auf sonnigen Felsen und dürrer steinigen Orten, 50—100 m. s. m. — Curzola: an Wegrändern.
- 50 *Lagurus ovatus* L. sp. pl. II. 119. — Vis. Fl. Dalm. I. 53.
 *Lesina: Sand- und Steinplätze am Meer, 2 m. s. m.
- 53 *Digitaria sanguinalis* (L.) SCOP. Fl. carn. ed. II. 1. 52. — *Panicum sanguinale* L. sp. pl. II. 84. — Vis. Fl. Dalm. I. 54.
 *Lesina: an Wegen 7 m. s. m. — *Curzola: in Gärten.
 Nur bei Sebenico, Trau, Spalato und Cattaro angegeben.
- 62 *Oryzopsis miliacea* ASCHERS. und SCHWEINF. Mém. Inst. Ég. II. 169. — *Milium arundinaceum* SIBTH. et SM. Prodr. Fl. Gr. I. 45. — Vis. Fl. Dalm. I. 57 (sub *M. multiflorum* CAV.).
 Lesina: auf feuchtem Boden, 100 m. s. m. — Curzola: an Wegen.
- 64 *Stipa pennata* L. sp. pl. II. 145. — Vis. Fl. Dalm. I. 58.
 *var. *mediterranea* TRIN. et RUPR. Mém. Ac. St. Pet. 6, Ser. V.
 Insel Lukovci (Bacili).
- 66 *Stipa Aristella* L. Syst. Nat. ed. 12, III. 229. — Vis. Fl. Dalm. I. 59 und Suppl. I. 16. II. 14.
 *Curzola: an Wegrändern.
- *69a *Cynodon Dactylon* (L.) PERS. Syn. I. 85. — *Panicum Dactylon* L. sp. pl. II. 85.
 Lesina: an Wegen 7 m. s. m. — Curzola: an Wegen.
- 70 *Setaria ambigua* GUSS. Fl. Sic. syn. 114. — *Panicum vertic.* β . *ambigua* GUSS. Prodr. Fl. Sic. 80. — Vis. Fl. Dalm. 61.
 Curzola: in Gärten.
- 71 *Setaria viridis* P. BEAUV. Agr. 51. — *Panicum viride* L. sp. pl. ed. II. 83. — Vis. Fl. Dalm. I. 61.
 Lesina: auf bebautem Boden, 3 m. s. m.
- 73 *Setaria italica* P. BEAUV. Agr. 51. — Vis. Fl. Dalm. I. 61.
 *forma *longiseta* DÖLL. Fl. Bad. I. 233.
 Curzola: an Wegen.
 Stammt aus dem Orient und scheint hier nur verwildert zu sein.

- 74 *Phalaris cunariensis* L. sp. pl. ed. II. 79. — Vis. Fl. Dalm. I. 62.
 *Curzola: an Wegen.
 Nur für die Insel Uljan bei Zara angegeben. Im Suppl. ist p. 16 obiger Standort für *Phal. brachystachys* LK. rektifiziert
- 75a *Phalaris paradoxa* L. sp. pl. ed. II. 1665. — Vis. Fl. Dalm. II. 337.
 *Lesina: Auf bebautem Boden, 100 m. s. m.
- 79 *Phleum echinatum* Host. Icon. gram. austr. III. 8. — Vis. Fl. Dalm. I. 64.
 Lesina: Dürre, sonnige Orte, magere, steinige Rasenplätze, 200 m. s. m. — Curzola: an Wegrändern.
 Vorliegende Pflanze stellt die kahle Form dar.
- 90 *Aira capillaris* Host Gram. IV. 20, t. 35. — *A. ambigua* DE NOT. Ann. Sc. nat. III. 2. 365.
 *var. *ambigua* ASCHERS. Fl. Brand. I. 831. — Vis. Fl. Dalm. I. 68.
 *Lesina: zwischen Gräsern.
- 92 *Avena barbata* Brot. Fl. Lusit. 108. — Vis. Fl. Dalm. I. 69 (unter *Av. strigosa* Vis. Stirp. dalm. 27, nec Schreb.). — *A. Hoppeana* SCHEELE Fl. XXVII. 57.
 *var. *Hoppeana* RICHT. Pl. Eur. I. 62.
 *Lesina: in Macchien. Hecken. — *Curzola: an Wegen. — *Sabioncello: in Gärten bei Kucište.
- 94 *Avenastrum convolutum* (PRESL.) FRITSCH Exkursionsfl. f. Österr. 54. — *Avena convoluta* PRESL. Cyp. et gram. Sic. 31. — Vis. Fl. Dalm. I. 70 (sub *Avena striata*).
 *var. *glabra* Boiss. Voyag. Esp. II. 655.
 Lesina: in Hecken und Gebüsch, auf Felsen und steinig, dürrer Orten, 70 m. s. m. — Curzola: auf steinigem Boden.
- 96 *Koeleria gracilis* PERS. Syn. I. 97. — *Aira cristata* L. sp. pl. ed. I. 63. — Vis. Fl. Dalm. I. 71.
 *var. *typica* DOMIN. Magy. Bot. Lap. III. 165. in Dom. Monogr. d. Gatt. *Koeleria* (1907).
 forma *genuina* RCHB. Ic. XI. fig. 1669.
 *Curzola: in Wäldern.
 Nach ASCHERSON ist vorliegende Pflanze *K. gracilis* PERS. var. *pallida* UECHTR.
- 96a *Koeleria pyramidata* (LAM.) DOM. Monogr. d. Gatt. Koel. 141.
 *Lesina: an trockenen Grasplätzen.
- 97 *Koeleria phleoides* PERS. Syn. I. 97. — *Festuca phleoides* VILL. Fl. Dauph. II, 95, t. 2, fig. 7. — Vis. Fl. Dalm. I. 71.
 var. *glabra* MARCHESETTI Fl. d. Trieste 630.
 *Lesina: kalkiger Boden, 2 m. s. m. (in einigen Exemplaren) — *Curzola: an Wegen, (nur var. *glabra*).
- 97a *Koeleria crassipes* LANGE in Willk. Fl. hisp. I. 76.
 *Lesina: an trockenen Grasplätzen.

- 98 *Bromus sterilis* L. sp. pl. ed. II. 113. — Vis. Fl. Dalm. I. 72.
 *var. *oligostachyus* A. et GR. Syn. II.
 Lesina: auf kalkigem Boden, unter *Asphodelus*-Stauden, 10 m. s. m.
- *105b *Bromus molliformis* LLOYD. Fl. Loire-Inf. 315. — *Br. confertus* BOR. Fl. d. centre II. 586. non M. B.
 *Curzola: an Wegen.
- 105c *Bromus villosus* FORSK. Descr. 39. — *Br. vill.* var. *maximus* A. u. GR. Syn. II. 595. — Vis. Fl. Dalm. III. 341.
 var. *Gussonei* RICHTER Pl. Eur. I. 114. = *Br. Gussonei* PARL. Pl. rar. fasc. II. 8.
 *Insel Lukovci (Bacili) bei Lesina. — *Curzola: in Gärten. — Lesina: unter *Asphodelus*-Stauden, 10 m. s. m.
- 113 *Dactylis hispanica* ROTH Catalect. bot. I. 8. — *D. glom.* β . *hispanica* KOCH Syn. ed. II. 808. — Vis. Fl. Dalm. I. 76.
 Lesina: auf kalkigem, steinigem Boden, 5 m. s. m. — Curzola: in Wäldern. — Sabioncello: auf Bergen bei Kucište.
- 119 *Poa bulbosa* L. sp. pl. ed. II. 102. teste HACKEL. — Vis. Fl. Dalm. I. 79.
 var. *vivipara* RCHB. Fl. germ. exc. nr. 303 b.
 Lesina: auf steinigem Boden, 50 m. s. m.
- 119 *Poa bulbosa* L. l. c.
 Lesina: steiniger Boden, 50 m. s. m.
- *119a *Poa concinna* GAUD. Agrost. Helv. I. 196. — *P. bulb.* β . *concinna* POSP. Fl. d. Küstenl. I. 97.
 var. *carniolica* RCHB. Ic. I. 34, t. 81, fig. 1618.
 *Lesina: in Hecken, an Wegen, Steinbergrändern und Wassergräben. — Curzola: an Wegrändern.
- 128 *Scleropoa rigida* GRIS. Spic. fl. Rum. II. 431. — *Festuca rigida* KUNTH. Enum. I. 392. — Vis. Fl. Dalm. I. 82. (sub *Poa*).
 *Lesina: unter Gräsern, 15 m. s. m. (var. *glaucescens* A. u. GR. Syn. II. 546 und var. *robusta* A. u. GR. l. c. II. 546 mit violett überlaufenen Ährchen. — *Sabioncello: bei Kucište, an Wegen.
- 134 *Briza maxima* L. sp. pl. ed. II. 103. — Vis. Fl. Dalm. I. 84.
 *var *rubra* A. u. GR. Syn. II. 440.
 *Lesina: auf Hügeln. — Curzola: sonnige Orte.
- 137 *Cynosurus echinatus* L. sp. pl. ed. I. 72. — *Chrysurus echinatus* P. BEAUV. Agrost. 123. — Vis. Fl. Dalm. I. 85.
 *Lesina: in Macchien, 200 m. s. m. — *Curzola: an dünnen, steinigen Wegrändern.
- 147 *Aegilops triaristata* WILLD. sp. pl. IV. 943. — Vis. Fl. Dalm. I. 90.
 Lesina: auf kalkig-steinigem Boden, 20 m. s. m.

- 148 *Aegilops triuncialis* L. sp. pl. ed. II. 1489. — Vis. Fl. Dalm. I. 90.
Curzola: an Wegen.
- 153 *Lolium perenne* L. sp. pl. ed. II. 122. — Vis. Fl. Dalm. I. 91
*var. *pauciflorum* A. u. GR. Syn. II. 754.
Curzola: an Wegen.
- 153a *Lolium rigidum* GAUD. Agrost. Helv. I. 334. — Vis. Fl. Dalm. Suppl. 22.
*Lesina: in *Dactylis*-Rasen eingemengt, 5 m. s. m., teste HACKEL.
Nach Ascherson dem *L. multiflorum* LAM. am ähnlichsten; *L. rigidum* wird von den meisten Autoren mit *L. strictum* PRESL verwechselt.
ASCHERSON gibt als Standorte das Rhônetal, Aostatal und den Gardasee an, bezeichnet die Dauphiné als höchst wahrscheinlich, hingegen betrachtet er die Nähe des Mittelmeeres und der Adria als zweifelhaft.
- 153b *Lolium siculum* PARL. Fl. palerm. I. 252. — Vis. Mem. Ist. Ven. XVI. 54.
Insel Lukovci (Bacili).
- 158 *Agropyron repens* L. sp. pl. ed. I. 86. — Vis. Fl. Dalm. I. 93 (sub *Tritico*).
*var. *glaucum* DÖLL. Fl. Bad. 130.
Lesina: auf kalkigem Boden, 30 m. s. m.
- 162 *Brachypodium distachyum* R. et SCH. Syst. II. 741. — Vis. Fl. Dalm. (sub *Tritico ciliato*) LAM. et DC. I. 94.
*Lesina: bei Cittavecchia (var. *genuinum* WILLK. in WILLK. u. LANGE Prodr. Fl. Hisp. I. 112 u. var. *pentastachyum* A. et GR.) (hochwüchsige Form). — *Lesina: auf bebautem Boden, 2 m. s. m. (beide Varietäten). — *Curzola: var. *genuinum* WILLK., an Wegen (niederwüchsige).
163. *Brachypodium silvaticum* R. et SCH. Syst. II. 741. — *Br. gracile* P. BEAU. Agr. 155. — Vis. Fl. Dalm. I. 95. (sub *Tritico*).
*Curzola: an Wegrändern.
Die Ährchen sind stark behaart, die Blätter rauh, aber nicht zottig.
- *165a *Brachypodium ramosum* (L.) R. et SCH. Syst. 737. II. — *Bromus ramosus* L. Mant. I. 34. — Vis. Fl. Dalm. I. 96.
*var. *fragile* R. et SCH. Syst. II. 742.
*Lesina: dürre, schotterige Plätze, Hecken, steinige Weinberggründe. — *Curzola: Hecken, Wege und Gebüsch.
- *170a *Hordeum leporinum* LINK Linnaea IX. 133. — teste HACKEL.
*Lesina: kalkig-erdiger Boden, unter Gräsern, 5 m. s. m. (Ähren rötlich überlaufen). — *Curzola: in Gärten.
ASCHERSON schreibt in Syn. II. 740: «Sicher noch in Dalmatien zu finden».

Cyperaceae.

- 174 *Carex divulsa* GOOD. Transs. Linn. Soc. II. 160. — *C. virens* LAM. Encycl. III. 384. — *C. muricata* φ . *divulsa* WHLBB. Vet. Ak. Handl. Stockh. 1803, 143. — Vis. Fl. Dalm. I. 100.

*Curzola: schattige Orte.

«Wir verzichten», schreibt ACHERS. in Syn. II. 42, «auf den allerdings am wahrscheinlichsten hierher gehörigen Namen *C. virens*, wegen seiner Unsicherheit und weil er fast auf alle Formen der Verwandtschaft angewendet worden ist».

- 178 *Carex flacca* SCHREB. Spic. fl. Lips. app. nr. 669. — *C. glauca* SCOP. Fl. carn. II. 223. — Vis. Fl. Dalm. III. 347.

var. *erythrostachys* SCHUR Enum. pl. Transs. 713.

Lesina: in Buschwäldern, besonders in höheren Lagen an trockenen Stellen. — Curzola: in Wäldern.

var. *acuminata* A. et GR. = *C. acuminata* WILLD. Sp. pl. IV. 300.

Insel Lukovci (Bačili).

- 178a *Carex illegitima* CES. in FRIEDR. Reise 271. — *C. pharensis* VIS. fl. dalm. III. 346.

Lesina: in Pinienwäldern bei Pellegrino, unter Sträuchern.

Diese seltene Segge wurde bisher außer auf Lesina in Griechenland in Attica, auf der Insel Aegina und Poros, in Argolis und Cephalonien gefunden.

KÜKENTHAL schreibt (Magyar Bot. Lap. 1911 N° 11—12): dürfte auf den benachbarten Inseln Curzola und Meleda zu finden sein.

- *182a *Carex punctata* GAUD. Agrost. Helv. II. 152.

*Lesina: an Bächen. 30 m. s. m., selten.

- *182a *C. Halleriana* ASSO Syn. pl. Arag. 135, t. 9. — *Carex gynobasis* VILL. Hist. pl. Dauph. II. 206.

*Lesina: in höheren Lagen zwischen Gebüsch und an feuchten Grasplätzen.

Juncaceae.

- 189 *Chlorocyperus badius* PALLA A. B. Z. VI. 201. — *Cyperus badius* DESF. Fl. Atl. I. 45. — Vis. Fl. Dalm. I. 106.

Lesina: auf feuchten Boden.

- 201 *Holoschoenus australis* RCHR. Ic. VIII., t. 317, fig. 737, 738. — Vis. Fl. Dalm. I. 111.

Lesina: auf feuchtem Boden, 100 m. s. m.

- 203 *Juncus acutus* α L. sp. pl. II. 463. — Vis. Fl. Dalm. I. 112.

*var. *conglobata* TRAUTV. Art. Hort. Petrop. I. 480.

*Curzola: am Meeresstrand.

- 206 *J. lamprocarpus* EHRH. Calam. nr. 126. — Vis. Fl. Dalm. I. 113. — *Juncus articulatus* auct. p. p.

Lesina: an feuchten Orten.

ASCHERSON bemerkt in Syn. II. 477: Für diese Art kann unmöglich der Name *Juncus articulatus* vorangestellt

werden, unter welchem LINNÉ wahrscheinlich *J. obtusiflorus*, *J. acutiflorus*, *J. alpinus* und *J. lamprocarpus*, vorzugsweise aber wohl *J. obtusiflorus* und *J. alpinus* verstand, da er seiner Pflanze ausdrücklich «*petala obtusa*» zuschreibt.

Irideae.

- 214 *Hermodactylus tuberosus* SALISB. Trans. Hort. Soc. I. 304. — BAKER Journ. Linn. Soc. XVI. 148. — *Iris tuberosa* L. sp. pl. ed. I. 40. — VIS. Fl. Dalm. I. 117.
*var *bispathacea* Sw. Brit. Flow. Gard. Ser. II. = *Iris bispathacea* SPACH. Hist. Veg. Phan. XIII. 15.
*Lesina: auf Grasplätzen.
Die meisten der von mir durchgesehenen Exemplare der Herbarien gehören der Form *bispathacea* an. Es scheint, dass selbe in Lesina die vorherrschende Form ist. REICHENBACH hat sie in seinen Icon Fl. germ. et helv. Vol. IX. t. 348 trefflich abgebildet. VISIANI gibt sie für Lesina nicht an. Im Herbar des k. k. Hofmuseums Wien erliegt aber auch ein Exemplar PITTONIS von Lesina.
- 217 *Crocus dalmaticus* VIS. Fl. Dalm. I. 119. — MAW. Monogr. of the Gen. *Crocus*, 193, t. XXXIV. — *Cr. reticulatus* var. *dalmaticus* HERB. Hist. Croc. — BAKER Syst. Iridac. in Journ. of Linn. Soc. Vol. XVI. 82.
*Lesina: auf steinigem, kalkigem Boden, ca. 25 m. s. m. und auf Weideplätzen.
VISIANI gibt *Cr. dalmaticus* für Lesina nicht an. Aus der Bemerkung MAW's l. c. 194, dass auf Lesina eine weisse Varietät vorkomme, geht zur Genüge hervor, dass sie dort wächst.
Im Herbar des k. k. Hofmuseums erliegt ein Exemplar BOTTERIS auf Lesina gesammelt. Diese Art scheint sehr selten zu sein, da sie nach VISIANI nur für Bossanka bei Ragusa angegeben ist.
- 221 *Romulea Bulbocodium* SEB. et MAUR. Fl. Rom. Prodr. 17. — BAKER Journ. Linn. Soc. XVI., 86. — VIS. Fl. Dalm. I. 121.
Lesina: auf steinigem Boden, 30 m. s. m.

Liliaceae.

- 223 *Gladiolus segetum* GAWL. Bot. Mag. 719. — VIS. Fl. Dalm. I. 122. — *Gl. communis* BERT. Fl. ital. I. 227. non L.
Lesina: unter Gebüsch auf steinigem Boden, 10 m. s. m.
- 237 *Fritillaria montana* HOPPE, Flora XV. 2., 476. — VIS. Fl. Dalm. I. 131.
Lesina: in Macchien, 150 m. s. m.
Aus dem vorliegenden Fruchtexemplar mit ziemlicher Sicherheit konstatiert.

- 245 *Allium subhirsutum* L. sp. pl. ed. II. 424. — Vis. Fl. Dalm. I. 134.
Lesina: in Gebüschern u. Hecken, auf steinigem Plätzen, bis in höhere Lagen bei St. Antonio. — *Curzola: um Blatta.
- 247 *Allium neapolitanum* CYR. Pl. rar. neap. fasc. I. 13, t. 4. — Vis. Fl. Dalm. I. 135.
*Lesina: 30 m. s. m.
VISIANI gibt *All. neapolitanum* nur für Trau, Spalato und Zara an.
- 264 *Allium sphaerocephalum* L. sp. pl. II. 426. — Vis. Fl. Dalm. I. 141.
**x. typicum* REGEL All. adh. cogn. Monogr. 47.
*Lesina: auf kalkigem Boden, 40 m. s. m. — *Curzola: in Wäldern.
- 267 *Scilla autumnalis* L. sp. pl. ed. II. 443. — Vis. Fl. Dalm. I. 142. — BAKER Journ. Linn. Soc. XIII. 324.
*Curzola: auf Heiden.
- *275a *Ornithogalum tenuifolium* GUSS. Fl. Sic. Prodr. I. 413. — RCHB. Ic. t. 1020. — *Orn. Gussonei* TEN. Fl. Neap. III., 337, t. 226, f. 1. — BAKER, *Ornith.* in Linn. Soc. 265.
*forma genuina POSP. Fl. d. Küstenl. 235.
*Lesina: auf kalkigem Boden zwischen Gräsern. — *Curzola: wiesige Plätze in einem aufgelassenen Garten.
VISIANI zieht im Fl. Dalm. I. 146 *Orn. tenuifolium* GUSS als Synonym zu *O. comosum* L., was schon aus REICHENB. Abbildung Ic. fig. 1020, verglichen mit fig. 1021, als irrig anzusehen ist.
- *276a *Ornithogalum pyramidale* L. sp. pl. ed. II. 440. — *O. narbonense* NEILR. Fl. N. Ö. 156 und G. G. Fl. fr. III. 188. — *O. narbonense* DOD. Pempt. 222, non L. — *O. stachyoides* SCHULT. Syst. VII. 518, non AIT. Eine an *O. Visianicum* TOMM. annähernde Form. BAKER zieht in Journ. of the Linn. Soc. Vol. XIII., 277, *Orn. pyramidale* L. als Syn. zu *O. narb.* L. u. *O. stachyoides* AIT., welche Ansicht bei Betrachtung der Abbildungen in RCHB. Icon. X. fig. 1029 und 1030 sich als Irrtum erweist.
Als Synonym ist nach KERNER zu *O. pyramidale* L. = *O. pyrenaicum* SADLER Fl. Com. Pest 155, *O. brevistylum* WOLFNER in öst. bot. Zeitschr. VII. 230 und *O. narbonense* NEILR. Aufz. ungar. Pfl. p. 51 zu ziehen.
KERNER klärt in der öst. bot. Zeitschrift, Jahrg. 1878 (Band 28): 19, die über die Nomenklatur von *O. pyramidale* L. herrschende Verwirrung vollständig auf und spricht die Berechtigung der LINNÉ'schen Art aus.
*Lesina: Kalkboden, 5 m. s. m.
- 280a *Muscari neglectum* GUSS. Fl. Sic. Syn. I. 411. — *Botryanthus neglectus* KUNTH EN. IV. 311. — Vis. Fl. Dalm. Nachtr. I. 62.

- *Lesina: zwischen Gräsern. — *Curzola: in einem aufgelassenen Garten.
 VISIANI gibt diese Art nur bei Trebinje an.
- 281 *Muscari racemosum* MILL. Gard. dict. ed. 8, no. 3. — *Hyacinthus racemosus* L. sp. pl. ed. II. 455? — VIS. Fl. Dalm. I. 149.
 Lesina: zwischen Gräsern auf kalkigen Boden, 10 m. s. m.
- 282 *Muscari comosum* (L.) MILL. Diet. nr. 2. — *Hyacinthus comosus* L. sp. pl. ed. II. 455. — VIS. Fl. Dalm. I. 149.
z. typicum.
 Curzola: um Blatta.
- *282a *Muscari Kernerii* MARCHES. in Bollet. soc. Adria 266. — *Botryanthus Kernerii* NYM. consp. suppl. II. 307.
 *Curzola: um Blatta.
- 290 *Asphodeline liburnica* (SCOP.) RCHB. Fl. Germ. exc. 116. — *Asphodelus liburnicus* SCOP. Fl. carn. ed. 2. I. 245. — VIS. Fl. Dalm. I. 152.
 Lesina: unter Gebüsch. 5 m. s. m.
- 292 *Asphodelus microcarpus* SALZM. et VIV. Fl. Cors. 5. — VIS. Fl. Dalm. I. 153.
 Lesina: steinige Orte.
- 294 *Asphodelus fistulosus* L. sp. pl. ed. II. 244. — *A. ramosus* STURM Deutshl. Fl. vol. IX. — VIS. Fl. Dalm. I. 154, non L.
 Lesina: zwischen Gräsern auf kalk. Boden, 20 m. s. m.
- 299 *Colchicum Bertolonii* STEV. Mem. Mosc. VII. 72. — VIS. Fl. Dalm. I. 156.
 *var. *augustifolium* PARL. Fl. Ital. III. 190.
 *Lesina: an Wegen, 10 m. s. m.
- 301 *Ruscus aculeatus* L. sp. pl. ed. II. 1474. — VIS. Fl. Dalm. I. 159.
 Lesina: in Gebüsch.
- 305 *Asparagus acutifolius* L. sp. pl. ed. II. 449. — *A. Corruada* SCOP. Fl. carn. ed. 2, I. 248. — VIS. Fl. Dalm. I. 161.
 Lesina: zwischen Steinen, 100 m. s. m.
- 306 *Smilax aspera* L. sp. pl. ed. II. 1458. — VIS. Fl. Dalm. I. 161.
 Lesina: zwischen Steinen, 120 m. s. m.

Dioscoreaceae.

- 312 *Tamus communis* L. sp. pl. ed. II. 1458. — VIS. Fl. Dalm. I. 164.
 Lesina: im Wäldern, 100 m. s. m.

Orchidaceae.

- 315 *Orchis provincialis* BALB. Misc. alt. in Mém. de l'Acad. de Turin 1805—8, 231. VIS. Fl. Dalm. I. 167.

var. *pauciflorus* LINDL. Orch. 263. — CAMUS, Monogr. des Orch. de l'Eur. 158.

*Curzola: in Wäldern.

- 318 *Orchis quadripunctata* CYR. in. Ten. fl. nap. prodr. 53. — *Orchis Hostii* TRATT. Arch. d. Gew. fasc. II. 107. — VIS. Fl. Dalm. I. 168. — CAMUS, Monogr. 156

Lesina: unter Gebüsch, 25 m. s. m., zwischen Steinen, 150 m. s. m. — *Curzola: in Wäldern.

- *322a *Orchis longicruris* LINK in SCHRAD. Diar. 1799, II. 323. — *O. undulatifolia* BIV. Cent. II. 94. — *O. tephrosanthos* DESF. fl. atl. II. 319, non VILL. — VIS. Fl. Dalm. Suppl. I. 69. — CAMUS Monogr. 129 (sub. *O. italica* POIR.).

*Curzola: in Wäldern (20. IV. 1911).

Diese Art ist für Dalmatien vollkommen neu. Hofrat DR. ANTON VON GUGLIELMI fand sie im Jahre 1905 auf der Insel Solta, daher ihm die Priorität gebührt, obwohl der Fund nicht veröffentlicht ist (mündl. Mitteilung). VISIANI gibt hiefür nur den Monte Gliva bei Trebinje an.

- 329 *Anacamptis pyramidalis* L. sp. pl. II. 1332. — VIS. Fl. Dalm. I. 173 var. *condensata* VIS. = *O. condensata* DESF. fl. atl. 2. 316. — CAMUS Monogr. 92.

*var. *brachystachys* D'URV. enum. 121.

*Lesina: unter Gebüsch, 120 m., in Macchien, auf steinigem, buschigen Stellen der. höh. Erhebungen, hie u. da unter sehr häufiger *Orchis Hostii*; Blütenstand typisch dreieckig.

*var. *brachystachys* D'URV. v. *albiflora* RAUL. II. d. Cr. 862.

*Lesina: Blütenstand breit oval.

Var. *brachystachys* wurde von BOTTERI auf Lesina gefunden (RCHB. Ic. 8).

A. *pyr.* var. *albiflora* scheint auf Creta die gewöhnliche Form zu sein, da RAULIN, in Ile de Crète, 1869 p. 558, nichts weiter bemerkt.

- 331 *Aceras anthropophora* (L.) R. BR. in AIT. Kew. V. 191. — *Ophrys anthropophora* L. sp. pl. 948. — VIS. Fl. Dalm. I. 174. — CAMUS Monogr. 71.

Lesina: auf unbebautem Boden, 200 m. s. m.

- 334 *Ophrys atrata* LINDL. Bot. reg. 1087. — *O. fuciflora* SM. Brit. fl. IV, 32 β . *atrata* LINDL. — VIS. Fl. Dalm. I. 176. — CAM. Monogr. 286.

Lesina: auf kalk. Boden zwischen Gräsern, 10 m. s. m.

- 335 *Ophrys aranifera* HUDS. Fl. Angl. II. 392. — VIS. Fl. Dalm. I. 176.

*var. *fucifera* RCHB. Ic. XIII. 89, t. 449, f. IV.

In CAMUS. Monogr., 281—285 nicht enthalten.

*Curzola: an Wegen.

- 337 *Ophrys cornuta* STEV. in Mém. soc. nat. Mosc. II. 175. —
 Vis. Fl. Dalm. I. 177. — CAM. Monogr. 270.
 *Lesina: zwischen Steinen, selten, 150 m. s. m.
- 342 *Ophrys iricolor* DESF. Coroll. de Tourn. 56, t. 3. — Vis. Fl.
 Dalm. I. 179.
 var. *genuina* RCHB. fil. Ic. XIII. 73, t. 444, fig. IV.
 Lesina: an kalk. steinigen Stellen, 15 m. s. m.
 Kommt nur auf Lesina vor, CAMUS gibt sie in seiner Monogr.
 für Dalmatien nicht an. ASCHERSON (Syn. III. 627) führt sie
 mit Fragezeichen an.

Aristolochiaceae.

- 379 *Aristolochia Clematitis* L. sp. pl. ed. I. 962. — Vis. Fl.
 Dalm. I. 195.
 *var. *macrophylla* TAUSCH. nach LINDEM. Fl. Chers. II. 165.
 Lesina: unter *Agave americana*, nahe dem Gestade, 1 m. s. m.
- 380 *Aristolochia rotunda* L. sp. pl. ed. II. 1364. Vis. Fl. Dalm. I. 195.
 Lesina: Zwischen Gebüsch, 50 m. s. m.

Rafflesiaceae.

- 383 *Cytinus hypocistis* L. syst. veg. ed. XIV. 826. — Vis. Fl.
 Dalm. I. 196.
 var. *kermesinus* Guss. Fl. Sic. Syn. II. 619.
 Curzola: in Gebüsch.

Coniferae.

- 395 *Juniperus Oxycedrus* L. sp. pl. ed. II. 1470. — Vis. Fl.
 Dalm. I. 202.
 *var. *viridis* POSP. Fl. d. Küstenl. I. 30.
 Lesina: felsige Orte.
- 397 *Juniperus phoenicea* L. sp. pl. 1040. — Vis. Fl. Dalm. I. 203.
 Lesina: in Macchien, 50 m. s. m.

Gnetaceae.

- *399a *Ephedra campylopoda* C. A. MEYER, Monogr. Eph. 73, t. 2. —
 Vis. Fl. Dalm. I. 204. — STAFF, Ephed. 56.
 *Lesina: an Felsen: 120 m. s. m.
 Kommt in Dalmatien nur zerstreut vor. Nach STAFF stellt
 sie eine ungemein veränderliche Art dar, deren unter-
 schiedene Arten in einander übergehen.

Urticaceae.

- 427 *Urtica membranacea* POIR. in. LAM. Enc. meth. IV. 597. —
 Vis. Fl. Dalm. Suppl. 46. — RCHB. fl. germ. XII. f. 1321.
 *Lesina: zwischen Gräsern, 10 m. s. m.
- 428 *Urtica piluliferu* L. sp. pl. ed. II. 1395. — Vis. Fl. Dalm.
 I. 217.
 var. *genuina* WILLK. et LANGE.
 Lesina: fl. fr. zwischen Gräsern, 10 m. s. m.

- *429 *Parietaria judaica* L. sp. pl. ed. II. 1492. — *P. ramiflora*
MOENCH Meth. 327.
*forma *brevipetiolata* BOISS. Fl. Or. IV. 1149.
Lesina: an Mauern.
var. *microphylla* BACH Fl. XXIV. 735.
*Lesina: an Wegen mit *Veronica didyma*, 20 m. s. m.

Santalaceae.

- 441 *Osyris alba* L. sp. pl. II. 1450. — Vis. Fl. Dalm. I. 223. —
C. K. SCHNEIDER Ill. Handb. Laubh. I. 247. fig. 160.
*Curzola: in Wäldern.
Auf den Wurzeln von *Laurus*, *Olea*, *Ficus* etc. schmarotzend.

Polygonaceae.

- 453 *Polygonum aviculare* L. sp. pl. II. 519. — Vis. Fl. Dalm. I. 228.
I. 228.
*var. *erectum* ROTH Tent. I. 174.
Curzola: an Wegrändern.
*var. *laxum* LEDEB. Fl. ross. III. 532.
Lesina: an Wegrändern, 100 m. s. m.
Die genaue Gliederung ist ungemein schwer, in Anbetracht
der vielen, besonders von A. LEHMANN aufgestellten Formen.
LINDMANN hat in Svensk Bot. Tidskr. VI. 693 (1912) eine
Gliederung vorgenommen, auf die hiemit verwiesen wird.
465 *Rumex pulcher* L. sp. pl. II. 477. — Vis. Fl. Dalm. I. 232.
*var. *microdon* HAUSSKN. Mitt. Thür. B. V. N. F. XI. 59.
Lesina: an Wegrändern ca. 100 m. s. m.

Chenopodiaceae.

- 473 *Salicornia fruticosa* L. sp. pl. II. 5. — Vis. Fl. Dalm. I. 236.
*var. *remotiflora* UNG. STERNB. Atti Congr. Bot. Fir. 299.
*Curzola: am Meeresstrand.
*Insel Lukovei (Bacili) bei Lesina.
480 *Atriplex litorale* L. sp. pl. II. 1494. — Vis. Fl. Dalm. I. 238.
*var. *serratum* (HUDS.) MOQU. = *A. sulcatum*. KIT. Laubblät-
ter \pm buchtig gezähnt.
*var. *sulcatum* G. BECK.
Blätter nach dem Grunde durch einen nach vorwärts
gekrümmten Zahn fast spießförmig.
Curzola: am Meeresstrand.
Beide Varietäten sind an demselben Exemplar zu beobachten.
497 *Salsola Soda* L. sp. pl. II. 323. — Vis. Fl. Dalm. I. 244.
*Curzola: Nahe dem Meeresstrand.
Nur bei Zara, Salona und Ragusa angegeben.

Thelygonaceae.

- 482 *Thelygonum Cynocrambe* L. sp. pl. II. 1411. — Vis. Fl. Dalm. I. 238.

Lesina: an feuchten Stellen, 20 m. s. m.

Amarantaceae.

- 500 *Amarantus silvestris* DESF. Cat. hort. Paris 44. — Vis. Fl. Dalm. I. 245.

*Curzola: in Gärten.

- 501 *Amarantus deflexus* L. Mant. 295. — *Euxolus deflexus* Moq. TAND. in DC. Prodr. XIII. 2. 275. — Vis. Fl. Dalm. I. 245. var. *prostratus* DC. Fl. fr. V. vol. VI. 375.

*Lesina: in Rissen der Steine, 1 m. s. m.

Nur für Trau, Sebenico und Cattaro angegeben.

Plantaginaceae.

- 508 *Plantago lanceolata* L. sp. pl. ed. II. 164. — Vis. Fl. Dalm. II. 2. var. *sphaerostachya* WIMM. et GR. Fl. Siles. 129 = var. *pumila* KOCH Syn. 597, non NEILR.

Curzola: an Wegen. — Lesina: auf dürrem, kalk. Boden, an Wegen, 20 m. s. m. — Sabioncello: in Weingärten bei Kucište.

*Die Blätter der vorliegenden Pflanze sind stark behaart, am Grunde zottig und erinnern dadurch sehr an *Pl. hungarica* W. K., von dem sie sich durch die anliegende Behaarung der Schäfte unterscheidet.

- 515 *Plantago Coronopus* L. sp. pl. ed. II. 166. — Vis. Fl. Dalm. II. 5. Lesina: an Wegen, 2 m. s. m.

- 516 *Plantago Psyllium* L. sp. pl. ed. II. 167. — Vis. Fl. Dalm. II. 5. Lesina: zwischen Gräsern auf kalk. Boden 10 m. s. m., an sonnigen, trockenen, sandige Plätzen.

Fehlt nach VISIANI auf dem dalm. Inseln vollständig; nur bei Zara, Sebenico, Trau, Spalato und Macarsca gefunden.

Plumbaginaceae.

- 522 *Statice cancellata* BERNH. in BERT. Fl. Ital. III. 525. — *St. pubescens* KOCH Syn. ed. I. 595. — *St. rorida* Vis. stirp. Dalm. 48 u. Fl. Dalm. II. 8.

Lesina: zwischen Steinen, 2 m. s. m.

- 523 *Statice caspica* WILLD. Enum. hort. berol. I. 336. — Vis. Fl. Dalm. II. 8.

Curzola: am Meeresstrand.

- 525 *Plumbago europaea* L. sp. pl. ed. II. 215. — Vis. Fl. Dalm. II. 9. Lesina: an Wegen, 100 m. s. m. — Curzola: an Wegrändern.

Globulariaceae.

- 527 *Globularia cordifolia* L. sp. pl. ed. II. 139. — Vis. Fl. Dalm. II. 10.

Curzola: auf den benachbarten Hügeln.

Dipsaceae.

- 532 *Cephalaria leucantha* (L.) SCHRAD. Cat. sem. hort. Gott. (1814). — *Scabiosa leucantha* L. sp. pl. ed. II. 142. — Vis. Fl. Dalm. II. 12.
Curzola: auf steinigten Stellen.
- 539 *Tremastelma Sibthorpiatum* (SM.) FRITSCH Exkursionsfl. f. Öst. *Pterocephalus palaestinus* COULT. Dipsac. 31. var. *indivisa* Vis. Fl. Dalm. II. 15. — *Scabiosa Sibthorpiana* SIBTH. et SM. Prodr. Fl. Graec. I. 84.
Lesina: bei Cittavecchia, 100 m. s. m. — Lesina: unter Gebüsch, 3 m. s. m.

Valerianaceae.

- 542 *Valerianella echinata* (L.) DC. Fl. fr. IV. 242. — *Valeriana echinata* L. sp. pl. ed. II. 47. — Vis. Fl. Dalm. II. 18.
Lesina: dürre, felsige Orte.
- 545 *Valerianella eriocarpa* DESV. Journ. bot. II. 314. — Vis. Fl. Dalm. II. 19.
Curzola: an steinigten, schattigen Stellen.
- 548 *Valerianella coronata* (L.) DC. Prodr. syst. nat. 4. 628. — *Valeriana locusta* L. sp. pl. II. 33. — Vis. Fl. Dalm. II. 20.
Lesina: zwischen Gräsern, 10 m. s. m. und unbebautem Boden, 200 m.
In VISIANI zu *V. hamata* BAST. in DC. Fl. fr. 5. 494 gezogen.

Compositae.

- 558 *Calendula arvensis* L. sp. pl. ed. II. 1303. — *C. sublanata* RCHB. Ic. fl. germ. XV. 99, t. 160, f. 1.
var. *rugosa* Vis. Fl. Dalm. II. 26.
Lesina: auf steinigem Boden, 10 m. s. m. — Curzola: um Blatta, an Wegen.
Diese Varietät ist in VISIANI nur auf Lesina und bei Ragusa angegeben.
- 558a *Calendula officinalis* L. sp. pl. ed. II. 1303.
Lesina: zwischen Gräsern an unkultivierten Orten, 40 m. s. m.
Unter dem 15. IV. 1911 erfuhr ich von dem Sammler dieser Pflanze brieflich: «Wie ich mich überzeugt habe, ist *C. off.* keine einheimische Pflanze. Sie wurde nämlich vor einigen Jahren in dem hiesigen Friedhofe gesät und von da dürften die Samen in die Umgebung desselben vom Winde getragen worden sein».
- 575 *Centaurea ragusina* L. sp. pl. ed. II. 1290. — Vis. Fl. Dalm. II. 35. — HAYEK, Centaur. Art. Öst.-Ung. 77.
Lesina: auf sonnigen Felsen, 15 m. s. m.
- 580 *Centaurea divergens* Vis. Fl. Dalm. II. 37. t. 41. — HAYEK, Cent. Art. 105.
Lesina: unter Olivenbäumen, an Wegen, 10 m. s. m.

- 581 *Centaurea dalmatica* A. KERN. Sched. ad. fl. exs. Austr. Hung. I. 87. — *C. Kartschiana* VIS. Fl. Dalm. II. 38. — HAYEK, Cent. Art. 103.
*Curzola: steinige Äcker.
- 588 *Centaurea solstitialis* L. sp. pl. ed. II. 917. — VIS. Fl. Dalm. II. 41. — HAYEK, Cent. Art. 18.
Lesina: auf kalkigem Boden, 20 m. s. m.
- 589 *Centaurea melitensis* L. sp. pl. 917. — *C. apula* LAM. Dict. I. 674. — VIS. Fl. Dalm. II. 41. — HAYEK, Cent. Art. 15.
Lesina: an Wegen, 50 m. s. m.
- 590 *Centaurea calcitrapa* L. sp. pl. ed. II. 1297. — VIS. Fl. Dalm. II. 41. — HAYEK, Cent. Art. 11.
Curzola: an Wegen.
HAYEK gibt obige Art nur von Zara und Ragusa an; VISIANI hingegen für ganz Dalmatien und die Inseln.
- 591 *Crupina Crupinastrum* VIS. Fl. Dalm. II. 42. — *Centaurea crupinastrum* MORIS in sem. h. taur. 1842. — ENGLER u. PRANTL, Composit. 325.
Lesina: auf steinigem Boden, 5 m. s. m.
- 592 *Carthamus lanatus* L. sp. pl. ed. II. 1163. — *Kentrophyllum lanatum* DC. in DUB. bot. gall. 1. 293. — VIS. Fl. Dalm. II. 43.
Lesina: an Wegen. 100 m s. m. — Curzola: an steinigem Orten.
- 595 *Tyrimius leucographus* CASS. Dict. sc. nat. vol. 41. 335. — *Carduus leucogr.* L. sp. pl. ed. II. 1149. — VIS. Fl. Dalm. II. 44. — ENGLER—PRANTL. l. c. 323.
Lesina: auf kalkig-steinigem Boden, 20 m. s. m.
- 599 *Carduus nutans* L. var. **micropterus* BORB. Beitr. z. Sommerfl. v. Arbe u. Veglia. in Math. — Term. Közl. XIV. 390. — *C. micropterus* (BORB.) TEYBER in Öst. Bot. Zeitschr. 60. Jahr. 308.
*Lesina: auf kalkig-erdigem Boden, 15 m. s. m.
VIS. Fl. Dalm. II. 46 gibt *C. chrysacanthus* TEN. fl. nap. 4. 118 als Syn. mit *C. nutans* var. *radians* BIAS., viagg. in Dalm. 205 an.
C. chrysac. TEN. ist eine Hochgebirgspflanze Italiens, welche nur am Monte Majella in den Abruzzen in einer Höhe von 2000 m. vorkommen soll. Sie hat stets aufrechte Köpfchen, tiefer geteilte Blätter und stärkere Bedornung als *C. nutans*.
Die Abbildung in TEN. Fl. nap. (1830) Tom. IV. t. 188. zeigt sehr schmale, nicht zurückgekrümmte Hüllschuppen, was bei vorliegender Pflanze nicht der Fall ist.
- 603 *Carduus pycnocephalus* JACQ. Hort. Vindob. I. 17, t. 44. — *C. tenuiflorus* VIS. stirp. Dalm. 29. u. Fl. Dalm. II. 47.
Lesina: auf kalk. Boden unter *Pinus maritima*. — *Curzola: an Wegen.

- 608 *Cirsium arvense* Scop. fl. carn. II. 126.
var. **obtusilobium* G. Beck. Fl. v. N. Ö. 1239 forma **subin-*
canum G. Beck l. c.
Lesina: in Weingärten.
- 630 *Erigeron canadensis* L. sp. pl. ed. II. 1209. — Vis. Fl.
Dalm. II. 57.
Lesina: in Weingärten bei Grablje, 400 m. s. m.
- 631 *Bellis perennis* L. sp. pl. ed. II. 1248. — Vis. stirp. Dalm. 27.
var. *pratensis* Vis. Fl. Dalm. II. 58.
Lesina: an Wegen, 30 m. s. m.
- 634 *Phagnalon rupestre* DC. Prodr. syst. nat. V. 396. — Vis. Fl.
Dalm. II. 59.
Lesina: auf steinigem Boden. 50 m. s. m.
- 635 *Evax pygmaea* Pers. syn. pl. 2. 422. — *Filago pygmaea* L. sp.
pl. ed. II. 1311. — Vis. Fl. Dalm. II. 60. (sub *Evace*).
Lesina: an Wegen, 30 m. s. m.
- 638 *Inula Conyza* DC. Prodr. V. 464. — *Inula vulgaris* Lam.
Fl. fr. II. 73. — Vis. Fl. Dalm. II. 61. — G. Beck, Inula
Monogr. 49.
Curzola: auf Heiden. — Lesina: bei Grablje, in Weingärten,
400 m. s. m.
- 644 *Inula candida* Cass. Dict. sc. nat. 23 p. 551. — *Conyza*
candida L. sp. pl. ed. I. 862.
var. *verbascifolia* (Willd.) sub *Conyza*. — Vis. Fl. Dalm.
II. 63. G. Beck, Monogr. 44.
Lesina: an steinigten Orten. — Curzola: auf felsigen Plätzen.
- 647 *Inula graveolens* (L.) Desf. Fl. atl. II. 275. — *Erigeron*
graveolens L. sp. pl. ed. II. 1210. — Vis. Fl. Dalm. II. 64.
G. Beck, Monogr. 55.
*Curzola: an Wegen. — Lesina: bei *Grablje, an Wegen,
300 m. s. m.
- 648 *Inula viscosa* Ait. Hort. Kerv. ed. 1. III. 223. — *Erigeron*
viscosum L. sp. pl. ed. 863. — Vis. Fl. Dalm. II. 64. —
G. Beck, Monogr. 54.
Lesina: auf kalkigem Boden, 10 m. s. m. — Curzola: an
Wegen.
- 649 *Inula crithmoides* L. sp. pl. ed. II. 1240. — Vis. Fl. Dalm.
II. 65. — G. Beck, Monogr. 53.
Insel Lukovei (Bacili). — Curzola: am Meeresstrand.
- 650 *Pulicaria dysenterica* Gärtner. Defruct. 462. — *Inula dysen-*
terica L. sp. pl. II. 1237.
*var. *microcephala* Boiss. Fl. orient. III. 202. — Vis. Fl.
Dalm. II. 65.
*Lesina: an feuchten Stellen. 100 m. s. m.
- 655 *Pallenis spinosa* Cass. in Dict. sc. nat. XXXVII. 275. —
Bupththalmum spinosum L. sp. pl. ed. II. 1274. — Vis. Fl.
Dalm. II. 67.

- *Lesina: Kalkboden, 20 m. s. m. — *Curzola: an Wegen. —
 *Sabioncello: bei Kucište, auf Weiden.
- 656 *Senecio vulgaris* L. sp. pl. II. 1216. — Vis. Fl. Dalm. II. 68.
z. typicus POSP. Fl. d. Küstenl. II. 822.
 Lesina: an unkultivierten Stellen, ca. 150 m. s. m. — Curzola: ebendort.
- 673 *Helichrysum italicum* (ROTH) Guss. Fl. sic. syn. II. 469. —
Gnaphalium italicum ROTH Cat. I. 115. — Vis. Fl. Dalm. II. 75.
 Insel Spalmadori, 3 m. s. m.
- 674 *Filago germanica* L. sp. pl. ed. II. 1311.
 var. *decumbens* Vis. Fl. Dalm. II. 75.
 *Sabioncello: an Wegrändern bei Kucište.
- 678 *Anthemis arvensis* L. sp. pl. ed. II. 1261. — Vis. Fl. Dalm. II. 78.
 Curzola: in einem aufgelassenen Garten, auf wiesigen Plätzen.
- 679 *Anthemis altissima* L. sp. pl. ed. II. 1259. — Vis. Fl. Dalm. II. 78.
 *Curzola: an Wegen.
- 682 *Anthemis Visianii* WEISS in diar. soc. zool. bot. vindob. 1869. — Vis. Fl. Dalm. II. 79 (sub *A. chia*).
 *Curzola: um Blatta. — *Lesina: auf steinig-kalk. Boden, 10 m. s. m.
- 691 *Achillea odorata* L. sp. pl. II. 1268. — Vis. Fl. Dalm. II. 83.
 *Curzola: an steinigen Stellen.
 Nach VISIANI NUR auf der Insel Pago. Blätter unterseits spärlich grubig punktirt.
- 702 *Chrysanthemum segetum* L. sp. pl. ed. II. 1254. — Vis. Fl. Dalm. II. 89.
 *Curzola: bei Blatta.
- 703 *Chrysanthemum coronarium* L. sp. pl. 890. — *Matricaria coronaria* DESR. in LAM. dict. III. 737. — Vis. Fl. Dalm. II. 90 (sub *Pinardia*).
 *Lesina: auf sterilem Boden, 100 m. s. m.
 VISIANI gibt sie nur von Lissa an.
- 715 *Scolymus hispanicus* L. sp. pl. ed. II. 1143. — *Myscolus microcephalus* CASS. Dict. d'hist. nat. 34, p. 85. — Vis. Fl. Dalm. II. 95.
 Lesina: auf Kalkboden, 30 m. s. m. — Curzola: auf Wegrändern.
- 717 *Rhagadiolus stellatus* Dc. Prodr. VII. 77. — *Lapsana stellata* L. sp. pl. ed. II. 1141. — Vis. Fl. Dalm. II. 96 (sub var. *indiviso*).
 Lesina: in Gärten, 50 m., in Weingärten und an Wegrändern. 30 m.

- 717 *Rhagadiolus edulis* GÄRTN. De fruct. et. sem. 2, 354. — *Rh. stellatus* DC. var. *edulis* DC. l. c. — VIS. Fl. Dalm. II. 96 (sub *Rh. stell.* γ *eduli*).
 *Lesina: an Wegen, 100 m., an Bächen, 30 m. — *Curzola: an Wegrändern.
 In VISIANI nur für Trau u. Ragusa angegeben.
- 719 *Cichorium pumilum* JACQ. obs. bot. 4 p. 3. — *C. Endivia* L. sp. pl. ed. II. 1142. var. *pumilum* VIS. Fl. Dalm. II. 97.
 Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
- 720 *Hyoseris radiata* L. sp. pl. ed. II. 1137. — VIS. Fl. Dalm. II. 97.
 Lesina: an steinigen, kalk. Stellen, 15 m. s. m. — *Curzola: an schattigen Orten.
 Von dieser Art liegen 2 Formen vor: die eine mit grossen Lappen der breiten Blätter; die andere mit mehrfach geteilten Lappen der schmalen Blätter. Auf Lesina wurde die 1. Form, auf Curzola die 2. Form beobachtet.
- 721 *Hyoseris scabra* L. sp. pl. ed. II. 1138. — *H. adpressa* MOENCH Meth. 541. — VIS. Fl. Dalm. II. 98.
 Lesina: in Rissen kalkiger Steine, ca 15 m.
 Vorliegende Pflanze ist in allen Teilen mehr minder behaart. POSPICHAL macht in der Fl. d. Küntenlandes 744 (Band II) die Bemerkung: «Warum die in allen Teilen glatte und kahle Pflanze «*scabra*» heißen soll, ist mir nicht klar».
- 730 *Picris Sprengeriana* (L.) POIR, Encyc. 310. — *Crepis Sprengeriana* L. sp. pl. ed. II. 1130. — VIS. Fl. Dalm. II. 102.
 *Curzola: an Wegrändern.
 Nur für Insel Giuppana bei Ragusa angegeben.
- 731 *Leontodon tuberosus* L. sp. pl. ed. II. 1123. — *Thrinicia tuberosa* DC. Fl. fr. IV. 52. — VIS. Fl. Dalm. II. 103. (sub *Thrinicia*).
 *Lesina: an steinigen, kalkigen Stellen 15 m. s. m. — *Curzola: auf Wiesen.
- 731 *Leontodon tuberosus* L. l. c. *Thrinicia tuberosa* DC. l. c.
 *nova forma: *integrifolia* mihi.
 Foliis indivisis in petiolum longum sensim attenuatis, undulato-dentatis; cetera ut in planta typica.
 Lesina: an steinigen, kalkigen Stellen, 15 m. s. m.
 Diese auffällige Form unterscheidet sich vom Typus durch ungeteilte Blätter, deren Rand weitschweifig-gezähnt ist. Die Blätter sind allmählich in den langen Blattstiel zugeschweift. HALÁCSY bearbeitete G. RIGO's Ausbeute (Iter Ital. quartum a. 1898, curavit I. DÖRFLER) und stellte unter No. 25a eine Varietät *subintegrifolia* auf, die weder in seinem Conspetus Fl. gr., noch in den Nachträgen publiziert ist. Diese Varietät unterscheidet sich von obiger Form durch viel breitere, plötzlich in den Blattstiel zugeschweifte Blätter.

- 734 *Leontodon crispus* VILL. Hist. pl. Dauph. III. 84. t. 25. —
L. saxatilis RCHB. Fl. germ. exc. 252. — VIS. Fl. Dalm. II. 104.
 var. *simplex* VIS. I. c.
 Lesina: in Macchien, 200 m s. m.
- 740 *Scorzonera villosa* SCOP. Fl. carn. ed. 2, II. 97. — VIS. Fl.
 Dalm. II. 107. — *Galasia villosa* CASS. Dict. sc. nat. 286. t. 122
 Lesina: steiniger Boden, 20 m. s. m. — Insel Lukovei (Bacili).
 Bemerkenswert sind Exemplare mit sehr schmalen und sehr
 breiten Blättern.
- 743 *Tragopogon porrifolius* L. sp. pl. ed. II. 1110. — VIS. Fl. Dalm.
 II. 108.
 : Lesina: 30 m. s. m.
- 747 *Urospermum picroides* DESF. Cat. hort. par. ed. I. 90. — *Tra-*
gopogon picroides L. sp. pl. ed. II. 1111. — VIS. Fl. Dalm.
 II. 109.
 Lesina: auf Kalkboden, unter Kiefern, 10 m., in Gärten, an
 Hecken, wüsten, sonnigen Plätzen (var. *laciniatum* und var.
indivisum).
 Curzola: an Wegen (var. *indivisum*).
- *749 *Taraxacum laevigatum* DC. Cat. hort. Monsp. 149. — *Leont.*
corniculatus KIR. in SCHULT. Öst. Fl. 2. Aufl. 406.
 *Curzola: an Wegen.
- 750 *Chondrilla juncea* L. sp. pl. ed. II. 1120. — VIS. Fl. Dalm.
 II. 111.
 Curzola: an Wegen.
- 758 *Lactuca viminea* (L.) PRESL Fl. čech. 100 (teste HANDEL—MAZZ.).
 — *Prenanthes viminea* L. sp. pl. ed. II. 1120. — VIS. Fl.
 Dalm. II. 114 (sub *Phoenixopo*).
 *Curzola: an Wegrändern.
- 759 *Lagoseris sancta* (L.) MALY. — *Hieracium sanctum* L. Cent.
 II. 30. *Pterotheca bifida* FISCH et MEY. Ind. hort. petrop. IV.
 Nr. 1736. — VIS. Fl. Dalm. II. 115, t. 50. f. III. (sup *Tricho-*
crepide).
 Lesina: an Wegen, 50 m. s. m.
- 761 *Zaeryntha verrucosa* GÄRTN. De fruct. II. 358, t. 157, f. 7. —
Lampsana Zaeryntha L. sp. pl. ed. II. 1141. — VIS. Fl. Dalm.
 II. 116.
 Lesina: bei Cittavecchia, 100 m. u. in der Umgebung von
 Lesina unter Ölbäumen und in lichten Wäldern 100 m.
- 765 *Crepis rubra* L. sp. pl. ed. II. 1132. — *Barkhausia rubra*
 MOENCH Meth. pl. 537. — VIS. Fl. Dalm. II. 118.
 var. *scapigera* Ten. syll. pl. nap. 404.
 *Lesina: auf kalkigem Boden, 20 m. s. m. — *Curzola: an
 Wegen. — *Sabioncello: an Wegen bei Kuncište.
 VISIANI gibt sie in der Inselgruppe nur für den Mte Ossero
 an. Im k. k. naturh. Hofmuseum Wien erliegt ein Exemplar
 von BOTTERI als *Barkh. rubra* DC.

- 766 *Crepis bulbosa* (L.) Cass. ann. sc. nat. vol. 29, 4. — *Leontodon bulbosum* L. sp. pl. ed. II. 1122. — Vis. Fl. Dalm. II. 118.
*Curzola: um Blatta.
- 771 *Crepis neglecta* L. Mant. I. 107. — Vis. Fl. Dalm. II. 120.
Lesina; bei Cittavecchia, an Wegen, 3 m. s. m.
- 776 *Hieracium praealtum* Vill. Voyag. 62, t. 2. f. 1. — Vis. Fl. Dalm. II. 121.
Lesina: in Macchien, 200 m. s. m.
- 776 *Hieracium florentinum* All. Fl. pedem. 213. — *H. piloselloides* Vill. Hist. pl. Dauph. III. 100. — Vis. Fl. Dalm. II. 122. (als var. ?).
forma *meridionalis* Naeg. et Pet. Hierac. Mitteleur. I. 555.
Lesina: auf kalkig-steinigem Boden, 20 m. s. m.; in Macchien, 200 m. (nur die Hauptart).
- 780 *Hieracium stuposum* Rchb. exc. 265. — *H. glaucum* All. Fl. Pedem. 1, 214. var. *stuposum* Vis. Fl. Dalm. II. 123.
— Hieracia (in Reichenb.) von Dr. Murr, Zahn und Poell., III. 318.).
Lesina: Grablje bei Lesina, an Wegen, 300 m. s. m. — Curzola: in Gebüsch.
- 786 *Sonchus laevis* Vill. Hist. pl. Dauph. III. 158. — *S. oleraceus* Wallr. Sched. 431. (L. p. p.) — Vis. Fl. Dalm. II. 125.
Curzola: um Blatta.
forma *lacera* Willd. sp. pl. III. 1513.
Curzola: an Wegen.
var. *triangularis* Wallr. Sched. Crit. 432 ex Posp. Fl. d. Küstenl. 762.
Lesina: an Wegen, unter *Urtica*, 2 m. s. m.
- 789 *Reichardia picroides* Roth, Abh. 35. — *Picridium vulgare* Desf. Fl. Atl. II. 221.
var. *maritima* Rchb. Ic.-fl. germ. XIX. 27. t. 56, f. 2 u. Posp. Fl. d. Küstenl. 777. Vis. Fl. Dalm. II. 126. (sub *Picride*).
Lesina: meist in den Rissen kalkiger Steine, 15 m. (darunter Exemplare mit feingeteilten Blattabschnitten). — Curzola: an Wegen. — Sabioncello: in Weingärten bei Kucište.
*nova forma: *indivisifolia* mihi.
Foliis basalibus et caulinis omnino indivisis, non dentatis, margine undulatis, cetera ut in planta typica.
Insel Lukovci (Bacili) bei Lesina. — Curzola: an Wegen.
Diese Form ist derart auffällig, dass man sie beim ersten Anblick nicht als *Reichardia* erkennen würde, wenn man nicht die weissberandeten herzförmigen Schuppen an den Köpfchen und Köpfchenstielen bemerken würde.
- 791 *Xanthium spinosum* L. sp. pl. ed. II. 1400. — Vis. Fl. Dalm. II. 127.
Curzola: an unkultivierten Stellen.

Campanulaceae.

- 810 *Campanula Erinus* L. sp. pl. ed. II. 240. — Vis. Fl. Dalm. II. 135.
Lesina: auf steinigem Wegen in Gärten und in den Ritzen der steinernen Feldmauer. 25 m. s. m.
- 816 *Legousia hybrida* (L.) DELARB. Fl. ANV. ed. II. 45; GÉRARD in Rev. bot. (1890) 168. — *Specularia hybrida* ALPH. DC. Monogr. Camp. 349. — Vis. Fl. Dalm. II. — *Campanula hybrida* L. sp. pl. 168. — Lesina: an Bächen.

Ericaceae.

- 821 *Arbutus Unedo* L. sp. pl. ed. II. 566. — Vis. Fl. Dalm. II. 141.
Lesina: auf felsigen Stellen (fl.) — Curzola: auf Felsen (fr.)
- 826 *Erica verticillata* FORSK. Descr. pl. fl. aeg. arab. cent. VIII. 210. — *E. vagans* BENTH. in DC. Prodr. syst. nat. VII. 667, non L. — Vis. Fl. Dalm. II. 143.
Lesina: an Wegen, 2 m. s. m.
- 827 *Erica multiflora* L. sp. pl. ed. II. 503. — Vis. Fl. Dalm. II. 143. — *E. peduncularis* PRESL. Del. prag. 89, non SALISB. — *E. vagans* DC. Fl. fr. 6, 438, non L.
Lesina: zwischen Sträuchern.
- 828 *Erica arborea* L. sp. pl. ed. II. 502. — Vis. Fl. Dalm. II. 144.
Lesina: an steinigem Stellen 200 m. s. m. — Curzola: in Wäldern.

Primulaceae.

- 835 *Cyclamen repandum* SIBTH. et SM. Prodr. fl. graec. 128. — Vis. Fl. Dalm. II. 148.
Lesina: zwischen Steinen, 25. m. s. m. — *Curzola: zwischen Gebüsch.
845. *Anagallis arvensis* L. sp. pl. ed. II. 211. — Vis. Fl. Dalm. II. 152.
Lesina: an Wegen, 40 m. s. m. — Sabioncello: bei Kucište, an Wegen.
- 845 *Anagallis femina* MILL. Gard. Diet. ed. VIII. Nr. 2. — *A. coerulea* SCHREB. Spic. fl. Lips. 5. — Vis. Fl. Dalm. II. 152.
Curzola: an Wegen. — Sabioncello: bei Kucište, an Wegen.
- *845a *Anagallis Dörfleri* RONNIGER in Sched. zum Herbar. normale v. J. DÖRFLER, Nr. 4484 und in Sched. ad. Fl. exs. Austr.-Hung. ed. A. KERNER Nr. 3692. — *A. arvensis* L. α *coerulea* SCHREB.
Lesina: grasige Plätze, 10 m. s. m.

Scrophulariaceae.

- 848 *Verbascum densiflorum* BERT. rar. pl. dec. 3. 52 et Fl. ital. 2, 575. — Vis. Fl. Dalm. II. 154.
Lesina: auf kalk. Boden, 100 m. s. m.

- 852 *Verbascum Lychnitis* L. sp. pl. e. II. 253. — Vis. Fl. Dalm. II. 156.
Insel Spalmadori: 5 m. s. m.
VISIANI gibt diese Art nur für die Insel Torcola an.
- 854 *Verbascum sinuatum* L. sp. pl. ed. II. 254, excl. var. ? — Vis. Fl. Dalm. II. 156.
Curzola: an Wegen.
- 857 *Verbascum Blattaria* L. sp. pl. II. 254. — Vis. Fl. Dalm. II. 158.
α. typicum POSP. Fl. d. Küstenl. II. 616.
Lesina: bei Cittavecchia, auf steinigem Boden, 10 m.
- 858 *Celsia orientalis* L. sp. pl. ed. II. 866. — Vis. Fl. Dalm. II. 158.
Lesina: auf kalk. erdigem Boden, 15 m. s. m.
- 861 *Scrophularia canina* L. sp. pl. ed. II. 865. — Vis. Fl. Dalm. II. 159.
Lesina: kalkiger Boden, 20 m. s. m.
- 862 *Scrophularia peregrina* L. sp. pl. ed. II. 866. — Vis. Fl. Dalm. II. 160.
Lesina: unter Gräsern auf steinigem Stellen, 10 m. s. m. —
*Curzola: um Blatta.
- 863 *Cymbalaria muralis* G. M. SCH. Fl. Wett. II. 397. *Linaria cymb.* MILL. Gard. Dict. ed. VIII. Nr. 17. — *Antirrhinum cymb.* L. sp. pl. ed. II. 851. — Vis. Fl. Dalm. II. 160 als var. *vulgaris* (kahle Form.)
var. *acutangula* CHAV. Monogr. d. Antirrh.
Lesina: steinig-kalkiger Boden, 10 m. s. m. — Curzola: an Mauern.
- 872 *Linaria vulgaris* MILL. Gard. Dict. ed. VIII. Nr. 1. — Vis. Fl. Dalm. II. 163.
var. *perglandulosa* ROHLENA.
Lesina: Grablje bei Lesina, in Weingärten.
Blütenstiele und Kelche stark zottig drüsig.
- 878 *Antirrhinum Orontium* L. sp. pl. ed. II. 860. — Vis. Fl. Dalm. II. 165.
Curzola: an Wegen.
var. *grandiflorum* CHAV. Monogr. d. ANTIRRH. t. 4, p. 90.
Lesina: in Gärten, 25 m. s. m.
- 888 *Veronica spicata* L. sp. pl. ed. II. 14. — Vis. Fl. Dalm. II. 167.
forma *squamosa* PRESL Fl. čech. 2.
*Curzola: Ausgezeichnet durch die lang ausgezogene Blütentraube.
- 895 *Veronica Anagallis* L. sp. pl. ed. II. 16. — Vis. Fl. Dalm. II. 171.
var. *aquatica* NEILR. Fl. v. N. Ö. 553.
Lesina: an Wegen und sumpfigen Stellen.

- 897 *Veronica polita* FRIES. — *V. didyma* TEN. fl. neap. prodr. 6. —
 Vis. Fl. Dalm. II. 172.
 var. *Linnaeana* VIS. l. c. = *agrestis* FRIES.
 Lesina: an Wegen, 20 m. s. m.
- 899 *Veronica hederaefolia* L. sp. pl. ed. II. 19. — Vis. Fl. Dalm.
 II. 173.
 Curzola: in einem aufgelassenen Garten.
- 900 *Veronica cymbalaria* BOU. Mém. sur la *Ver. cym.* 3. — Vis.
 Fl. Dalm. II. 173. — *V. hederaefolia* ? L. sp. pl. ed. II. 19.
 Lesina: zwischen Gräsern, kalk. Boden, 10 m. s. m.
- 903 *Orphantha lutea* (L.) KERN. in ENGL. u. PRANTL. Nat. Pfl.
 IV. 3 b, 101. — *Euphrasia lutea* L. sp. pl. ed. II. 842. —
 Vis. Fl. Dalm. II. 175 (sub *Euphrasia*).
 Lesina: Grablje bei Lesina; in Weingärten.
- 905 *Bellardia Trixago* (L.) ALL. Fl. Pedem. I. 61. — *Euphrasia*
latifolia L. sp. pl. ed. II. 841. — Vis. Fl. Dalm. II. 175
 (sub *Euphrasia*). — *Bartsia Trixago* ALL. Fl. ped. I. 61.
 Lesina: auf Weiden.

Orobanchaceae.

- 915 *Orobanche minor* SUTT. Transact. of Linn. Soc. IV. 179. —
 Vis. Fl. Dalm. II. 179. — *O. arvensis* DUM. Fl. belg. 33
 (1827). — G. BECK, Monogr. d. Gatt. Orob. (1890).
 Lesina: auf steinigem Boden, 20 m. s. m.
- 915a *Orobanche pumila* KOECH. et NOË bei RICH. Ic. XX. 104,
 t. 165, f. II. — *O. minor* var. *adenostyla* VIS. Fl. Dalm.
 II. 179.
 *Sabioncello: in Gärten bei Kucište, auf *Helichrysum angustifolium*.
- 916 *Orobanche crinita* VIV. fl. cors. diag. 11. — Vis. Fl. Dalm.
 II. 179.
 Insel Lukovei (Bacili) bei Lesina.

Verbenaceae.

- 919 *Verbena officinalis* L. sp. pl. ed. II. 29. — Vis. Fl. Dalm.
 II. 181.
 Lesina: an Wegrändern, 1 m. s. m.
- 921 *Viter agnus castus* L. sp. pl. ed. II. 890. — Vis. Fl. Dalm.
 II. 182.
 Lesina: auf kalkigem Boden, 2 m. s. m.

Labiatae.

- 925a *Mentha rubra* SMITH in Trans. of Linn. soc. V. 205 (*M.*
arvensis × *viridis*?)
 *Lesina: auf unbebauten Boden, 100 m. s. m.
- 930 *Salvia officinalis* L. sp. pl. ed. II. 34. — Vis. Fl. Dalm.
 II. 186.
 Lesina: auf steinigem Boden. 100 m. s. m.

- 933 *Salvia viridis* L. sp. pl. ed. II. 34. — Vis. Fl. Dalm. I. 187. —
S. Spielmanni Scop. del insubr. 3, p. 31.
 *Lesina: an steinigen Stellen, 30 m. s. m. — *Curzola: an
 Wegrändern.
 Hievon liegen 2 Formen vor: eine hochwüchsige mit langen
 Quirlinternodien und eine gedrungene, niedrige Form mit
 wenigen Blüten.
- 934 *Salvia Sclarea* L. sp. pl. ed. II. 38. — Vis. Fl. Dalm. II. 188.
 Lesina: an Wegen, 15 m. s. m.
- 937 *Salvia verbenaca* L. sp. pl. ed. II. 35. — Vis. Fl. Dalm. II. 189.
 var. *multifida* Vis. Fl. Dalm. II. 190. = *S. multifida* Sibth.
 et Sm. fl. graec. I. 17.
 *Curzola: an Wegen.
 var. *sinuata* Vis. I. c. = *S. verbenaca* ? *laciniata* Willd.
 Enum. hort. berol. suppl. 2. Lesina: grasige Stellen, 10
 m s. m. *Curzola: an Wegen.
- *938a *Salvia brachyodon* Vand. in Österr. Bot. Zeitschr. XXXIX.
 (1889) 179.
 *Sabioncello: auf der Spitze des Monte Vipera, 907 m. Dr.
 v. DEGEN schrieb mir unter dem 29. Okt. 1914, dass *S.*
brachyodon von P. ERICH BRANDIS am 6. VIII. 1904 am
 obigen Standort zum erstenmale gesammelt wurde; eine für
 Dalmatien neue Pflanze. An Ort und Stelle ist sie unter
 dem volkstümlichen Namen «Veliki Krstac» bekannt.
- 939 *Rosmarinus officinalis* L. sp. pl. ed. II. 33. — Vis. Fl. Dalm.
 II. 191.
 Lesina: höchst gemein in allen Macchien und auf den Hügeln.
- 940 *Origanum hirtum* Link. Enum. Hort. Berol. 2, 114 ?
 var. *hirtum* Vis. Fl. Dalm. II. 192 von *O. vulgare* L. =
O. vulgare ? *prismaticum* (GAUD.) = *O. creticum* L. sp. pl.
 823 in Benth. Labiat. (335.)
 Curzola: an Wegrändern.
 var. *virens* Benth. Labiat. 335 (pro *O. vulgare* Vis. Fl.
 Dalm. II. 191. = *O. virens* Hoffm. et Link Fl. Port. I
 119, t. 9.
 Lesina: an kalkigen Orten, 30 m. s. m. mit var. *hirtum*.
- 941 *Thymus dalmaticus* Freyn. Fl. v. Südistr. 162. *Th. angustifolius*
 Vis. Fl. Dalm. II. 192, non Pers. nec. Schreb. — *Th. lon-*
gicaulis Presl. sic. 37, var. *typicus*.
 Lesina: bei Cittavecchia, zwischen Steinen, 2 m. s. m. —
 *Curzola: an Wegen, bei Blatta.
- 941 *Thymus Chamaedrys* Fr. Nov. fl. suec. ed. II. 197. — Vis.
 Fl. Dalm. II. 192.
 Lesina: in Macchien. 150 m. s. m.
- 942 *Thymus acicularis* W. K. pl. hung. II. 157. — *Th. Zygis* L.
 L. sp. pl. ed. II. 826. — Vis. Fl. Dalm. II. 193.
 *Curzola: an felsigen Orten.

- 946 *Satureia montana* L. sp. pl. ed. II. 794.
var. *variegata* VIS. Fl. Dalm. II. 194.
Curzola: auf Felsen.
- 948 *Satureia juliana* L. sp. pl. ed. II. 793. — *Micromeria juliana*
BENTH. Labiat. 373.
var. *angustifolia* VIS. Fl. Dalm. II. 196.
Lesina: auf kalkigem Boden, 30 m. s. m.
- 948a *Satureia Kernerii* (MURB.) FRITSCH Exkursionsfl. Osterr. *Micromeria Kernerii* MURB. Beitr. Fl. v. Südbosn. u. Herzeg. 1891, 53.
*Curzola: an steinigen Orten.
- 949 *Satureia graeca* L. sp. pl. ed. II. 794. — *Micromeria graeca*
BENTH. Labiat. 373.
var. *tenuifolia* VIS. Fl. Dalm. II. 196 (BENTH. als var. *densiflora*).
Insel Spalmadori, 5 m. s. m. — Sabioncello: auf Weiden bei Kucište. — Curzola: an Wegen.
var. *pauciflora* VIS. Fl. Dalm. II. 196.
Lesina: kalk. erdige Stellen, 20 m. s. m.
- 954 *Satureia Nepeta* (L.) SCHEELE in «Flora» XXVI. 577. *Melissa Nepeta* L. sp. pl. ed. II. 828. — VIS. Fl. Dalm. II. 198 (sub. *Calamintha*).
var. *acinifolia* POSP. Fl. d. Küstenl.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m. — Curzola: an Wegen.
var. *typica* POSP. l. c. (zottiger behaart als var. *acinifolia*).
Nach DR. v. DEGEN gibt es von *S. Nepeta* zwei Formen: eine abstehend- und eine anliegend behaarte.
- 958 *Satureia Acinos* (L.) SCHEELE l. c. — *Melissa Acinos* BENTH. Labiat. 389. — *Thymus Acinos* L. sp. pl. II. 826. — VIS. Fl. Dalm. II. 200 (als *Acinos thymoides* MOENCH Meth. pl. 407).
forma *acuminata* FRIV. in Reg. bot. Zeit. 332.
Lesina: kalk. steinige Stellen, 20 m. s. m.
f. *genuina*.
Lesina: an sonnigen, wüsten Plätzen, 50 m. s. m.
- 966 *Sideritis romana* L. sp. pl. ed. II. 802. — BENTH. Labiat. 582. — VIS. Fl. Dalm. II. 204.
Lesina: an steinigen Orten, 30 m. s. m. — *Curzola: an Wegen.
- 969 *Stachys serotina* (HOST) FRITSCH Exkursionsfl. Österr. *Betonica serotina* HOST Fl. Austr. II. 165. — *Stachys Betonica* BENTH. VIS. Fl. Dalm. II. 205.
Curzola: an trockenem, schattigen Orten.
- 970 *Stachys italica* MILL. Gard. Dict. ed. VIII. No. 3. — BENTH. Labiat. 536. — VIS. Fl. Dalm. II. 205. (*St. lanata* VIS. Stirp. dalm. 48, non JACQ., nec CRANTZ.).
Lesina: kalk. erdige Orte, 20 m. s. m. — Curzola: an Wegrändern. — Sabioncello: an Wegen bei Kucište.

- 980 *Stachys subcrenata* VIS. in «Flora» (1829) I. Erg. Bl. 15. — VIS. Fl. Dalm. II. 208.
var. *labiosa* VIS. l. c. = *St. labiosa* BERT. fl. ital. 6, 160.
Lesina: bei Cittavecchia, 100 m. s. m. — *Curzola: an Wegrändern.
VISIANI gibt diese Pflanze ausser Lesina nur am Fusse des Biokovo und bei Crkviča an.
- 984 *Lamium amplexicaule* L. sp. pl. ed. II. 809. — VIS. Fl. Dalm. II. 210.
Lesina: an Wegen, 30 m. s. m. — Curzola: um Blatta.
- 993 *Brunella laciniata* L. sp. pl. ed. II. 837. — *Br. alba* PALL. bei M. B. Fl. taur. cauc. II. 67. — VIS. Fl. Dalm. II. 213.
*Curzola: auf Wiesen.
- *998a *Ballota velutina* POSP. Fl. d. Küstenl. II. 599.
*Lesina: an Wegen, 30 m. s. m. (Neu für Lesina) Von *B. foetida* LAM. durch das dicke und an den Blättern sammelige Indument verschieden.
Der *B. rupestris* VIS. Fl. Dalm. II. 216 nahestehend, die sich durch Sternhaare am Kelche, spitz gezähnte Oberlippen und reichblütige Cymen von *B. velutina* unterscheidet.
- 999 *Marrubium vulgare* L. sp. pl. ed. II. 816.
var. *apulum* TEN. fl. nap. V. 16. VIS. Fl. Dalm. II. 217.
Lesina: an Wegen, auf kalk. Boden, 30 m. s. m.
- 1000 *Marrubium candidissimum* L. sp. pl. ed. II. 816. — VIS. Fl. Dalm. II. 217.
Curzola: an steinigten Plätzen.
- 1008 *Prasium majus* L. sp. pl. ed. II. 838. — VIS. Fl. Dalm. II. 221.
Lesina: zwischen Gräsern unter *Agave americana* 15. m. s. m. — *Curzola: in Wäldern.
- 1012 *Ajuga Iva* SCHREB. Verticill. unil. 25. — *Teucrium Iva* L. sp. pl. II. 787. — BENTH. Labiat. 698. — VIS. Fl. Dalm. II. 222.
Lesina: zwischen Steinen, 10 m. s. m.
- 1015 *Teucrium Botrys* L. sp. pl. ed. II. 786. — VIS. Fl. Dalm. II. 223.
Lesina: auf unbebautem Boden, 100 m. s. m.
- 1016 *Teucrium Chamaedrys* L. sp. pl. ed. II. 790. — VIS. Fl. Dalm. II. 224.
var. *ilyricum* BORB. et BORNEM. in Öst. Bot. Zeitschr. XXXIX (1889), 335.
*Lesina: Insel Spalmadori, 3 m. s. m. — *Curzola: an Wegen. — *Sabioncello: an Wegen bei Kucište.
BORBÁS gibt sie bei St. Stefano, Spalato, auch Porto Ré und Zengg an.
- 1017 *Teucrium flavum* L. sp. pl. ed. II. 791. — VIS. Fl. Dalm. II. 224.
Lesina: kalk. steinige Stellen, 100 m. s. m.

- 1019 *Teucrium Polium* L. sp. pl. ed. II. 792, excl. var. *z.* BENTH. Labiat. 686.
var. *angustifolium* VIS. Fl. Dalm. II. 225.
Lesina: an Wegen, 30 m. s. m. Curzola: an steinigem Orten.
Nähert sich sehr der var. *gnaphalodes* BENTH. (*T. gnaph.* VAHL Simb. 1. 41.).
- 1020 *Teucrium supinum* L. sp. pl. ed. II. 791. — *T. montanum* L. var. *supinum* VIS. Fl. Dalm. II. 225.
Curzola: auf felsigen Plätzen

Convolvulaceae.

- 1029 *Convolvulus tenuissimus* SIBTH. et SM. Fl. graec. prodr. I. 134. — VIS. Fl. Dalm. II. 229.
Curzola: Gartenwege. — Sabioncello: am Meeresstrand bei Kucište.
- 1030 *Convolvulus Cantabrica* L. sp. pl. ed. II. 225. — VIS. Fl. Dalm. II. 229.
Lesina: auf Bergwiesen. — Insel Lukovci (Bacili).
- 1033 *Cuscuta Epithimum* L. Lyst. veg. ed. XIV. 167. — VIS. Fl. Dalm. II. 220.
Insel Lukovci (Bacili). Schmarotzt auf *Scorzonera villosa*.

Solanaceae.

- 1038 *Hyoscyamus albus* L. sp. pl. ed. 257. — *H. varians* VIS. in bot. Zeit. 1829, Ergb. 61, 1. Bd. 3. (nach VIS. Fl. Dalm. II. 234. t. 24.).
Lesina: an Wegen, 4 m. s. m. — Curzola: bei Blatta.
- 1042 *Solanum miniatum* BERNH. in WILLD. Enum. hort. berol. I. 236. — VIS. Fl. Dalm. II. 235.
var. *hyoscyamifolium* GUSS. Enum. Inar 228.
Lesina: zwischen Gräsern auf steinigem Boden, 10 m. s. m.
- 1043 *Physalis Alkekengi* L. sp. pl. ed. II. 262. VIS. Fl. Dalm. II. 235.
Lesina: Grablje bei Lesina. in Weingärten. 400 m.
- 1046 *Lycium europaeum* L. sp. pl. 192. — *L. mediterraneum* DUN. in DC. prodr. XIII. 523. — VIS. Fl. Dalm. II. 237.
Lesina: in Hecken.

Borraginaceae.

- 1047 *Heliotropium europaeum* L. sp. pl. ed. II. 187. — VIS. Fl. Dalm. II. 239.
Lesina: auf kalkigem Boden, 3 m. s. m. — Curzola: in Gärten.
- 1051 *Cynoglossum creticum* MILL. Gard. Diet. ed. VIII. nr. 3. — *C. pictum* AIT. Hort. Kew. I. 179. — VIS. Fl. Dalm. II. 240.
Lesina: an Wegen, 10 m. s. m.

- 1053 *Lappula echinata* GILIB. Fl. Lith. I. 25. — *Echinosperrum Lappula* LEHM. Asper. 121. — VIS. Fl. Dalm. II. 241.
Lesina: in Weingärten, 40 m. s. m.
- 1060 *Lithospermum arvense* L. sp. pl. ed. II. 190. VIS. Fl. Dalm. II. 245.
Lesina: an Bächen. 30 m. s. m.
- 1066 *Echium parviflorum* MOENCH Meth. pl. 423, excl. syn. L. — *E. calycinum* VIV. ANN. bot. I., pars. 2, 164 et Fl. ital. fragm. I, 2 (excl. syn. BOCC., BARREL. et CUP. — VIS. Fl. Dalm. II. 248.
Lesina: zwischen Gräsern, 15 m. s. m., und an steinigem, sonnigen Orten. — *Curzola: in einem aufgelassenen Garten und steinigem Heideplätzen.
- 1069 *Echium pustulatum* SIBTH et SM. Fl. graec. prodr. I. 125. — VIS. Fl. Dalm. II. 249.
Lesina: Santorin. 3 m. s. m.
- 1070 *Echium altissimum* JACQ. Fl. Austr. V. app. t. 16. — *Ech. italicum* L. sp. pl. ed. II. 201. — VIS. Fl. Dalm. II. 249.
Lesina: nahe dem Meeresstrand, 2 m. s. m.
Echium italicum soll wiederholt verzweigte Wickel in rispigenpyramidenförmigem Blütenstande besitzen, dürfte aber nach POSPICHAL Fl. Dalm. Künstenl. 523. von *E. altissimum* nicht spezifisch verschieden sein.
- 1076 *Anchusa italica* RETZ Obs. I. 12. — *A. paniculata* AIT. Hort. Kew. I. 117. — VIS. Fl. Dalm. II. 252.
var. *lucida* VITM. Summ. I. 387.
Lesina: an Wegen, 10 m. s. m.
Blätter breitlanzettlich. die unteren 1·5 dm lang und 4 cm. breit.
- 1078 *Lycopsis variegata* L. sp. pl. ed. II. 198. — *Anchusa variegata* LEHM. Monogr. Asper. 223. — VIS. Fl. Dalm. II. 253.
Lesina: an Wegen, sonnigen, kurzgrasigen Stellen, in Ölgarten. 20–50 m. — Curzola: um Blatta.
- 1081 *Myosotis hispida* SCHLDL in Mag. d. Naturf. Berlin, VIII. 230. — *M. filiformis* SCHLEICH. Cat. ed. II. 180. — VIS. Fl. Dalm. II. 254 (sub *M. arvensi* ROTH).
var. *intermedia* VIS. l. c.
Curzola: an Wegen.
POSPICHAL meint, der beste Name für diese Art wäre *M. filiformis*.
- 1082a *Myosotis sylvatica* (EHRH) HOFFM. Deutschl. Fl. I. Aufl. I. 61. non HOST. — VIS. Fl. Dalm. II. 254. — *M. scorpioides sylvatica* EHRH. Dec. 31.
var. *suaveolens* KIT. in WILLD. Enum. hort. Berol. I. 176. non RCHB.
Curzola: an Bächen.

- 1086 *Borrago officinalis* L. sp. pl. ed. II. 197. — Vis. Fl. Dalm. II. 256.

Curzola: in Gärten, bei Blatta.

Gentianaceae.

- 1087 *Centaurium pulchellum* DRUCE. *Erythraea pulchella* Sw. in Act. holm. 1783 (sub *Gentiana*). — *E. Centaurium* PERS. var. *ramosissima* Vis. Fl. Dalm. II. 257.

Lesina: kalkiger, dürerer Boden, 10 m. s. m.

- 1087 *Centaurium minus* GARS. — *Erythraea Centaurium* PERS. Syn. I. 283. — Vis. Fl. Dalm. II. 256.

Curzola: auf Wiesen. — Sabioncello: auf Wiesen bei Kucište.

- 1099 *Blackstonia perfoliata* (L.) HUDS. Fl. angl. 146. — *Chlora perfoliata* L. Syst. nat. ed. XII., II. 267. — Vis. Fl. Dalm. II. 261.

Lesina: an Wegen, 20 m. s. m. — Curzola: an Wegrändern. — Sabioncello: an Wegen bei Kucište.

Asclepiadaceae.

- 1102 *Cynanchum adriaticum* (BECK) FRITSCH in Exkursionsfl. Österr.; BECK in Ann. Nat. Hofmus. Wien XIII. 30. var. *fuscatum* Vis. Fl. Dalm. III. 2.

Insel Golišnik bei Lesina, 3 m. s. m. — Lesina: auf den umliegenden Hügeln. — Insel Lukovci (Bacili).

Rubiaceae.

- 1108 *Galium lucidum* ALL. Fl. pedem. I. 5. — *G. erectum* Vis. Fl. Dalm. III. 6, non HUDS. forma *corrudaefolium* VILL. Prosp. 20 = *f. tenuiflora* DC. Fl. fr. IV., 256, non ALL.

Lesina: kalkiger Boden, zwischen Gebüsch, 20 m. s. m.

- 1112 *Galium asperum* SCHREB. Spicil. Fl. Lips. 3. — *G. silvestre* POLL. Hist. Pl. Palat. 1, 151. — Vis. Fl. Dalm. III. 7 (sub *G. pusillo*).

*Curzola: auf waldigen Anhöhen.

VISIANI gibt diese Art nur bei Verlika an.

- 1116 *Galium Aparine* L. sp. pl. ed. II. 157. — *G. verum* WIMM. et. GR. Fl. Siles I. 119. — Vis. Fl. Dalm. III. 8. z. *typicum* POSP. Fl. d. Küstenl.

Lesina: unter Kiefern zwischen *Urtica*, 2 m. s. m. — Curzola: auf waldigen Hügeln.

- 1122 *Asperula arvensis* L. sp. pl. ed. II. 150. — Vis. Fl. Dalm. III. 10.

Lesina: an Wegen, 1 m. s. m.

- 1123 *Asperula aristata* L. FIL. pl. syst. veg. 120. — *A. Cynanchica* var. *longiflora* PARL. Fl. ital. VII. 86. et Auct. ital. alior. — Vis. Fl. Dalm. III. 11.

Curzola: an Wegen.

1126 *Crucianella latifolia* L. sp. pl. ed. II. 158. — Vis. Fl. Dalm. III. 12.

Lesina: an Wegen, 100 m. s. m. — *Curzola: an Wegen.

1127 *Sherardia arvensis* L. sp. pl. ed. II. 149. — Vis. Fl. Dalm. III. 13.

Lesina: unter Kiefern, auf kalk. Boden 10 m. s. m.

1131 *Vaillantia muralis* L. sp. pl. ed. II. 1490. — *Valantia aculeata* TEN. fl. nap. prodr. app. IV. 33. — Vis. Fl. Dalm. III. 14.

Lesina: in Ritzen von Felsen, 10 m. s. m. und zwischen Gräsern.

Caprifoliaceae.

1134 *Viburnum Tinus* L. sp. pl. ed. II. 383. — C. K. SCHNEIDER, III. Laubh. II. 652. — Vis. Fl. Dalm. III. 16.

*Curzola: in Wäldern.

Oleaceae.

1146 *Phillyrea media* L. sp. pl. bd. II. 10. — C. K. SCHNEIDER, III. Laubh. II. 788. — Vis. Fl. Dalm. III. 20.

Lesina: 6 m. s. m.

1147 *Olea europaea* L. sp. pl. ed. II. 11. — C. K. SCHNEIDER, III. Laubh. II. 794. — Vis. Fl. Dalm. III. 21.

Lesina: var. *sativa* DC. Prodr. VIII. 284. bei Cittavecchia, zwischen Steinen, 150 m. s. m.

VISIANI unterscheidet nach den Früchten 10 Varietäten.

Umbelliferae.

1156 *Eryngium campestre* L. sp. pl. ed. II. 337. — Vis. Fl. Dalm. III. 27.

Curzola: an Wegen. — Lesina: auf kalkigem Boden, 30 m. s. m.

1165 *Ptychotis ammoides* (Gou.) Koch Umbell. 124 et Syn. fl. germ. ed. II. 313. — *Seseli ammoides* GOUAN ill. pl. 16. — Vis. Fl. Dalm. III. 30.

Lesina: kalk. Boden, 30 m. s. m. u. in Macchien, 100 m. —

*Curzola: in Gärten.

1168 *Ammi maius* L. sp. pl. ed. II. 349. — Vis. Fl. Dalm. III. 32.

Lesina: in Gärten, 25 m. s. m. — *Curzola: in Gärten.

1171 *Bunium divaricatum* BERT. Fl. ital. III. 222, non CESAT. — *B. montanum* KOCH, Syn. ed. III. 245. — Vis. Fl. Dalm. III. 33.

Lesina: in Macchien, 200 m.; schotterige, buschige Stellen, Berghalden.

1180 *Bypleurum aristatum* BARTL. et WENDL. Beitr. 89. — *B. Odontites* SM. Engl. fl. 93, non L. nec DC. — Vis. Fl. Dalm. III. 36.

Curzola: an sterilen Stellen.

- 1185 *Bupleurum protractum* LINK. et HOFFGG. Fl. port. II. 387. —
VIS. Fl. Dalm. III. 37.
*Sabioncello: auf Wiesen bei Kucište.
- 1191a. *Foeniculum piperitum* SWEET Hort. Brit. ed. I. 187.
*Curzola: an Wegen.
- 1205 *Crithmum maritimum* L. sp. pl. ed. II. 354. — VIS. Fl.
Dalm. III. 46.
Lesina: in der Nähe des Meeresufers. — Sabioncello: bei
Kucište am Meeresstrand.
- 1212 *Opopanax Chironium* (L.) KOCH Umb. 96. — *Laserpitium*
Chironium L. sp. pl. ed. II. 358. — VIS. Fl. Dalm. III. 50.
*Curzola: an steinigten Stellen.
- 1214 *Peucedanum longifolium* W. K. pl. rar. Hung. 3, 279. —
VIS. Fl. Dalm. III. 51.
*Curzola: an buschigen Stellen.
- 1223 *Tordylium apulum* L. sp. pl. ed. II. 345, excl. syn. Col. —
VIS. stirp. dalm. 49 u. 56. — *Condylocarpus apulus*
HOFFM. umbell. 203 in VIS. Fl. Dalm. III. 55.
Lesina: an grasigen Stellen, 10 m. s. m. und auf kalk.
steinigem Boden, auf Wiesen, Hecken, Felsplätzen, überall
häufig. — Curzola: auf wiesigen Plätzen in einem auf-
gelassenen Garten; auch um Blatta.
- 1224 *Tordylium officinale* L. sp. pl. ed. II. 345. — *T. microsper-*
mum TEN. App. sem. hort. Neap. VIS. Fl. Dalm. III. 55.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m. — Curzola: an sterilen
Orten.
- 1228 *Daucus Carota* L. sp. pl. ed. II. 348. — VIS. Fl. Dalm. III. 57.
var. **glaber* ČELAK. Prodr. 582.
*Sabioncello: auf Weiden bei Kucište.
Die Pflanze ist in allen Teilen vollkommen kahl.
- 1229 *Daucus maximus* DESF. fl. atl. 1, 241, non TOMM. — VIS.
Fl. Dalm. III. 57.
Lesina: An Wegen, 40 m. s. m. — *Curzola: an Wegen.
Wird auf Lesina gebaut.
- 1231 *Daucus Gingidium* L. sp. pl. ed. II. 242. — *D. gummiifer*
LAM. Dict. I. 634.
var. *latilobus* VIS. Fl. Dalm. III. 58.
*Insel Lukovci (Bačili).
- 1234 *Orlaya platycarpa* (L.) KOCH umb. 79. — *Caucalis platy-*
carpos L. sp. pl. ed. II. 347. — VIS. Fl. Dalm. III. 59.
Lesina: auf bebautem Boden, 2 m. s. m.
- 1236 *Caucalis leptophylla* L. sp. pl. ed. II. 347. — *Torilis lept.*
RCHB. fl. Ic. XXI. 83, t. 169. — VIS. Fl. Dalm. III. 60.
Lesina: auf bebautem Boden, 100 m. s. m.
- 1239 *Torilis heterophylla* Guss. Prodr. fl. Sic. I. 326. — VIS. Fl.
Dalm. III. 61.
Curzola: an Wegrändern.

- 1240 *Torilis nodosa* (L.) GAERTN. De fruct. I. 82, t. 20, f. 6. — *Tordylium nodosum* L. sp. pl. ed. II. 346. — Vis. Fl. Dalm. III. 61.
Lesina: an Wegen, auf Äckern, Grasplätzen und in Hecken, häufig.
- 1241 *Scandix pecten Veneris* L. sp. pl. ed. II. 368. — Vis. Fl. Dalm. III. 63.
Lesina: auf kalkigem Boden, an Wegen und zwischen Gräsern, 150 m. s. m. — Curzola: auf wiesigen Plätzen in einem aufgelassenen Garten.
- 1242 *Scandix australis* L. sp. pl. ed. II. 369. — Vis. Fl. Dalm. III. 63.
*Lesina: auf trockenen Rasenplätzen, längst den Hecken und Mauern, häufig.
- 1250 *Chaerophyllum coloratum* L. mant. alt. 57. — *Myrrhis colorata* SPR. in SCHULT. Syst. veg. 6, 515. — Vis. Fl. Dalm. III. 65.
*Lesina: bei Cittavecchia.
- 1261 *Scaligera cretica* Vis. Fl. Dalm. III. 70. — *Bunium creticum* D'URV. En. pl. 311 et DC. Prodr. IV, 117.
*Insel Spalmadori: unter Gebüsch, 5 m. s. m. — Lesina: auf steinigem Boden, 30 m. s. m.
Von VISIANI nur für die Insel Lesina allein angegeben.

Ranunculaceae.

- 1271 *Clematis Flammula* L. sp. pl. ed. II. 766. — *Cl. caespitosa* SCOP. fl. carn. I. 389.
var. *vulgaris* Vis. Fl. Dalm. III. 76.
Lesina: in Gebüsch, 30 m. s. m.
- 1285 *Anemone hortensis* L. sp. pl. ed. II. 761. — Vis. Fl. Dalm. III. 80.
Lesina: an grasigen Stellen, 10 m. s. m. — Curzola: auf Anhöhen an feuchten Stellen.
VISIANI zieht *Anemone stellata* LAM. als Syn. zu *A. hortensis* L., während POSPICHAL *Anemone stellata* LAM. als Syn. zu *A. hortensis* KOCH, non L., stellt.
- *1302a *Ranunculus neapolitanus* TEN. Syll. 272.
*Lesina: an Wegen, 20 m. s. m. — *Curzola: in Wäldern.
- 1306 *Ranunculus muricatus* L. sp. pl. ed. II. 780. — Vis. Fl. Dalm. III. 86.
Lesina: an Wegen, feuchten Stellen. unter *Urtica*, 4 m. s. m., zwischen Gräsern, 10 m. — *Curzola: um Blatta und in Gärten.
- 1307 *Ranunculus chius* DC. Syst. I. 299. — *R. Schraderianus* FISCH. et MEY. Ind. Petrop. XII. 165. — Vis. Fl. Dalm. III. 86.
Lesina: an feuchten Orten, in Strassengräbern, längs den Felsmauern, 150 m. s. m., mit *Ranunculus muricatus*.

- 1311 *Nigella damascena* L. sp. pl. ed. II. 758. — Vis. Fl. Dalm. III. 88.
Lesina: auf kalk. steinigem Boden, 100 m. s. m. — Sabioncello: auf Wiesen be Kucište.
- 1313 *Delphinium paniculatum* Host Fl. Austr. II. 65. — *D. Consolida* L. sp. pl. ed. II. 748, var. *sparsiflora* Vis. Fl. Dalm. III. 89.
Curzola: auf Heiden.
- 1315 *Delphinium brevicorne* Vis. Fl. Dalm. III. 90.
Lesina: bei Cittavecchia, 150 m. s. m. selten.
Kommt nur auf Lesina vor.
- 1316 *Delphinium peregrinum* L. sp. pl. ed. 749. — Vis. Fl. Dalm. III. 90.
var. *pubescens* Vis. l. c.
Lesina: in Weingärten, 40 m. s. m.
- 1318 *Delphinium Staphysagria* L. sp. pl. ed. I. 351. — HUTH Monogr. d. Gatt. Delph. 481. — Vis. Fl. Dalm. III. 91.
Lesina: an Wegen, auf steinigem Boden, 25 m. s. m.

Polygalaceae.

- 1322 *Polygala nicaeensis* RISSO Fl. d. Nice 54. — *P. corsica* GREMLI Exc. Fl. III. 91, non SIEB. — Vis. Fl. Dalm. III. 93 (sub. *Pol. vulgaris*).
forma *rosea* GR. G. Fl. fr. I. 194 non DESF.
Lesina: zwischen Gebüsch, 3 m. s. m. — Curzola: auf Bergwiesen.
Die Pflauzen beider Standorte blühen rosa.

Resedaceae.

- 1325 *Reseda alba* L. sp. pl. ed. II. 645. — Vis. Fl. Dalm. III. 95.
Lesina: auf Äckern, Schutzplätzen und an Wegrändern häufig. 30 m. s. m.
Nach REICHENBACH'S Abbildungen Ic. fl. germ. fig. 4448—4449 sind die beiden äußern Lappen der Petalen entweder eingeschnitten oder ganzrandig.
- 1326 *Reseda Phyteuma* L. sp. pl. ed. II. 645. — Vis. Fl. Dalm. III. 95.
Lesina: an Wegrändern, 3 m. s. m.

Papaveraceae.

- 1331 *Fumaria capreolata* L. s. pl. ed. II. 985. — Vis. Fl. Dalm III. 97. — HAMMAR, Monogr. Fumar. 24. — HAUSSKN. in. «Flora», Band 56, 421.
Curzola: an Wegen.
- 1334 *Fumaria officinalis* L. sp. pl. ed. II. 984.
var. *floribunda* HAM. Monogr. Fumar. 10 = *F. floribunda* KOCH Syn. ed. 3, p. 29.

Lesina: auf Kalkboden zwischen Gräsern, 10 m. s. m.
 HAUSKNECHT bemerkt in «Flora», Band 56, p. 421, dass diese Varietät hauptsächlich dem Mediterrangebiet eigen ist. Er gibt sie von Zara (TOMMASINI) und Veglia (hb. RÖMER) an.

var. *tenuifolia* VIS. Fl. Dalm. III. 98 = *F. media* LOIS. not. 101.

*var. *acrocarpa* PETERM. Deutschl. Fl. 25 = *F. tenuifolia* FRIES Nov. 221, non Garcke = *F. Wirtgeni* KOCH Syn. ed. III. 29 nach HAUSKN. in «Flora», 420. — HAMMAR Monogr. 13.

Curzola: an Wegen. — Curzola: bei Blatta.

1338 *Papaver Rhoeas* L. sp. pl. ed. II. 726. — VIS. Fl. Dalm. III. 100.
 forma **Roubiaei* POSP. I. 566 (vix VIG. Diss. 39, t. 1, f. 1).

Lesina: steinigem Boden, 30 m. s. m. — Curzola: in Gärten bei Kucište.

Ein Form, kenntlich durch ihre abstehenden, langen, steifen Borsten.

1340. *Glaucium flavum* CR. STIRP. ed. II. 141. — *G. luteum* SCOP. fl. carn. ed. II. 1, 369. — VIS. Fl. Dalm. III. 100.

Lesina: nahe dem Meeresstrand.

Cruciferae.

1342 *Raphanus sativus* L. sp. pl. ed. II. 935. — VIS. Fl. Dalm. III. 103.

var. *Radicula* VIS. l. c.

Lesina: an Wegen, 50 m. s. m. — Curzola: bei Blatta.

1345 *Cakile maritima* SCOP. Fl. carn. ed. 2 II. 35. — *Bunias Cakile* L. sp. pl. ed. II. 936. — VIS. Fl. Dalm. III. 104.

var. *sinuatifolia* DC. (foliis dentato — sinuatis) = *C. Aegyptiaca* WILD. sp. 3, 417 in DC. Prodr. syst. nat. Regn. veg. I. 185.

Insel Spalmadori: am Meeresufer zwischen Steinen. — Curzola: am gleichen Orte.

1346 *Rapistrum rugosum* ALL. Fl. ped. I. 257. — VIS. Fl. Dalm. III. 104. — *Myagrum rugosum* L. sp. pl. ed. II. 893.

var. **scabrum* HOST Fl. austr. II. 220.

Lesina: auf sonnigen Rasenplätzen der Insel Golušnik, 40 m. s. m.

1348 *Bunias Erucago* L. sp. pl. ed. II. 935. — VIS. Fl. Dalm. III. 105.

Lesina: auf sterilem Boden, 100 m. s. m. — Curzola: an Wegen.

1352 *Clypeola Jonthlasi* L. sp. pl. 652. — VIS. Fl. Dalm. III. 107.
 var. **lasiocarpa* HAL. in Consp. Fl. gr. I. 116.

Lesina: an Wegen, 30 m. s. m.

- 1355 *Coronopus procumbens* GILIB. Fl. Lith. V. 52. — Vis. Fl. Dalm. III. 108 (sub *Cor. Ruellii* ALL. Fl. ped. 1, 256). *Senebiera Coronopus* POIR. Encycl. VII. 76.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
- 1356 *Aethionema saxatile* (L.) R. BR. in AIT. Hort. Kew. IV. 80. — *Thlaspi saxatile* L. sp. pl. ed. II. 901. — Vis. Fl. Dalm. III. 108.
Lesina: auf Kalkboden, zwischen Gräsern mit *Ononis reclinata*, 20 m. s. m.
var. *gracile* DC. syst. 2. 559 in DC. Prodr. I. 209. Vis. Fl. Dalm. III. 109.
Lesina: auf steinigem, kalkigem Boden, 15 m. s. m. — Curzola: in Wäldern.
- *1357a *Capsella grandiflora* (CHAUB. et BORY) BOISS. et HELDR. Fl. graec. exs. (1846). — *Thlaspi grandiflorum* CHAUB. et BORY Fl. Pelop. 41, t. 24.
*Curzola: um Blatta.
- *1357b *Capsella rubella* REUT. in Bull. soc. Hall. 18.
*Lesina: an Wegen, 30 m. s. m. — *Curzola: an Wegen.
var. **acaulis* POSP. Fl. d. Küstenl. I. 518.
*Lesina: auf steinigem Boden, 30 m. s. m.
- 1358 *Lepidium Draba* L. sp. pl. ed. I. 645. Vis. Fl. Dalm. III. 109.
Lesina: an grasigem Stellen, 3. m. s. m.
Scheint in Dalmatien nicht besonders verbreitet zu sein.
- 1359 *Lepidium graminifolium* L. sp. pl. ed. II. 900. — Vis. Fl. Dalm. III. 110.
Curzola: an Wegen.
- 1361 *Hutchinsia procumbens* L. DESV. Journ. bot. III. 168. — Vis. Fl. Dalm. III. 110. — *Lepidium procumbens* L. sp. pl. 643.
*Lesina: an Wegen, 30 m. s. m.
Nur auf dem Scoglio Levrera bei Cherso und auf der Insel Sansego.
- 1368 *Biscutella ciliata* DC. Diss. de *Biscut.* in Ann. du Mus. 18. 295. — *B. didyma* L. sp. pl. ed. II. 911, var. *ciliata* Vis. Fl. Dalm. III. 113.
Lesina: dürre, felsige Orte.
- 1372 *Thlaspi praecox* WULF. in JACQ. Coll. III. 124. — *Thl. montanum* L. sp. pl. ed. II. 902. *♀. praecox* Vis. Fl. Dalm. III. 114.
*Lesina: an Wegen, 30 m. s. m.
- 1374 *Alyssum sinuatum* L. sp. pl. ed. II. 909. — Vis. Fl. Dalm. III. 115.
Lesina: zwischen Gräsern, 15 m. s. m. und an sonnigen Orten, sehr verbreitet.
- 1380 *Alyssum campestre* L. Syst. ed. X. 1130. — Vis. Fl. Dalm. III. 117.
Lesina: an unkultivierten Stellen und an Wegen. VISIANIS *Alyss. latifolium* ist als Synonym zu *Alyss. campestre* zu

ziehen. Vergleiche darüber Magy. Bot. Lap. XIII. (1914) 218.

1882 *Alyssum alyssoides* L. Syst. ed. X. 1130. — Vis. Fl. Dalm. III. 118.

Lesina: an sonnigen Plätzen, dürrer, steinigen Orten. — Curzola: an Wegen.

1389 *Draba verna* L. sp. pl. ed. II. 896. — *Erophila vulgaris* DC. Syst. II. 356. — Vis. Fl. Dalm. III. 120.

var. **spathulata* LANG. in Syll. soc. Ratisb. I. 180.

Lesina: an Wegen m. s. m.

1405 *Arabis verna* R. BR. in ART. Hort. Kew. ed. 2, IV. 105. non DESF. — Vis. Fl. Dalm. III. 126. — *Hesperis verna* L. sp. pl. ed. II. 928.

Lesina: an Wegen, an feuchten Orten. gemein im Schatten der Feldmauern mit *Ranunculus muricatus*. — Curzola: an Wegen.

1408 *Arabis hirsuta* (L.) SCOP. Fl. carn. 2, 30, ♀. *sagittata* Vis. Fl. Dalm. III. 127. — *Turritis hirsuta* L. sp. pl. ed. II. 936.

Lesina: in Macchien, 100 m. s. m. — Insel Spalmadori, ♂ m. s. m. — *Curzola: in Wäldern.

1409 *Arabis muralis* BERT. pl. rar. dec. II. 37. — Vis. Fl. Dalm. III. Lesina: auf unbebautem Boden, 200 m. s. m.

1413 *Cardamine hirsuta* L. sp. pl. ed. II. 915. — Vis. Fl. Dalm. III. 129.

Lesina: an Wegen. 30 m. s. m.

Scheint eine sehr veränderliche Pflanze zu sein, besonders betreffs der Behaarung. Ob sie mit *C. multicaulis* HOPPE synonym ist, wie es VISIANI meint, bleibt dahingestellt.

1423 *Sisymbrium polyceratum* L. sp. pl. ed. II. 918. — Vis. Fl. Dalm. III. 132.

Lesina: an Wegrändern, 30 m. s. m. und auf Schuttplätzen um den Ort. — Insel Golišnik bei Lesina.

1424 *Sisymbrium officinale* SCOP. Fl. carn. 2, 26. — *Erysimum officinale* L. sp. pl. ed. II. 922. — Vis. Fl. Dalm. III. 132.

Lesina: auf steinigem Boden, 30 m. s. m. — *Curzola: an Wegrändern.

*1430a *Erysimum repandum* L. sp. pl. ed. II. 923.

Curzola: an Wegen.

1431 *Diplotaxis tenuifolia* DC. Syst. II. 632. — *Sisymbrium tenuifolium* L. Amoen. IV. 279. Vis. Fl. Dalm. III. 134.

Lesina: auf kalk. Boden, 10 m. s. m.

1435 *Brassica Rapa* L. sp. pl. ed. II. 931.

var. *rapifera* Vis. Fl. Dalm. III. 136; METZG. Cult. Kohllart. 52.

Curzola: bei Blatta gebaut.

1436 *Sinapis arvensis* L. sp. pl. ed. II. 933. — Vis. Fl. Dalm. III. 136 (sub. *Brassica Sinapis*).

Curzola: an Wegen. — Sabioncello: an Wegen bei Kucište
(forma *leiocarpa* NEILR.).

Cucurbitaceae.

- 1442 *Ecballium Elaterium* (L.) RICH. Dict. class. VI. 19. —
Momordica Elaterium L. sp. pl. ed. II. 1434. — VIS. Fl.
Dalm. III. 139.
Lesina: an Wegen, 15 m. s. m.

Cistaceae.

- 1458 *Helianthemum nummularium* (L.) DUN. in DC. Prodr. V. 280.
— *Cistus nummularius* L. sp. pl. ed. I. 527.
forma *discolor* (RCHB.) JANCHEN Cist. Öst.-Ung. (1909)
Sonderabdr. aus d. Mit. d. nat. Ver. a. d. Univ. Wien
(VII. Jahrg. 1909).
Hcl. vulgare z *discolor* RCHB. Fl. germ. exc. 714. VIS. Fl.
Dalm. III. 145. — C. K. SCHNEIDER, Ill. Laubh. II. 352.
Lesina: auf unbebautem Boden, 200 m. s. m.
- 1461 *Fumana thymifolia* (L.) VERL. Cat. rais. pl. vasc. Dauph. 43.
— *Cistus glutinosus* L. Mant. alt. 246.
forma *glutinosa* (L.) BURNAT Fl. d. Alp. Marit. I. 164. —
VIS. Fl. Dalm. III. 147. — JANCHEN, Cist. 103.
Lesina: auf steinigem Boden, 10 m. s. m. in Macchien. —
* Curzola: an Wegen, sonnigen, trockenen Grasplätzen.
- 1464 *Cistus salvifolius* L. sp. pl. ed. I. 524. — GROSSER, Cistaceae
20. — JANCHEN, Cist. 20. — VIS. Fl. Dalm. III. 148.
Lesina: unter Gebüsch. — Curzola: an Wald- und Weg-
rändern.
- 1465 *Cistus villosus* L. sp. pl. ed. II. 736. — VIS. Fl. Dalm. III.
148. — C. K. SCHNEIDER, Ill. Laubh. II. 348.
forma *villosus* (L.) JANCHEN 15.
Lesina: um den Ort, 50 m. s. m.
forma *corsicus* (LOIS.) GROSS. Cist. 15 = *C. corsicus* LOIS.
in Mem. soc. Linn. Paris VI. 416.
Curzola: in Wäldern und an Wegrändern.

Guttiferae.

- 1475 *Hypericum veronense* SCHRANK bei KOCH Syn. ed. 3, 115. —
H. perforatum L. v. *angustifolium* VIS. Fl. Dalm. III. 153.
Insel Spalmadori: sonnige Stellen, 5 m. s. m. — Curzola:
an Wegrändern.

Caryophyllaceae.

- 1489 *Tunica Saxifraga* Scop. Fl. carn. ed. 2. I. 300. — *Dianthus*
saxifragus L. sp. pl. ed. II. 413. — VIS. Fl. Dalm. III. 159.
Lesina: auf steinigem Boden, 25 m. s. m., an Wegen 100 m.
— Curzola: an Wegen.

- 1508 *Silene sedoides* POIR. Voyag. Barb. II. 164. — ROHRBACH, Monogr. d. Gatt. *SILENE* 164. — VIS. Fl. Dalm. III. 166.
*Insel Spalmadori: in Rissen der Steine am Meeresufer.
- 1512 *Silene inflata* SM. Fl. brit. II. 292. — VIS. Fl. Dalm. III. 168. — ROHRB., Mon. *Silene* 86.
var. *angustifolia* DC. Fl. fr. IV. 747.
Lesina: an Wegen.
var. *vulgaris* VIS. Fl. Dalm. III. 168. — ROHRB. Monogr. Sil. 84.
Curzola: in Wäldern.
- 1514 *Silene cretica* L. VIS. Fl. Dalm. III. 169. — ROHRB. Sil. 167.
Lesina: in *Dactylis*-Rasen eingemengt, 5 m. s. m.
- 1527 *Melandryum album* (MILL.) GARCKE Fl. v. Nord- und Mitteldeutschl. IV. Aufl., 55.
Lychnis alba MILL. Gard. Dict. n. 4. — VIS. Fl. Dalm. III. 173 (*M. pratense*).
Lesina: bei Cittavecchia, in Gebüsch zwischen Steinen, 50 m. s. m.
- 1542 *Spergularia salina* PRESL. Fl. čech. 95. — *Arenaria media* L. sp. pl. ed. II. 696. — VIS. Fl. Dalm. III. 179 (sub *Alsine marginata* RCHB.).
Lesina: an Wegen, in Ritzen der Steine, 2 m. s. m.
- *1543a *Arenaria leptoclados* GUSS. Syn. II. 824.
Lesina: an Wegen, 10 m. s. m.
Gehört als Var. zu *Ar. serpyllifolia* L (VIS. Fl. Dalm. III. 180).
- 1554 *Cerastium glomeratum* THUILL. Fl. par. 225. — VIS. Fl. Dalm. III. 183.
forma *typicum*.
Lesina: an sterilen Orten, 30 m. s. m. — Curzola: auf Wiesen.

Crassulaceae.

- *1565a *Crassula caespitosa* CAVAN. ic. t. 69. — *Cr. Magnolii*. DC. prodr. Fl. fr. Suppl. 522. — *Tillaea rubra* GOU. Hort. Monsp. 77.
*Lesina: bei Cittavecchia (Starigrad), zwischen Steinen, 2 m. s. m.
- 1566 *Sedum hispanicum* L. sp. pl. ed. II. 618. — VIS. Fl. Dalm. III. 188.
*Curzola: an Wegen.
- 1569 *Sedum acre* L. sp. pl. ed. II. 619. — VIS. Fl. Dalm. III. 188.
Lesina: zwischen Steinen, 30 m. s. m. — Curzola: an Wegen.
— Sabioncello: an Wegen bei Kucište.
- 1571a *Sedum ochroleucum* CHAIX in VILL. Hist. pl. Dauph. I. 325.
— *S. anopetalum* DC. Rapp. II. 80 var. *ochroleuca* CHAIX.
*Curzola: an Wegen. — *Sabioncello: am Meeresstrand bei Kucište.
Ist in VISIANI Fl. Dalm. nicht enthalten.

- 1574 *Cotyledon horizontalis* Guss. in sem. hort. Bocc. 1826. 4. pr. fl. sic. I. 517. — *Umbilicus hor.* DC. Prodr. III. 400. — Vis. Fl. Dalm. III. 190.
Lesina: an Wegen, 75 m. s. m. — *Curzola: bei Blatta.

Myrtaceae.

- 1601 *Myrtus italica* MILL. Dict. 184. — Vis. Fl. Dalm. III. 201.
Lesina: 50 m. s. m.

Malvaceae.

- 1609 *Malva silvestris* L. sp. pl. ed. II. 969. — Vis. Fl. Dalm. III. 205.
var. *ambigua* Guss. Prodr. fl. sic. II. 371.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
1611 *Lavatera arborea* L. sp. pl. ed. II. 972. — *Malva arb.* WEBB. et BERTH. phyt. canar. 1, 30. — Vis. Fl. Dalm. III. 206.
*Curzola: in Gärten.
1618 *Althaea hirsuta* L. sp. pl. ed. II. 965. — Vis. Fl. Dalm. III. 208.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
*1618a *Althaea cannabina* L. sp. pl. ed. II. 966. — Vis. Fl. Dalm. suppl. 135.
Lesina: unter Gebüsch, 100 m. s. m.

Geraniaceae.

- 1631 *Geranium rotundifolium* L. sp. pl. ed. II. 957. — Vis. Fl. Dalm. III. 212.
Lesina: auf steinigem Boden zwischen Gräsern, 15 m. s. m.
1632 *Geranium molle* L. sp. pl. ed. II. 955. — Vis. Fl. Dalm. III. 212. — ASCHERS. Syn. VII. 53.
var. *grandiflorum* LANGE in WILLK. et LANGE Prodr. Fl. hisp. III. 528.
*Curzola: wiesige Plätze in einem aufgelassenen Garten. —
*Curzola: um Blatta.
1633 *Geranium lucidum* L. sp. pl. ed. II. 955. — Vis. Fl. Dalm. III. 213. — ASCHERS. Syn. VII. 58.
*Curzola: in einem aufgelassenen Garten.
1534 *Geranium purpureum* VILL. Hist. pl. Dauph. III. 374, t. 40. — *G. Robertianum* var. *purpurea* GAUD. Fl. helv. IV. 417. — Vis. Fl. Dalm. III. 213 (sub. var. *G. Robert.*) — ASCHERS. Syn. VII. 63.
Lesina: unter Gräsern auf steinigem Boden, 10 m. — Curzola: um Blatta.
In der Behaarung des Kelches sehr verschieden (darunter forma *leiosepalum* HAUSSKN.), ebenso der Blätter und des Stengels.
1635 *Erodium cicutarium* L'HÉRIT. in AIT. Hort. Kew. ed. 1, I. 414. — *Geranium cicut.* L. sp. pl. ed. II. 951. — Vis. Fl. Dalm. III. 213. — ASCHERS. Syn. VII. 93.

var. *chaerophylla* RCHB. Fl. germ. vol. V—VI. t. 183, f. 4864.
Lesina: an steinigem Stellen, 4 m. s. m.

- 1637 *Erodium malacoides* WILLD. sp. pl. ed. III. 639. — *Geranium malac.* L. sp. pl. ed. II. 952. — VIS. Fl. Dalm. III. 214.
var. **althaeoides* ROUY in ROUY u. FOUCAUD. Fl. fr. IV. 118.
Lesina: zwischen Gräsern auf steinigem Boden, 10 m. s. m. — **Curzola*: an Wegen.
var. **malvaceum* A. u. GR. LYN. VII. 74.
Lesina: obiger Standort.

- *1637a *Erodium moschatum* (L.) L'HÉRIT. in AIT. hort. Kew. II. 414. — *Geranium mosch.* L. sp. pl. ed. I. 680. ASCHERS. Syn. VII. 100.
*Lesina: steinige Stellen, 4 m. s. m.
Fehlt in VISIANI'S Fl. Dalm.

Linaceae.

- 1638 *Linum usitatissimum* L. sp. pl. ed. II. 397. — VIS. Fl. Dalm. III. 215. — ASCHERS. Syn. VII. 219.
Curzola: bei Blatta.
- 1645 *Linum nodiflorum* L. sp. pl. ed. II. 401. — VIS. Fl. Dalm. III. 217. — ASCHERS. Syn. VII. 719.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
- 1647 *Linum tenuifolium* L. sp. pl. ed. II. 398. — VIS. Fl. Dalm. III. 217. — ASCHERS. Syn. VII. 191.
Curzola: an Wegen und in Wäldern.
- 1648 *Linum gallicum* L. sp. pl. ed. II. 401. — VIS. Fl. Dalm. III. 218.
**Curzola*: an Wegen.
Als Standorte sind nur angegeben: Cherso. Lesina, bei Ragusa.
- 1650 *Linum spicatum* PERS. Syn. I. 336. — *L. strictum* ? *spicata* VIS. Fl. Dalm. III. 218.
Lesina: auf dürrem, kalk. Boden, 10 m. s. m.

Oxalidaceae.

- 1651 *Oxalis corniculata* L. sp. pl. ed. II. 623. — VIS. Fl. Dalm. III. 219.
Lesina: bei Cittavecchia. an Wegen 50 m. s. m. — *Curzola*: an dünnen Plätzen.

Euphorbiaceae.

- 1659 *Euphorbia Chamaesyce* L. sp. pl. ed. II. 652. — VIS. Fl. Dalm. III. 223.
var. *canescens* G. G. Fl. d. France, III. 76, non L.
Lesina: in Gärten, 25 m. s. m. — **Curzola*: in Gärten.

- 1665 *Euphorbia spinosa* L. sp. pl. ed. 655. — Vis. Fl. Dalm. III. 225.
Lesina: auf unbebautem Boden, 200 m. s. m. — Insel Lukovci (Bačili).
- 1670 *Euphorbia paralias* L. sp. pl. ed. II. 657. — Vis. Fl. Dalm. III. 226.
Sabioncello: am Meeresstrand bei Kuciste.
- 1679 *Euphorbia peploides* GOUAN. Fl. monsp. 174. — *Euph. Peplus* var. *peploides* Vis. Fl. Dalm. III. 229.
Lesina: auf steinigem Kalkboden, 15 m. s. m.
- *1679a *Euphorbia nutans* LAGAS. Gen. et sp. 17. — *Euph. hypericifolia* JAN. El. 7.
*Curzola: nahe dem Meeresstrand.
Angeblich aus Nordamerika eingeschleppt.
- 1681 *Euphorbia exigua* L. sp. pl. ed. II. 654. — Vis. Fl. Dalm. III. 229.
var. *acuta* Vis. l. c.
Lesina: an feuchten Stellen zwischen Gräsern, 30 m.
- *1681a *Euphorbia pubescens* VAHL symb. II. 55. — *Euph. verrucosa* L. sp. pl. ed. I. 459.
*Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
- 1683 *Mercurialis annua* L. sp. pl. ed. II. 1465. — Vis. Fl. Dalm. III. 230.
Lesina: grasige Plätze, 10 m. s. m.
- 1686 *Andrachne telephoides* L. sp. pl. ed. II. 1439. — Vis. Fl. Dalm. III. 231.
Lesina: bei Cittavecchia, zwischen Steinen, 100 m.

Rhamnaceae.

- 1687 *Paliurus spina Christi* MILL. Gard. Diet. ed. VIII. 1768.
P. australis GÄRTN. de fr. et sem. I. 203. — Vis. Fl. Dalm. III. 232. — C. K. SCHNEIDER, Ill. Laubh. II. 260.
Lesina: bei Cittavecchia, zwischen Steinen 100 m.

Rutaceae.

- 1698 *Ruta chalepensis* L. mant. I. 69. — Vis. Fl. Dalm. III. 237.
var. *bracteosa* DC. Prodr. I. 710.
Lesina: in Macchien, auf steinigem Boden. 70 m.

Zygophyllaceae.

- 1700 *Tribulus terrestris* L. sp. pl. ed. II. 554. — Vis. Fl. Dalm. III. 238.
Lesina: auf kalkigem Boden.

Anacardiaceae.

- 1701 *Pistacia Terebinthus* L. sp. pl. ed. II. 1025. — Vis. Fl. Dalm. III. 239. — C. K. SCHNEIDER, Ill. Laubh. II. 146.
Lesina: in Macchien, 100 m. s. m.

Auf einer Pflanze fand sich eine Galle von hochroter Farbe, ca. 1·5 dm lang und 0·75 dm breit. Nach gütiger Mitteilung des Herrn DR. K. RECHINGER beherbergt diese Galle eine Blattlaus, *Pemphigus cornicularius* PASS. zu den *Apiiden* gehörig.

- 1702 *Pistacia Lentiscus* L. sp. pl. ed. II. 1025. — VIS. Fl. Dalm. III. 239. — C. K. SCHNEIDER, I. c. 146.
Lesina: auf kalk. Boden, 20 m. s. m.

Rosaceae.

- 1712 *Rosa sempervirens* L. sp. pl. ed. 704. — VIS. Fl. Dalm. III. 242. C. K. SCHNEIDER, Laubh. I. 544.
z. *typica* R. KELLER in A. et GR. Syn. VI. 37.
Lesina: an Wegen, 100 m.
- 1727 *Rubus ulmifolius* SCHOTT FIL. in «Isis» (1818) 821. — *R. fruticosus* L. β . *amoenus* VIS. Fl. Dalm. III. 248. — C. K. SCHNEIDER I. c. I. 516.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
Erinnert in vielen Merkmalen an *Rub. anatolicus* FOCKE.
- 1733 *Potentilla hirta* L. sp. pl. ed. I. 497.
var. **laeta* FOCKE in HALL., WOHLF., KOCH. Syn I. 809. — VIS. Fl. Dalm. III. 250.
Lesina: an Wegen, 100 m.
In Hinsicht der Bekleidung, der Zähnung der Blätter und Größe sehr variable Form.
- 1744 *Agrimonia Eupatoria* L. sp. pl. ed. II. 643. — VIS. Fl. Dalm. III. 253.
Lesina: bei Cittavecchia, zwischen Steinen, 50 m. s. m.
1748. *Sanguisorba minor* Scop. fl. carn. ed. II. 110. — *Poterium Sanguisorba* L. sp. pl. ed. II. 1411. — VIS. Fl. Dalm. III. 255.
var. *platylopha* A. n. GR. Syn. VI. 433.
Lesina: in Weingärten, 15 m. s. m. — Curzola: an Wegen.

Leguminosae.

- 1761 *Spartium junceum* L. sp. pl. ed. II. 995. — VIS. Fl. Dalm. III. 262. — C. K. SCHNEIDER, III. Laubh. II. 23.
Curzola: an Wegen. — Sabioncello: auf Weiden bei Kucište.
- 1772 *Argyrolobium Linnacanthum* WALP. in PIERI conc. fl. 104. — *Cytisus argenteus* L. sp. pl. ed. II. 1043. — VIS. Fl. Dalm. III. 267. — C. K. SCHNEIDER, III. Laubh. II. 24.
Lesina: in Macchien, 200 m. s. m.
- 1778 *Genista dalmatica* BARTL. et WENDL. Beitr. Bot. II. 74. (1825) VIS. Fl. Dalm. III. 269 (sub *Cyt. sylvestris* VIS. β . *pungente*). — CK. SCHNEIDER, III. Laubh. II. 29.
Lesina: in Pinus-Wäldern. unter Gebüsch. 200 m.

- 1794 *Ononis reclinata* L. sp. pl. ed. II. 1011. — Vis. Fl. Dalm. III. 275.
 β. *minor* MORIS Fl. Sard. I. 422.
 Lesina: zwischen Gräsern auf kalk. Boden. 5 m. s. m. —
 Curzola: auf trockenen Plätzen.
- 1795 *Ononis ornithopodioides* L. sp. pl. ed. I. 718. — Vis. Fl. Dalm. III. 276.
 *Insel Spaladori: 5 m. s. m.
 Kommt im Inselgebiet nach VISIANI nur auf Lesina vor.
- 1796 *Ononis breviflora* DC. Prodr. II. 160. — Vis. Fl. Dalm. III. 276. — *O. viscosa* S. et S. pr. II. 57.
 Lesina: zwischen Steinen nächst dem Meeresufer.
- 1797 *Ononis Natrix* L. sp. pl. ed. I. 717. — Vis. Fl. Dalm. III. 276.
 var. *major* BOISS. Voy. Esp. 149.
 Davon kommen 2 Formen vor:
 a) *O. Natrix pinguis* A. u. GR. Syn. VI. 2, 363.
 Fahne stark purpurn gestreift.
 b) *O. Natrix concolor* ROUY u. FOUC. Fl. fr. IV. 256.
 Fahne einfarbig, nicht gestreift.
 Lesina: zwischen Gräsern auf steinigen Stellen (beide Formen). — *Curzola: an Wegen (Form *b*).
- 1798 *Anthyllis illyrica* G. BECK. in ABN. Naturh. Hofmus. Wien XI. 165. — *Anth. Vuln.* var. *coccinea* VIS. Fl. Dalm. III. 276. — *Anth. Weldeniana* ROUY u. FOUC. Fl. fr. IV. 290, non RB.
 Lesina: auf steinigem Boden, 10 m. s. m. — Curzola: in Wäldern.
 Nicht zu verwechseln mit *Anth. coccinea* L., die nur auf der Insel Oeland vorkommt.
- 1802 *Anthyllis tetraphylla* L. sp. pl. ed. I. 719. — *Phisanthyllis tetraph.* BOISS. voy. Esp. 162. — Vis. Fl. Dalm. III. 278.
 Lesina: auf kalkigem Boden, 100 m. s. m.
- 1803 *Hymenocarpus circinatus* SAVI Fl. Pis. II. 205. — *Medicago circ.* L. sp. pl. ed. II. 1096. — Vis. Fl. Dalm. III. 279.
 Lesina: auf Kalkboden, 20 m. s. m. — *Curzola: an Wegen.
- 1807 *Medicago orbicularis* ALL. fl. pedem. I. 314. — Vis. Fl. Dalm. III. 280.
 var. *marginata* WILLD. in hort. berol. II. 802.
 Lesina: unter Gebüsch, 50 m. s. m.
- 1809 *Medicago hispida* GÄRTN. de fruct. et sem. II. 349. Vis. Fl. Dalm. III. 281 (sub *M. denticulata* W. var. *brevispina* BENTH.).
 var. *apiculata* WILLD. sp. pl. III. 1414. — URBAN, Gatt. *Medicago* 74.
 forma *oligocarpa* A. et GR. Syn. VI., II. 430.
 Lesina: trockene Grasplätze, wüste Orte.

- 1811 *Medicago disciformis* DC. cat. Monsp. 124. — Vis. Fl. Dalm. III. 281. — URBAN l. c. 79.
Lesina: Wegränder, trockene Grasplätze, gemein längs des Meeres mit *Medicago truncatula*.
- 1817 *Medicago minima* (L.) BARTAL. cat. piant. Sien. 61; L. sp. pl. 1099. — Vis. Fl. Dalm. III. 283.
var. **vulgaris* URB. l. c. 78.
forma *pubescens* WEBB. Hist. Canar. III. 2, 65.
Lesina: wüste Orte. — Curzola: auf Wiesen.
- 1819 *Medicago recta* WILLD. sp. III. 1415. — Vis. Fl. Dalm. III. 283. — URBAN, l. c. 78. — *Med. minima* var. *longisetata* DC. Prodr. II. 178.
Lesina: zwischen Gräsern auf steinigem Boden, 10 m. — Sabioncello: an Wegen bei Kucište.
- 1821 *Medicago truncatula* GÄRTN. fruct. et sem. II. 350. — Vis. Fl. Dalm. III. 284 URBAN l. c. 67.
Lesina: Wegränder, trockene Grasplätze, gemein längs des Meeres mit *Med. disciformis*.
- 1828 *Trigonella corniculata* L. syst. ed. 10, 1180. — Vis. Fl. Dalm. III. 286.
forma *major* ROUY u. FOUQ. Fl. fr. V. 48.
Lesina: an grasigen Stellen 10 m. s. m.
forma *genuina* A. u. GR. Syn. VI. 388.
Curzola: in Gärten.
- *1828a *Trigonella coerulea* (L.) SÉR. in DC. Pr. II. 181. — *Trifol. Melilotus coerulea* L. sp. pl. 764.
*Sabioncello: auf Weiden bei Kucište.
- 1836 *Melilotus sulcata* DESF. El. atl. II. 193. — Vis. Fl. Dalm. III. 288.
var. *simplex* O. SCHULZ in Engl. bot. Jahrb. XXIX. 723.
forma *angustifolium* WILLK. u. LGE in Prodr. Fl. Hisp. III. 375.
Lesina: steinige Orte, magere Rasenplätze. — *Curzola: an Wegrändern.
- 1837 *Trifolium angustifolium* L. sp. pl. ed. I. 769. Vis. Fl. Dalm. III. 289.
Lesina: steinige Stellen, 5 m. s. m.
- 1838 *Trifolium intermedium* GUSS. Cat. pl. Bocc. 65, 82. — Vis. Fl. Dalm. III. 289.
*Sabioncello: auf Wiesen bei Kucište.
In VISIANI nur auf Scoglio Ploçizza bei Lesina angegeben.
- 1840 *Trifolium stellatum* L. sp. pl. ed. I. 769. — Vis. Fl. Dalm. III. 290.
Curzola: auf Weideplätzen. — Curzola: um Blatta.
forma *xanthinoides* ROHL Magy. Bot. Lap. III. 322. (mit hellgelben Blüten.
VISIANI gibt die Blüten nur rosa blühend, BOISSIER in Flor. weiss u. rosa, ASCHERSON weiss bis hellrosa an.

- 1841 *Trifolium maritimum* HUDS. Fl. angl. I. 284. — Vis. Fl. Dalm. III. 290.
Lesina: an Wegen und auf unbebautem Boden, 2 m.
- 1850 *Trifolium scabrum* L. sp. pl. ed. I. 770. — Vis. Fl. Dalm. III. 292.
subs. *lucanicum* ROUY u. FOUC Fl. fr. V. 109.
Lesina: auf steinigem Boden 50 m. — Curzola: an trockenen Stellen. — Insel Spalmadori: 3 m. s. m.
Eine nach dem Feuchtigkeitsgrade in Gestalt und Behaarung sehr veränderliche Art.
- 1865 *Trifolium repens* L. sp. pl. ed. II. 1080. — Vis. Fl. Dalm. III. 297.
var. **Biaioletti* A. u. GR. Syn. VI. 501 = *Tr. Biaiol.* STEUD u. HOCHST. Fl. X. 72.
- 1869 *Trifolium subterraneum* L. sp. pl. ed. II. 1080. — Vis. Fl. Dalm. III.
var. **brachycladum* GIB. u. BELLI Mem. Accad. sc. Torino, ser. 2. XLIII. 15.
Lesina: auf steinigem Boden, ca. 100 m. s. m.
- 1870 *Trifolium fragiferum* L. sp. pl. ed. II. 1086. — Vis. Fl. Dalm. III. 298.
var. **pulchellum* LANGE Meddel. Nat. Fören. 2, Aart. VII. 169.
Curzola: auf Wiesen.
- 1872 *Trifolium tomentosum* L. sp. pl. ed. I. 771. — Vis. Fl. Dalm.
Lesina: in grosser Menge auf wüsten Plätzen, 15 m.
Manche Exemplare erinnern in der Blattgestaltung an var. *minus* GIB. u. BELLI, auch mit kriechenden Stengeln.
- 1876 *Trifolium strepens* CR. Stirp. Aust. ed. II. fasc. V. 411. — *Trif. agrarium* L. sp. pl. ed. I. 772. — *Trif. campestre* GMEL. Fl. Bad. III. 237. — Vis. Fl. Dalm. III. 300.
Lesina: auf steinigem Boden, 20 m. s. m. — Curzola: an Wegen. — Sabioncello: an Wegen bei Kucište.
VISIANI zieht *Trifol. procumbens* L. mit *Trif. campestre* SCHREB. und *Tr. agrarium* POLL. zusammen. Vergleiche hierzu CELAK. phytogr.
Beiträge in öst. bot. Zeitschr. 1872. p. 245.
- 1880 *Lotus edulis* L. sp. pl. ed. I. 774. Vis. Fl. Dalm. III. 302.
Lesina: zwischen Gräsern auf steinigem Boden, 10 m.
- 1881 *Lotus ornithopodioides* L. sp. pl. ed. I. 775. — Vis. Fl. Dalm. III. 302.
*Lesina: unter Gräsern auf steinigem Boden, 10 m.
Eine wenig veränderliche Pflanze, die, an Wegen und auf Mauern mehr niederliegend, zwischen Gras u. Kräutern eine aufrechte Haltung einnimmt.
VISIANI gibt sie im Inselgebiet nur für Ossero an. Es erliegen im Hofmuseum Wien Exemplare, die von BOTTERI auf Lesina gesammelt wurden.

- 1882 *Lotus corniculatus* L. sp. pl. ed. II. 1092. — Vis. Fl. Dalm. III. 302 (sub β . *ciliato*).
var. **pilosus* POSP. Fl. d. Küst. II. 390. forma *ciliata* KOCH
Syn. ed. III. 154, non TEX.
Curzola: in Wäldern.
- 1883 *Lotus cytisoides* L. sp. pl. ed. I. 776. — L. *creticus* β . *cytisoides* BOISS. Fl. or. II. 165. — Vis. Fl. Dalm. III. 303.
var. *Allionii* WILLK. u. LGE. Prodr. Fl. Hisp. 341. (Schiffchen meist violett.)
*Lesina: nahe dem Meeresstrand. zwischen Steinen.
VISIANI gibt diese Art nur für Curzola, Ragusa u. Trau an.
- 1887 *Dorycnium herbaceum* VILL. Hist. pl. Dauph. III. 417. — Vis. Fl. Dalm. III. 304 (sub *D. Crantzii* Vis.).
var. *illyricum* G. BECK Fl. Südbosn. Herzeg. VIII. 73, in Ann. naturh. Hofmus. Wien. XI. 176.
Lesina: unter Gebüsch, 10 m. s. m. — *Curzola: an Wegrändern. — *Sabioncello: am Brdo bei Kucište.
Ausser auf Lesina (VISIANI), wird diese Art nur noch bei Ragusa (ADAMOVIČ) angegeben.
- 1888 *Dorycnium hirsutum* (L.) SÉR. in DC. Prodr. II. 208. — Vis. Fl. Dalm. III. 304. — *Lotus hirsutus* L. sp. pl. 775.
var. *incanus* SÉR. (RIKLI in ENGL. Bot. Jahrb. XXXI., 333) nicht ganz typisch!
Lesina: auf Felsen, 10 m. s. m.
var. **hirtum* RIKLI l. c. 338.
Curzola: an Wegen.
- 1889 *Psoralea bituminosa* L. sp. pl. ed. I. 763. Vis. Fl. Dalm. III. 305.
var. *plumosa* Rehb. Ic. fl. germ. XXII. 91.
Lesina: unter Gebüsch, 30 m. s. m. — Curzola: an Wegrändern. Sabioncello: auf Wiesen bei Kucište.
- 1899 *Astragalus sesameus* L. sp. pl. ed. I. 759. — Vis. Fl. Dalm. III. 309.
Lesina: auf steinigem Boden, 40 m. s. m.
Eine in Dalmatien zerstreut vorkommende Pflanze, die von den Inseln nicht bekannt ist. Beim Trocknen verliert sie ihre blaue Färbung und wird gelblich, während viele andere lebhaft gefärbt bleiben.
- 1900 *Astragalus hamosus* L. sp. pl. ed. II. 1067. — Vis. Fl. Dalm. III. 309.
forma **buceras* ROUY und FOUCH. Fl. fr. V. 166.
Lesina: an Wegen, 100 m. s. m.
Eine in Dalmatien zerstreut vorkommende Art. Ändert sehr die Tracht nach dem Substrat.
- 1906 *Scorpiurus subvillosus* L. sp. pl. ed. II. 1050. Vis. Fl. Dalm. III. 311.
var. *genuinus* G. G. Fl. fr. I. 493.
forma **eriocarpus* GUSS. Fl. Sic. Syn. II. 307.

- *Lesina: auf Kalkboden. 15 m. s. m. — *Curzola: an schattigen, trockenen Stellen.
 var. *breviaculeatus BATT. u. TRAB. Fl. Alg. 285.
 forma *acutifolius BURN. Fl. Alp. Mar. II. 211.
- *Lesina: auf Kalkboden, 15 m. s. m.
 VISIANI gibt sie nur in Weingärten bei Ragusa an.
- 1907 *Coronilla Emerus* L. sp. pl. ed. I. 742. — VIS. Fl. Dalm. III. 312.
 var. *austriaca G. BECK. in RCHB. Ic. XXII. 139.
- *Curzola: in Wäldern.
- 1907a *Coronilla emeroides* BOISS. et SPRUN. Diag. ser. I. No. 2, 100.
 var. *typica G. BECK in RCHB. Ic. l. c. 139. non FIORI.
- *Lesina: unter *Pinus* 6 m. s. m.
- 1908 *Coronilla valentina* L. sp. pl. ed. II. 1047. excl. syn. BAUH. et CLUS. — *C. stipularis* LAM. Enc. bot. II. 120. — VIS. Fl. Dalm. III. 312.
 Lesina: auf steinigem Boden, 40 m. s. m.
- 1913 *Coronilla cretica* L. sp. pl. ed. II. 1048. — VIS. Fl. Dalm. III. 313.
 Lesina: auf steinigem Boden, 40 m. s. m.
- 1914 *Coronilla scorpioides* KOCH Syn. ed. III. 164. — *Ornithopus scorp.* L. sp. pl. ed. II. 1049. — VIS. Fl. Dalm. III. 313.
 Lesina: unter *Pinus maritima*. 15 m. s. m.
- 1915 *Securigera securidaca* (L.) DEG. et DÖRFL. Beitr. z. Fl. v. Alb. u. Maced. in Denkschr. d. Ak. d. Wiss., Band 64, 718. — *Coronilla securigera* L. sp. pl. 743. — VIS. Fl. Dalm. III. 314 (sub *Bonaveria*).
 Curzola: an Wegen und in Wäldern.
 Lesina: auf steinigem Boden, 40 m. s. m.
- 1917 *Hippocrepis comosa* L. sp. pl. ed. II. 1050. — VIS. Fl. Dalm. III. 314.
 var. *major ROUY in ROUY et FOUC. Fl. fr. V. 303.
- *Curzola: auf Anhöhen.
 Im Inselbereich nur für Brazza angegeben.
 var. *genuina ROUY l. c.
- *Curzola: an trockenen Stellen.
 Ebenso nur auf Brazza angegeben.
- 1918 *Hippocrepis unisiliquosa* L. sp. pl. ed. II. 1049. — *H. multisiliquosa* VIS. stirp. Dalm. sp. 37 (non L.)
 Lesina: zwischen Gräsern auf kalkigem Boden, 20 m.
 Die Varietät *biflora* VIS. ist irrtümlich aus Dalmatien angegeben. Nach BOISSIER kommt sie nur im Orient (nach HALÁCSY in Griechenland) vor.
- 1919 *Hippocrepis ciliata* WILLD. Mag. Ges. d. Naturfr. Berl. 1808, 173. — VIS. Fl. Dalm. III. 315.
 Lesina: auf kalkigem Boden, 10 m. s. m.
 Ist ausser Lesina nur noch bei Spalato für Dalmatien notiert.

- 1920 *Hedysarum capitatum* DESF. Fl. Atl. II. 177. — *H. spinosissimum* β *capitatum* BECK in RCHB. Ic. XXII., 144. — Vis. Fl. Dalm. III. 315.
Lesina: auf kalkigem Boden, 20 m. s. m.
- 1924 *Onobrychis caput galli* (L.) LAM. Fl. fr. III. 651. — *Hedysarum caput galli* L. sp. pl. ed. II. 1059. — Vis. Fl. Dalm. III. 316.
Lesina: auf Grasplätzen, in Ölgärten, am Wege gegen Milna, auf steinigem Boden, 40 m.
Sehr zerstreut in Dalmatien angegeben.
- 1929 *Vicia hybrida* L. sp. pl. ed. I. 737. — Vis. Fl. Dalm. III. 318
Lesina: zwischen Gräsern auf steinigem Boden, 10 m. —
*Curzola: an Wegen.
Unter den gesammelten Pflanzen entsprechen einige Stücke der var. *latifolia* A. u. GR. Syn. VI. 2. 980.
- 1934 *Vicia sativa* L. sp. pl. ed. II. 1037. — Vis. Fl. Dalm. III. 319.
var. **amphicarpa* COSS. et KRAL. Bull. Soc. Bot. France IV. 140.
forma **pseudosativa* A. u. GR. Syn. VI. 2, 975.
Lesina: auf steinigem Boden, 100 m. s. m.
var. *Cosentini* ARCANG. Comp. Fl. It. ed. I. 201.
Lesina: ebendort.
- 1934 *Vicia angustifolia* L. Amoen. Acad. IV. 105. — Vis. Fl. Dalm. III. 319.
var. **Bobartii* KOCH Syn. ed. I. 197.
forma **collina* HEUFF. Abh. ZBG. Wien, VIII. 96.
Lesina: zwischen Gräsern auf kalk. Boden, 15 m. s. m.
- 1935 *Vicia cordata* WULF. nach HOPPE in STURM Fl. Deutschl., Heft 32. — Vis. Fl. Dalm. III. 319.
Lesina: auf Wiesen und Äckern.
forma *heterophylla* ROUY in ROUY et FOUC. Fl. fr. V. 211.
Lesina: an grasigen Stellen, 10 m. s. m.
- 1937 *Vicia peregrina* L. sp. pl. ed. II. 1038. — Vis. Fl. Dalm. III. 320.
var. *leptophylla* HAL. Consp. Fl. graec. I. 481.
Lesina: auf steinigem Boden, 40 m. s. m.
- 1950 *Vicia dalmatica* KERN. Fl. exs. Austr. Hung. Nr. 1209. —
V. tenuifolia var. *laxiflora* GRIS. Spic. Fl. Rum. Bith. I. 82. — Vis. Fl. Dalm. III. 323.
Lesina: auf kalk. Boden, 10 m. s. m.
- 1953 *Vicia onobrychioides* L. sp. pl. ed. II. 1036. — Vis. Fl. Dalm. III. 324.
*Curzola: an Wegen.
In Dalmatien eine ziemlich seltene Pflanze. VISIANI gibt sie nur zwischen dem Dorfe Boccagnazzo und dem gleichnamigen See an.

- 1954 *Vicia atropurpurea* DESF. Fl. Atl. II. 164. — *Vicia lanata* VIS. Fl. Dalm. III. 324.
 *Insel Lukovei (Bacili) bei Lesina.
 Nach G. v. BECK als spontan zu betrachten, welche Ansicht auch schon VISIANI ausgesprochen hat.
 In der Tracht ist vorliegende Pflanze sehr der *Vicia villosa* ähnlich.
- 1956 *Lens nigricans* GODR. Fl. Lorr. I. 173. — *Lathyrus nigricans* PETERM. in VIS. Fl. Dalm. III. 325.
 Lesina: auf steinigem Boden, 100 m. s. m.
 In Dalmatien sehr zerstreut kommt sie im Inselgebiet ausser Lesina nach VISIANI nur noch auf dem M. Ossero vor.
- 1955 *Lathyrus Aphaca* L. sp. pl. ed. II. 1029. — VIS. Fl. Dalm. III. 325.
 forma **laeta* POSP. Fl. d. Küst. II. 431.
 Curzola: an Wegrändern.
- 1962 *Lathyrus Cicera* L. sp. pl. ed. II. 1030. — *L. dubius* TEN. En. sem. h. neap. 1825, 1. — VIS. Fl. Dalm. III. 327.
 Lesina: an grasigen Stellen, 100 m. s. m. Der var. *erythrinus* A. u. GR. VI. 2. 1007. nahe stehend.
 Lesina: ebendort.
 Häufig findet man Exemplare mit geteilten Wickelranken, wie es ASCHERSON, Syn. VI. 2, 1007 andeutet.
- 1963 *Lathyrus setifolius* L. sp. pl. ed. II. 1031. — VIS. Fl. Dalm. 327.
 Lesina: auf steinigem Boden, 40 m. s. m.
 Im Inselgebiet ziemlich selten.
- 1973 *Lathyrus saxatilis* VENT. Jard. Cels. 94. I. 94. (sub *Orobo*) VIS. — *L. aristatus* VIS. app. sem. hert. patav. 1826, t. 47. — VIS. Fl. Dalm. III. 330.
 Lesina: an sonnigen Grasplätzen.
 Vorliegende Pflanze erinnert lebhaft an eine *Vicia* und wird von manchen Botanikern ob der fehlenden Wickelranken zu *Orobus* gezogen.
 ASCHERSON meint, dass der unbeachtete und von Lesina beschriebene *Lath. microphyllus* SCHEELE sicher hiehergehört, da seine Beschreibung in allen Teilen auf obige Art passt. Dieser Pflanze müsste noch weitere Beachtung geschenkt werden.

Literatur,

welche bei Abfassung dieser Schrift benützt wurde:

- ASCHERSON u. GRÄBNER, Synopsis der Mitteleur. Flora, Leipzig.
 BACKER, J. G., Monographie v. *Ornithogalum* in «Trans. of the Linnaean Society», Vol. XIII. (1873).
 BECK, DR. G. v., Monographie der Gatt. *Orobanchae*, 1890.
 « « Monographie der europ. *Inula*-Arten, 1881.
 « « Annalen des naturhist. Hofmuseums von Wien, VIII. Teil, 1896.
 BENTHAM, G., *Labialiarum* Genera et Species, London, 1832—1836.
 BUCHENAU, F., Monographia *Iuncacearum* in «Engler's bot. Jahrbuch», XII, 1890

- CAMUS, E. G., Monographie des *Orchidées* de l'Europe etc., Paris, 1908.
 CHAVANNE E., Monographie des *Antirrhinées*, Paris, 1883.
 DE CANDOLLE, A., Monographie d. *Crucifères*, Prodr.
 DÖRFLEK, J., Schedae ad Herb. normale No 4484.
 FRITSCH, DR. K., Exkursionsflora für Österreich, II. Aufl. Wien, 1909.
 HACKEL, E., Monogr. *Festucarum* Europ., Kassel, 1882.
 HAMMAR, OLAF, Monogr. Generis *Fumariarum*, 1857, Upsaliae.
 HANDEL—MAZZETTI DR., Monogr *Taraxac.*, 1907, Leipzig—Wien.
 HAUSSKNECHT, C., Beitrag zur Kenntn. der Arten *Fumaria* in «Flora», Band 56 (1873) 421.
 HAYEK, DR. AUG. V., *Centaurea*-Arten Österr.-Ungarns, Akad. d. Wiss. 1901, Band 72.
 HOFFMANN, O., Compositen in «ENGLER und PRANTL, natürl. Pflanzenfamilien», 1894, Leipzig.
 HOST, DR. N. TH., Icones *Graminum* Austriacorum Vindob. 1801—1809.
 HUTH, DR. E., Monogr. der Gatt. *Delphinium*, 1895, Leipzig.
 JANCHEN, DR. E., *Cistaceen* Österr.-Ungarns, Wien, 1909.
 KERNER, A., Vegetationsverhältnisse Ungarns in Öst. Botan. Zeitschr. (1878) Band 28.
 LAMARCK ET DE CANDOLLE, Flore Française, Paris, 1805, III. edit.
 LUERSEN, DR. CHR., Die Farnpflanzen, Leipzig, 1889.
 MEYER, C. A., Versuch einer Monographie der Gatt. *Ephedra*, 1846, St. Petersburg.
 MAW, G., Monogr. of the Gen. *Crocus*, 1886, London.
 MILLER, PH., The Gardener's Dictionary, London, 1759.
 POSPICAL, E., Flora des oest. Küstenlandes, 1897, Leipzig—Wien.
 REICHENBACH, Icones Fl. Germ. et Helvet.
 ROHRBAH, DR. P., Monogr. der. Gatt. *Silene*, 1868, Leipzig.
 SCHNEIDER, C. K., III. Handbuch der Laubholzkunde, Jena, 1912.
 STAFF, DR. O., Die Arten der Gatt. *Ephedra*, in Akad. d. Wiss. Wien, Band 56, (1889).
 URBAN, J., Prodrum einer Monogr. d. Gatt. *Medicago* in Abh. d. Bot. Ver. Brandenburg, Band 15, Berlin, 1873.
 VILLARS, D., Histoire des plantes du Dauphiné, Grenoble 1786—89.
 VISIANI, R., Flora Dalmatica, Lipsiae, 1842—1852, Supplement 1872—77.
 ZAHN, MURR u. POELL, *Hieracia* in REICH. Fl. Germ. et Helv. 1904—6.
 Zum Schlusse fühle ich mich angenehm verpflichtet, Herrn DR. RITT. v. KEISSLER, Adjunkt am k. k. Hofmuseum, Wien, für die vielen literarischen Behelfe meinen besten Dank auszusprechen.

Drei neue *Astragalus*-Arten aus der orientalischen Flora.

Három új *Astragalus*-faj a keleti flórából.

VOD: {
 Irta: { J. Bornmüller (Weimar).

1. *Astragalus pseudocylindraceus* BORNM. (spec. nov.)

Sectio XVIII. *Euhypoglottis* BGE. BOISS. Fl. Or. II. 208. et 248—253.

Perennis, adpressissime setosus (pilis basifixis), subsericeo-vel opaco-virens, e caudicibus subterraneis tenuibus adscendentibus subacaulis; *scapis* (cum spica) c. 20 cm. longis folia subduplo superantibus; *stipulis* connatis oblongo-lanceolatis obtusiusculis vel acutis margine albo-nigro-ciliatis; *foliis* adpresse pilosis 10—12 cm. longis; *foliolis* 12—16-jugis oblongo-ellipticis,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Keller Louis

Artikel/Article: [Beitrag zur Inselflora Dalmatiens. 2-51](#)