

1898-ban, a mikor a zanótbokrok kétszeri virágzásáról értekezését megírta, újból foglalkozott a békásmegyeri *C. millennii*vel és fenntartotta első értelmezését.

A *C. millennii* vegyülektermézetére vonatkozólag irodalmi adat nincsen. A látott példány pedig különösen az erősen borzas, gyapjas csészéi miatt nem is lehet *austriacus* × *ratisbonensis*, hanem amennyiben vegyülékről lehet szó, úgy a *ratisbonensis* × *leucotrichus* kombinációnak felelne meg leginkább és a *C. Vadasi*-vel össze nem téveszthető. Utóbbinak t. i. egészen rövid, odasimuló szörözettel borított csészéje van.

men ist. Das ist umso mehr anzunehmen, als er seinen *C. millennii* 2-mal mit *C. elongatus* vergleicht, seine Publikationen nirgends korrigiert, trotzdem er sein *C. millennii* — Material bei der Verfassung seiner zitierten Abhandlung über 2-mal blühende Geisskleearten im Jahre 1898 einer Revision unterwarf musste.

Abgesehen von alldem ist zu bemerken, dass *C. millennii* — über dessen Bastardnatur keine literarische Publikationen vorliegen — keinesfalls ein Bastard von *C. austriacus* mit *ratisbonensis* sein kann, u. zw. hauptsächlich darum nicht, weil seine Kelche mit langen abstehenden Haaren besetzt sind, welche *C. millennii* weder von *C. austriacus*, noch von dem beinahe kahlen *C. ratisbonensis* erhalten konnte. *C. millennii* scheint — wenn er überhaupt ein Bastard ist — vielmehr einer Kombination *C. ratisbonensis* × *C. leucotrichus* zu entsprechen und kann mit *C. Vadasi*, dessen Kelche mit sehr kurzen, anliegenden Haaren bedeckt sind, nicht verwechselt werden.

Megjegyzések néhány keleti növényfajról.
Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten.

Irta: { Dr. Degen Árpád.
Von: {

LXXVII. *Achillea Prodani*

(*coarctata* × *collina*) nov. hybr.

Planta 4—5 Dm alta. *caulibus* simplicibus vel hinc-indē ramosis, striatis, pilis albī longī, *crispulis* sat dense obtectis, tamen virescentibus; *foliis* ambitu late linearibus, utrinque sat dense pilis longī albī obsitis, tamen virescentibus, bipinnati-

sectis, rhachide angusta, denticulata; *segmentis* primariis ambitu linearibus. 4-7 Mm longis, basi in rhachidem decurrentibus, secundariis (ultimis) lineari-lanceolatis, obtusis, cca 1 Mm longis, $\frac{1}{2}$ Mm latis, apice minute mucronulatis; foliis superioribus sensim diminutis minusque sectis; *corymbus* densus, sat compactus, *capitula* parva, cca 3 Mm alta, *involuci squamis* anguste ovato-lanceolatis, hyalinis, medio costa viridi percursis, dorso villosis, ventre glabris; *corollis* pallide luteis, ligulis radiantibus sat parvis, leviter tricrenatis.

Hab. in Romaniae distr. Dobrogea. In monte «Suluc» prope Mačin inter parentes cl. 5. Jul. 1911 detexit cl. JUL. PRODAN: cui dicata. Ab *A. coarctata* Pois. differt indumento breviore et parciore; foliorum segmentis primariis ambitu multo angustioribus magisque distantibus, secundariis paucioribus, angustioribus, foliorum rhachide tenuiori, capitulis duplo fere minoribus, corymbo laxiore. Ab *A. collina* BECKER differt indumento, foliorum sectione, corymbo magis contracto, inflorescentiae ramis crassioribus, capitulis majoribus, imprimis autem florum colore.

A simili *A. Degenii* (*coarctata* \times *crithmifolia*) SEYM. (Magy. Bot. Lap. VIII. (1909): 240) differt caule, praesertim autem capitulis densius villosis, foliis ambitu angustioribus, paulo tenuius sectis, rhachide pluridentata multo angustiore, segmentis primariis magis approximatis, secundariis paulo brevioribus.

Budapestini, Idibus Junii 1915.

Ujabb adatok Fereg-vármegye flórájához.

Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora des Bereger Komitates.

III. Közlemény (Mitteilung).

Irta: Margittai Antal (Stubnyafürdő).
Von: {

Az 1913. és 1914. évek nagy szűnidejének egy részét Beregen töltöttem s amennyire a kedvezőtlen körülmények megengedték, a megye egyes részeibe néhány botanikai kirándulást végeztem. Eme kirándulásaim eredményeként a következő új adatokkal bővíthetem a már eddig e lapban közzétett adataimat.

Calamagrostis Epigeios (L.) ROTH. A Nagyhegyen Munkács mellett; Ujdávidháza környékén.

Rumex conglomeratus MURR. Rákos környékén.

Polycnemum Heuffelii LÁNG. Tarlókon Orosztelek körül.

Kochia scoparia (L.) SCHRAD. Elvadulva az utezán Iványiban.

Melandrium noctiflorum (L.) FR. Újdávidházán.

Ranunculus sardous Cr. var. *mediterraneus* GRISEB. Orosztelek környékén.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Degen Árpád von

Artikel/Article: [Megjegyzések néhány keleti növényfajról. Bemerkungen
über einige orientalische Pflanzenarten. 80-81](#)