

# MAGYAR BOTANIKAI LAPOK.

## (UNGARISCHE BOTANISCHE BLÄTTER.)

Kiadja és szerkeszti: — Herausgeber u. Redakteur: Főmunkatársak: — Hauptmitarbeiter:  
Dr. DEGEN ÁRPÁD. Dr. GYÖRFFY ISTVÁN — Dr. LENGYEL GÉZA.

Bizományban: — In Commission:  
Németországban: — Für Deutschland: Bei Max Weg-nél Leipzig, Königsstrasse Nr. 3.

XIX. kötet 1920. évfolyam. BUDAPEST. №. 1—12. sz.

Lunaria Telekiana Jav. n. spec.

Irta: | S. Javorka (Budapest).  
Von: |

Multiennis, radice saepe crassa, ramosa, *ramis* *radicis* saepe *napuligeris*. Caulis ca. 5 dm. altus, sicut tota planta parum glaucescens, fere a basi ramosus, cum ramis setis plusminus reflexis sat deuse obtectus. Folia alternantia, *inferiora* iam emarcida, media longe petiolata, e basi fere *rotundata* late ovata, acuta vel acuminata, *etiam superiora* (et bracteantia) *sat longe petiolata* (petiolo 0·5—2 cm. longo), e basi fere rotundata in petiolum abrupte angustata, ovata vel late ovata, acuta, simpliciter late dentato-crenata vel superiora fere integra, omnia pilis simplicibus rigidis adpressis supra et subtus obtecta. Inflorescentia sat elongata, pluriflora, pedunculis ca. 1 cm. longis, pilis adpressis obtectis. Flores purpureo-violacei, calycis pallide purpurei, sepala lateralia (in floribus paucis supremis postremum florentibus) cum sacco 7—8 mm. longa, saccata, *saccis* 2·5 mm. longis, *calcariiformibus*, circa (— an semper? —) *dimidium* *totius* *sepali* *aequantibus*. Petala ca. 1·2 cm. longa, e lamina obovata in unguem longum attenuata. Germen subsessile, stylo longo bilobo terminatum. Silicula plana, 3—5 cm. longa, *fere sessilis*, *carpophoro* vix 1 mm. longo, elliptico-obovata, elliptica vel late oblonga, basi angustata, acuta, apice acuta vel fere rotundata, *valvis* *etiam maturis* *margine* *dense* *breviter* *ciliolatis*, ciliis rigidis arrectis, setiformibus, vix 0·5 mm. longis, semina in loculo 2—4 biseriata vel uniseriata, compressa alata.

Habitat in montibus Albaniae borealis (in parte nunc ad Jugoslaviam pertinente) versus opp. Djakova extensis, in glareosis calc., in praeruptis orientalibus alpis Škelsen supra rivum Tropoja ad pag. Tropoja, alt. ca. 1200 m., ubi specimena duo fructifera die 5. Sept. 1918. legi.

Proxima *Lunariae annuae* L. ac praecipue *L. pachy-*

*rrhizae* Borb. (conf. Borb. in Term. Fuz. XVIII. (1895.) p. 87—96) = rectius *L. Eschfaelleri* Wiesb., a qua posteriore carpophoro fere nullo, 1 mm.-o plerumque breviore, valvis siliquae margine ciliatulis, sepalis lateralibus longe et anguste saccatis, foliis etiam superioribus longiuscule petiolatis, basi non cordatis, sed rotundatis vel subintegris, etiam mediis basi rotundatis, caule dense setoso differt.

Species haec *Lunariae* ob carpophorum ut videtur constanter fere deficiente valde memorabilis est et hac nota in sistente Cruciferarum cl. Hayekii in Beih. Bot. Centralblatt XXVII. 1. (1911) ad genus *Seleniae*, *Ricotiae*, *Citharolemae* et *Farsetiae* accedit, sed notis caeteris et habitu certe ad Lunariam pertinet.

In honorem comitis, doctoris Pauli Teleki de Szék, doctissimi ac indefessi viri rei geographicae peritissimi dicavi, qui itinera studiendi causa in Albania peracta in Academia scientiarum Hungarica curavit.

## Pteridologai közlemények. Pteridologische Mitteilungen.

Irta: | Dr. Kümmerle J. B., (Budapest).  
Von: |

Fenti címen közreadom sorozatos cikkekben azokat az érdekes lelőhelyeket, újdonságokat, kritikai megjegyzéseket és nomenklaturai eredményeket, melyekhez az edényes virágítan növényeknek és irodalmuknak tanulmányozása réyén jutottam.

Unter diesem Titel beabsichtige ich in einer fortlaufenden Reihe interessante Fundorte, Novitäten, kritische Bemerkungen und nomenclatorische Erörterungen zu veröffentlichen, die sich im Laufe meiner Studien an Pteridophyten und in der einschlägigen Literatur ergeben haben.

### 1. Egy új európai harasztgénusz.\*) Eine neue europäische Farngattung.

(Egy képpel. — Mit einer Abbildung).

Birópterus Küm m. nov. gen.

*Filix* parvula caespitosa foliis difformibus, sterilibus numerosioribus dense palmatifidis vel pinnatifidis, fertilibus

\* ) Előadta a szerző a Kir. Magyar Természettudományi Társulat növénytani szakosztályának 1922. évi február hónapján tartott ülésén.

Vorgetragen in der am 8. Februar 1922 abgehaltenen Sitzung der botanischen Sektion der Königl. Ungarischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Javorka Sandor

Artikel/Article: [Lunaria Telekiana Jáv. n. sp., 1-2](#)