

A 48-ik közleményben a szerző felsorolja azokat a gombákat, amelyeket Degen Árpád különböző helyeken gyűjtött. A Velebit-hegység gombái itt nem szerepelnek, mert azok másutt fognak megjelenni.

A 49-ik közleményben a szerző kimutatja, hogy a „*Phyllosticta sabalicola* Szabó” nem más, mint *Anthostomella sphaerotheca* Earle, amelyet azonban a *Phaeochora* v. H. génuszba kell áttenni.

Az 50-ik közlemény egy új génusznak, a *Plectophomella*-nak leírását tartalmazza, amelybe a fagyöngy levelének egy gombája tartozik, amely valószínűleg azonos a *Phyllosticta visci* Sacc.-al.

Az 51-ik közlemény a *Linum austriacum* kórójának egyik új gombájának leírását foglalja magában.

Az 52-ik közlemény a Hazslinszky-féle *Phoma harmalae*-nak leírását adja. A szerző ezt a gombát a *Sclerophomella* génuszba helyezi.

Az 53-ik közleményben a Hazslinszky-féle *Phoma Scopulinae*-t a *Phomopsis dulcamarae*-val azonosítja.

Az 54-ik közlemény a Hazslinszky-féle *Phoma Hibisci*-t a *Phomopsis malvacearum*-mal azonosítja. A szerző leírja e gomba túalakú konidiumait, amelyeket eddig nem ismertek.

Az ábrák a szövegben leírt új és kritikus gombákat ábrázolják.

Újabb adatok Debreczen növényzetének ismeretéhez.

Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora von Debreczen.

Irta : } Rapaics Raymund.
Von : }

1922. év nyarán Wagner János, egy évvel előbb pedig Jávoroka Sándor botanizáltak a debreczeni homokterületen, minek eredményeként jelentékeny mértékben gyarapodtak e terület flórájára vonatkozó ismereteink. Adataik közzétételével fentirottat bízták meg, s ez alkalomból néhány, eddig még napvilágot nem látott adatomat én is közzé teszem.

Equisetum limosum L. a halápi lápban. (Jávoroka).

E. hemale L. f. *Moorei* Newman sivar homokbuckán Halápon (Jávoroka).

Quercus Robur L. f. *pilosa* Schur erdőben Halápon (Jávoroka).

Polygonum Kitaibelianum Sadl. száraz homokmezőn (Wagner).

Euphorbia exigua L. tarlóban Halápon (Wagner).

E. villosa W. K. f. *glabra* Wiesb. a halápi lápban (Jávoroka).

Amarantus albus L. vasuti töltésen Nagycserén (Wagner).

Melandryum noctiflorum L. a Nagyerdőben (Wagner).

Geranium divaricatum Ehrh. erdőszélen Pallagon.

Sium latifolium L. a halápi lápban (Jávoroka).

Cynoglossum hungaricum Simk. homokmezőn Halápon (Jávorka).

Solanum alatum Mnch. Pallagon kerítés mellett (Wagner).

Digitalis ambigua Murr. erdőszélen Halápon (Jávorka).

Melampyrum silesiacum Ronniger var. *debreceniensis* Soó differt a typo foliis caulinis anguste-lanceolatis longe acuminatis, bracteis foliaceis viridibus angustioribus. A homokterület erdeiben a Nagyerdőtől Halápig gyakori. Kitaibel (Rel. p. 41) debreceni és egyéb nyírségi *M. silvaticum*-a, melyet én *M. pratense* névvel vettem fel Debreczen flórájáról szóló főközleményembe (Erd. Kisérl. 1916, p. 57) minden bizonnyal ezt az alakot jelenti.

Marrubium remotum Kit. homokmezőn Halápon (Wagner).

Inula hirta L. erdőszélen Halápon (Wagner).

I. rigida Doll. ugyanott a szőlők között (Wagner).

Solidago virga-aurea L. erdővágásban a Nagyerdőben.

Centaurea pseudorhenana Gugl. homokmezőn Halápon (Wagner).

C. spinulosa Roch. f. *hajdonicalis* I. Wagn. differt a typo et a f. *curtispina* Gugl. appendicibus squamarum spinula perfecte destitutis, homokmezőn Halápon (Wagner).

Hypochoeris radicata L. réten Halápon (Jávorka).

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) a halápi lápban (Jávorka).

Avenastrum pratense L. közeledik a *subdecurrens* Borb. felé, réten Halápon (Jávorka).

Poa palustris L. a halápi lápban (Jávorka).

Plantae novae albanicae II.

Irta: } S. Jávorka (Budapest).
Von: }

1. *Rosa Jávorkae* Deg. n. sp.

E sect. „*Tomentosae*“ Déségl. Catal. rais. 1877 294 B. — *Villosae* Crép. („*Pomiferae*“ Déségl. l. c. 320). — „*Caninae*“
2. *Vestitae* R. Kell. ap. Aschers. et Gr. Syn. VI. 1. 1900. 63.

Frutex mediocris axi recta, ramis extus cortice griseo-violeaceo-brunnescente obtectis, vetustis et junioribus puberulis, aculeis e basi anguste-elliptica rectis, sat longis (6—7 mm.) stramineis saepe geminatis armatis, stipulis sursum dilatatis utrinque puberulis, eglandulosis, apice oblique truncatis, auriculis acutis divergentibus, dorso inermibus, margine breviter pilosis, et glanduloso-ciliatis, petiolis in parte inferiore inermibus, eglandulosis, tenuiter tomentosis, foliis trijugis; foliolis griseo-viridibus ovatis vel ovato-ellipticis, basi rotundatis, apice breviter acutatis, simpliciter serratis, dentibus inferioribus hinc-inde glandula auctis, apice paulo callosis, lamina utrinque. sed subtus ad nervos densius pilosa,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Raymund Rapaics

Artikel/Article: [Neuere Beiträge zur Kenntnis der Flora von Debreczen 16-17](#)