

T. Simonkaiana Wagn. (*T. euchlora* Koch $\times$ *cordata* Mill.).⁴⁾ Der lebende Baum zeigt schon im Habitus eine Annäherung an *T. euchlora*, besonders die herabhängenden Blüten- und Fruchststände sind charakteristisch. Die Nervenverzweigungen dritten Ranges sind ziemlich parallel (dadurch von *cordata* nicht schwer zu unterscheiden), die Blättzähne $\pm$ bespitzt. Früchte grösser als bei *cordata*, $\pm$ länglich, filzig, möglicherweise auch schwach gerippt.

Bisher nur bei Eszterháza und Balatonfüred beobachtet.

Adatok az Északnyugati Kárpátok növény- ismeretéhez.

Beiträge zur Kenntnis der Flora der Nordwest-Karpathen.

Írta: }
Von: } **Hulják János** (Perecesbánya).

Az 1910—1918. év között az Északnyugati Kárpátok különböző helyein folytatott gyűjtésem alkalmával florisztikailag több érdekes adatra akadtam, amelyeket a terület eddigi növényföldrajzi ismeretének kibővítéseül közreadok.

Hálásan köszöntöm Dr Degen Árpád, Lyka Károly urakat; a M. T. Akadémia math. és term. Bizottságát, a kolozsvári F. J. tud. egyetem Ált. növ. Intézetét a részemre nyújtott nagybecsű anyagi támogatásért; Dr Jávorka Sándor urat pedig az anyag részinti meghatározásáért.

Adataim a következők:

Juncus alpinus Vill. *carpaticus* Simk. Liptói havasok. A „Banikov vrh“ alatti patak mentén, Liptó vm: Nagybóbróc-Jalóc. — *Achroanthos monophyllos* (L.) Greene. Nagy-Fátra. A „Tlsta“ aljának Gagyervölgy feletti oldalán, fenyves tisztáson, Turóc vm: Blatnica.

Stellaria palustris Retz. Nagy-Fátra. A „Rojkov“ láp szélén, kaszálón, Liptó vm: Sztankován. — *Ranunculus nemorosus* DC. Magas-Fátra. A „Furkota“ völgyben, Liptó vm: Csorba tó. — *Spiraea salicifolia* L. Magyar érchegység. A „Bzova“ patak jobb partja mentén, kaszálón, Nógrád vm: Vámosfaiva. — *Sorbus Chamaemespilus* (L.) Cr. Alacsony-Fátra. A „Krakova hola“ hegy déli lejtőjén, Liptó vm: L. sz. Iván; Liptói havasok. A „Biela skala“ gerinc élén, Liptó vm: Jalóc. — *Potentilla thuringiaca* Bernh. Fátra-Kriván. A „Bisztricska“ völgyében, Árva vm: Kra-

⁴⁾ Arhor in statu vivo praesertim propter inflorescentiam pendulam *T. euchlorae* similis, sed rami nervorum tertiarum foliorum fere paralleli (hac nota a *T. cordata* differt), dentes $\pm$ acuminati, fructus eis *T. cordatae* majores, $\pm$ oblongi, tomentosi, forsán leviter costati.

lován; Liptói havasok. A „Jalóc,” völgyében, Liptó vm: Jalóc. — $\times$ *Geum sudeticum* Tausch. (*Sieversia montana* $\times$ *G. rivale*) Alacsony-Tátra. A „Krakova hola” hegy déli lejtőjén, Liptó vm: L. szt. Iván; Liptói havasok. A „Banikov vrh” alján, Liptó vm: Jalóc. — $\times$ *Geum tirolense* Kern. (*G. rivale* $\times$ *Sieversia montana*) Magas-Tátra. A „Furkota” völgyben a tófal alatti tisztáson, Liptó vm: Csorba tó. — *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. Magyar érchegység. A „Paphegy” bükkvágásában, Nógrád vm: Divény. — *Viola palustris* L. Liptói havasok. A „Rackova” völgy előtt, tűzegesben, Liptó vm: Pribilina. — *Circaea alpina* L. Liptói havasok. A „Maly Beli” völgyében, Pribilina. — *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. Magyar érchegység. A Várhegyen, Nógrád vm: Divény. — *Laserpitium Siler* L. Magas-Tátra. A „Nagy tarpataki” völgyben a felső tüzelőkö körüli katlan részen, tisztáson, Szepes vm: Tátrafüred.

Ledum palustre L. Nagy-Fátra. A „Rojkov” láp tűzegesében, Liptó vm: Sztankován. — *Cerinth glabra* Mill. Liptói havasok. A Cervenec hegy „Sokol” szakadékában, Liptó vm: Jalóc. — *Euphrasta picta* Wimm. Liptói havasok. A „Cervenec” hegyen, Liptó vm: Jalóc. — *Pedicularis carpatica* (Andrae) Simk. f. *marmarosiensis* Deg. Liptói havasok. A „Banikov vrh” alatti forrás viz mentén, Liptó vm: Jalóc. — *Orobanche reticulata* Wallr. Nagy-Fátra. Gagyervölgy, Turóc vm: Blatnica. — *Knautia arvensis* (L.) Coult, f. *carpatica* (Fisch.) Borb. Magyar érchegység. A „Paphegy” lejtőjén, Nógrád vm: Divény. — *Erigeron neglectus* Kern. v. *hungaricus* (Vierh.) Jáv. Liptói havasok. A „Rackovató” körül, Liptó vm: Pribilina. — *Chrysanthemum alpinum* v. L. *Tatrae* Vierh. A „Rackovató” körül, Liptó vm: Pribilina. — *Carduus Schulzeanus* Ruhm. (*C. acanthoides* $\times$ *glaucus*) Nagy-Fátra. Gagyervölgy, Turóc vm: Blatnica. — $\times$ *C. turocensis* Marg. (*C. crispus* $\times$ *glaucus*) Nagy-Fátra. „Tlsta”; Gagyervölgy, Turóc vm: Blatnica. — $\times$ *C. Nyárádyanus* Deg. (*C. lobulatus* $\times$ *glaucus*) Nagy-Fátra. A Gagyervölgy felső részén, Turóc vm: Blatnica. — *C. acanthoides* L. v. *hranicensis* Petrak. Nagy-Fátra. Liptó vm Középrevuca. — *C. acanthoides* L. f. *polyanthemus* Schreb. Nagy-Fátra. Gagyervölgy; Középrevuca. — *C. f. submitis* Neillr. Nagy-Fátra. Alsórevuca. — *Picris sonchoides* Vest. v. *Tatrae* Borb. Liptói havasok. A „Cervenec” hegyen, Liptó vm: Jalóc.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): János Hurlák

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Flora der Nordwest-Karpathen 95-96](#)