

Additamenta ad cognitionem fungorum Poloniae.

(Adatok Lengyelország gombáinak ismeretéhez.)

Continuatio secunda*)

Auctore: **Dr. G. de Moesz** (Budapest).

I. Phycomycetes.

Albugo bliti (Biv.) O. KUNTZE, in foliis Amaranti retroflexi, prope opp. Kielce. — *A. candida* (PERS.) O. KUNTZE, in fol. caulibusque Capsellae bursapastoris, Kielce; in foliis, caulibusque Arabidis arenosae, Olkusz. — *A. portulacae* (DC.) O. KUNTZE, in fol. Portulacae oleraceae, prope opp. Chełm.

Bremia lactucae REGEL, in fol. Sonchi arvensis, Kielce.

Peronospora alta FUCKEL, in fol. Plantaginis mediae, Kielce. — *P. aparines* (DE BY) GÄUM. in fol. Galii aparines, Kielce. — *P. arvensis* GÄUM. in fol. Veronicae hederifoliae, Kielce. — *P. lunariae* GÄUM. in foliis et siliquis Lunariae redivivae, (conidii et oosporae), Ojców. — *P. media* GÄUM. in fol. Stellariae mediae, Kielce. — *P. melandryi* GÄUM. in fol. Melandryi albi, Kielce. — *P. obovata* BON. in foliis caulibusque Spargulae arvensis, Kielce. — ? *P. ornithopi* GÄUM. in fol. Ornithopi sativi, Lubartów. — *P. parasitica* (PERS.) TUL. in fol. caul. Capsellae bursapastoris, Kielce. — *P. ranunculi* GÄUM. in fol. Ranunculi repentis, Kielce. — *P. roripae-islandicae* GÄUM. in fol. Roripae islandicae (= R. palustris), Lubartów. — *P. verna* GÄUM. in fol. Veronicae serpyllifoliae, Lublin.

Physoderma menyanthi DE BY in fol. Menyanthis trifoliatae, Wobłom.

Plasmopara nivea (UNGER) SCHROETER, in fol. Aegopodii podagrariae, Kielce et Lubartów. — *P. pygmaea* (UNG.) SCHROETER, in fol. Anemones nemorosae, in monte Karczówka pr. opp. Kielce.

II. Ascomycetes.

Protodiscineae.

Taphria alni-incanae (KÜHN) MAGNUS, in amentis femineis Alni incanae, Miechów. — *T. aurea* (PERS.) FRIES, in fol. Populi nigrae, Miechów. — *T. bullata* (BERK. et BR.) TUL. in fol. Piri communis, Kielce. — *T. pruni* TUL. in fructibus Pruni domestici, Kielce. — *T. Sadebeckii* JOHANSEN, in fol. Alni glutinosae, Radom et Chełciny. — *T. Tosquinetii* (WEST.) MAGN. in fol. Alni glutinosae, Kielce et Klucze prope opp. Olkusz.

*) Pars prima in Botan. Közlem. Budapest, (1920), p. 22 et (6).

Helvellinae.

Rhizina inflata (SCHAEFF.) KARST., ad terram, in pinetis, Włoszczowa.

Pezizineae.

Ascophanus carneus (PERS.) BOUD., in fimo leporino, Włoszczowa.

Belonidium punctum (SACC.) REHM, in foliis siccis Nardi strictae, Kielce.

Bulgaria polymorpha (OEDER) NIESSL, in truncis Quercus roboris, prope opp. Chełm.

Cenangium abietis (PERS.) REHM, in ramis emortuis Pini silvestris, Włoszczowa. — *C. acicolum* (FUCK.) REHM, in acubus Pini silvestris, Zagdańsk.

Dasyscypha Willkommii HARTIG, in ramis Laricis europaeae, Wierbka, prope opp. Wolbrom.

Dermatea eucrita KARST. in cortice Pini silvestris, Zaklików.

Helotium herbarum (PERS.) FRIES, in caulibus emortuis ad terram, Kielce.

Lachnea scutellata (L.) GILL., in cortice Pini silvestris, ad terram, Zagdańsk.

Lachnum bicolor (BULL.) KARST., in caulibus emortuis Rubi idaei, Ojców. — *L. nidulans* (SCHM. et KZE) KARST. var. *subnidulans* REHM. in caulibus Chamaenerii angustifolii, Włoszczowa. — *L. sulphureum* (PERS.) REHM, in caulibus emortuis Lunariae redivivae, Ojców.

Mollisia atrata (PERS.) KARST. in caulibus emortuis Ranunculi acris (Kielce) et Sedi maximi, Włoszczowa. — *M. revincta* KARST., in caulibus siccis Epilobii hirsuti, Dorohusk.

Plicaria badia (PERS.) FÜCKEL, ad terram in silvis, Kielce.

Pseudopeziza trifolii (BERNH.) FÜCKEL, in fol. vivis Trifolii pratensis, Lubartów et in foliis Medicaginis sativae, Kielce.

Pyrenopeziza rubi (FRIES) REHM, in sarmentis emortuis Rubi idaei, Ojców.

Tympanis conspersa FRIES, in cortice Alni incanae, Miechów.

Phacidiineae.

Coccomyces coronatus (SCHUM.) REHM, in foliis dejectis Quercus roboris (Chełm) et Fagi silvaticae, in monte Lysica. — *C. dentatus* (KZE et SCHM.) SACC. in fol. dejectis Quercus roboris, Chełm.

Cryptodiscus succineus (SACC.) SCHROETER, in caulibus Genistae tinctoriae, Kielce.

Cryptomyces pteridis (REBENT.) REHM in frondibus Pteridii aquilini, Włoszczowa.

Rhytisma andromedae (PERS.) FRIES, in fol. Andromedae polifoliae, Włoszczowa. — *R. punctatum* (PERS.) FRIES, in fol. Aceris pseudoplatani, in monte Lysica.

Hysteriineae.

Lophodermium arundinaceum (SCHRAD.) CHEV. in culmis foliisque emortuis Calamagrostidis epigeii (Włoszczowa), Elymi arenarii, Wencelów, prope opp. Radom et prope opp. Olkusz. — *L. juniperinum* (FRIES) DE NOT., in acubus siccis Juniperi vulgaris, Kielce. — *L. nervisequium* (DC.) REHM, in acubus dejectis Abietis albae. — *L. pinastri* (SCHRAD.) CHEV., in acubus dejectis Pini silvestris, inter Lubartów et Firlej, Zaklików, Olkusz, Zagdańsk.

Perisporiales.

Erysibe cichoriacearum DC. in fol. Arctii lappae, Firlej, prope opp. Lubartów. — *E. polygoni* DC. in fol. caulibusque Ononidis hircinae, Trifolii dubii et Lupini angustifolii, Lubartów; in fol. Delphinii elati, Kielce.

Microthyrium cytisi FÜCKEL, in caulibus vivis et languidis Genistae tinctoriae, Kielce.

Podosphaera oxyacanthae (DC.) DE BY, in fol. Crataegi monogynae, in monte Karczówka, prope opp. Kielce et in fol. vivis Vaccinii uliginosi, Włoszczowa, Kielce.

Sphaerotheca humuli (DC.) BURR., in fol. Bidentis tripartitae, Lubartów, in fol. Erigerontis canadensis, Włoszczowa et in fol. Impatientis noli tangere, in monte Lysica.

Trichocladia astragali (DC.) NEGER, in fol. Astragali glycyphylli, Kielce.

Hypocreales.

Cordyceps clavulata (SCHWEIN.) ELL. et EV. Ad scutellum Lecanii in ramis Coryli avellanae, cum Isaria lecaniicola. Prope opp. Chełm.

Epichloë typhina (PERS.) TUL. In vaginis Agrostidis sp. (Lubartów) et Poae nemoralis, Chełm.

Nectria cucurbitula (TODE) FRIES, in cortice Pini silvestris, Zaklików. — *N. peziza* (TODE) FRIES, in ligno denudato Fagi silvaticae, Zagroda, prope opp. Kielce.

Polystigma ochraceum (WAHLBG.) SACC., in fol. Pruni padi, Ojców.

Dothideales.

Euryachora betulina (FR.) SCHROETER, in fol. Betulae pendulae, Kielce.

Phyllachora graminis (PERS.) FÜCKEL, in fol. Calamagrostidis epigeii, Włoszczowa.

Montagnellina stellaris (PERS.) THEISS. et SYD., in fol. Phyteumatis spicati, Zagroda, prope opp. Kielce.

Sphaeriales.

Botryosphaeria melanops (TUL.) WINTER, in ramis emortuis Quercus roboris, Chełm.

Coleroa potentillae (PERS.) KARST., in fol. Potentillae arena-
riae, Lublin.

Cryptospora suffusa (FR.) TUL., in ramis emortuis Alni inca-
nae, Miechów.

Cucurbitaria spartii (NEES) CES. et DE NOT., in ramulis Soro-
thamni scoparii, Włoszczowa.

Daldinia concentrica (BOLT.) CES. et DE NOT., in truncis put-
ridis Betulae pendulae, Zaklików.

Diaporthe fibrosa (PERS.) FÜCKEL, in ramis siccis Rhamni
frangulae, Miedzianka, prope opp. Kielce.

Diatrype stigma (HOFFM.) DE NOT., in ramis emortuis Quer-
cus roboris, Chełm.

Diatrypella favacea (FRIES) NITSCHKE, in ramis emortuis
Betulae pendulae, Zaklików.

Didymosphaeria brunneola NISSL, in caulibus emortuis
Euphorbiae palustris, Dorohusk.

Hypoxylon fuscum (PERS.) FRIES, in cortice Alni incanae,
Miechów.

Laestadia carpinea (FRIES) SACC., in fol. siccis Carpinii betuli,
Rabsztyń.

Leptosphaeria apogon SACC. et SPEG., in calamis emortuis
Junci squarrosi, Kielce. — *L. caespitosa* NISSL, in caulibus emor-
tuis Artemisiae campestris, Miedzianka. — *L. cylindrospora*
AUERSW. et NISSL, in caulibus emortuis Chamaenerii angusti-
folii. — *L. dumetorum* NISSL, in caulibus emortuis Solidaginis
virgaureae, Włoszczowa. — *L. Niessleana* RBH., in caulibus emor-
tuis Lathyrus silvestris, Zagroda, pr. opp. Kielce. — *L. ogilvien-
sis* (BERK. et BR.) CES. et DE NOT. in caul. emort. Cirsii arvensis,
Włoszczowa. — *L. quadriseptata* TRAIL. in caulibus emortuis Cimi-
cifugae foetidae et Valerianae officinalis, Miedzianka, pr. opp.
Kielce.

Melanconis alni TUL., in ramis emortuis Alni incanae, Miechów.

Mycosphaerella aegopodii A. POT., in fol. vivis Aegopodii
podagrariae, Lubartów. — *M. gypsophilaecola* (HOLLÓS), in foliis
caulibusque emortuis Gypsophylae fastigiatae, Skorocice, prope opp.
Busk. — *M. innumerella* (KARST.) SCHRÖTER, in fol. languidis et
siccis Potentillae palustris. Prope lacum Kunów. — *M. isariophora*
(DESM.) JOHANS., in fol. emort. Stellariae holostaeae, Kielce. —
M. lineolata (DESM.), in fol. emort. Caricis silvaticae, Chełm. —
M. lycopodina (KARST.) in fol. siccis Lycopodii annotini, in monte
Lysica. — *M. punctiformis* (PERS.) SCHROETER, in fol. siccis
Quercus roboris, Chełm.


Ophiobolus acuminatus (SOW.) DUBY, in caulibus emort. Cirsii

palustris, Potok Złoty. — *O. fruticum* (ROB.) SACC. in caulibus emort. *Ononidis hircinae*, Subartów.

Pleomassaria varians (HAZSL.) WINTER, in ramis emortuis *Lycii barbari*, Opatów.

Pleospora Gilletiana SACC., in ramulis *Genistae tinctoriae*, Kielce. — *P. herbarum* (PERS.) RBH., in caulibus *Armeriae vulgaris* et in fol. emortuis *Koeleriae glaucae*, prope opp. Olkusz; in fol. emort. *Stellariae holostae*, Kielce. — *P. microspora* NIESSL, in culmis emortuis *Elymi arenarii*, Wencelów, prope opp. Radom. — *P. vagans* NIESSL var. *arenaria* NIESSL, in culmis emortuis *Elymi arenarii*, Olkusz.

Pyrenophora brachyspora (NIESSL) BERL., in foliis, caulibusque siccis *Scleranthi perennis*, Chęciny. Peritheciis 108—147 μ diam.,



Pyrenophora Szaferiana n. sp.

setis usque ad 81 μ longis; ascis 59 — 80 $\times$ 20 — 25 μ ; sporis 26 — 35 $\times$ 10 — 12 μ ; paraphysibus mucrescentibus.

Similis *Pyrenophorae Venzianae* Sacc., sed posterior sporas acutas habet.

***Pyrenophora Szaferiana* Moesz sp. n.** Peritheciis gregariis, initio peridermio innatis, ligno semiimmersis, dein superficialibus, globosis vel globoso-conicis, papillatis, nigris, 145—290 μ diam., extus pilis brunneis, plus-minus flexuosis, usque ad 75 μ longis, septatis, obsitis, sed vertice nudis; parietibus membranaeis, 25—30 μ crassis, ad basin tenuioribus fere inperlucidis, indistincte parenchymaticis; ascis cylindraceutis, breve stipitatis octosporis, 125 — 163 $\times$ 14.5 — 16 μ ; paraphysibus filiformibus copiosis; sporidiis monostichis, subovatis vel ellipticis, luteo brunneis 7-septatis, in longitudine 1—2 divis, ad septum medianum constrictis, 22 — 26 $\times$ 10 — 12 μ .

Hab. in ramis *Vaccinii uliginosi*, prope Zaklików.

Dedicavi in honorem professoris DR. W. SZAFER, florum polonicarum scrutatoris indefessi.

Fungus hic, praecipue quum in ramis decorticatis paulum ligno immersus invenitur, Pleosphaeriam in mentem revocat.

Explicatio ad icon. 1. — A., peritheciis ($100/1$); B., spora ($500/1$).

Rosellinia xylarispora (C. et E.) SACC., sub cortice in ramis *Vaccinii uliginosi*. Zaklików.

Peritheciis 145 — 260 μ ; ascis 97 — 114 $\times$ 6.5 — 8 μ ; sporis 13 — 18 $\times$ 5 — 7 μ ; setis 16 — 23 μ longis.

Fungus hic in America-boreali in ramis *Andromedae* decorticatis inventus est.

Sordaria macrospora AUERSW., in fimo leporino, Włoszczowa. — *S. Rabenhorstii* NIESSL, in fimo leporino. Włoszczowa.

Sphaerulina intermixta (BERK. et BR.) SACC., in caulibus emortuis *Rubi* sp. Kielce.

Sporormia intermedia AUERSW., in fimo leporino, Włoszczowa.

Stigmatea Robertiani FRIES, in fol. vivis *Geranii Robertiani*. Kielce.

Ustilina maxima (HALLER) SCHROETER, in ligno putrido. Zagroda, prope opp. Kielce.

Valsa nivea (PERS.) FRIES, in ramis emortuis *Populi nigrae*. Kielce. — *V. pini* (ALB. et SCHW.) FRIES, in ramis emortuis *Pini silvestris*, Zaklików.

Xylaria hypoxylon (L.) GREV., in ligno putrido, Wierbka.

III. Basidiomycetes.

Hemibasidii.

Doassansia sagittariae (WESTD.) FISCH., in fol. vivis *Sagittariae sagittifoliae*. Puławy.

Entyloma ranunculi (BON.) SCHROETER, in fol. vivis *Ranunculi ficariae*. Lublin: Saski park.

Sphacelotheca panici-miliacei (PERS.) BUBÁK, in inflorescentia *Panici miliacei*. Kielce.

Tubercinia occulta (WALLR.) LIRO, in foliis, vaginisque *Secales cerealis*. Kielce.

Ustilago hordei (PERS.) KELLERM. et SWINGLE, in ovariiis *Hordei sativi*. Żerniki, prope opp. Busk. — *U. longissima* (SOW.) TUL., in foliis *Glyceriae aquaticae*. Kielce, Lublin, Lubartów. — *U. tritici* (PERS.) JENSEN, in ovariiis *Tritici vulgaris*, Kielce. — *U. violacea* (PERS.) TUL., in antheris *Melandryi albi*. Dorohusk.

Uredinales.

Aecidium euphorbiae GMEL., in fol. *Euphorbiae cyprissias*. Wencelów, prope Radom.

Calyptospora Goeppertiana J. KÜHN, in caulibus vivis *Vaccinii vitis-idaeae*. Kielce, Zagdańsk.

Chrysomyxa ledi (ALB. et SCHW.) DE BY., in fol. *Ledi palustris*. Włoszczowa.

Coleosporium campanulae (PERS.) LÉV., in fol. *Campanulae rotundifoliae*, Olkusz et Włoszczowa; in fol. *Campanulae rapunculoidis*, Chełm, in fol. *C. trachelii*, Zagroda, prope Kielce. — *C. euphrasiae* (SCHUM.) WINTER, in fol. caulibusque *Euphrasiae Rostkovianae*, Kielce. — *C. melampyri* TUL., in fol. *Melampyri nemorosi*, Kielce; in fol. *Mel. vulgati*, Zagdańsk. — *C. senecionis* FR., in fol. *Senecionis silvatici*, Włoszczowa, Zagdańsk. — *C. sonchi* LÉV., in fol. *Sonchi arvensis*, Włoszczowa, Lubartów. — *C. tussilaginis* (PERS.) LÉV. in fol. *Tussilaginis farfarae*, Zagroda, prope Kielce, Lubartów. — *C. sp.*, aecidium in foliis *Pini silvestris*, Zagdańsk.

Cronartium flaccidum (ALB. et SCHW.) WINTER, in fol. *Paeoniae officinalis*, Lubartów. — *C. ribicolum* FISCHER, in fol. *Ribis rubri*, Kielce.

Gymnosporangium juniperi LINK., in fol. *Sorbi aucupariae*, Zagroda, Kielce.

Hyalopsora polypodii P. MAGN., in frondibus *Cystopteridis fragilis*. Skarżysko. — *H. polypodii-dryopteridis* (MONG. et NESTL.) MAGN., in frondibus *Phegopteridis dryopteridis*, Zagdańsk, Zagroda.

Melampsora amygdalinae KLEB., in fol. *Salicis triandrae*, Lubartów. — *M. euphorbiae* (SCHUB.) CAST, in fol. *Euphorbiae cyparissias*, Lubartów. — *M. euphorbiae dulcis* OTTH., in fol. *Euphorbiae angulatae*, Zagroda, prope Kielce. — *M. helioscopiae* (PERS.) CAST. f. sp. *euphorbiae exiguae* W. MÜLLER, in fol. caulibusque *Euphorbiae exiguae*. Skarżysko. — *M. hypericorum* WINTER, in fol. *Hyperici perforati*, Zagroda, prope opp. Kielce. — *M. lini* (EHRBG.) LÉV. in fol. caulibusque *Lini cathartici*, Chotel czerwony, prope opp. Busk. — *M. repentis* PLOWR. in fructibus *Salicis repentis*. Olkusz. — *M. tremulae* TUL. in fol. *Populi tremulae*. Tantum aecidium. Kielce.

Melampsorella caryophyllacearum SCHROETER, in fol. caulibusque *Stellariae mediae* (Kielce) et *Stellariae uliginosae*, Zagdańsk; in acubus *Abietis albae*. Zagdańsk.

Melampsoridium betulinum (PERS.) KLEB., in fol. *Betulae pendulae*. Inter Lubartów et Firlej, Zaklików, Włoszczowa.

Phragmidium potentillae (PERS.) KARST, in fol. *Potentillae arenariae*, Lublin: *Konopnica*; in fol. *Potentillae argenteae*, Kielce et Lubartów; in fol. *Potentillae collinae*, Skarżysko. — *P. rubi* (PERS.) WINTER in fol. *Rubi sp.* Lubartów. — *P. rubi-idaei* (PERS.) WINTER, in fol. *Rubi idaei*, in monte Lysica. — *P. tormentillae* FUECK., in fol. *Potentillae erectae*, Zaklików. — *P. tuberculatum*

J. MÜLL., in fol. Rosae sp., Kielce. — *P. violaceum* (SCHULTZ) WINTER, in fol. Rubi sp., Kielce.

Puccinia absinthii DC., in fol. Artemisiae vulgaris, Lubartów, — *P. acetosae* (SCHUM.) KOERN., in fol. Rumicis acetosae. Lubartów. — *P. aegopodii* (SCHUM.) MART., in fol. Aegopodii podagrariae. Lubartów. — *P. arenariae* (SCHUM.) WINTER, in fol. Stellariae aquaticae (Lubartów); in fol. Stellariae nemorum, in monte Lysica; in fol. Arenariae serpyllifoliae (Włoszczowa) et in fol. Moehringiae trinerviae (Chełm). — *P. asarina* KZE, in fol. Asari europaei. Ojców. — *P. cichorii* (DC.) BELL., in fol. caul. Cichorii intybi, Lubartów. — *P. circaeae* PERS., in fol. Circaeae alpinae, in monte Lysica. — *P. cirsii-lanceolati* SCHROETER, in fol. Cirsii lanceolati, Kielce. — *P. conii* (STR.) FÜCKEL, in fol. Conii maculati, Firlej. — *P. coronata* CDA, in fol. Rhamni frangulae, Zagdańsk. — *P. dispersa* ERIKSS., aecidiis in fol. Lycopsidis arvensis, Kielce.

P. epilobii-tetragoni (DC.) WINTER, in fol. Epilobii hirsuti, Chełm. — *P. falcariae* (PERS.) FÜCKEL, in fol. Falcariae Rivini, Kielce. — *P. graminis* PERS., aecidium in fol. Berberidis vulgaris, Lubartów; in spicis caulibusque Lolii perennis, Puławy; *f. sp. avenae* ERIKSS. et HENN. in fol. culm. Avenae sativae, Kielce; *f. sp. secalis* ERIKSS. et HENN., in fol. Hordei sp. cult., Kielce; in fol. culm. Agropyri repentis, Lubartów et Lublin; in fol. culm. Elymi arenarii, Wencelów, prope Radom. — *P. lolii* NIELS., in fol. Glyceriae aquaticae, Lubartów; in fol. Lolii perennis, Kielce. — *P. malvacearum* MONT., in fol. Malvae silvestris, Włoszczowa. — *P. menthae* PERS., in fol. Clinopodii vulgaris, Kielce et Zagroda; in fol. Menthae aquaticae, Zagdańsk; in fol. Menthae arvensis, Zagroda, prope Kielce. — *P. phragmitis* (SCHUM.) KOERN., in fol. Phragmitis communis, in lacu Kunów. — *P. picridis* HAZSL., in fol. Picridis hieracioidis, Lubartów. — *P. poarum* NIELSEN, aecid. in fol. Tussilaginis farfarae, Chełm. — *P. polygoni-amphibii* PERS., in fol. Polygoni dumetori (Lubartów) et in fol. Polygoni amphibii, Kielce et Lubartów. — *P. pulsatillae* KALCHBR., in fol. Anemones silvestris, Żerniki, prope opp. Busk. — *P. spergulae* DC. in fol. Spergulae arvensis. Kielce et Lubartów. — *P. suaveolens* (PERS.) ROSTR., in fol. Cirsii arvensis, in monte Karczówka. — *P. taraxaci* (REBERT.) PLOWR., in fol. Taraxaci officinalis, Lublin, Lubartów. — *P. valantiae* PERS., in fol. Galii verni, Włoszczowa. — *P. violae* (SCHUM.) DC., in fol. Violae hirtae, Zagroda, et in fol. Violae silvestris, in monte Karczówka, prope opp. Kielce.

Pucciniastrum circaeae (SCHUM.) SPERG., in fol. Circaeae alpinae, in monte Lysica.

Thekopsora areolata (FR.) P. MAGN., in fol. Pruni padi, Kielce. — *T. vacciniorum* KARST., in fol. Vaccinii uliginosi, Włoszczowa, Kielce et Zaklików.

Uromyces armeriae (SCHLECHT.) LÉV., in fol. scapisque Arme-

rae vulgaris. Olkusz. — *U. astragali* (OPIZ) SACC., in fol. Astragali arenarii, Kielce, et in fol. Astragali glycyphylli. Lubartów.

U. fabae (PERS.) DE BY, in fol. caulibusque Viciae sativae, Viciae sepium, Pisi sativi, Kielce et in fol. Viciae villosae, Włoszczowa. — *U. genistae-tinctoriae* (PERS.) WINTER, in fol. caulibusque Genistae tinctoriae, Kielce, Kostomłoty. — *U. pisi* (PERS.) WINTER, in fol. caul. Lathyri sativi, Kielce et Firlej. — *U. poae* RBH. (sive *U. rumicis*?), in fol. Ranunculi ficariae, Lublin; Saski park. — *U. polygoni* (PERS.) FÜCKEL, in fol. caul. Polygoni avicularis, Kielce, Chęciny. — *U. scutellatus* (SCHRANK) SÉV., in fol. Euphorbiae cyparissias Kielce. — *U. striatus* SCHROETER, in fol. Medicaginis lupulinae, Kielce, Lubartów; in fol. Trifolii arvensis, Lubartów. — *U. thapsi* (OPIZ) BUBÁK, in fol. Verbasci phlomoideis, Lubartów. — *U. trifolii-repentis* (CAST.) LIRO, in fol. Trifolii repentis, Lubartów. — *U. verruculosus* SCHROETER, in fol. Melandryi albi, Włoszczowa. — *U. sp.*, aacid. in fol. Euphorbiae cyparissias, Kielce.

Dacryomycetinae.

Calocera viscosa (PERS.) FR., in truncis putridis, in monte Lysica.

Exobasidiineae.

Exobasidium vaccinii (FÜCK.) WOR., in fol. Vaccinii vitis idaeae, Kostomłoty, Zagdańsk; in fol. Vaccinii uliginosi, Kielce, Zaklików.

Hymenomycetinae.

Boletopsis luteus (L.) P. HENN., in pinetis. Zagdańsk.

Boletus badius FR., in pinetis, Zagdańsk.

Daedalea quercina (L.) PERS., in truncis Quercus roboris, Zagdańsk. — *D. unicolor* (BULL.) FRIES, in truncis Qu. roboris, Zagroda, pr. Kielce.

Hymenochaete rubiginosa (DICKS.) SACC., ad truncos Quercuum, Zagdańsk, Chełm.

Hypochnus solani P. et D., in fol. caulibusque vivis Herniariae glabrae. Włoszczowa. — K. O. MÜLLER (Arbeiten aus der Biol. Reichsanstalt für Land- u. Forstwirtschaft, 13. Bd. 3. Heft) anno 1924 plantas nutrientes 160 huius fungi enumerat. Planta nutriens 161 *Herniaria glabra* est.

Lentinus rudis (FR.) P. HENN., in truncis Pini silv. Włoszczowa. — *L. squamosus* (SCHAEFF.) SCHROETER, in truncis Pini silvestris, Kielce, Zagdańsk.

Lenzites abietina (BULL.) FR., in truncis Pini silv. Zagdańsk.

Lepiota procera (SCOP.) QUÉL., ad terram arenosam, Włoszczowa.

Peniophora corticalis (BULL.) COOKE, in ramis siccis Quercus roboris. Chełm.

Polyporus caudicinus (SCHAEFF.) SCHROETER, in truncis Salicis albae (Dęblin) et Pini silvestris, Zagdańsk.

Valde est memorabile, quod fungus hic etiam in Pino silvestri proveniat.

Polystictus perennis (L.) FR., in pinetis, ad terram arenosam. Kielce, Zagdańsk.

Sparassis ramosa (SCHAEFF.) SCHROETER, Kielce.

Suillus cyanescens (BULL.) KARST., in pinetis, ad terram arenosam. Zagdańsk.

Thelephora laciniata PERS., in pinetis Caricem piluliferam in-crustans. Zagdańsk. — *T. palmata* (SCOP.) FRIES, in arenosis pine-torum, Kielce. — *T. terrestris* EHRBG. ad terram, in pinetis. Kielce, Skarżysko, Rabsztyn, Włoszczowa.

Gasteromycetes.

Geaster minimus SCHWEIN., in arenosis, prope opp. Olkusz. Rarissime.

Lycoperdon gemmatum BATSCH, in pratis humidis. Kielce.

IV. Fungi imperfecti.

Sphaeropsidales.

Actinothyrium graminis KZE, in fol. emort. Dactylidis glo-meratae. Kielce.

Ascochyta microspora TRAIL., in fol. Arctii lappae, Chełm. — *A. quadriguttulata* KAB. et BUB., in fol. languidis Sparganii minimi. Kielce. Quia inter conidia interdum etiam 4-cellularia occurrunt, haec species forsitan cum *Stagonospora spargani* (Fuckel) Sacc. esset identificienda.

A. viciae LIB., in fol. vivis Viciae villosae. Włoszczowa. — *A. Vodakii* BUB., in fol. Anemones hepaticae. Zagroda, prope Kielce.

Cicinnobolus Cesatii DE BY., in hyphis Erysibis galeopsidis. Lubartów.

Colletotrichella periclymeni (DESM.) v. H., in fol. Lonicerae xylostei. Ojców.

Coniothyrium genistae (ROUM.) BERL. et VOGL. in caulibus Genistae tinctoriae, Kielce.

? *Cytospora fertilis* SACC., in ramis emortuis Salicis daphnoi-dis. Wencelów, prope opp. Radom. Conidiis $6.5 - 10 \times 2 \mu$; conidiophoris $13 - 16 \mu$ longis, filiformibus. — *C. sp.*, in ramis emor-tuis Alni incanae. Miechów.

Darlucula filum (BIV.) CAST. In soris Uromycetis genistae-tinc-toariae (Genista tinctoria), Kielce; in soris Pucciniae spergulae


(*Spergula arvensis*) et *Pucciniaie absynthii* (*Artemisia vulgaris*) Lubartów; in soris *Uromycetis astragali* (*Astragalus arenarius*) Kielce; in soris *Uromycetis armeriae* (*Armeria vulgaris*) Olkusz.

Dendrophoma sarothamni DIED., in caulibus emortuis *Sarothamni scoparii*. Włoszczowa.

Diplodia rubi FRIES, in caul. *Rubi* sp. Kielce.

Diplodina conii JAAP, in caul. emort. *Sileris trilobi*. Ojców.
— *D. gypsophilae* HOLLÓS, in caul. emort. *Gypsophilae fastigiatae*, Zaklików. — *D. teretiusecula* (SACC. et ROUM.) DIED., in fol. languidis et siccis *Luzulae pilosae*. Włoszczowa.

Leptostroma pteridis EHRLH., in rhachide foliorum *Pteridii aquilini*. Zagdańsk, Włoszczowa.



Phoma lunariae n. sp.

Leptostromella hysteroidea (FR.) SACC., in caul. emortuis *Cimicifugae foetidae*, Miedzianka; *Cynanchi vincetoxici*, Ojców.


Melasmia acerina LÉV., in fol. *Aceris campestris*, Lubartów.
— *M. berberidis* THÜM. et WINTER, in fol. vivis et languidis *Berberidis vulgaris*. Zaklików.

***Microdiplodia arenaria* Moesz**, sp. n. Pycnidiis sparsis, epidermide tectis, erumpentibus, depresso-globosis, nigris, minute papillatis, 100—200 μ diam.; parietibus membranaceis, contextu parenchymatico, brunneo; conidiis ovatis vel fusoides, medio 1-septatis, ad septa leniter constrictis, dilute brunneis, eguttulatis, 7.5 — 10 $\times$ 3 — 5 μ ; conidiophoris indistinctis.

Hab. in caulibus emortuis *Helichrysi arenarii*, prope pag. Miedzianka.

A *Diplodia Helichrysi* a clar. Passerini in Italia superiore ad *Helichrysum angustifolium* lecta, differt conidiis paulo angustioribus, cellulisque conformibus.

Phoma lunariae Moesz, sp. n. Pycnidiis laxe gregariis, epidermide tectis, rostello erumpentibus, dein superficialibus, nigris, disciformibus, $370-625\ \mu$ longis, $250-375\ \mu$ latis, rostello $87-130 \times 65-70\ \mu$; parietibus $35-45\ \mu$ crassis, contextu parenchymatico, cellulis interioribus hyalinis, tenuimembranaceis, radiatim ordinatis, cellulis eorum extimis marginalibus brunneis, radiatim dispositis; conidiis cylindraceis, vel anguste ellipsoideis,



Phomopsis mazzantioides Petr.

rectis, $5-10 \times 1.5-2.5\ \mu$, utrinque rotundatis, continuis, biguttulatis; conidiophoris nullis.

Hab. in caulibus emortuis *Lunariae redivivae* prope pag. Ojców. 31. VII. 1918.

Paries plus-minus carnosus. Si cellulae parietis scleremchymaticae essent, tum fungus hic ad genus *Plenodomus* esset serendus.

Explicatio ad icon. 2. A., pycnidium ($\frac{50}{1}$); B., sectio pyc-

nidii longitudinalis ($\frac{50}{1}$); C., pars parietis pycnidii cum conidiis ($\frac{500}{1}$).

Phoma acuta FÜCKEL, in caul. emort. Urticae dioicae. Dęblin.

Phoma thalictrina SACC. et MALBR., in caul. emort. Thalictri flexuosi. Bronina. (= *Phomopsis thalictrina* Died.?)

Phomopsis mazzantioides PETR., in caulibus emortuis Galii verii. Opatów. — *P. subordinaria* (DESM.) TRAV.; in caulibus emort. Plantaginis ramosae, Miedzianka.

Phyllosticta sagittifoliae BRUN., in fol. Sagittariae sagittifoliae. Puławy. — *P. sp.*, in fol. vivis et languidis Chamaenerii angustifolii, Włoszczowa. Pycnidiis 50—55 μ diam.; conidiis 3—4.5 $\times$ 0.5—1 μ , bacillaribus, utrinque rotundatis, plus-minus capitellatis.

Sclerophoma pityophila (CDA) v. H., in acubus emortuis Pini silvestris. Zaklików.

Septoria astragali DESM., in fol. vivis Astragali glycyphylli. Kielce, Włoszczowa. — *S. cerastii* ROB. et DESM., in fol. siccis Cerastii arvensis, Kielce. — *S. chelidonii* DESM., in fol. Chelidonii majoris. Kielce, Lubartów. — *S. convolvuli* DESM., in fol. Convolvuli arvensis, Chełm. — *S. cruciatae* ROB. et DESM., in fol. languidis Galii verni. Włoszczowa. — *S. ebuli* DESM. et ROB. in fol. vivis Sambuci ebuli. Kielce. — *S. euphorbiae* KALCHBR., in fol. Euphorbiae angulatae Zagroda, prope opp. Kielce. — *S. lineolata* SACC. et SPEG., in fol. siccis Caricis silvaticae, Chełm. — *S. oenotherae* WEST., in fol. vivis Oenotherae biennis. Chęciny, Lubartów. — *S. podagrariae* LASCH, in fol. Aegopodii podagrariae, Lubartów. — *S. polygonicola* (LASCH) SACC., in fol. Polygoni hydro-piperis (Zagdańsk); Polygoni lapathifolii, Włoszczowa. — *S. polygonorum* DESM., in fol. Polygoni nodosi, Chęciny. — *S. posoniensis* BÄUMLER, in fol. Chrysosplenii alternifolii, Zagroda, prope Kielce. — *S. rosae-arvensis* SACC., in fol. vivis Rosae caninae, Kielce. Conidiis 33—75 $\times$ 2.5—3.5 μ , 4—6-septatis; septis valde distinctis. — *S. rubi* WEST. in fol. Rubi sp. e grege Rubi hirti W. et K., in monte Lysica. — *S. scleranthi* DESM., in fol. calycibus caulibusque Scleranthi perennis, Kielce. — *S. stellariae* ROB. et DESM., in fol. Stellariae mediae. Kielce. — *S. trientalis* (LASCH) SACC., in fol. Trientalis europaeae. Kielce, Zagdańsk. — *S. vermicularioides* (SYD.) DIED. in caulibus Genistae tinctoriae. Kielce. — *S. villarsiae* DESM., in fol. Nymphoidis peltatae. Zagożdżon. — *S. violae-palustris* DIED., in fol. vivis Violae palustris, Kielce, Zaklików.

Stagonospora medicaginis (ROB.) v. H., in fol. vivis Medica-ginis lupulinae, Kielce. — *S. pulsatillae* VESTERGR., in caul. petiolisque Pulsatillae pratensis. Kielce.

Melanconiales.

Colletotrichum cereale MANNS., in vaginis foliisque siccis Calamagrostidis pseudophragmitis. Skarżysko.

Coryneum Kunzei CDA., in cortice Betulae albae. Chełm. — *C. ruborum* OUD., in caul. emort. Rubi sp. Kielce.

Gloeosporium ribis (LIB.) MONT. et DESM., in fol. Ribis rubri. Lubartów.

Marssonina potentillae (DESM.) P. MAGN., in fol. Fragariae sp. cultae. Kielce.

Monochaetia monochaeta DESM. var. *gallicola* TROTTER, in fol. siccis Quercus roboris, Zagdańsk.

Septogloeum fragariae (B. et A.) v. H. in fol. vivis Fragariae vescae. Kielce. — *S. ulmi* (FR.) DIED., in fol. Ulmi scabrae. Kielce.

Hyphomycetes.

Botrytis cinerea PERS., in scapis Armeriae vulgaris. Olkusz.

Cercospora armoraciae SACC., in fol. Armoraciae rusticanae. Chełm. — *C. beticola* SACC., in fol. Betae vulgaris, Lubartów. — *C. ferruginea* FUECKEL, in fol. Artemisiae vulgaris, Lubartów. — *C. ii* TRAIL., in fol. vivis Violae palustris. Zaklików. — *C. majanthemi* FUECKEL, in fol. Majanthemi bifolii, Zagdańsk, Rabsztyn. — *C. mercurialis* PASSER, in fol. Mercurialis perennis, in monte Lysica. — *C. violae* SACC., in fol. Violae caninae et silvaticae. Włoszczowa.

Cercospora cana SACC., in fol. languidis Erigerontis canadensis. Lubartów.

Cladosporium fuliginum BON. in Exobasidii vaccinii (Vacc. vitis idaea) Kielce. — *C. herbarum* (PERS.) LINK, in fol. languidis et emortuis Quercus roboris, Tiliae platyphylloides, Lathyrus silvestris, Salicis pentandrae. Kielce.

Cylindrium clandestinum (CDA) SACC., in fol. emort. Quercus roboris, Zagroda.

Cylindrocolla urticae (PERS.) BON. in caulibus emort. Urticae dioicae. Dęblin.

Epicoccum purpurascens EHRB., in caulibus Genistae tinctoriae. Kielce.

? *Fusarium graminum* CORDA; in hymenio *Exobasidii vaccinii* (FUECK.) WOR. ad folia Vaccinii uliginosi prope pag. Zaklików.

Clariss DR. O. APPEL de hoc fungo opinionem sequentem declaravit: „Der zur Bestimmung übersandte *Fusarium*-Pilz auf *Exobasidium vaccinii* scheint mit *F. graminum* CORDA identisch zu sein“

Fusarium roseum LINK, in leguminibus Viciae sativae; in fol. languidis Panici miliacei. Kielce.

Fusicladium heterosporum v. H., in fol. Chamaenerii angustifolii, Włoszczowa.

Haplographium chlorocephalum (FRESEN.) GROVE, in caulibus emort. Lathyri silvestris. Zagroda.

Heterosporium gracile SACC. in fol. vivis Iridis germanicae. Kielce. — *H. variable* COOKE, in fol. vivis Spinaciae oleraceae. Lubartów.

Isaria lecaniicola JAAP. Ad scutello Lecanii in ramis Coryli avellanae. Chelm.

Linodochium hyalinum (LIB.) v. H., in acubus deciduis Pini silvestris. Włoszczowa.

Macrosporium commune RBH., in leguminibus arescentibus Viciae sativae. Kielce.

Oidium quercinum THÜMEN, in foliis Quercus roboris. Chelm, Lubartów, Kostomłoty.

Ovularia obliqua (COOKE) OUD., in fol. Rumicis sanguinei Lubartów. — *O. Villiana* MAGNUS, in fol. vivis Viciae cassubicae. Włoszczowa.

Ramularia alismatis FAUTR., in fol. Alismatis plantaginis. Kielce, Chęciny, Lubartów. — *R. arvensis* SACC, in fol. Potentillae anserinae, Chęciny. — *R. calthae* LINDR., in fol. Calthae palustris. Kielce. — *R. cylindroides* SACC., in fol. Pulmonariae officinalis, Chelm. — *R. phyteumatis* SACC. et WINTER, in fol. Phyteumatis spicati. Kielce. — *R. rosea* (FUCKEL) SACC., in fol. Salicis triandrae. Lubartów. — *R. rubicunda* BRES., in fol. languidis et emortuis Majanthemi bifolii. Kielce et in monte Lysica. — *R. sambucina* SACC., in fol. Sambuci nigrae. Lubartów. — *R. Tulasnei* SACC., in fol. Fragariae sp. cultae. Kielce. — *R. urticae* CES., in fol. Urticae dioicae. Lubartów. — *R. variabilis* FUECKEL, in fol. Verbasci phlomoidis. Lubartów.

Sepedonium chrysospermum (BULL.) FRIES, in fungis putridis. In monte Lysica.

Stilbella erythrocephala (DITM.) LINDAU, in fimo, Miedzianka.

Tubercularia vulgaris TODE, in ramis emortuis Rhamni frangulae. Miedzianka.

Tuberculina persicina (DITM.) SACC., in aecid. in fol. Tussilaginis farfarae. Chelm.

Vermicularia dematium (PERS.) FRIES, in caul. emort. Thalictri aquilegifolii. Kielce.

Párhuzamos alakok a középeurópai Thymus-ok körében.

Irta : **Lyka Károly** (Budapest).

A középeurópai kakukfűvek rendszertana feltűnően kevés szerzőt csábított a behatóbb munkára. Ennek egyik oka a nomenklatúra zavarossága, a rengeteg név azonosításának nehézsége, ez azonban tudományos szempontból nem éppen nagy baj, mert alig

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Moesz Gusztáv

Artikel/Article: [Additamenta ad cognitionem fungorum Poloniae 25-39](#)