© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

B) Hybridae.

Cirsium palustre × *rivulare*. a) *C. subalpinum* Gaud. In pratis humidis et in vineis ad Rőt et Léka. b) *C. Oenanum* Treuinf. In vineis solo humido ad Német-Gyirót.

C. palustre × *canum*. *C. silesiacum* Schultz. In pratis humidis inter parentes ad Weissenbachl.

C. palustre × *oleraceum*. *C. lacteum* Schleich. In silvis caeduis solo humido ad Kőpatak.

C. canum × *pannonicum*. a) *C. subcanum* G. Beck. (*C. canopannonicum* Neilr. *C. austro-pannonicum* Simk. in Waisb. l. c. p. 30); b) *C. persimile* G. Beck. Utraque forma crescit in castanetis inter parentes ad Kőszeg.

C. canum × *rivulare*. a) *C. Siegerti* Schultz. In pratis humidis in vineis ad Bozsok et Rohonez; b) *C. Castriferrei* Borb. (Vasmegye fl. 1887. p. 195). In pratis humidis ad Rohonez; c) *C. subrivulare* G. Beck. In pratis humidis ad Kőszeg; d) *C. rivulariforme* Waisb. In pratis humidis inter parentes ad Rőt et Kőszeg.

C. canum × *oleraceum*. a) *C. tataricum* All. Ad ripas fossarum in pratis humidis inter parentes fere ubique; b) *C. subolearaceum* G. Beck. (*C. tataricum* var. *pinnatum* Borb. l. c. p. 195). In pratis humidis ad Kőszeg; c) *C. purpurascens* Čel. In pratis ad Tarcsa et Szt.-Mihály.

C. erisithales × *pannonicum*. a) *C. Linkianum* Löhr. In castanetis inter parentes ad Kőszeg; b) *C. erisithaloides* Huter. Crescit in societate priori. c) *C. Waisbeckeri* Simk. (Magy. orv. és term. vizsg. XXV. vándorgyülésének munkálatai 1891, p. 425). Crescit in castanetis inter parentes ad Kőszeg, sed raro; d) *C. adulterinum* Waisb. (Természetrajzi Füzetek 1901. XXIV. p. 337). In castanetis ad Kőszeg.

C. erisithales × *oleraceum*. *C. suberisithales* G. Beck. Ad margines silvarum inter parentes ad Kőszeg.

C. rivulare × *oleraceum*. a) *C. erucagineum* DC. (*C. praemorsum* Michl. Treuinf.) In pratis humidis inter parentes ad Kőszeg et Rőt; b) *praemorsum* Rchb. (non Michl nec Treuinf.) In pratis humidis inter parentes ad Kőszeg. **Thaisz.**

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1903 január hó 14-én tartott ülése.

Sitzung der botanischen Section der kön. ung. naturwissenschaftl. Gesellschaft am 14. Jänner 1903.

Róth Róbert: A magyarhoni *Erica*-félék összehasonlító anatomiája» czímű dolgozatát Belulescko Sándor mutatta be.

Alexander Beluleszkó legt die Arbeit **Robert Roth's** «Vergleichende Anatomie der ungarischen *Ericaceen*» vor.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hollós László: 1. «Két új *Lycoperdon*-faj», előterjesztette Mágocsy-Dietz, Sándor. Lloyd C. G. floridai (É.-Amerika) gombász gyüjteményét meghatározás végett Hollós-nak szokta elküldeni. Sok más érdekes között Hollós két új fajt ír le a Lloyd-féle gyüjtésből. Ezek: *Lycoperdon pseudopusillum* Holl., terem Floridában, hazánkban pedig Brassó és Resicza vidékén. *Lycoperdon pseudoumbrinum* Holl. terem Dél-Carolinában.

2. «Nógrádmegye földalatti gombái» című értekezésében szintén sok érdekes felfedezéséről emlékszik meg.

Kümmerle Jenő: «A magyar nemzeti muzeum növénytára» című emlékiratot mutatja be, melyet a növénytár tisztviselői a muzeum 100-éves fennállása alkalmára szerkesztettek. Az emlékirat Dr Filárszky Nándor és Dr. Bernátsky Jenő tollából, a növénytár gyüjteményeinek és könyvtárának fejlődését, szaporodását és jelenlegi állapotát mutatja be, úgyszintén a gyüjtők, ajándékozók és muzeumi őrök működésének eredményét ismerteti.

Papp Dezső: «Adatok az *Iris*-levél anatomiájának ismeretéhez» című értékes dolgozatát legközelebb bővebben ismertetjük.

Schilberszky Károly. «Újabb teratologiai esetek» című előadása folyamán több érdekes teratologiai esetet ismertet és mutat be:

Al. Mágocsy Dietz legt folgende zwei Arbeiten **Lad. Hollós**' vor:

1. «Zwei neue *Lycoperdon*-Arten. Der floridaner Mycologe C. G. Lloyd sandte eine Sammlung von Pilzen behufs Determination Herrn Hollós; unter vielen anderen interessanten Arten fanden sich zwei neue, u. zw. *Lycoperdon pseudopusillum* Holl. (kommt ausser in Florida auch in Ungarn bei Brassó und Resicza vor) und *L. pseudoumbrinum* Holl. aus Süd-Carolina vor.

2. «Ueber die Hypogaeen-Pilze des Neograder Comitates». Enthält eine Anzal bemerkenswerter Entdeckungen.

Eugen Kümmerle spricht über die Denkschrift «Die bot. Abteilung des ungar. National-Museums», welche als Separat-Abdruck aus dem gelegentlich des 100-jährigen Bestandes des Mnseums, von den Beamten desselben redigierten Werke erschienen ist. Der botan. Teil hat die Herren Dr. Filarszky u. Dr. Bernátsky als Verfasser, welche die Entwicklung, Bereicherungen u. gegenwärtigen Stand der Sammlungen u. der Bibliothek behandelt; auch wird darin der verschiedenen Sammler, Schenker gedacht u. die Tätigkeit der bisherigen Custoden gewürdigt.

Desiderius Papp hält einen interessanten Vortrag über: «Beiträge zur Anatomie der Iris-Blätter», über welchen wir bei Gelegenheit referieren werden.

Karl Schilberszky hält einen Vortrag über «Neuere teratologische Fälle» (mit Demonstrationen).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1. Egy tenyésztett rózsavirág csészéjének levelei teljesen kifejlődött nyéllel és lemezzel ellátott lomblevelekké alakultak át.

2. Egy szőllőfürt főtengelye szalagalakban ellaposodott.

3. A *Tulipa Gesneriana* perigoniumának belső körében az egyik levél kettéválott, úgyszintén a porzók belső körében is az egyik porzó, így a 6 porzó helyett 7, a 6 perigoniumlevél helyett 7 fejlődött.

Thaisz Lajos: «Adatok Csongrád vármegye növényzetének ismeretéhez» című előadása folyamán Csongrád és Szentes városok határából 145-féle virágos növényt sorol fel. Ezek közül érdekesebbek a síki növények, mint pl. *Beckmannia erucaeformis* (L.), *Lepturus pannonicus* (Host.), *Camphorosma ovata* W. K., *Lepidium crassifolium* W. K., továbbá a *Cuscuta suaveolens* Ser. Ezen veszedelmes nagymagú aranka faj a szentesi lóheréseket pusztítja.

Schilberszky Károly jelentést tett a növénytani szakosztály mult évi működéséről.

Th.

1. Verwandlung der Kelchblätter einer cult. Rose in laubblätter mit vollkommen entwickeltem Blattstiel u. Spreite (Blättchen)

2. Verbänderung d. Hauptachse einer Weintraube.

3. Im inneren Kreise des Perigons einer Tulpe ist ein Perigonblatt gespalten, zugleich im inneren Kreise des Androeceums ein Staubfaden dedoubliert, es finden sich also anstatt 6 Staubgefässe 7 und statt 6 Perigonblätter deren 7 vor.

Ludwig Thaisz hält einen Vortrag über «Beiträge zur Flora des Csongráder Comitates», während welchem er 145 im Gebiete der Städte Csongrád u. Szentes beobachtete Phanerogamen erwähnt. Hervorzuheben sind die Natronpflanzen *Beckmannia erucaeformis* (L.), *Lepturus pannonicus* (Host.), *Camphorosma ovata* W. K., *Lepidium crassifolium* W. K., und das Vorkommen des gefährlichen Parasites *Cuscuta suaveolens* Ser. auf den Kleefeldern bei Szentes.

Zum Schlusse referiert **Karl Schilberszky** über d. Tätigkeit der botan. Section im vorigen Jahre. **Th.**

Meghalt. — Gestorben.

Számunk zártakor értesülünk **Freyn József** mérnök úrnak Prágában f. év jan. hó 16-án életének 57. évében történt gyászos elhúnytáról, kinek elvesztését bizonyára szíve mélyében

Zum Schlusse unserer Nummer erhalten wir die betrübende Nachricht vom Hinscheiden des Ingenieurs **Josef Freyn** (gestorben in Prag am 16. Januar l. J. im Alter von 57 Jahren), des-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 2

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának 1903 január hó 14-én tartott ülése. Sitzung dér botanischen Section der kön. ung. naturwissenschaftl. Gesellschaft am 14. Jänner 1903. 48-50