

In Istria: in insula Veglia ad Voss!

In Dalmatia ad Pago.

2. *S. orientalis* L. in ditioe Budae-Pestini sat frequens, Békás-Megyer, Brassoviae!!

In Serbia ad Zaječar (Ničić).

In Vestfalia: Annen (SCHEMMANN).

3. *S. Schkuhriana* RCHB. trichocarpa, in ditioe Budae-Pestini ubique sat frequens, ad Békás-Megyer, Kis-Terenne, Agriae, Károlyfalva cott. Temes. Rajecfürdő, Gánóc. Fenyőháza.

In Croatia litor.: Buccarizza!!

In Gallia: Arnas.

4. *S. Schkuhriana a/trichocarpa* circa Budam-Pestinum haud rara, Buda-Eörs. Békás-Megyer, Hidegkút, c. Pest, Nagy-Enyed (*Brassica* sive *Sinapis Borbásii* CSATÓ exsicc. a. 1879, ob siliquas rachi inflorescentiae + adpressas pro «*Brassica nigra* × *Sinapis arvensis*» indicata), Zimony, inter Syrina et Berszászka.

Sinapeos dissectae (cfr. M. B. L. 1902 p. 380) typus et var. *setocarpa* ad viam ferream novam prope Vésztő aug. anni 1891. mihi obvia fuit, anno 1894. iam territorium insalutatum reliquit.

S. foliosa SCHULT. Observ. 1809 p. 132 a d. d. GENERSICH accepta «rostro (siliquarum) obliquo ensiformi longissimo» (fere verba LINNAEI de *S. alba*) ad *S. albam* pertinere videtur, at folia superiora *hastata* minus in eam quadrat. - *S. foliosa* WILLD. Enum. pl. h. botan. Berolin. p. 688, eodem anno indicata, stylo longo «scaberrimo» ex Boiss. Fl. orient. I. 395 pariter ad *S. albam* pertinet.

Bryologiai jegyzetek.

Közlő: Györfly István (Kolozsvár).

A mult év nyarán oly szerencsés voltam, hogy hazánk, ez idő szerint, egyetlen bryologusával, PÉTERFI Márton úrral több —, rám nézve élvezetes és igen tanulságos — kirándulásra mehettem. Együtt tett excursióinkon igen sok új adatot találtunk. Pár ily érdekes, válogatott adat a következő. — Kimerítőbben majd egy más alkalommal.

Seligeria pusilla (EHRH.) BRYOL. EUR. cfr. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 108. Gyűjtöttük a *Kolozsvár*-tól nem messze levő u. n. «*Plecska*» völgyben, annak a katonai czéllövőházzal szemben fekvő egyik szakadékos helyén, kis csermely medrében levő mészkövekről (1902 jun.).

Ditrichum pallidum (SCHREB.) HAMPE cfr. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 119. sub *Leptotricho*. *Kolozsvár* vidéke, «*Bükk*»: a «*Peana*» [az EKE. «Árpád-csúcs» a) 836 m.]-ra vivő új erdei út mellett, kiszáradt agyagos. homokos árokparton, napos helyen elég

bőven. — Ugyancsak a *Peana*-ra vivő út mentén gyönyörű s nagy kiterjedésű

Catharinaea Haussknechtii (JUR. et MILDE) BROTHÉRUS gyepeket találtunk (1902 jul.). Ugyane — nemrégiben még alig pár termőhelyről ismert — szép mohát gyűjtöttük a *Topánfalva* melletti «Podur» fenyvesben 1902 május havában.

Magam szedtem **Catharinaea undulata** (L.) társaságában, melyek közé még **Pogonatum urnigerum** (L.) is keveredett, fenyvesben, **Baeomyces roseus** P.-tól egészen ellepott agyagos folt szélén, «Magura» (Kolozs m.)-ról «Holumbul» (1341 m.) illetve «Beles» faluhoz vivő utamban.*)

Topánfalva vidékén a «Lucsia» nevű barlanghoz menet mészkő-sziklarepedésekben pár kis **Myurella julacea** (VILL.) gypet szedtünk; ugyanott **Seligeria pusilla**-t is (1902 máj.).

Az Aranyos völgyében Offenbányáról Topánfalvára menet egyik — az út mellett felmeredő — kis sziklaodúba, barlangba felmászva, ott nagy örömünkre a zöldes-pirosas fényben csillogó protonema-val bíró, apró kis

Schistostega osmundacea (DICKS.)-t HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 162. szedtem sterilis állapotban, hol meglehetősen mennyiségben volt chloritos palán.

A legelterjedtebb májmohok közé tartozik a **Metzgeria furcata** L. Gyűjtöttem a «Hideg-Szamos» völgyében, «Olasztelep» tájékán, «Bethlen szikla»-nál, «Rekető»-nál (1902 máj.): «Retyeczeli vízesés» (Sikótorony)-nál (1902 szept.): «Ojtozi szoros»-ban **Isothecium myurum** (POLICH) cum fruct. (1902 aug.): «Vlegyásza» hegységben a «Valea Saca» völgyben (1902 szept.).

Neckera crispa (L.) HEDW. HAZSL. p. 211. Sziklafalakon kaptam a «Hideg-Szamos» völgyében; *Vlegyásza* hegység, «Intre Muntze»-n; *Retyeczai* hegység, a «Piatra Kolibbite»-n (Delma mare). Ez utóbbi helyen **Madotheca laevigata** DUMORT. társaságában.

Andreaea petrophila EHRH. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 269. Szedtük *Verespatak* környékén a «Cetate»-re menet «Kinyik» hegy oldalán mészsiklákon (1902. máj.).

Cum fruct. gyűjtöttem **Mnium undulatum** (L.) WEIS-ot *Kolozsvár* vidékén a «Hideg-Szamos» völgyében. Ugyancsak e völgy sziklafalairól a Hideg-Szamos jobb partján gyűjtöttünk sterilis

Amphidium Mougeotii (BRYOL. EUR.) SCHIMP. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 148. szép nagy gyepeket.

Pogonatum nanum NECK. *Lupény*—*Kimpulajnyág* falvak közt gyűjtöttem a «Muszt» nevű kaptatón, chloritos palán (inkább *Sericitis*!), hol bőven fordul elő (1902. jun. 23.).

Kolozsvár vidékén a «Hideg-Szamos» völgyben szép

*) Nem messze e helytől — mellékesen jegyzem meg — Erdély híres specialitása, a *Pulmonaria rubra* SCHOTT et KORSCHY virágzott a fenyves árnyas helyén *Symphytum cordatum* W. K. társaságában (1902 jun.).

Bartramia Halleriana HEDW. és **B. pomiformis** (L.) HEDW. gyepeket szedtem. Ez utóbbi nagy mennyiségben található *Kolozsvár* vidékén a «*Malom-völgy*»-ön átfolyó kis esermely mentén (1900—1901); továbbá a «*Vlegyásza*» hegység több helyén: «*Valea Saca*», «*Intre Muntye*» stb.

Catharinaea augustata BRID. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 196. szép gyepeit leltük a «*Hideg-Szamos*» völgyében, humuson (1902. júl. 11.), hol elég bőven vegetált e csinos kis moha.

Hedwigia albicans (WEB.) LINDB. var. d. **viridis** BRYOL. EUR. E tisztán csak levelei végén fehér, — egyebütt zöld — mohát a «*Hideg-Szamos*»-on s *Tusnád*-ról a «*Szent-Anna*» tavához menet gyűjtöttem (1902 aug.). Ugyancsak a «*Hideg-Szamos*»-nál gyűjtöttük a

Cinclidotus fontinaloides (HEDW.) PAL. BEAUV. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 134. szép példáit (1902. júl. 11.).

Fontinalis antipyretica L. HAZSL. p. 202. Bihar m., *Remecz*, «*Valea Lupului*» völgyben 1902 ápr. 10. gyűjtötte WALZ Lajos.

Fissidens taxifolius (L.) HEDW. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 106. Nedves talajon, a «*Hideg-Szamos*» völgyében gyűjtöttem 1902 aug. hónapban.

Ulotia americana (P. BEAUV.) Mitten. «*Hideg-Szamos*» völgyében mészsíklákon gyűjtöttük (1902 júl. 11.).

Bryologische Notizen.

Mitgeteilt von István Györffy (Kolozsvár).

Im Sommer des vorigen Jahres hatte ich das Glück, mit dem einzigen Bryologen Ungarns, Herrn Márton PÉTERFI, mehrere — für mich genussreiche und sehr lehrreiche — Ausflüge machen zu können. Auf diesen Excursionen haben wir sehr viele neue bryologische Daten gesammelt. Einige Interessantere mögen schon jetzt veröffentlicht werden. — Ausführlicheres soll bei einer anderen Gelegenheit folgen.

Seligeria pusilla (EHRH.) BRYOL. EUR. cfr. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 108. Sammelten wir in dem, von *Kolozsvár* nicht weit gelegenen sogenannten «*Plecska*»-Thal, an einer der militärischen Schiessstätte gegenüber liegenden Stelle, auf Kalksteinen die in einem Bächlein lagen (1902. Juni).

Ditrichum pallidum (SCHREB.) HAMPE. cfr. HAZSL. Magy. bir. mohfl. p. 119. sub.: *Leptotrichum*. Umgebung von *Kolozsvár*, «*Bükk*»; ziemlich häufig auf sonnigen Stellen, am ausgetrockneten, lehmigen, sandigen Ufer eines Grabens, neben dem neuen Waldweg, der auf die «*Peana*» (836. M. [die «*Árpád-Spitze*» des Siebenbürgischen-Karpathen-Vereins]) führt. — Gleichfalls neben diesem Weg fanden wir Prachtrasen von

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Györfy Stephan [István]

Artikel/Article: [Bryologiai jegyzetek. 146-148](#)