

més alakjának feleltek meg. Bimbóalakúan megrövidült s felfűjt (valószínűleg *Dipterocecidium*-okozta) pártát a *Medicago sativán* találtam 1899-ben, Salurn mellett, 1902-ben *Vicia Cracca*n Seefeld mellett (Innsbruck közelében), ezenkívül gyakrabban láttam még e különben általánosan ismert megfelelő koresképződményt Innsbruck mellett a *Lotus corniculatus*-on Végül megemlítem, hogy a *Scorzonera austriaca*-t Vela felett Trient mellett az utolsó években többnyire egy cecidium-okozta bunkóalakúan megvastagodott szárral találtam.

Murr J.

Medicago sativa bei Salurn, 1902 an *Vicia Cracca* bei Seefeld nächst Innsbruck, ausserdem mehrfach bei Innsbruck und anderwärts die auch sonst allgemeiner bekannte entsprechende Bildung von *Lotus corniculatus*. Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass ich *Scorzonera austriaca* über Vela bei Trient in den letzten Jahren zum grossen Teile mit durch ein *Cecidium* keulenartig angeschwollenen Blütenschäften traf. J. Murr.

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.*)

Referate über ungarische botan. Arbeiten.**)

Borbás V. «*Lavatera*-virág csak mályva». («A Kert» [1903.] 640. l.) A *Lavatera* a mályvától csak annyiban különbözik, hogy a *Lavatera* külső kelyhe 3 metszetű, míg a mályváé 6—9 metszetű. Szerző szerint, mivel a kehely inkább az önfenntartó részekhez tartozik, semmint a szaporodó részekhez, tehát génusznak megkülönböztetésére alapúl nem szolgálhat. Egyéb elkülönítő bélyegek hiánya folytán legfeljebb *allem*-ről lehetne szó s mint ilyen az *Althaea* génusz alá sorolandó.

Borbás, V. v. «*Lavatera* ist nur eine Malve». («A Kert» 1903 p. 640.) Die Gattung *Lavatera* unterscheidet sich von *Althaea* nur dadurch, dass der Hüllkelch der *Lavatera* dreispaltig, jener der *Althaea* aber 6—9-spaltig ist. Da der Kelch eher den vegetativen Organen zuzuzählen ist, als den Fortpflanzungsorganen, sind die Unterschiede desselben nach Auffassung des Verf. zur Gattungsunterscheidung nicht geeignet. Wegen Mangel anderer Gattungsmerkmale ist *Lavatera* höchstens als Untergattung der Gattung *Althaea* zu betrachten.

*) Tisztelt. tittel felkérjük a t. szaktársakat, hogy megjelent b. dolgozataikat ismertetés céljából szerkesztőségünkhöz (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b) beküldeni sziveskedjenek.

**) Wir ersuchen unsere geehrten Herren Fachgenossen um Einsendung ihrer neu erschienenen Arbeiten behufs Referatos an die Redaction des Blattes (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b).

Mágócsy-Dietz Sándor: A diófa egy ritka rendellenesége. Természettud. Közl. 1903. 625—627. old. Egy ábrával.

Egy rendellenes diófavirágzat leírása, mely feltűnően megnyúlt volt s mindkét ivarú virágot tartalmazott.

Borbás V.: Fias burgonya. Természettud. Közl. 1903. 627—629. old. Egy rajzzal.

Leírása egy fias burgonyának, melynél a burgonyafiók az anyatestbe nőtt bele.

Schilberszky Károly: A levélszervek számbeli ingadozásáról, különös tekintettel a virágok morphologiai és phylogeniai viszonyaira. Math. és term. értesítő XXI. 3. füz. Budapest. 1903. 14 rajzzal.

A szerzőnek előkelő előadásban írt teratologiai tanulmánya, mely tárgyalja a *Phaseolus vulgaris* L. *nanus*-nál előforduló polycotyledoniát s 3 elsődleges levél megfigyelt fellépését, a *Syringa vulgaris* kerti változatainál előfordulni szokott háromtagú örvöket, a *Phaseolus vulgaris* csirázó növényeinél észlelt terminális leveleket, egy esetben 5 levélkével, a *Dianthus collinus*-nak négylevelű örvét, a *Fragaria vesca* 4—5 osztatú leveleit, egy *Aesculus Hippocastanum* levelet 8 levélkével, melynél a csúcs-levéltre azonfelül meghasadt, egy *Diplotarix* t s egy *Erysimum canescens*-t, melyeknél a termés 4 termőlevélből keletkezett, egy *Aesculus Hippocastanum*-ot, melynek vi-

A. Mágócsy-Dietz: Eine seltene Abnormität des Nussbaumes. Természettud. Közl. 1903 p. 625—627 mit Abbildung.

Beschreibung einer Abnormität eines Nussbaumb Blütenstandes, welcher auffallend verlängert war und Blüten beiderlei Geschlechtes aufwies.

V. v. Borbás: Proliferierende Kartoffel. Természettud. Közl. 1903 p. 627—629. Mit einer Abbildung.

Beschreibung einer Kartoffel, bei welcher die knollige Proliferation in das Innere der Mutterknolle eingedrungen war.

Karl Schilberszky: Ueber die numerischen Schwankungen der Blattorgane mit besonderer Berücksichtigung der morpholog. u. phylog. Verhältnisse der Blüten. Math. term. értes. XXI. 3. Heft. Budapest 1903. Mit 14 Abbildungen.

Im bekannten eleganten Stile des Verf. geschriebene teratologische Studie über Polycotyledonie u. Auftreten von 3 Primordialblättern bei *Phaseolus vulgaris* L. *nanus*: Auftreten von 3-gliedrigen Wirteln bei Gartenvarietäten von *Syringa vulgaris*: Auftreten von Terminalblättern bei Keimpflanzen von *Phaseolus vulgaris*, in einem Falle mit 5 Blättchen; Auftreten eines vierblättrigen Wirtels bei *Dianthus collinus*; 4 und 5-teilige *Fragaria vesca* Blätter; *Aesculus Hippoc.* Blatt mit 8 Blättchen und gleichzeitiger Spaltung des Terminalblättchens; 4 fruchtblättrige Frucht bei *Diplotarix* u. *Erys. canescens*; durch Staminopetalodie u. Dedoublement entstandene ge-

rágai staminopetalodia és megkettőzés folytán teljessékké lettek, kéttagú *Colchicum autumnale* és *arenarium* virágot, melyek két termőlevélből keletkezett termést hoztak, a *Tulipa Gesneriana* belső hínkörénél észlelt soktagúságát, továbbá ugyanemek 4 tagú virágját, a *Gagea arvensis* virágrendellenességeit, az *Iris germanica* és *I. Kaempferi* 2 és 4 tagú virágját s az *Iris squalens* 4 tagú virágait, a *Crocus vernus* dimer virágját s a külső lepelleveleknek teljes cohäsióját s végül porzónélküli virágját, az elzöldült *Bunias orientalis* virágjának rendellenességeit, a *Parnassia palustris* kehelyleveleinek petalodiáját a 6-ik állhím kifejlődésével, a *Capsicum longum* és *Atropa Belladonna* kehelyleveleinek gyakori pleiophylliáját s előbbinek 3—4 termőlevélből keletkezett termését, a *Fuchsia* virágjának 3—5 tagúságát s a *Cyclamen persicum* 4—6—7 tagúságát.

füllte Blüthen bei *Aesculus Hippocastanum*; dimere *Colchicum autumnale* u. *arenarium* Blüthen, welche zwei carpellige Früchte erzeugen: Polymerie des inneren Stanbblatt-Kreises, ferner tetramere Blüte bei *Tulipa Gesneriana*; Blütenabnormitäten bei *Gagea arvensis*; di- u. tetramere Blüthen bei *Iris germanica* u. *I. Kaempferi*; tetramere Blüthen bei *Iris squalens*; dimere Blüthen ferner vollständige Cohäsion der äusseren Perigonblätter und antherenlose Blüthen bei *Crocus vernus*; Blütenabnormitäten bei vergrünemtem *Bunias orientalis*; Petalodie der Kelchblätter bei *Parnassia palustris* mit Entwicklung des 6. Staminodinus; häufige Pleiophyllie der Kelchblätter bei *Capsicum longum* u. *Atropa Belladonna*, 3—4—5 fruchtblättrige Frucht bei ersterem; Tri-, Pentamerie u. andere Abnormitäten der *Fuchsia*-Blüthen; Tetramerie, Hexamerie u. Heptamerie der Blüthen von *Cyclamen persicum*.

A kir. magy. Term.-tud. Társ. növénytani szakosztályának
1903 október hó 14-én tartott ülése.

Sitzung der botanischen Section der kön. ung. naturwissenschaftl. Gesellschaft am 14. October 1903.

Kümmerle Jenő: «A *Waldsteinia trifolia* Roch. új termőhelye.»

Scherffel Aladár: «Újabb adatok Magyarhon alsórendű szervezetének ismeretéhez.»

Szécskay István: «Óriás növényű mogyorófa (*Corylus Avelana* L.)» című dolgozatát ismer-

E. Kümmerle spricht über einen neuen Standort der *Waldsteinia trifolia* Roch.

Aladár Scherffel hält unter dem Titel: «Neuere Beiträge zur Kenntniss der niedrigen Organismen Ungarns» einen Vortrag.

Karl SCHILBERSZKY legt eine Arbeit Stefan Szécskay's «Ue-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Hazai botanikai dolgozatok ismertetése. Referate über ungarische botan. Arbeiten. 305-307](#)