

tam még az igen megnyúlt, csipdelkélts rövid és tonipalebenyes tőlevelein is. Egy a közelben nőtt másik tő, melyen az elsatnyúlt beczőkék mellett néhány teljesen normálisan fejlődött is volt, világosan mutatta, hogy e növény nem egyéb, mint egy a termőhely szokatlan szárazsága által előidézett abnormitás, itt tehát a valószínű fajvegyütléknek, a *C. gracilis* G. G.-nek majmolása van jelen; ezen nézetemet MAGNUS berlini tanár is osztja, a kinek a növényt esetleges gombafertőzés megállapítása végett megküldöttem.

Valószínűnek tartom ellenben a *Cystopus candidus* befolyását egy oly alaknál, melyet S. Martino (Trient) mellett az út kavicsán szedtem: var. *lepidioides* m., mert hasonló példái, melyek közelében nőttek, erősen fertőzve voltak. Ezen alakot jellegzi, hogy termete általában a *Lepidium campestre*-éhez hasonló, szára heverő, felső részében röviden ágas, levele csipdelkélts, fürtje igen sűrű, tetején kerekített, beczőkéje közepes nagvságú, szélesen szívalakú, meglehetősen felfűjt, olajbogyószínű-zöld, szirma sokáig megmarad és éppen úgy mint barnás csészéi a már kifejlődött beczőkétől élesen elüt: sűrű termésfürtje ezen sajátosságos színvegyütlék miatt majdnem a rezedára emlékeztet.

Trient, 1903. decz. hó 1-én.

Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

Mi a *Hesperis dauriensis* Amo? Ezen név, mely WILLK. és LANGE Prodrömusa (III. 794), NYMAN Consp. (Suppl. II. 24.) végül BORRÁS *Hesperis*-monographiája (M. B. L. I. 268. 374) révén került az európai növények névsorába, GANDOGER vizsgálatai szerint (Bull. de la soc. bot. de France 1903, 466—468), a kinek alkalmá volt a granadai egyetemen őrzött Amo-féle eredeti növényt megvizsgálni, nem egyéb, mint az *Arabis verna* R. Br.

Nem csoda, hogy a tökéletes leírás az eredeti példa megvizsgálása nélkül nem engedte megfejteni e növényt, WILLK. és LANGE, továbbá BORRÁS is idéző jelek között vették fel diagno-

Was ist *Hesperis dauriensis* Amo? Dieser Name, welcher durch WILLK. u. LANGE's Prodrömusa (III. 794), NYMAN's Conspect. (Suppl. II. 24.) endlich BORRÁS's *Hesperis* Monographie (Ung. bot. Bl. I. 268. 374) in die Reihe der europäischen Pflauzen gelangt ist, ist nach GANDOGER (Bull. de la soc. bot. de France 1903, 466—468), welcher Gelegenheit gehabt hat, das im Herbar der Universität zu Granada liegende Original-Exemplar Amo's zu untersuchen, nichts anderes als *Arabis verna* R. Br.

Es ist nicht zu wundern, dass nach der unzulänglichen Beschreibung niemand im Stande war, ohne das Orig.-Ex. zu sehen — die Pflanze zu erkennen. WILLK. u. LANGE, ferner BORRÁS

zisát a *Hesperisek* között, úgy látszik, hogy már ők is kételkedtek benne. **Degen.**

Trapa natans L.-t Budapest jól átkutatott környékén eddig még senki sem találta meg. Ez év nyarán elég nagy mennyiségben találtam e hazánkban mindinkább ritkuló növényt a soroksári Duna-ágban Erzsébetfalva mellett, ott, ahol a töltés illetőleg híd átvisz a Csepel-szigetre. Bizonyára csak a legújabb időkben telepedhetett itt meg. **Augusztin Béla.**

üibernahmen in Diagnose mit Anführungszeichen, es scheint also, dass auch sie schon der Sache nicht recht getraut haben.

Degen.

Trapa natans L. bei Budapest Diese in unserem Lande immer seltener werdende Pflanze wurde in der gut durchforschten Umgebung unserer Hauptstadt noch nicht beobachtet. Im Sommer l. J. traf ich sie im soroksärer Donauarm nächst Erzsébetfalva an der Stelle, wo der Damm resp. die Brücke zur Insel Csepel führt. Sie muss sich dort erst in jüngster Zeit angesiedelt haben. **Béla Augusztin.**

Hazai botanikai dolgozatok ismertetése.*)

Referate über ungarische botan. Arbeiten.**)

Pantocsek József dr. «Beschreibung und Abbildung der fossilen Bacillarien des Andesittuffes von Szliács in Ungarn. Pozsony, 1903. 20 S. mit 68 Figuren auf 2 Tafeln.

Felsorolása, ill. leírása 62 foszszil *Bacillariá*-nak, melynek legnagyobb része új faj, fajta ill. alak. Három új faj az ujonnan felállított *Széchenya* nemet képviseli. A következő új fajok ill. alakok leírását tartalmazza:

Aufzählung resp. Beschreibung von 62 fossilen Bacillarien, deren grösster Teil neue Arten, Varietäten resp. Formen darstellt. Drei neue Arten repräsentieren die neu aufgestellte Gattung *Széchenya*. Neu beschriebenen sind:

Cymbella austriaca GRUN. var. *tumida*, *C. grata*, *C. lanceolata* E. var. *densestriata* *C. sliacensis*, *Encyonema caespitosum* KG. var. *fossilis*, *Stauroneis Phoenicenteron* E. var. *angustior*, *Navicula fallax*; *N. Legumen* (E.) VAN H. var. *staurophora*, *N. Csaszkaue*, *N. Haueri* GRUN. var. *angustior*, *N. Addae*, *N. Filarszkyi*, *N. arata* GRUN. var. *validior*, *N. viridis* (NITZSCH.) KG. var. *pachyptera* PANT. f. *interrupta*, var. *parallelestriata* PANT. f. *staurophora*, *N. arata* GRUN.

*) Tisztelettel felkérjük a t. szaktársakat, hogy megjelent b. dolgozataikat ismertetés céljából szerkesztőségünkhez (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b) beküldeni sziveskedjenek.

**) Wir ersuchen unsere geehrten Herren Fachgenossen um Einsendung ihrer neu erschienenen Arbeiten behufs Referates an die Redaction des Blattes (Budapest, VI., Városligeti fasor 20/b).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Degen Árpád von, Augusztin Bela

Artikel/Article: [Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 346-347](#)