

Alectoriae nonnullae novae vel minus cognitae.

Auctore: **V. Gyelnik** (Budapest).

Die folgende Enumeration ist eine Ergänzung meiner „Alectoria Studien.“ Alle besprochenen Exemplare sind (jedes Stück in zwei Teile geteilt) im Herbar meines Freundes F. FÓRISS (Miskolc in Ungarn) und im Herbar der Botanischen Abteilung des Ungarischen National Museums (Budapest) niedergelegt. Den Text der Etiketten führe ich wörtlich an.

*

A. bicolor (EHRH.) NYL. f. n. **tenuissima** GYELNIK. — Oberhalb Rantenkranz i. Vogland auf sonnigen Granitfelsen, auf *Marsupella* spec. ca. 650 m. (SPIN . . . , sub *Alect. bicol.* no. 3723). Rami thalli breves, ad 10 mm longi, tenuissimi. In ceteris ut in f. *melaneira* (ACH.) NYL.

A. chalybeiformis (L.) RÖHL. f. n. **bükensis** GYELNIK et FÓRISS. — Hungaria. Montes Bükk, Hámor: in jugo montis Delkahegy, ad truncos siccos Quercus, alt. 470 m. s. m. (FÓRISS, no. 6382). — A f. *intricante* VAIN. differt thallo in sorediis ramulis adventivis tenuibus (circ. 3—4 mm longis) dense instructo.

A. cincinnata (E. FR.) LYNGE. — Fennia. Kl., Kurkijoki, Lapinlahti Ristosaari, in rupibus (RÄSÄNEN, sub *Alect. sarm. v. cincinn.* no. 6902); Germania, Schwarzwald: Feldberggebiet, 1300 m. Wälder beim Notschrei (VOIGTLÄNDER-TETZNER, sub *Alect. sarm.* no. 596.)

A. csarnagurensis GYEL. f. n. **subolivacea** GYELNIK et FÓRISS. — Hungaria. In schistosis m. „Surián havas“ prope Kudsir (Com. Hunyad, ca. 1900 m. s. m. (FÓRISS, no. 1961, sub *Alect. bicol.* — Thallus fuscus.

A. csarnagurensis GYEL. f. n. **grisea** GYELNIK et FÓRISS. — Hungaria. In cortice Fagi ad Cultul Marului in montibus Kudsiri Havasok (Com. Hunyad), c. 1000 m. (FÓRISS, no. 2246, sub *Alect. jub. v. chalyb.*) — Thallus griseus vel pallido-griseus.

A. Fórisii GYELNIK n. sp. — Hautes Pyrénées (A. F. JEANJEAN, sub *Alect. impl. v. cana*). Hungaria. Com. Vas, ad corticem Pini in silvis, pr. pag. Drumoly, alt. ca. 400 m. (FÓRISS sub *Alect. impl.* no. 4179). — Thallus pendulus, 15—20 cm. longus, osteolus vel osteolo-griseus, esorediosus, K⁺ flavus demum plusminusve rubescens, KC⁺ ruber. Sterilis. Pseudocyphellae et rami adventivi desunt. — Similis *Alectoriae Degenii* SZAT., sed thallus non viridescens vel luteolo-viridescens sed osteolus. Subsimilis

Alectoriae implexae (HOFFM.) RÖHL. sed thallus osteolus non alius. — Ab *Alectoria Kümmerleana* GYEL. differt thallo KC+ rubro. — Ab *Alectoria Haynaldii* GYEL. differt thallo KC+ rubro et K+ flavo, demum plus-minusve rubro, etc. — Ab *Alectoria subcana* (NYL.) GYEL. differt thallo esoredioso, KC+ et K+, etc. — Ab *Alectoria Ostrobotniae* GYEL. differt thallo esoredioso.

A. fuscescens GYEL. — Fennia. Ob., Simo, Koivulla (RÄSÄNEN, sub *Alect. impl. f. setae*. no. 6767 in herb. Föriiss, Miskole).

A. jubata (L.) ACH. var. *prolixa* ACH. — Hautes Pyrénées (JEANJEAN, sub *Alect. jub. f. soled.* 2666) .

A. ochroleuca (HOFFM.) MASS. f. *tenuior* CROMB. — Suecia. Jemtlandia, Sundsvalen, 700 m. s. m. (DU RIETZ, sub *Alect. ochr. v. rigid.* no. 3714.

A. Ostrobotniae GYELNIK n. sp. — Finlandia, Ob., Simo, Kuusella (RÄSÄNEN, sub *Alect. impl.* Spec. orig. sub no. 6774.) — Thallus pendulus, circ. 20 cm longus, osteolus (osteolo-pallidus), K+ lutescens demum plus-minusve rubescens. KC+ ruber, solediosus, solediiis maculiformibus, rotundatis subrotundatisve, albidis, granuloso-pulverulentis, lateralibus instructus. Pseudocyphellae et rami adventivi desunt. Sterilis. — Similis *Alectoriae viridescenti* GYEL. (var. *pendulae* GYEL.) sed thallus non viridis vel viridescenti-luteus sed pallido-osteolus. — Subsimilis *Alectoriae canae* (ACH.) LEIGHT., sed thallus osteolus non alius. — Ab *Alectoria Kümmerleana* GYEL. differt thallo soledioso et KC+ rubro, non KC—. — Ab *Alectoria osteola* GYEL. differt thallo KC+ rubro, non KC—, etc. — Ab *Alectoria subcana* (NYL.) GYEL. differt thallo KC+ rubro et K+, non K—, etc. — Ab *Alectoria Föriissii* GYEL. differt thallo soledioso.

A. simplicior (VAIN.) LYNGE f. *lapponica* GYEL. Suecia. Härjedaltn, Fjällnäs (VRANG, sub *Alect. nidul. v. simpl.* no. 2618.)

A. subcana (NYL.) GYEL. — Fennia. Kl., Kurkijoki, Särkjärvi, in *Betula odor.* (RÄSÄNEN, sub *Alect. prolix.* no. 6934.)