

## Újabb adatok Sopronvármegye flórájához. Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Sopron.

Irta } Kárpáti Zoltán dr.  
Von : }

Sopronvármegye területén 1928-tól 1931-ig végzett gyűjtéseimet, melyek eredményét az „Annales Sabarienses: Folia Musealia“ I. füzetében (1932) már ismertettem, az 1932. évben is folytattam.

Kirándulásaim, amelyeket részben mint DR. JÁVORKA SÁNDOR nemzeti múzeumi osztályigazgató úr és DR. GOMBÓCZ ENDRE egyet. magántanár, múzeumi igazgatóőr úr kísérelője tettem, következő eredménnyel jártak:

*Nephrodium austriacum* (JACQU.) FRITSCH a Sopronbánfalva és Brennbergbánya között húzódó „Tolvajárok“ nevű mély, szakadékos völgy fenyvesében is előfordul. GOMBÓCZ csupán a Lajtahegységéből közli. (Sopronvármegye növényföldrajza és flórája 1906, p. 176.)

*Lycopodium annotinum* L. A Rozáliakápolna és Fraknóvára (= Schloss Forchtenstein) közötti lejtőn lévő irtásban, fiatal lucfenyők, nyirfák, *Calluna* stb. társaságában igen bőven fordul elő. Ezt a magasabb hegyvidéki növényt a magyar noricumtól mindaddig nem ismertük.

*Lycopodium complanatum* L. Az előbbivel nő, szintén igen bőven. A szomszédos Vas megye hegyvidékén több pontról ismeretes; így Velem mellett a Hosszúvölgyből (WAISBECKER: Kőszeg és vidékének edényes növényei. 1891, p. 9), Bozsok mellett a Kalaposkőről (GAYER: Új adatok Vasvármegye flórájához II. Ann. Sabar. III. 1929, p. 71.), Felsőörről (GAYER: Új adatok Vasvármegye flórájához III. Ann. Sabar.: Folia Musealia I. 1932, p. 9), de mindenütt csak igen gyéren. Ez az adat tehát nemcsak azért érdekes, mivel Sopron megyére új, hanem ennek az egyébként igen gyéren előforduló növénynek nagyon gazdag termőhelye. Az itt gyűjtött példányok mind a *var. anceps* WALLR.-nak felelnek meg, éppen úgy, mint az összes magyarországi példányok, míg másik alfaja, a *var. Chamaecyparissus* hazánkban még nem került elő. Ez a körülmény meg is felel ezen két alfaj külföldi elterjedésének, mert míg az előbbi az Alpokban és a Kárpátokban mindenütt előfordul s így Magyarország területére is átlép, addig az utóbbi hozzánk legközelebb Németországban, Csehországban, Tirolban, Salzburgban és Karinthiában honos, tehát a mi területünket sehol sem érinti. (HEGI: Illustr. Flora v. Mitteleuropa I. p. 68.)

*Leersia oryzoides* (L.) Sw. A Rákospatak mentén, Fertő-rákostól egész a Fertőtőig meglehetősen bőven terem. Sopron-megye hegyvidékéről csak Kismarton mellől volt közölve (WALLNER: Sopron környékén található virágos növények és edényes cryptogamok. 1903, p. 21, GOMBOCZ l. c. p. 59, K. PILL: Die Flora des Leithagebirges und am Neusiedlersee. 1916, p. 44), míg a síkságról KORNUBER nyomán GOMBOCZ közli (l. c.).

Különösen érdekes florisztikai szempontból a „Tödl“ nevű völgy, amely Ágfalva és Brennbergbánya közt húzódik Lépesfalva irányában. Itt elsősorban a völgy alján elterülő, nedves, szakadékos erdő érdemel különösebb figyelmet, mivel igen gazdag montán elemekben. Ezek közül feltünőbbek a következők:

*Veratrum album* L. var. *Lobelianum* BERNH. A völgyön végigfolyó Rákpatak mentén. A megyére új.

*Betula pubescens* EHRH. A völgy alján, a patak mentén bükkal és gyertyánnal keveredve s itt-ott önálló csoportokat is alkotva, főleg a Vadászház környékén gyakori. Sopron mellett GAYER gyűjtötte (JÁVORKA: Magyar flóra 1925, p. 1282).

*Hypericum maculatum* CR. var. *Desetangsiiforme* FRÖHLICH. Az erdőszéli cserjésben. Ez a növény úgy morfológiailag, mint földrajzi elterjedés szempontjából az alacsonyabban honos *H. perforatum* és a magasabb hegyvidéken termő *H. maculatum* között áll. A nyugati határon eddig csak Zala- és Vas megyéből ismertük, (JÁVORKA: M. F. p. 1287) de ez az új termőhely elterjedési vonalát most észak felé egész Sopron megyéig egészíti ki.

*Pleurospermum austriacum* (L.) HOFFM. A völgy alján, nedves, szakadékos helyeken elég bőven terem. A Dunántúlról eddig csak Vas megyéből ismertük (WAISBECKER: l. c. p. 45).

*Cirsium Erisithales* (JACQ.) SCOP. Az erdő szélén helyenként tömegesen nő. Ez a növény csak legújabbán került elő Sopron-megyéből, az alsóausztriai határ melletti Szikra közeléből, néhány példányban. (KÁRPÁTI: Adatok Sopronvármegye flórájához. Ann. Sabar.: Folia Musealia 1. 1932, p. 6.) Ez az előfordulása azonban a határtól sokkal beljebb van s az előbbinél jóval bővebb.

(A Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztályának 1932. évi október hó 13-án tartott 352. üléséből)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Karpati Zoltan

Artikel/Article: [Neue Beiträge zur Kenntnis der Flora des Komitates Sopron 105-106](#)