

Legészakibb termöhelye Pečnik, legnyugotibb Laginatz, legkeletibb s délibb a Sveto Brdo. Legalacsonyabb termöhelye Pečnik 350 m., a legmagasabb Malovan (Debelo brdo) kb. 1700 m. Tulajdonképeni előfordulási helye az 1250 és 1600 m. közé eső régió.

Die Standorte der *Primula Kitaibeliana* Schott.

Von Ludwig Rossi (Karlovae).

In den bot. Werken findet man über diese hübsche Primel schon etliche Angaben. KITABEL hat sie auf dem Velebit: Samar, Visočica, Badanj und Debelobrdo als *Primula viscosa* KIT. gesammelt. (NEILREICH Veget. Verh. von Croatien p. 143.) SCHOTT erwähnt sie im Allgemeinen: «habitat in alpinis et subalpinis Croatiae.» (Oest. bot. Wochenblatt II. p. 268) In der Flora croatica p. 706 kommt dazu noch KLEK und KERNER hat sie von der Schlucht Pečnik bei Ogulin und vom Berge Laginatz (rectius Alaginac) bei Oštarije ausgegeben. (Schedae IV. p. 51).

Ich habe diese Primel zuerst am 24. April 1880 in voller Blüthe in der Schlucht Pečnik bei Ogulin entdeckt und an VUKOTINOVIC in Agram mitgetheilt, der sie nachher in grösserer Menge für die Flora exsiccata Austro-hungarica an KERNER einsandte. Am 30. Mai 1889 fand ich diese interessante Pflanze auf der Südseite des Klek, aber bereits verblüht. Lange Jahre hindurch fand ich auf meinen bot. Excursionen keine *Pr. Kitaibeliana*.

Erst im Jahre 1896 als ich zum erstenmal den Velebit besuchte, mehrten sich die Standorte der erwähnten Pflanze. Vom nördlichen Theile des Velebit nenne ich die Standorte: Ljubić-kobrdo gesammelt 11. VII. und Laginatz 12. VII. vom südlichen Theile: Sladovača, Vorsprung gegen die Strasse Gospić-Karlobago 9. VII. und Sv. Brdo 6. VIII. VISIANI (Fl. Dalmat. II. 149.) nennt sie *Pr. integrifolia* L., was falsch ist, denn sie ist eine echte *Pr. Kitaibeliana*. Bei meinem zweiten Besuche des südlichen Velebit im Jahre 1901 sind die Standorte erheblich gestiegen. Ich notire sie von Osten gegen Westen: Voralpe Vukotinovac 1658 m. westlich von Sv. Brdo, Uebergangsstrecke Solila, östlich von Malovan 1708 m., beide am 21. VII. gesammelt; Malovan 1708 m. vom 22. VII., Golić 1735 m. westlich vom Vaganskivrh, Malovan (Debelobrdo) 1738 m., Gebirge zwischen Babino jezero und Višerujna, alle drei vom 27. VII., Badanj und Buljba südöstlich von Višerujna 28. VII., Višerujna 1623 m. vom 26. VII. und Visočica 1. VIII.

Die Strecke zwischen Visočica und Sladovača habe ich noch nicht untersucht, glaube aber, dass die erwähnte Primel, ausser auf dem Samar, noch auf anderen Spitzen zu finden wäre.

Somit hätten wir bis nun 17 verbürgte Standorte dieser Pflanze, von denen, ausser vom Berge Samar, die Belege in meinem Herbare niedergelegt sind.

Auf den Spitzen des nördlichen Velebit: Šatorina, Rajinac, Velebit Pliešivica, Snježnjak, sowie auf der Kapela, Bielolasica, Bitoraj, Risnjak etc. wurde *Pr. Kitaibeliana* weder von mir gefunden, noch erwähnt sie Jemand von dortselbst.

Auch auf der Pliešivica bei Korenica, sowie auf dem Verbindungszug derselben mit dem Velebit: Brusnić 1373 m., Ozeblin 1657 m., Rudilisac 1611 m., Kremen 1591 m. und Poštak 1425 m. habe ich keine Spur von ihr gefunden; auch fehlt sie auf dem Crnopac 1404 m. des südlichen Velebit.

Aus dem obenangeführten erhellt, dass *Pr. Kitaibeliana* hauptsächlich ihren Sitz im Velebite und zwar im mittleren Theile desselben, nämlich zwischen Oštarija und Halan, hat. Die Fundorte bei Pečnik und auf dem Klek stehen vereinzelt da.

Noch muss ich erwähnen, dass die Standorte gewöhnlich auf der nördlichen, zerissenen, felsigen Abdachung zu treffen sind, und es war mir desshalb auffallend, diese Pflanze auf der gegen Süden gewendeten Seite des Klek gefunden zu haben.

Der nördlichste Standort ist Pečnik, der westlichste Laginatz, der östlichste und südlichste Sv. Brdo.

Der niedrigste Standort Pečnik 350 m., der höchste Malovan (Debelobrdo) etwa 1700 m.

Der eigentliche Wohnsitz die Höhen zwischen 1250—1600 m.

Bryologiai közlemény. — Bryologische Mittheilungen.*)

Irta: (Péterfi Márton (Déva).
Von: (

Hunyadmegye különböző pontjain gyűjtött *Bryum*-fajaimat átvizsgálván, a közönségesebb fajok mellett ritkábbakra is akadtam. A figyelemreméltóbb adatokat a következőkben közlöm, megjegyezvén, hogy e fajokban felette gazdag nemből több példám van, melyek külföldi anyaggal nem lévén még összehasonlítva, kétesek. Ezeket e sorok keretébe nem vettem fel.

Bryum inclinatum (Sw.) *Br. eur.* fasc. 6/9. p. 17. (1839.) Terem gypes helyeken Szászváros körül és mészkösziklákon Boicza mellett.

Bryum uliginosum (BRUCH.) *Br. eur.* l. c. p. 18. Forrásos helyeken nő a nagyági Hajtóhegyen.

Bryum torquescens *Br. eur.* fasc. 6/9. p. 49. (1839.) A dévai Várhegyen évek óta állandóan észlelem.

Bryum pallescens SCHLEICH. *Crypt. exs. Helv.* no. 28. Régi kőfalon szedtem Felsőcsertés mellett.

Bryum capillare L. *Sp. pl.* p. 1586. (1753.) Közönséges; igen feltűnő egy fán lakó alakja. Fűzfák korhadékos hasadékaiban

*) Die Standorte sind aus dem ung. Texte leicht zu entnehmen. Red.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Rossi Ludwig

Artikel/Article: [Die Standorte der Primula Kitaibeliana Schott. 115-116](#)