

Auf den Spitzen des nördlichen Velebit: Šatorina, Rajinac, Velebit Pliešivica, Snježnjak, sowie auf der Kapela, Bielolasica, Bitoraj, Risnjak etc. wurde *Pr. Kitaibeliana* weder von mir gefunden, noch erwähnt sie Jemand von dortselbst.

Auch auf der Pliešivica bei Korenica, sowie auf dem Verbindungszug derselben mit dem Velebit: Brusnić 1373 m., Ozeblin 1657 m., Rudilisac 1611 m., Kremen 1591 m. und Poštak 1425 m. habe ich keine Spur von ihr gefunden; auch fehlt sie auf dem Crnopac 1404 m. des südlichen Velebit.

Aus dem obenangeführten erhellt, dass *Pr. Kitaibeliana* hauptsächlich ihren Sitz im Velebite und zwar im mittleren Theile desselben, nämlich zwischen Oštarija und Halan, hat. Die Fundorte bei Pečnik und auf dem Klek stehen vereinzelt da.

Noch muss ich erwähnen, dass die Standorte gewöhnlich auf der nördlichen, zerissenen, felsigen Abdachung zu treffen sind, und es war mir desshalb auffallend, diese Pflanze auf der gegen Süden gewendeten Seite des Klek gefunden zu haben.

Der nördlichste Standort ist Pečnik, der westlichste Laginatz, der östlichste und südlichste Sv. Brdo.

Der niedrigste Standort Pečnik 350 m., der höchste Malovan (Debelobrdo) etwa 1700 m.

Der eigentliche Wohnsitz die Höhen zwischen 1250—1600 m.

Bryologiai közlemény. — Bryologische Mittheilungen.*)

Irta: (Péterfi Márton (Déva).
Von: (

Hunyadmegye különböző pontjain gyűjtött *Bryum*-fajaimat átvizsgálván, a közönségesebb fajok mellett ritkábbakra is akadtam. A figyelemreméltóbb adatokat a következőkben közlöm, megjegyezvén, hogy e fajokban felette gazdag nemből több példám van, melyek külföldi anyaggal nem lévén még összehasonlítva, kétesek. Ezeket e sorok keretébe nem vettem fel.

Bryum inclinatum (Sw.) *Br. eur.* fasc. 6/9. p. 17. (1839.) Terem gypes helyeken Szászváros körül és mészkősziklákon Boicza mellett.

Bryum uliginosum (BRUCH.) *Br. eur.* l. c. p. 18. Forrásos helyeken nő a nagyági Hajtóhegyen.

Bryum torquescens *Br. eur.* fasc. 6/9. p. 49. (1839.) A dévai Várhegyen évek óta állandóan észlelem.

Bryum pallescens SCHLEICH. *Crypt. exs. Helv.* no. 28. Régi kőfalon szedtem Felsőcsertés mellett.

Bryum capillare L. *Sp. pl.* p. 1586. (1753.) Közönséges; igen feltűnő egy fán lakó alakja. Fűzfák korhadékos hasadékaiban

*) Die Standorte sind aus dem ung. Texte leicht zu entnehmen. Red.

szokott előfordulni és 5—8 cm. magas gyepeivel, számos vékony hajtásával igen figyelemre méltó. Leírás szerint igen közel állnak ezek az alakok a *Br. eur. flaccidum* nevű variációjához; kellő anyag hiányában ezzel nem hasonlíthattam egybe. A LIMPRICHT-nél említett (l. p. 377.) kelőriügyek azonban hiányzanak a levelek hónukaljában.

(Gemein; auffallend ist jedoch eine auf Bäumen wohnende Form, welche in moderigen Rissen von Weiden vorzukommen pflegt, und mit ihren 5—8 cm. hohen Rasen, zahlreichen dünnen Trieben beachtenswert erscheint. Nach der Beschreibung steht es der Var. *flaccidum* Br. Eur. nahe, in Ermangelung von Vergleichsmaterial konnte ich sie nicht confrontieren. Die von LIMPRICHT (l. p. 377.) erwähnten Brutknospen fehlen jedoch in den Achseln der Blätter.)

Bryum elegans NEES Mscr. Föltünően vereses gyepekben nő Szászváros mellett a Grigori-erdőben.

Bryum alpinum HUDS. Fl. angl. p. 415 (1762.) Szedtem a Szurduk-szorosban nedves földön, Déva mellett a Szárhegy trachyt-szikláin, továbbá a Rézbánya-patak mentén ugyancsak Déva mellett. A Rézbánya-patak mellől való példányok levelének az ere meglehetősen kifut a lemezből

Bryum Mildeanum JUR. in Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1862 p. 967. A vasuti töltések mentén Déva mellett, de miként az előbbi faj, csak st. állapotban.

Bryum erythrocarpum SCHWÄGR. Suppl. I. P. II. p. 100. (1816.) Igen szép példákat szedtem erdei talajon Zám és Kőzsa mellett.

Bryum versicolor A. BRAUN Mscr. Vízerek mentén bőven nő a Páring havasesoport Páring nevű csúcsán.

Bryum Duvalii VOIT. in STURM. Deutschl. fl. II. 12. (1811.). Nedves helyeken a Szárhegyen Déva mellett.

Bryum pallens Sw. Musc. Suec. p. 47. (1799.) Nagyág mellett szedtem a Hajtó-hegyen. A pillák függelékai satnyásak, de azért világosan kivehetők. E felette ingadozó bélyeg révén egyes példái a csalódásig hasonlóak a *Br. fallax* MILDE-hez.

(Die Anhängsel der Cilien verkümmert, doch deutlich wahrnehmbar. Einzelne Exempl. sind in Folge dieses schwankenden Merkmales dem *B. fallax* MILDE täuschend ähnlich.)

Bryum turbinatum (HEDW.) SCHWÄGR. Suppl. I. P. II. p. 109. (1816.) Nedves helyeken nő a Szurduk-szorosban, továbbá Nagybaár, Déva és Vajdahunyad mellett.

Bryum pseudotriquetrum (HEDW.) SCHWÄGR. l. c. p. 110. Déva mellett a Rézbánya-patak mentén.

Déva, 1904. I. 22.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Peterfi Marton [Martin]

Artikel/Article: [Bryologiai közlemény- Bryologische Mitteilungen. 116-117](#)