

Auch vom *Bad Rauschenbach* (Com. Szepes, in der Nähe von Podolin) besitze ich gleichfalls auf morscher Fichte gefundene Exemplare von *B. indusiata*. Datum des Sammelns: 10. VII. 1904.

Im Com. Gömör fand ich den 24. VIII. 1904. in der Umgebung der weltberühmten *Dobsina-er Eishöhle*, die sich an der Berglehme des sich neben dem *Spitzenstein* (972 M.) erhebenden «Duesa» befindet, auf faulen Fichtenstämmen auch mehrere Exemplare der *B. indusiata*.

### Irodalom. — Citierte Abhandlungen.

- <sup>1)</sup> GOEBEL K.: Archegoniatenstudien mit 4 Tafeln. Flora od. allg. bot. Zeit. 76. B. Ergänzungsband zum Jahrg. 1892.
- <sup>2)</sup> LIMPRICH, K. G.: Die Laubmoose Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. II. Abth. Leipz. 1895 II. Aufl. (Rabenhorst's: Kryptogamenflora IV. B.).
- <sup>3)</sup> HABERLANDT, Dr. G.: Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Laubmoose [Pringsheim's Jahrbücher f. wiss. Bot. B. XVII. Heft 3].
- <sup>4)</sup> BAUMGARTEN, J. Ch. G.: Enumeratio stirp. magn. Traussilv. prine. etc. Tomus Quartus. Cibinii 1846.
- <sup>5)</sup> RICHTER, Dr. Á.: Jelentés az Erdélyi Orsz. Múz. növénytáráról az 1900. évben etc. Értesítő II. term. szak. XXIII. k II—III. f. 1901.
- <sup>6)</sup> SCHUR, Dr. Ferd.: Enumeratio plantarum Transsilvaniae etc. Vindobonae 1865.
- <sup>7)</sup> HAZSLINSZKY F.: A magyar birodalom mohflorája. Budapest, 1885.
- <sup>8)</sup> GYÖRFFY J.: Bryologiaci jegyzet. Magyar botanikai Lapok. 1903. 9/10. sz. Négy ritkább növény új termöhelye Erdélyben. Magy. bot. Lap.
- <sup>9)</sup> SIMKOVICS L.: Bánsági s hunyadmegyei utazásom 1874-ben. Mathem és term. tud. közlemények etc. XV. k. 1877/78. pp. 479—624.
- <sup>10)</sup> CHALUBINSKI, Dr. F.: Enumeratio muscorum frondosorum Tatrenium hucusque cognitorum etc. 1886
- <sup>11)</sup> LIMPRICH, K. G.: Novitäten aus d. Laubmoosflora d. Hohen Tátra (Bericht ü. d. Tätigk. d. bot. Sect. d. Schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur. Breslau 1874)

### Fragmente zu einer Monographie der Gattung Koeleria.

Von Ph. Dr. Karl Domin, Assistenten der Botanik an der k. k. böhm. Univers. in Prag.

(Folytatás — Fortsetzung).

#### 2 Rhizomatibus non repentibus nec bulbosis.

A) *Aut plantae robustae culmis robustis striatis, foliis planis latioribus plerumque viridibus rarius inconspicue glaucescentibus*<sup>10)</sup> *vaginis rigidioribus sed pro more culnum laxe ambientibus et iis foliorum infimorum interdum pubescentibus exceptis nunquam mollier pilosis, panicula saepe robusta, spiculis maioribus vel minoribus sed glumis semper latioribus*

*aut plantae graciliores habitu formis nonnullis K. gracilis haud dissimiles sed alpina vel subalpina incolentes, spiculis coloratis.*

<sup>10)</sup> *K. hirsuta* GAUD. interdum eximie glauca arista conspicua a sect. B. discernitur.

a) *Glumellis haud aristatis vel aristula vix 1 mm longa instructis.*

***K. ciliata.***

KERNER in BAENITZ Herb. europ. Prosp. 1879. 5 Nr. 3684 (1878), ASCHERS. et Gr. Syn. II. 358 (1900) p. p., DOMIN Allg Bot. Zeitschr. IX. 23 (1903). *K. cristata* Auct. p. p.<sup>11)</sup>

Rhizomatibus dense caespitosis vaginis foliorum emarcidorum indivisis saepe brunneis obductis, culmis elatis ad 4—10 dm. et ultra altis robustis strictis saepe fusco-viridibus vel purpurascensibus plerumque glabris sub panicula + puberulis rarius (var. e.) totis puberulis, foliis mollioribus vel rigidioribus maxima ex parte planis plus 2 mm. latis glabris vel ciliatis margine ciliatis, vaginis iis foliorum infimorum interdum molliter pilosis exceptis glabris apice saepe ciliatis rarius totis ciliatis, ligula brevi, panicula robusta usque plus 2 dm. longa contracta saepe inferne interrupta vel lobata vix splendenti. spiculis plerumque circa 6 mm longis 2—5 floris saepe hirtulis, glumis latioribus, glumellis acuminatis interdum brevissime aristulatis.

Floret V.—VIII.

Habitat in graminosis, pratis humidioribus vel siccoribus, in collibus sterilibus, in lapidosis glareosisque promiscue per totam fere Europam (sed praecipue in Eur. media), in Asia, Africa, America bor.

a) var. *genuina*

*K. ciliata* KERN. I e., *K. ciliata* A. I. a. *genuina* ASCHERS. et Gr. Syn. II. 358 (1900).

*Panicula densa longa anguste cylindrica inferne + interrupta, spiculis breviter pedicellatis vel fere sessilibus.*

Occurrunt formae panicula angusta sed lobata ramis sub flore quoque vix patentibus et formae robustissimae altissimae sed panicula contracta haud vel parum lobata, quae transitum ad var. *pyramidalatum* praebent.

Forma *humilis* an varietas propria?) circa 2 dm. alta sed typice robusta foliis latis planis supremis vaginis subinflatis instructis paniculam multifloram sublobatam fulcrantibus et saepe superantibus, ligula protracta in Bohemia or. (leg. FLEISCHER) nascitur.

Die var. *genuina* ist die häufigste. Ich sah Exemplare aus Deutschland (aus verschiedenen Ländern), Böhmen (von sehr zahlreichen Standorten), Mähren, Niederösterreich, Ungarn, Salzburg, Tirol, Frankreich.

Die von Elisée REVERCHON (Plantes de France 1886, Alpes Maritimes) als *K. cristata* var. *maior* Nobis herausgegebene Pflanze ist die typische *K. ciliata*, die durch die vollständig kahlen Blätter auf die *K. montana* hindeutet.

b) var. *pyramidalata*

<sup>11)</sup> Auch die *K. avenacea* TAUSCH. und *K. mollis* MANN gehören hierher.

*K. cristata* γ. *pyramidalis* PERS. Syn. I. 97 (1805), *Poa pyramidalis* LAM. III. 1. 183 (191), *K. crist.* γ. *maior* KOCH Syn. ed. 2. 912 (1844), *K. ciliata* A. I. b. pyr. ASCHERS. et GR. Syn. II. 358 (1900).

*Panicula minus densa robusta multiflora valde lobata ramis saepe 3—4 cm. longis patentibus, culmis interdum plus 10 dm. altis.*

Ich sah sie aus mehreren böhmischen Standorten, aus Süddeutschland, Elsass und Ungarn.

subvar. *interrupta*

*K. interrupta* SCHUR in ÖBZ. VII. 306 (1857), *K. cristata* ζ. *nemoralis* ČELAK. Böhm. Ges. Wiss. 1884, 59. *K. ciliata* A. II. *interrupta* ASCHERS. et GR. Syn. II. 358 (1900).

*Panicula valde laxa ubique interrupta, pedicellis tenuibus, foliis saepe longioribus, spiculis minoribus.*

Habitat praecipue in locis graminosis umbrosis, ad silvarum margines, in dumetosis.

Typisch entwickelt sah ich diese Form aus Böhmen und Elsass, minder typisch von der Reisalpe in Niederösterreich.

c) var. *pubiculmis*

HACKEL bei BORBÁS Geogr. otqne enum. pl. Comit. Castrif. 159 (1887), var. *villosa* DOMIN Allg. Bot. Zeitschr. IX. 24 (1903), *K. cristata* v. *villosa* BUBAK bei Celak. Böhm. Ges. Wiss. 1893, X. 7.

*Culmis apice longo tractu interdum totis villosis, vaginis inferioribus vel omnibus hirsutis.*

Hierher rechne ich alle Formen der *Koel. ciliata*, die sonst mit der var. a) oder b) übereinstimmen, aber durch die bedeutend stärkere Behaarung der Halme und der Blattscheiden gekennzeichnet sind.<sup>12)</sup> Die Behaarung der Halme ist meist dichtzottig, die Scheiden sind dagegen öfters wimperig (wenn auch dicht) behaart. Eine solche stark wimperig behaarte Form, die sonst zu der var. *pyramidalis* neigte, nannte ich früher (l. c. 24) f. *hirsuta*. Wenn gleich diese stark behaarten Formen sehr auffallen und durch die weichzottige, sonst dieser ganzen Gruppe fremdartige Haarbekleidung gut gekennzeichnet sind, kommen oft auf einem und demselben Standorte Uebergangsformen zu der typisch behaarten Form vor. Die Behaarung der Blätter pflegt bei dieser Varietät kaum stärker zu sein, als bei der var. *genuina*. Uebrigens wird schon eine Varietät der *K. ciliata* «foliis hirsutis et ciliatis» von F. SAUTER in ÖBZ. XLIX. 352 (1899) aus Tirol (Bozen) erwähnt.

Die var. *villosa* kenne ich bisher bloss aus Böhmen (H. D., H. V., H. M. B.) und aus Ungarn (leg. et mis. v. BORBÁS).

d) var. *pubescens*

HAUSMANN bei PACHER Nat. Landesm. Kärnt. XIV. 129 (1880),

<sup>12)</sup> Auch BLUFF et FINGERHUT (Comp. Fl. Germ. I. 118 (1825), ed. II. 141 (1836)) beschreiben eine *K. cristata* ♀ *villosa*: foliis vaginisque dense villosis. Natürlich ist es schwer zu entscheiden, welche Form selbe hiemit meinten.

*K. pubescens* DALIA TORRE Anleit. Alpenpfl. 341 (1882), non P. B.,  
*K. cil.* A. II. b) *pubescens* ASCHERS. et Gr. Syn. II. 358 (1900).

*Glumis + molliter pubescentibus vel villosis, panicula saepe lobata interrupta.*

Habitat praecipue in collibus dumetosis subumbrosis, in graminonis

Ich sah sie bisher bloss aus Böhmen (bei Aussig, Domin 1903, bei Kladno, BAYER 1902, beide H. D.) und Niederösterreich (St. Pölten, leg: HACKEL 1879, H. de D.)

Ueberdies wird sie aus Kärnten und Tirol angegeben.

c) var. *rigidiuscula*

Domin Allg Bot Zeitschr. IX. 24 (1903) als forma.

*Foliis basilaribus plerumque abbreviatis angustioribus rigidis glabris margine ciliatis interdum praecipue subtus parum glaucescentibus, culmeis paucis brevissime laminatis unacum vaginis glabris, culmis saepe atrovirentibus, panicula densa rarius sublobata, glumis glumellisque + virenti-violaceo-coloratis, spiculis minoribus.*

*Radice dense caespitosa sed culmis paucis duris saepe geniculatim adscendentibus. Tota planta non raro glabrescit et tunc pro varietate K. montanae haberri posset.*

Habitat in pratis siccioribus submontanis et subalpinis in *Bohemia* (locis pluribus legi 1897—1903) et *Tirolia*, ubi legit in Ampezzotal solo dolomitico cum *Avena argentea* et *Silene Saxifraga* et in monte Platzerberg pr. Gossensass solo schistoso alt. circa 1650 m s. m. a 1903 J. MURR.

Eine Form, die ich zu der var. *rigidiuscula* rechne, kenne ich aus Kalifornien (Plants of southern California Nr. 855 als *K. cristata* PERS.) von San Bernardino Mountains (May 1881, coll. PARISH. H M. B.). Sie besitzt robuste strikte Halme, kurze, starre, gerade und etwas bläuliche kahle Grundblätter und mit einer halbeingerollten, kurzen, dem Halme anliegenden Spreite versehene Stengelblätter, gefärbte Aehrenrispen und kaum grössere Aehrenchen, als bei der *K. gracilis*.

### *K. montana*

*K. cristata* var. *montana* HAUSM. Fl. Tir. II. 978 (1852), *K. mont.* DALLA TORRE Anleit. Alpenpfl. 341 (1882), non ASCHERS. et Gr. Syn. II. 358 (1900).

Differt a praecedenti, a qua vix specific separanda est, praecipue *caespitibus* haud *densis* *laxis* *pauciculmibus* *gracilioribus* *solum* *inferne* typice robustis, *foliis* *mollioribus* *laxioribus* *obscure* *viridibus* (vix magis glaucescentibus ac in *K. ciliatae* formis non nullis) *planis* *unacum* *vaginis* *glabris* *non* *ciliatis*, *foliis* *culmeis* *paucis* *laxis* *saepe* *curvatim* *patentibus*, *culmo* *solum* *apice* *parum* *puberulo* *saepius* *glabro*, *panicula* *subbreviori* *inferne* *saepe* *paullum* *dilatata* *ibidemque* *lobata* *haud* *densa*, *spiculis* *interdum* *bifloris* *glabrescentibus* *coloratis*, *gluma* *flosculos* *saepe* *subaequanti*, *glumella* *interdum* *aristula* *brevi* *instructa* *vel* *longe* *acuminata*. — Floret VI—VIII.

Habitat in pratis siccis montanis Alpium, praecipue in Tirolia et Carniola.

Ich sah Exemplare aus *Tirol* (bei Luttach 1000—1400 m leg. TREFFER 1882, H. de D., Sexten im Pusterthal, 1200—1400 leg. TREFFER 1881, H. de D., im Pusterthal auf Dolomit, leg. MURR 1903) und *Kärnten* (auf dem Berge Porschen leg. DOLLINGER 1851 in F. SCHULTZ herb. norm., nov. ser. Cent. 10 Nr. 961, H. D., H. de D., H. U. M.).

Die von FREYN in *Tirol* (Hohe Tauern, Kals. Lärchenwälder, Voralpenstriften 1500 m. 1885, H. V.) gesammelte *K. montana* besitzt teilweise an den Rändern zerstreut wimperige Blätter.

var. *gracilescens* m.

Differt a typo *culmis gracilioribus* *saepe flexilibus foliatis, vaginis infimis foliorumque basali* *lamina parte inferiore minute pubescentibus, panicula elongata angusta subnutanti minus colorata, spiculis evidenter minoribus*, sed caeterum foliis planis mollibus parum glaucescentibus vix ciliatis, caespitibus laxis pauciculmibus cum typo congruit.

Habitu interdum *K. gracili* simillima.

Habitat in herbidis alpinis et subalpinis, praecipue in Bulgaria, Montenegro, Hungaria, Croatia.

Bulgarien (In graminosis alpinis m. Petrohan-Balkan leg. VELENOVSKY 1887, H. V., ad Bela Cerkva, leg. STRIBRNY 1894, H. V.), Montenegro (Andrijevica c. 1000 m. leg. ROHLENA 1903, H. R., Sekirica planina c. 1200 m. leg. ROHLENA 1903, Jerinja glava pr. Andrijevica c. 1300 m. leg. ROHLENA 1903 H. R.), Croatien (in montibus pr. Ogulin, leg. SIMONKAI et de THAISZ 1893, H. de D.), Ungarn (in cacumine Suškuluj supra Thermas Herculis, com. Krassó-Szörény, leg. v. THAISZ 1901, H. de D.), in graminosis alpinis montis Öcsém teteje pr. Balánbánya, com. Csik, leg. v. DEGEN 1901, H. de D.).

Zu dieser Varietät gehört auch die *K. ambigua* SCHUR Enum. pl. Trans. 750 (1866), die ich aus Com. Cibin von Kocsis 1903 loco classico gesammelt in H. de D. zu sehen Gelegenheit hatte. Es ist dies eine niedrige derbere Form, die der aus Croatien erwähnten am nächsten kommt und abgesehen von den mehr straffen Blättern, den Charakter dieser Varietät gut bewahrt.

Die bulgarischen Pflanzen sind dagegen hochwüchsrig (aber gracil!), ihre dünnen, oberwärts nicht beblätterten Halme tragen eine halbnickende Aehrenrispe.

Sehr typisch sind die Exemplare aus Montenegro und Ungarn, bei denen das oberste Stengelblatt in der Regel die Rispe erreicht: ja bei der Pflanze von Andrijevica sind die Halme dicht beblättert, die Ligulen verlängert, die Blattspreiten viel länger als ihre Scheiden, bogig gekrümmmt, die der obersten Stengelblätter deutlich länger als die Rispe.

Uebergänge zu der *K. montana* habe ich bisher nicht beobachtet.

*K. transsilvanica*

SCHUR Ö. B. Z. VII. 313 (1857), IX. 59 (1859), Enum. pl. Transs. 570 (1866), *K. crist. d. transs.* RICHTER Pl. eur. I. 75<sup>13)</sup>

*Culmis gracillimis basi interdum incrassatis interdum lare caespitosis plus minusre geniculatis saepe purpurascensibus pro more humilibus 2–4 dm. altis vix sub panicula puberulis, foliis basilaribus brevibus glabris planis nonnullis saepe complicatis rigidiuseulis subglaucouscentibus, culmis ad medium foliatis, foliis culmeis planis brevibus, vaginis culmum arete ambientibus, panicula breviori fusco-purpurea paulum lobata lata subcontracta basi saepe interrupta. spiculis mediocriter longis subglabris plerunque bifloris, glumella longe acuminata.*

Floret VII. VIII.

Habitat in pratis alpinis et subalpinis Transsilvaniae, praecipue solo calcareo.

Ich sah sie aus Comit. Fogaras, in pratis alpinis et subalpinis montis Királykő supra Zernest, alt. c. 1800 m. s. m. leg. v. DEGEN 1902 (H. de D.), Com. Brassó: in eacumine montis Bucees, alt. c. 2500 m. s. m. leg. v. DEGEN 1902 (H. de D.)

var. *tenuipes*

*K. transs. b) tenuipes alpestris* SCHUR. Ö. B. Z. VII. 313 (1857), Enum. pl. Transs. 750 (1866).

*Culmis elatioribus basi tenuibus haud incrassatis, foliis planis mollioribus elongatis dimidium culmum manifeste superantibus, panicula majori magis lobata subnutanti. spiculis saepe maioribus 2–4 floris minus intense coloratis.*

In herbidis alpinismontis Királykő supra Zernest cum typo (H. de D.)

f. *discolor* DEGEN in sched. *foliis subtus eximie glaucis.*

In monte Piatra mare supra Tömös (com. Brassó) leg. Kocsis 1903 (H. de D.)

f. *hirsuta* m. *Differet vaginis infimis foliorumque parte inferiori complicata mollier hirsutis.*

Com. Hunyad in valle Lepusnik, alt. c. 2000 m. leg. v. DEGEN 1903 (H. de D.).

Einige Formen der *K. transsilvanica*<sup>14)</sup> var. *tenuipes* kommen

<sup>13)</sup> Die *K. transsilvanica* BARTH Arch. XV. 117 (1879) soll mit der *K. glauco-virens* identisch sein.

<sup>14)</sup> SCHUR sagt bei der Beschreibung seiner *K. transsilvanica*, dass sie der *K. Vallesiana* am nächsten stehe und ein vermittelndes Glied zwischen dieser und der *K. glauca* Anet. bilde. Diese Bemerkung ist natürlich nicht nur unpassend, sondern gänzlich falsch, da die *K. transs.* (dies geht selbst aus der SCHURischen Originaldiagnose klar hervor) weder mit der ersten noch mit der letzteren Art etwas gemein hat. Gestützt auf diese Bemerkung stellt NYMAN (Consp. 816) die *K. transs.* als Varietät zu seiner *K. setacea* DC.; erst in Suppl. 335 bemerkt er, dass sie nach SIMONKAI eine Subspecies der *K. cristata* darstellen soll. Uebrigens haben solch' unrichtige Bemerkungen schon mehrere ernste Autoren irregeführt. So finden wir z. B. bei ASCHERS. et GR. Syn. II. 358 die vollständig falsche Bemerkung (aus HAUSMANN's Fl. Tir. 978 (1852) wiedergegeben), dass die *K. montana* «fast nur durch die spitze Deckspelze von der *K. glauca* verschieden sei».

der *K. montana* var. *graciliscescens* ziemlich nahe und dienen somit als gute Belege für den genetischen Zusammenhang beider Arten. Dagegen ist die typische *K. transs.* (var. a. *crassipes alpina* SCHUR. l. c.) von einer äusserst charakteristischen Tracht und schon durch die niedrigen, gracilen, oft knickig aufsteigenden Halme, die kurzen strikten Halmblätter, die festeren Rasen, die fast schwarzviolet gefärbte Aehrenrispe von der *K. montana* leicht zu unterscheiden.

### *K. brevifolia*

REUTER Ind. sem. Horti Genev. 4 (1861), ASCHERS. et Gr. Syn. II. 364 (1900), NYMAN Consp. 816 als Sbsp. der *K. hirsuta*, Suppl. 335, *K. hirsuta* d. *brevifolia* RICHTER Pl. europ. I. 76, *K. montana* JORDAN herb. (1854), *K. cenisia* REUT.<sup>16)</sup> in NYM. Consp. 816.

*Dense caespitosa caespitibus duris. culmis gracillimis geniculatum ascendentibus 1—4 dm. altis teretibus glabris. foliis basilaribus brevibus saepe 1—4 cm. longis stricte convolutis vel complicatis rigidiusculis angustis glabris rarius parum ciliatis, vaginis pubescentibus, foliorum caulinorum laminis brevissimis vix 1 cm. longis unacum vaginis glabris saepe planis uti basilaribus rigidiusculis, ligulis circa 1 mm. longis parum lacero-incipitis, panicula cylindrica subnutanti haud densa nunquam lobata 2—4 cm. longa basi subinterrupta violaceo-colorata. spiculis breviter pedicellatis vix puberulis minoribus circa 4—5 mm. longis plerumque bifloris glumis latis brevibus acutis interdum obtusiusculis unacum glumellis glabris, glumellis nunc acuminatis nunc brevissime et vix evidenter aristulatis. — Planta glauca.*

### Floret VII.

Habitat in herbidis alpinis, pratis montanis et in saxosis Alpium occid.

Ich sah Exemplare von Aurent (Basses Alpes) in H. D., H. M. B., H. de D. (El. REVERCHON Plantes de France 1885 Nr. 26 als *K. cenisia*, und El. REVERCHON et A. DERBEZ Plantes de France Nr. 26 als *K. brevifolia*).

Die *K. brevifolia*, eine der *K. transsilvanica* analoge regionale Art. hat nach meiner Ueberzeugung mit der *K. hirsuta*, mit der sie gewöhnlich verglichen wird, gar nichts gemein. Sie gehört in die nahe Verwandtschaft der *K. transsilvanica*, ist aber von ihr hinreichend verschieden und leicht zu unterscheiden.

### *K. eriostachya*

PANČ. Verh. Z. B. G. Wien 591 (1856); NYMAN Consp. 816, Suppl. 335, VEL. Fl. Bulg. I. 611 (1891), ASCHERS. et Gr. Syn. II. 365 (1900), *K. hirsuta* e) *eriost.* RICHTER Pl. eur. I. 76.

*Caespitosa rhizomatibus saepe subrepentibus culmis robustis*

<sup>16)</sup> Es ist mir ebenso wie ASCHERSON nicht bekannt, wo die *K. cenisia* publiziert wurde. ASCHERS. et Gr. berichten l. c., dass sich dieser Name nach BARBEY (Soc. Dauphinoise XIII. Bull. 553 [1886] in Hb. REUTER nicht befindet. Als neu für Frankreich wird die *K. cenisia* von M. P. REVERCHON in Bull. de la Soc. d'études scient. d'Angers, 3e année, 138 (1873) erwähnt.

*basi vaginis indivisis pallidis saepe pilosis longe involucratis rectis crassis usque 9 dm. altis glabris infra paniculam plerumque longo tractu molliter villosis, foliis viridibus planis ut in K. ciliata latis glabris vel solum margine adpresso breviter ciliatis. basilaribus elongatis culnum dimidium aequantibus, culmeis subpatentibus planis longe attenuatis vaginis suis paulo brevioribus. ligula elongata laceroso-dentata. panicula elongata late cylindrica subnutanti, rachide dense molliter pilosa, spiculis magnis 5–8 mm. longis plerumque trifloris pro more violaceo-variegatis undique molliter et dense pilosis. glumis latis acutis subinaequalibus inferiori spiculum aequante, glumella lanceolata acuta interdum brevissime aristata. Tota planta viridis.*

#### Floret VII., VIII.

Habitat in asperis montanis, in saxosis praecipue calcareis, in pascuis alpinis in Bulgaria, Thracia, Serbia, Carniola, Carinthia, probabiliter in Tirolia et Croatia.

Ich sah sie aus Bulgarien (in m. Kom inter *Juniperos* leg. VELENOVSKY et VANDAS 1887, H. V., Mara Gidik leg. URUMOFF 1897, H. V.), Serbien (m. Midžor leg. ADAMOVIC 1899 H. V.), Krain (auf der Alpe Begunšica leg. et mis. HACKEL), Kärn'nen (Pleeken-Alpe leg. AUSSERDORFER, comm. HACKEL).

#### var. *carniolica*

*K. carn.* KERNER ÖBZ. XVII 7 (1867), *K. hirsuta* e) *carniol.* RICHTER Pl. eur. I. 76.

Diffr. culmis interdum humilioribus, foliis quidem mollibus sed conspicue brevioribus, praecipue autem indumento spiculorum multo pauciori.

Habitat in Venetia, Carinthia, Carniola in pascuis et herbidis alpinis, rupibus calcarii.

Ich sah sie aus KRAIN (in alpe Snežnik — loco class! — leg. JUSTIN H. D.), Kärnten (in graminosis alpium Selenitza solo calc. alt. 1600 m. s. m. leg. v. JABORNEGG 1883 H. D., in monte Loibl alt. 1400 m. s. m. leg. v. JABORNEGG 1899, H. D., H de D.) und Venetien (in pascuis montium Lessinensium, locis Campegno, Malera, Revolto, solo calc. alt. 1000—1600 m. s. m. leg. RIGO 1886, H. D.)

Höchst interessant ist es zu bemerken, dass die *K. carniolica* durch Mittelformen mit der *K. montana* verbunden erscheint; deshalb haben wir auch die so sehr abweichende *K. eriostachya*<sup>16)</sup> der *K. montana*, *transsilvanica* etc. coordiniert. Trotzdem sie typisch entwickelt so leicht zu erkennen ist, so gibt es wiederum Formen, die den Uebergang zum Typus der *K. montana* vermitteln. Wie schon HACKEL (ÖBZ. XXIX. 210 [1879]) bemerkt, variiert die Art der Behaarung der Aehrchen von völliger Kahlheit bis zu

<sup>16)</sup> Dieselbe wurde von BORBÁS (ÖBZ. XXXII. 359 [1882] und TERMÉSZETT. KÖZLÖNY 1882, 155-ik füzetéből) mit Blättern innerhalb der Aehrenrispe beobachtet. Eine ähnliche Erscheinung hat auch GODRON in Mém. de la Soc. Nation des Sciences à Cherbourg Sér. III, T. 22, p. 239—254 bei der *K. cristata* beschrieben.

starker Rauhhaarigkeit in verschiedenen Zwischenstufen. Da überdies manchmal auch der im oberen Teile kurzwollige Halm mitunter fast kahl wird, gehen eigentlich die zwei Hauptmerkmale der Art verloren. Dagegen sind die bulgarischen Exemplare der *K. eriostachya* viel konstanter und auch durch den vegetativen Teil von der *K. montana* wesentlich abweichend. Ja selbst KERNER, dem Originalexemplare der *K. eriostachya* zur Verfügung standen, sagt l. c. 7 von derselben, sie sei «foliis laxis elongatis longe ciliatis et culmis glumis et paleis longe et densissime villosa» von seiner *K. carniolica* verschieden. K. FRITSCH (Mit. Nat. Ver. f. Steierm. 1901, p. 220—221) sagt von der *K. carniolica* aus den Sulzbacher Alpen in Steiermark, dass ihre Blattscheiden «dicht mit Kurzen abwärts gerichteten Haaren bekleidet sind.» Dieses Merkmal kommt aber weder der *K. eriostachya*, noch der *carniolica* oder *montana* zu, sodass man hier höchst wahrscheinlich mit einer merkwürdigen Abweichung des Typus zu tun hätte, die etwa der *K. ciliata* var. *villosa* entspräche.

Aus all dem Gesagten geht hervor, dass die *K. carniolica* in manchen Fällen der *K. montana* so nahe steht, dass sie vielleicht richtiger den Platz bei ihr einnehmen sollte; dazu gesellt sich noch der Umstand, dass im Kreise der *K. ciliata* eine Form mit dichtzottigen Hüllspelzen beschrieben wurde, die nach ihren Standorten zu urteilen, wenigstens teilweise mit der *K. montana* in naher Beziehung steht. Dem gegenüber sind aber die Merkmale der PANČÍĆ-schen *K. eriostachya* kaum so konstant, dass sie nicht in die Merkmale der *K. carniolica* übergehen würden; es hat ja schon HACKEL (l. c. 210) darauf hingewiesen, dass beide Arten als Synonyme zu betrachten sind. Wenn ich jetzt die *K. carniolica* als Varietät der *K. eriostachya* aufstelle, so ist dies dadurch begründet, dass schon die von KERNER beschriebene Form sowie seine authentischen Exemplare von der typischen *K. eriostachya* abweichen und zu weiteren Abänderungen zu der *K. montana* hinneigen.

Die aus Venetien erwähnte Form hat fast gänzlich verkahlte Spelzen, bewahrt aber sonst gut den Charakter der *K. carniolica*; bei den Pflanzen von anderen Standorten sind wieder teilweise die Hälme unter der Aehrenrispe nur sehr schwach kurzzottig.

b) *Glumellis arista 1 mm et ultra longa instructis.*

### ***K. hirsuta.***

GAUD. Agrost. Helv. I. 150 (1811), *Aira hirsuta* SCHLEICHER Pl. exs. Cat. 55 (1800) solum nomen, *Festuca hirsuta* LAM. DC. Fl. France III. 53 (1805), *Airochloa hirsuta* LINK Hort. Berol I. 129 (1827).

*Dense caespitosa, culmis erectis saepe geniculatim ascendentibus circa 15—30 cm. rarius plus 40 cm. altis insuper sub panicula dense villoso-puberulis, vaginis foliorum infimorum pro more pubescentibus superioribus glabris, laminis angustis saepius com-*

plicatis rectis vel curvatis rigidiusculis glabris sebrisque, *ligulis* conspicue protractis usque 2 mm. longis laceroso-dentatis glabris vel ad marginem ciliatis, *panicula ex viridi violacea ovoidea orato-oblonga* vel *oblonga* 1—5 cm longa basi plerumque subinterrupta ramis ramulisque breviter villosulis, *spiculis* 2—3 floribus 4—5 mm. longis, *glumis* acutis inaequalibus brevibus dense villosis, *glumella* dense hirsuta brunneo hyaline marginata plerumque bidentata sub emarginatura arista circa 1.5—2 mm longa scabra tenui saepe curvata instrueta.

*Planta glauca*. — Floret VI. VIII.

Habitat in pratis alpinis siecioribus, in saxosis, rupium fissuris, in montanis asperis in Alpibus occidentali-australis.

Variat foliis planis et spiculis minus hirsutis, caeterum typum primo aspectu agnoscendum exhibit. Forma «*spiculis pallidis*» var. *pallida* KNEUCKER in Bull. d. Trav. de la Murithienne Fasc. XIX., XX. 81 (1892) nominatur.

Ich sah diese Art aus Oberitalien (Provincia Sondrio e. 2000 sm, leg. M. LONGA 1901 in KNEUCKER Gram. exs. IX. Lief. 1902 Nr. 256 H. U. B.) und Tirol (Pfossental, leg. PAUL 1889, H U. B., Ortlergebiet: Stilfser Joch, alt. 2400—2600 m, leg. ARZT 1897, H. D. und ibidem leg. FREYN 1886, H. V., Ad montem Seeberg pr. Loppach, alt. 2300 m, leg. TREFFER 1880 in F. SCHULTZ Herb. norm., nov. ser. Cent. 10 Nr. 962 als *K. carniolica* A. KERN, H. D. ibidem leg. TREFFER 1883, H. D., Wormser Joch, leg. UEGHETZ 1858, H. M. B.).

B) *Plantae humiliores vel elatae, sed culmis gracilibus plerumque totis glaberrimis, vaginis foliisque + molliter pilosis vel glabris, sed tunc tota planta conspicue glauca (rarisime obseure viridis) gracilisque spiculis minoribus vel ut in sect. a) maioribus et 2—4 floribus, tunc autem glumis semper anguste lanceolatis diametro transversali brevi.*

*K. pseudocristata*.

DOMIN Böhm. Ges. Wiss. II. Cl. LVIII. Sep. 45 (1902) als Var. der *K. cristata* und solum nomen. *K. pseudoer*. DOMIN Allg. Bot. Zeitschr. IX 42 (1903), *K. albida* OPIZ Hb. p. p.

*Dense caespitosa, vaginis siecis pallidis culmum interdum longe involuerantibus, culmis elatis usque 85 cm altis parte inferiori robustis insuper semper gracilioribus glabris vel sub panicula puberulis, foliis plerumque planis latioribus (plus 2 mm) longioribusque complicatis pro more intermixtis glaucescentibus vel obscure viridibus ad marginem et nervos sebris caeterum saepius glabris, vaginis culmum laxe ambientibus glabris vel hirsutis, panicula oblongo-cylindrica longa haud densa pro more nitenti semper lobata multispiculata, ramis ramulisque tenuibus puberulis, spiculis iis *K. gracilis* var. *elatioris* similibus haud maioribus bifloris anguste lanceolatis.*

Floret VI.

Habitat praecipue in graminosis siecis, collibus aridis, in saxosis

in *Bohemia* centr. et septentr. (locis pluribus leg. DOMIN, VELENOVSKY, GINTL, OPIZ, ROHLENA), in *Alsacia* (pr. Wasselnheim leg. ISSLER 1902) et in *Hungaria* (in declivibus aridis montis «Háromhatárhegy» ad Budapestinum leg. v. DEGEN, «forma eximie glauca vaginis inferioribus dense molliter pilosis»).

Die *K. pseudocristata* umfasst einen höchst interessanten Formenkreis, der immer dadurch charakterisiert ist, dass er in den vegetativen Merkmalen den Charakter der *K. ciliata*, in der Aehrenrispe der *K. gracilis* bewahrt. Manche Formen aus der Prager Umgebung stimmen ziemlich genau mit einer langblättrigen Form der *K. ciliata* var. *pyramidalis* überein und sind von derselben im Wesen nur durch die Ausbildung der Aehrchen verschieden. Trotzdem ist die *K. pseudocristata* viel näher der *K. gracilis* verwandt, und besonders jetzt, nachdem ich Formen kennengelernt habe, die einen natürlichen Uebergang zu der *K. gracilis* var. *elatior* vermitteln, nehme ich keinen Anstand sie in die Nähe der *K. gracilis* zu stellen. Als blosse Varietät der *K. gracilis* kann sie aber keineswegs aufgefasst werden: typisch entwickelt unterscheidet sie sich von ihr etwa in dem Grade wie die *K. eriostachya* von der *K. ciliata*. Es wäre höchstens für die natürliche Einteilung einiger jetzt noch nicht genügend erklärten Formen zweckmässig die Beziehung der *K. pseudocristata* zu der *K. gracilis* var. *elatior* und *planifolia* einer genauen Erörterung zu unterwerfen und hiedurch den Zusammenhang dieser Formen zu praeceisiren. Natürlich muss sich die Entscheidung einer so schwierigen Frage auf ein möglichst umfangreiches Material stützen.

Besondere Erwähnung verdient die aus Elsass-Lothringen stammende Pflanze, die ich als var. *Issleri* m. in schedis bezeichnet habe. Sie besitzt sehr verlängerte, bis 30 cm lange Grund- und untere Stengelblätter mit dicht und ziemlich lang weichzettigen Scheiden und meist nur an den Rändern behaarte, teilweise flache und bis über 3 mm breite, teilweise zusammengefaltete Spreiten. Die Halme sind typisch robust, über 6 dm hoch mit wenigen flachen Halmblättern, nur oberwärts dicht kurzottig, die gelappte, sehr reichblütige glänzende Aehrenrispe ähnlich wie bei manchen Formen der *K. gracilis* v. *elatior*.

Eine ähnliche mehr graugrüne Form mit kürzeren Grundblättern und einer sehr robusten Aehrenrispe mit meist verlängerten Seitenzweigen und mit breiteren z. T. dreiblütigen Aehrchen erhielt ich neuerdings von Prof. Dr. V. von BORBÁS (Comit. Pestinensis: in monte Aquilarum leg. v. BORBÁS 1902). Sie führt den Namen var. *budensis* BORB. (= *K. bud.*)

Eine andere interessante Form dieser Art kenne ich aus Californien, von C. G. PRINGLE im J. 1882 bei «Hills, San Diego» gesammelt und als *Koel. cristata* herausgegeben. Ich bezeichne sie vorläufig als *K. pseudocristata* var. *californica* m. Sie ist folgendermassen charakterisiert:

Multiculmis sed laxe caespitosa, culmis c. 70 cm altis glabris sub panicula puberulis vaginis infimis vetustis sordide albescentibus tenuibus longe involueratis, foliis basilaribus numerosis uti culmeis inferioribus elongatis usque 40 cm longis dimidium culmum conspicue superantibus tenuibus laxis complicatis planis intermixtis unacum vaginis glabrescentibus vel sparse pubescentibus, panicula lobata inferne interrupta cum typo congrua.

### *K. gracilis*

PERS. Syn. I. 97 (1805). ASCHERS. et GR. Syn. II. 359 (1900). DOMIN Allg. Bot. Zeitschr. IX. 43 (1903). *Poa nitida* LAM. III. I. 182 (1791). *Aira gracilis* TRIN. fund. 144 (1820).

*Dense caespitosa*, vaginis vetustis indivisis pallidis. ± *glaucia* (praecipue formae glabrescentes saepe conspicue glaucoirescentes), humilis vel elata. *culnis gracilibus pro more etiam sub panicula glabris*, *foliis saepe brevioribus rigidiusculis vaginis + molliter pilosis* rarissime glabris. *laminis angustis saepe convolutis vix plus 2 mm. latis saepe in facie pubescentibus*, ligulis brevibus saepe exauriculatis. *panicula varissime dense cylindrica saepius inferne subdilatata* interruptaque *pallida nitenti ramis ramicisque tenuibus, spiculis angustioribus lanceolatis bifloris minutis solum 3—5 mm. longis*.

Floret V—VII. Habitat in siecis et aridis, graminosis vel saxosis, in desertis praecipue regionis inferioris in Europa media et australi, Asia, America bor.

Unterscheidet sich von dem Formenkreise der *K. ciliata* schon in dem vegetativen Teile; mag sie auch mitunter bedeutend höher werden als dieselbe (die *K. ciliata* kommt auch in Zwergformen vor), so ist sie niemals so robust, ihre Blätter sind schmäler, rinnig zusammengefaltet bis fast rundlich eingerollt oder wenn breiter und flach, so entweder stark graugrün und straff mit hervorragender Nervatur oder dicht zottig behaart.

Auch die frühere Blütezeit ist für sie bezeichnend: wenn die *K. ciliata* noch gut entwickelt ist, steht sie meist schon vertrocknet da und bildet flache Grundblätter. Es ist als besonders wichtig hervorzuheben, dass auch die ganz typische *K. gracilis* sehr oft nach dem Abblühen straffe, kürzere, stärker graugrüne, völlig flache und mitunter fast kahle Sommerblätter treibt, sodass solehe Formen sehr täuschen.

Die Zahl der Formen dieser Art ist so gross, dass man sich hier nur auf die Hauptvarietäten beschränken muss. Man könnte mit vollem Recht sagen, dass alle ihre Merkmale ziemlich weitgreifenden Variationen unterliegen. Die bei mehreren Varietäten sich wiederholenden Formen werden am Schlusse erwähnt werden.

#### var. *typica*

*Vaginis foliorum omnium vel infimorum molliter pilosis, culnis humilioribus, panicula oblongo-cylindrica basi subinterrupta.*

Hie praecipue duo formae dignoscuntur:

*Forma lauata* m. *vaginis omibus dense longe villosis vel lanuginosis, foliis caulinis interdum planis eodemque modo hirsutis, foliis radicalibus numerosis complicatis planis intermixtis.*

*Forma glabrescens* m. *laniis tantum foliorum infimorum minute et sparse molliter pilosis caeteris glabris.*

Ich sah die var. *typica* aus Elsass-Lothringen (leg. E. ISSLER locis pluribus), Baden leg. (A. KNEUCKER 1899, Gram. exsc. II. Lief. 1900 Nr. 36 als *K. cristata*), Böhmen (von sehr zahlreichen Standorten (auch beide Formen), meidet aber die rauheren Lagen), Mähren (ebenfalls von mehreren Standorten), Niederösterreich (Türkenschanze bei Wien, leg. JANKA 1888, H. de D., Bisamberg bei Wien leg. v. HAYEK 1899, Kneucker Gram. exc. II. Lief. 1900 Nr. 37., bei Wien leg. v. Kováts (*f. lauata*). H. de D., auf den Hügeln bei Krems, leg. v. HAYEK 1902, H. D.), Ungarn (auf der Insel Csepel bei Soroksár, leg. SZALÓ 1898, H. de D., in dem Com. Krassó-Szörény auf den Wiesen bei Herkulesbad leg. v. THAISZ 1899, H. de D. und auf den sonnigen Lehnern oberhalb «Trikule» bei Svinica, leg. v. DEGEN 1903, H. de D., Com. Vas: auf dem Berge Sághegy bei Kis-Czell, leg. GAYER 1903, H. de D., auf dem trachytischen Berge Mokra (Com. Arad) leg. SIMKOVICS 1885, H. de D. (*f. glabrescens*), auf dem Berge Csíkihegy bei Török-Bálint leg. v. DEGEN 1903 (mit Anklängen auf die var. elatior), Békás-Megyer, auf dem nächsten Berge, leg. v. BORBÁS 1903, H. de D. f. ad var. *latifoliam* vergens etc.), Schweiz (Obergestelen, Haut Valais, leg. JACQUET 1897, H. R.), Tirol (bei Trient auf Kalk, leg. J. MURR 1898, 1899, auf warmen felsigen Orten bei Brixen leg. 1892 SCHAFERER, misit MURR (*f. glabrescens*, fere glabra), Borghetto bei Airo, leg. MURR 1903 [in derselben Form]), Steiermark (Marburg, leg. MURR), Istrien (Insel Coseda, leg. FREYN 1875, *f. glabrescens*, H. D., H. de D.), Bulgarien (von mehreren Standorten H. V.), Rumänien (Hinova, leg. GRECESCU 1885, H. V.), Krym (A. CALLIER: Ita tauricum sec. a. 1896 Nr. 220 [Hügel in Atschiklar bei Sudak] und Nr. 221 (Wälder in Karagatsch bei Sudak), H. de D., H. D.).

Die typische *K. gracilis* reicht bis weit in den Orient und weiter in Osten Asiens. Ich kenne sie (in einer Form «glumis latioribus») von «Western Himalaya, Province Lahól. Locality Bhága valley in Herb. SCHLAGINTWEIT from India and High Asia Nr. 4080. (1856), H. M. B. und in Ost-Asien aus dem Amurgebiete (Blagovješčensk, F. KARO: Plantae Amuricae et Zeaënsæ Nr. 139., 1898, H. D.)

var. *gypsacea* m.

*Caespitibus densissimis multieulmibus, culmis gracilibus humilibus pro more c. 1—2 dm. altis, foliis basilaribus numerosis brevissimis curvatis convolutis rigidiusculisque, foliis culmeis paucis brevissime laminatis (culmis ideo insuper longe nudis), paniculis cylindricis laxioribus interdum depauperatis.*

Eine sehr charakteristische Pflanze! Bisher blos auf den Gipsbergen in der Umgebung von Nordhausen (Harz), daselbst aber mehrfach (leg. et mis. OSWALD 1904).

var. *flaccida*

DOMIN: Allg. Bot. Zeitschr. IX. 43. (1903). *K. gracilis* JANKA  
ÖBZ. VIII. 93. (1858).

*Planla elata lara, culmis flexilibus lare caespitiferis, foliis angustis planis usque striatis complicatis valde elongatis usque 30 cm. longis culmeis paulo latioribus brevioribus ligulis paulo protractis, vaginis parcius molliter pilosis interdum glabrescentibus, panicula sola interrupta lara nitida.*

Habitat in subumbrosis in Bohemia centr. (DOMIN) et Transsilvania septentrion. (leg. CERZ 1858. H. de D.)

var. *leiophylla*

*K. cristata* var. *gracilis* subv. *leioph.* HACKEL in A. KNEUCKER: Gram. exs. XII Lief. 1903 Nr. 346. und Allg. Bot. Zeitschr. VIII. (1902). *K. grac. f. aspera* ROHLENA Böhm. Ges. Wiss. Math. Nat. Cl. XXIV. 317 (1899) em.. DOMIN Allg. Bot. Zeitschr. IX. 44 (1903).

*Vaginis laminisque pro more omnino glaberrimis laevis vel asperis rarissime sparse et minute rix evidenter hic inde puberulis.*

Habitat in *Bohemia* (pr. Pragam), *Hungaria* (in monte Suškuluj ad Thermas Herculis in A. KNEUCKER l. e., H. U. B.), *Bulgaria* (locis nonnullis. H. V) et probabiliter alibi cum typo.

Die vollkommen kahlen Formen der *K. gracilis* sind im Ganzen sehr selten und ihre Zuständigkeit zu dieser Art immer noch etwas zweifelhaft. Man findet zwar Formen, die fast gänzlich verkahlt sind und deren Zugehörigkeit zu der *K. gracilis* keinem Zweifel unterliegen kann; sie besitzen aber stets wenigstens hier und da ein Blatt, welches noch eine schwach kurzhaarige oder kurzgewimperte Scheide oder Spreite aufzuweisen vermag und übergehen nicht selten auf einem und demselben Standorte in die typische *K. gracilis*. Aber schon die erwähnte ungarische Pflanze macht deutliche Anklänge auf die *K. glaucovirrens*: andererseits kommen besonders im Südosten Europas und im Orient Formen vor, die etwa die Mitte zwischen der *K. gracilis* und *nitidula* halten und entweder zu der letzteren Art als nicht typische Formen oder zu unserer Varietät einbezogen werden können.

Eine merkwürdige, nach ihrem Standorte auf warmen Kalkfelsen und nach ihren Hauptmerkmalen hierher gehörende Form ist die *K. Fenziana* SCHUR Ö. B. W. VII. 314 (1857). Sie unterscheidet sich aber von der var. *leiophylla* durch ihren wesentlich abweichenden Wuchs, durch die beblätterten Stengel, die flachen Blätter etc.; ganz richtig sagt von ihr SCHUR l. e.: «culmo debile geniculato foliato, foliis omnibus planis mollibus glabris glauco-pruinosis, vaginis longissimis glabris laxiuscule accumbentibus, panicule nutante, densiflora etc.» Aber alle diese Divergenzen könnten durch den Standort («in rupibus caleareis subumbrosis») erklärt

werden. Andererseits kommen ganz ähnliche Abweichungen in dem Wuchs auch auf den montanen und subalpinischen Standorten zum Vorschein; daselbst tritt aber in der Regel noch eine + deutliche Färbung der Aehrenrispe und oft auch der Halme dazu. Und in der Tat ist die *K. Fenziana* (in radice montis Szurul supra pagnum Portsesd leg. SCHUR. H. de D.) in ihrer Tracht der *K. montana* var. *gracilescens* abgesehen von der Färbung der Rispe nicht unähnlich, wie wohl beide Formen genetisch wohl weit von einander stehen.

var. *colorata*

*K. cristata* d. *colorata* HEUFF. Zool. Bot. Ges. Wien VIII. 228. (1858).

*Laxiuscule caespitosa culmis gracilibus elatis mollibus sed plerumque strictioribus, foliis angustis complicatis planis intermirtis minus glaucis fere virescentibus laxiusculis, vaginis saepe glabrescentibus, panicula elongata saepe interrupta pro more nitenti, spiculis violaceo-tinetis.* Habitat in collibus vel pratis humidiорibus praecipue in regione montana (600—1000 m) in *Hungaria* (Rákos ad Budapestinum, leg. CZAKÓ 1888 und 1890, H. de D., in montanis supra Gyergyó Ditró (Com. Csík), leg. v. DEGEN 1901, in monte «Götzenberg» ad Nagy-Dissznođ Com. Cibiniensis, leg. v. THAISZ 1894, H. de D., in pratis ad Drassó (Com. Alba infer.) leg. v. THAISZ 1893, H. de D., in monte Svábhegy pr. Budapestinum leg. CZAKÓ 1888, H. de D., in pratis montis Stubieza comit. Scopusiensis, leg. CZAKÓ 1888 (*f. glabra*) H. de D.), et *Montenegro* (Andrijevica, c. 900 m, leg. ROHLENA 1903, *f. humilior*).

Die Varietät umfasst einige Formen, deren Halmblätter eine längere Spreite besitzen und die dann auf die *K. montana* var. *gracilescens* erinnern.

var. *elatior*<sup>17)</sup>

VEL. Fl. Bulg. Suppl. I. 295 (1898)

*Planta elata saepe plus 6 dm. alta robustior, foliis praecipue culmeis saepe latiuscule linearibus planis, panicula multispiculata hand densa elongata lobata.*

Ocurrexit forma culnis geniculatim ascendentibus.

Habitat in *Bohemia* (locis pluribus H. D.), *Austria inf.* (pr. Viennam H. D.), *Hungaria* (Rákos pr. Budapestinum, leg. CZAKÓ 1889, H. de D.), *Bulgaria* (locis pluribus H. V.).

Diese Varietät ist in ihrer typischen Ansprägung von einer sehr charakteristischen Tracht; in manchen Formen kommt sie der *K. pseudocristata* ziemlich nahe.

Die *K. cristata* var. *oregana* (HOWELL's Pacific Coast Plants, Oregon, coll. Th. HOWELL 1881, H. M. B.) ist von dieser Varietät kaum verschieden. Auffallend sind bei ihr die meist deutlich verlängerten Lignen und der robuste vegetative Teil, der auf die

<sup>17)</sup> Irrtümlich von mir als var. *maior* in Allg. Bot. Zeitschr. I. e. 43 angeführt.

*K. pseudocristata* hinweist, mit welcher diese Varietät, wie schon oben gesagt, manchmal in der Tat sehr nahe verwandt ist.

var. *BORBÁSH* m.

*Culmis elatis, panicula lobata, spiculis linearis-elongatis trifloris, glumis linearis-elongatis, caeterum ut varietas praecedens.*

So bisher blos in *Ungarn* (Hung. orient.: in Rákózyberg ad Görgény, leg. ? 1860, mis. de BORBÁS, H. Mus. Kolozs., bei Nassod, leg. ? ibidem).

Eine ganz analoge Form, der *K. nitidula* var. *obscura*, die aber bestimmt zu der *K. gracilis* gehört.

var. *depauperata* m.

*Humilior, foliis radicalibus rigidissulis elongatis culmos diminutos superantibus eximie glaucis pro more planis 1—2 mm. latis saepe glabris et tantum ad margines aulpresso ciliatis, vaginis plurimum typice pubescentibus, foliis culmeis brevioribus (sed iis formae typicae evidenter longioribus) planis, panicula brevi valde interrupta et depauperata spiculis submajoriibus non raro fasciculis spiculorum solitariis constante.*

Habitat in *Bohemia* ad Beřkovice (ROHLENA, DOMIN) et pr. Ústí (leg. SCHUBERT).

var. *latifolia* m.

*K. pseudoglauca* BORB. non SCHUR!

*Foliis omnino planis latioribus* (usque plus 2 mm) *saepe elongatis*, caeterum cum diversis *K. gracilis* formis congruens.

Habitat in *Hungaria* (pr. Budam leg. v. BORBÁS 1900, H. de D.), *Bohemia* (pr. Beřkovice leg. DOMIN 1902 in f. *lanata*), *Tirolia* (pr. Trient locis aridis leg. MURR 1899, f. *rigida* m. foliis planis rigidis plurimi nervo albo cartilagineo marginatis eximie glaucis glabris seberrimis nonnullis brevissime puberulis, panicula longa uitenti).

Da sich bei der *K. gracilis* verschiedene Merkmale, nach welchen man Varietäten aufzustellen gewöhnt ist, im manigfaltigen Verhältnisse combinieren, schliessen wir hier eine kurze Uebersicht der häufiger wiederkehrenden Combinationen an: dadurch wird die Zahl der Varietäten beträchtlich geringer und eine kurze Bezeichnung solcher Formen, die z. B. nach der Ausbildung der Blätter und der Rispe verschiedenen Varietäten angehören, wesentlich erleichtert.

I. *Quoad spiculorum indumentum:*

a) f. *glabriflora* *glumis glumellisque glabris vel glabrescentibus*,  
b) f. *puberula* (OPIZ Sežnam 56 [1852] als Species, DOMIN Allg. Bot. Zeitschr. IX. 43 [1903] p. p., f. *lasiantha* BECK Fl. v. Nied. 79 [1890]) *glumis glumellisque puberalis vel hirsutis*. Habitat praecipue in *Bohemia*. Formae intermediae frequentes.

OPIZ gründete seine *K. puberula* auf die «spiculi puberuli», verstand aber später unter diesem Namen alle Formen der *K. gra-*

*cilis*, die niedrige, zarte, fast blattlose Halme, schmale, endlich zusammengerollte Grundblätter, oft fast verkahlende Scheiden und eine ziemlich dichte kürzere Aehrenrispe besitzen. Es ist falsch, wenn ČELAKOVSKY die *K. puberula* als blosses Synonym der *K. gracilis* citiert, da OPIZ die typische *K. gracilis* gut kannte und wie das H. M. B. beweist, von seiner *K. puberula* gnt zu unterscheiden vermag. Ich habe in Allg. Bot. Zeitsehr. I. c. unter der *K. gracilis* var. *γ. puberula* (OPIZ) DOMIN solche Formen der *K. gracilis* verstanden, die den oben erwähnten Merkmalen entsprachen, ohne Rücksicht darauf, ob ihre Aehrchen kahl oder behaart sind. Dies geschah in erster Reihe deswegen, weil sich die *K. puberula* in Böhmen als eine gute Varietät zu halten scheint; indessen treten anderwärts Formen auf, die nur die behaarten Aehrchen, nicht aber den charakteristischen Wuchs derselben besitzen: noch häufiger kommen Formen zum Vorschein, bei denen umgekehrt die Tracht der *K. puberula* erhalten bleibt, nicht aber die «spiculae puberulæ». Deshalb scheint es doch zweckmässiger zu sein, die Benennung f. *puberula* für alle Formen der *K. gracilis* mit behaarten Spelzen anzuwenden.

2. *Quoad paniculae formam:*

- a) f. *typica* *panicula minus densa inferne dilatata oblongo-cylindrica.*
- b) f. *contracta* *panicula densa contracta cylindrica vel oblonga.*
- c) f. *anthoxanthoides* (*K. anthox.* GSALLER herb., *K. gracilis* b. *anthos.* ASCHERS et GR. Syn. II. 359 [1900]) *panicula densa breviter cylindrica usque fere capitata.*

Die f. *contracta* und die mir unbekannte f. *anthoxanthoides* könnten vielleicht als Formen einer Varietät aufgefasst werden, die durch die dichte zusammengezogene Rispe gekennzeichnet wäre. Es würde zu ihr auch die *K. cristata elongata* OPIZ Seznam 56 (1852) gehören, welche eine hochwüchsige Form der typischen *K. gracilis* vorstellt, die eine dichte, streng cylindrische, ziemlich lange Aehrenrispe besitzt.

Die *K. brevis* STEVEN<sup>18)</sup> in Bull. Soc. Imp. Nat. Moscon XXX. II. 110 (1857) («caespitosa tota glabra, foliis omnibus convolutis angustissimis ligula truncata vel acutiuscula, panicula brevi ovata spiculis glumas subaequantibus, paleis acutis»), unter deren Namen so verschiedene und gar nicht verwandte Pflanzen einkludieren und die nach BOISSIER Fl. or. V. 575 eine «variatio panicula abbreviata ovata» der *K. cristata* vorstellen soll, gehört entweder hierher, oder noch eher zu der *K. glaucoviridis*.

Eine schöne Form der f. *contracta* kenne ich aus Südrussland (Jekaterinoslavskaya gubernija, bei der Stadt Nikopol, leg. BOGOMAZOV 1900, H. de D.).

<sup>18)</sup> Nach Index Kewensis II. 10 ist die *K. brevis* als Synonym zu der *K. cristata* zu betrachten.

## 3. Quoad spicularum colorem:

a) f. *pallida* UECHTRITZ in ASCHERS et GR. Syn. II. 359 (1900) *spiculis luteo-albis pallidis plus minusve nitentibus.*

b) f. *violascens* UECHTRITZ in ASCHERS et GR. Syn. II. 359 (1900) *spiculis + violaceo-coloratis culmis saepe insuper purpurascenibus.*

Beide Formen nicht selten, die erstere die verbreitetere.

## 4. Quoad glumellae apicis formam:

a) f. *mutica* *glumellis acutis vel acuminatis nunquam aristulatis.*

b) f. *aristulata*, *glumellis aristis breribus sed conspicuis usque plus  $\frac{3}{4}$  mm. longis instructis.*

Die erstere ist die bei weitem häufigste Form, die f. *aristulata* kenne ich bisher bloss aus Böhmen (H. D.) und von der Umgebung von Fiume (leg. v. DEGEN 1902, H. de D.).

## 5. Quoad spicularum magnitudinem:

a) f. *typica* *spiculis circa 3–5 mm. longis.*

b) f. *grandiflora* *spiculis maiusculis usque 6 cm longis latioribus plerumque trifloris.*

Die letztere Form selten, bisher bloss in Böhmen (H. D.) und Elsass-Lothringen (leg. ISSLER 1902, zugleich in der Form *aristulata*).

## 6. Quoad foliorum formam:

a) f. *typica* *foliis angustis omnino complicatis vel planis intermixtis.*

b) *foliis omnibus planis latiusculis elongatis* vide var. *planifolia.*

c) f. *festucoides*, *planta conspicue glauca, foliis radicatis rigidis curvatis plurimis more Festucae glaucae vel sileatae, setaceo-convolutis.*

Die f. c) kommt ziemlich selten vor, sehr typisch z. B. in Böhmen (H. D.).

*K. niticula*

VEL. Fl. Bulg. 611 (1891)

*Dense caespitosa, culmis inferne vaginis pallidis longe tenuie involueratis pro more geniculatim ascendentibus haud strictis circa 3–6 dm. et ultra allis, gracilibus teretibus glabris, foliis longioribus saepius minus glauca sat mollibus unacum vaginis glaberrimis planis, radicalibus anguste linearibus flexuosis interdum complicatis rarissime parce et minute puberulis, foliis caulinis elongatis patentibus basi biauriculatis planis, panicula laxa praesertim sub flore expansa valde lata ramis ramulisque tenuibus longis laxis, spiculis iis K. gracilis haud maioribus in formis nonnullis linearie-longatis glabris, glumis glumellisque lanceolatis acutatis maxima ex parte hyalino-seariosis nitidulis.*

## Floret VI.

Habitat in graminosis siccis, collibus aridis, in rupestribus et saxosis praecipue regionis inferioris calidæ in Armenia tureica

(P. SINTENIS Iter or. 1890 Nr. 2446, H. M. B., H. de D.). *Phrygia* (J. BORNMÜLLER Iter Anatolicum tertium 1899 Nr. 5642, H. de D.), in *m. Ida* (P. SINTENIS Iter Trojanum 1883 Nr. 642b, H. M. B.), in *Macedonia* (leg. FORMÁNEK, misit VANDAS), *Bulgaria* (locis plurimis H. V.), *Serbia* (leg. ADAMOVIĆ, H. V.) et in *Bohemia* septentr.<sup>19</sup> (DOMIN 1902).<sup>20</sup>)

var. *obscura*

*K. gracilis* var. *obscura* VELEN. Böh. Ges. Wiss. 1903 II. Cl. XXVIII. 26<sup>21</sup>) erw.

*K. cristata* ssp. *grandiflora* Auct. p. p. vix BOISSIER Fl. 'or. V. 575 (1884).<sup>22</sup>)

*Culmis elatis interdum robustioribus, panieula longiori saepius magis lobata, spiculis fere duplo longioribus linearis elongatis glumis valde linearis-elongatis sensim acutatis nunc marina ex parte virentibus anguste hyalino-marginalis nunc ut in forma typica fere totis scarioso-hyalinis.*

Habitat in *Bulgaria* (locis pluribus H. V.), *m. Athos* (Hagios Dionysos, leg. FORMÁNEK, comm. VANDAS), *Macedonia* (prope Vodenam leg. Jun. 1900 KIDL. H. de D.), *Thracia* (in agro Byzantino in colle Tschamlidseha supra Skutari leg. v. DEGEN 1890, H. de D.), *Kurdistania* (P. SINTENIS Iter or. 1888 Nr. 883, H. M. B., H. de D.).

var. *bohemica*

Domin Allg. Bot. Zeitschr. IX. 78 (1903) als forma. *K. gracilis* f. *aspera* ROHL. l. c. senso stricto.

Differt praecipue *glumis maxima ex parte virentibus interdum parum violaceotinctis, foliis radicalibus nonnullis minute vix evidenter puberulis.*

Habitat in Bohemia.

Die *K. nitidula* ist eine im Orient weit verbreitete Form, die in jedem Falle nach den ziemlich weichen, kahlen, mehr oder weniger graugrünen, flachen und verlängerten Grundblättern, den

<sup>19)</sup> Näheres über die photographische Bedeutung dieser Art für die Flora Böhmens, siehe in Allg. Bot. Zeitschr. I. c. 77–79.

<sup>20)</sup> In H. M. B. lag die typische *K. nitidula* mit einer *K. gracilis*, die von RICHTER LAJOS bei Budapest gesammelt wurde. Darauf gestützt, hielt ich früher die *K. nitidula* auch für Ungarn nachgewiesen; bei einer neuen Revision des Museumsmaterials kam ich aber zu der Ueberzeugung, dass die fragliche Pflanze höchstwahrscheinlich durch eine Verwechselung mit der hinter ihr sich befindenden *K. nitidula* aus der Siutenischen Collection zu der ungarischen Pflanze gelangt ist. Somit wäre das Vorkommen dieser Art für Ungarn noch stets zweifelhaft, obzwar man kaum voraussetzen kann, dass dieser Art ein so disjunktives Areal zukäme.

<sup>21)</sup> Schon VELNOVSKY l. c. sagt von dieser Varietät, dass sie dieselbe Stelle bei der *K. nitidula* einnehmen könnte.

<sup>22)</sup> Die von PODPERA in Verh. Z. B. Ges. Wieu 679 (1902) beschriebene *K. cristata* Sbsp. *orientalis* PODP. ist teilweise mit der typischen *K. nitidula*, teilweise mit dieser Varietät identisch. Ihr Hauptmerkmal, die deutlich lineal-verlängerten Aehrenchen, wird aber in der Diagnose nicht erwähnt. Vergleich auch VELNOVSKY in Böh. Ges. Wiss. II. Cl. XXVIII. 27 (1903).

flachen, abstehenden, besonders bei der var. *obscura* die Rispe oft erreichenden Stengelblättern, den in der Regel knickig aufsteigenden Halmen, der lockeren, glänzenden Rispe mit schmalen kahlen Ährchen leicht zu erkennen ist. Am nächsten steht ihr die *K. glaucovirens* var. *typica*, die ebenfalls vollständig kahl ist. Die Verwandtschaft mit der *K. gracilis* ist nicht so gross; nur in Böhmen, wo die *K. nitidula* einen gegen N. W. merkwürdig vorgeschobenen Standort hat, kommen auch Formen vor, die zwar zu der *K. gracilis* gehörend, doch deutliche Anklänge auf die *K. nitidula* aufweisen.

Aus Macedonien kenne ich eine Form mit ganz kurz begrannten Deckspelzen (*f. aristulata* m.).

***K. glaucovirens* m.**

*K. rigidula* SIMK.<sup>23)</sup> Enum. Fl. Transs. 570 (1886) ampl. VEL. Fl. Bulg. 610 (1891) non STEUD. Syll. pl. Gram. I. 293 (1855).

Praecedenti similis sed *rhizomatibus* saepe *densissime caespitosis*, *caespitibus* *duris*, *culmis strictioribus interdum robustioribus*, *foliis conspicue glaucis valde rigidis saepe pungentibus unacum vaginis glaberrimis curvatis vel strictis planis saepius convolutis margine albo cartilagineo duro marginatis, caulinis minus numerosis auriculatis laminis brevioribus instructis, panicula pro more contracta cylindrica* (sed in var. prima *K. nitidulae* simili) *minus nitenti ramis densis brevibus, spiculis saepe maiusculis latioribus.*

Floret VI.

Habitat in siccis vel petrosis, in collinis aridis in Transsilvania, Bulgaria, Serbia, Macedonia, insula Samothrake, Paphlagonia, Anatolia, Armenia tureica, Tauria, Caucasia, Dauria.

1. var. *Simonkaii*.<sup>24)</sup> ADAMOV. in Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, Bd. LXXIV. p. 4. (1904).

*Panicula minus densa laxiori nitenti, spiculis minoribus saepe tantum c. 4 mm. longis anguste lanceolatis, foliis angustissimis convolutis saepe curvatis.*

<sup>23)</sup> Zu ihr gehört z. B. auch *K. cristata* h. *Pseudo-glaucia* SCHUR Ö. B. W. VII. 305 (1857) (= *K. Pseudo-glaucia* SCHUR Enum. Pl. Trans. 749 [1866]).

<sup>24)</sup> Neuerdings hat ADAMOVIC die *K. rigidula* wegen der gleichlautenden älteren Benennung STEUDELS in *K. Simonkaii* umbaut. Da aber die serbische Pflanze von der in Siebenbürgen heimischen wesentlich abweicht, -- (und dies ist eben die *K. rigidula* SIMK. s. str.!) -- behalte ich für die Gesamtart den von mir gleichzeitig vorgeschlagenen Namen *K. glaucovirens* und gebrauche die Benennung ADAMOVIC's für die besonders auf der Balkanhalbinsel (Serbien, Bulgarien) verbreite kleinährige Form.

Dass ADAMOVIC in der Tat *nur* diese Rasse und nicht die eigentliche *K. rigidula* SIMK. oder die Gesamtart (= *K. glaucovirens*) meinte, ist aus dem, was er in dieser Zeitschrift III. p. 139 (1904) sagt, sofort ersichtlich: er vergleicht nämlich die *K. Simonkaii* mit der *K. gracilis* («Ab auctu K. gracilis Pers. distinguuntur etc.»), von der sie in der Grösse der Ährchen nicht abweichen soll.

Wie ADAMOVIC heißt auch ich, bevor ich die siebenbürgische Pflanze kennen gelernt habe, die Form aus der Balkanhalbinsel irrtümlich für die echte *K. rigidula* SIMK.

So z. B. häufig in *Bulgarien* (H. V.), dann in *Serbien* (H. V.), auf dem Südabhang von *Athos* (leg. JANKA 1871. H. de D., f. *colorata* glumis glumellisque (minus intense) violaceo-coloratis), bei *Amasia* (J. BORNMÜLLER: pl. exs. Anatoliae or. a. 1889 Nr. 424 H. D.), auf der Insel *Samothrake* (leg. A. v. DEGEN 1890. einige Grundblätter unter der Loupe schwach kurzhaarig, anscheinend alle gänzlich kahl), in *Armenien* (P. SINTENIS Iter orient. 1890 Nr. 3558, H. de D.), *Paphlagonien* (P. SINTENIS Iter orient. 1892 Nr. 4235, H. de D.), in *Dahurien* (F. KARO Plantae Dauricæ Nr. 424, H. de D.).

Auch einige von FORMÁNEK in *Macedonien* in schlechten Exemplaren gesammelte Koelerien gehören höchst wahrscheinlich hierher.

#### 2. var. *macrantha*

*K. rigidula* Auet. Traussilvan. p. p. max. (incl. SIMK.). *K. rigida* HACKEL?

*Panicula strictiori cylindrica densa, spiculis evidentur maiorum lato-ribus usque 7 cm. longis, culmis robustioribus elatis, foliis radicalibus interdum planis semper typice rigidis glaucisque.*

Nur in *Transsilvanien* (leg. CSATÓ 1888. BARTH 1888. JANKA 1868. H. de D.).

Diese Varietät ist von einer äusserst charakteristischen Tracht und wäre vielleicht besser als Subspecies aufzufassen. Es ist das im Ganzen ein ganz analoges Verhältniss, wie zwischen der typischen grossährigen und robusten *K. grandiflora* und der gracilen *subcaudata*.

#### 3. var. *pseudoglauca* HACKEL bei *K. cristata*.

*Humilior foliis radicalibus angustis breviribus convolutis scaberrimis, panicula densa conferta cylindrica ramis brevibus, spiculis quoad longitudinem inter var. 1. et 2. intermediis, glumis praesertim in dorso aculeis brevibus scaberrimis.*

So in *Taurien* (Karasubazar. A. CALLIER: Iter Tauricum III. a. 1900 Nr. 763, als *K. cristata* var. *pseudoglauca* (SCHUR) HACKEL det. HACKEL. H. de D.).

#### 4. var. *Jankae* m.

*K. glabra* JANKA ÖBZ. XIV. 172 (1864) solum nomen.

*Culmo elato usque plus 6 dm. alto robustiori sed molliori, caespitibus minus densis, foliis pro more lato-ribus planis, panicula elongata sublobata spiculis minutis circa 4-5 mm. longis, glumellis saepe obtusiuscente acutatis.*

Bisher nur in *Ost-Ungarn* (bei Gross-Vardein. leg. JANKA 1863, H. de D.).

#### 5. var. *macedonica* m.

*Formæ typicae glauco-rigidiorque, rhizomatibus dense caespitosis multiculmibus basi fere bulboso-incrassatis, foliis crassis planis, una cum vaginis dense brevissime viriditer puberulis, culmis strictis gracilibus, panicula latiori spiculis minoribus.*

Bisher nur in Macedonien (auf den Felsen prope Alchhar, J. DÖRFLER, Iter Turicum II. 1893, Nr. 394, H. de D.).

3. *Rhizomatibus bulboso-incrassatis, glumellis aristulatis.*

**K. Degeni** II. sp.

*K. brevis* BRANDZA EXS. 1884, non Steven Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou XXX. II. 110 (1857).

Multiculmis *densissime caespitosa, rhizomatibus bulboso-incrassatis, foliis basilaribus conspicue abbrevialis tantum 2–4 em. longis rigidis scabris convolutis angustissimis glaucescentibus unacum vaginis glabris, foliis caulinis solum 2* (culmis ideo longe nudis excedentibus) *laminis vir 1,5 em. longis instructis unacum vaginis minus glaucis, culmis reetis gracilibus c. 20–25 cm. altis totis glabris, panicula ovoidea vel ovoideo-oblonga contracta densissima pallida, spiculis eirea 5,5–6,5 mm. longis 3–4 floris, glumis inaequalibus spiculis eirea tertia parte brevioribus, glumis puberulis vel glabrescentibus dorso scabris, glumellis pro more adpresso pilosis ad margines et dorsum ciliatis anguste lanceolatis omnibus in aristam tenuem scabram interdum curvatam 1 mm. et ultra longam abeuntibus.*

Floret V.

Habitat in Romania orient., in calcareis ad Greci pr. Macineu (leg. BRANDZA 1884, H. de D.). Ich erlaube mir diese neue Art Herrn Docenten Dr. A. von DEGEN, dessen reichhaltiges Koelerien-Material für meine Studie von ganz besonderer Wichtigkeit war, zu widmen.

Diese *Koeleria*, die in dichten harten Rasen dem felsigen Boden aufsitzt und schon Anfangs Mai in bester Entwicklung sich befindet, bildet einen so selbstständigen Typus, dass sie überhaupt mit keiner Art dieser Gattung näher verwandt ist. Dies äussert sich nicht nur in ihrer Tracht, sondern noch deutlicher in der Zusammensetzung ihrer Aehrcheu, in ihren verdickten Rhizomen etc. Sie stimmt zwar mit der STEVEN'schen *K. brevis* in der «panicula brevi ovata» überein, hat aber mit ihr gewiss gar nichts zu tun, wie dies schon die kurz begründeten Deckspelzen beweisen; STEVEN sagt von seiner Art «paleis acutis».

4. *Rhizomatibus bulboso-incrassatis, glumellis haud aristatis.*

(Gruppe der *K. splendens* PRESL Cyp. et Gram. Sic. 34 [1820], ASCHERS. et GR. Syn. II. 359 [1900]).

Typisch entwickelt sind die *K. caudata*, *grandiflora*, *subcaudata* und *canescens* wohl leicht und gut zu unterscheiden, da sie schon in ihrem Habitus wohl wenig Ähnlichkeit aufweisen. Doch wie schon ASCHERSON I. e. 361 richtig bemerkte, fehlt es bei der *K. grandiflora* nicht an Formen, die deutliche Anklänge an die *K. ciliata* aufweisen; ob es Uebergangsformen sind, wie z. B. v. BECK vermutet, oder nur nicht genug instruktiv gesammelte Herbar-exemplare (ASCHERSON), mag dahingestellt bleiben. Meine feste Ueber-

zeugung ist es, dass die *K. splendens* (*grandiflora*, *subcaudata*, *caesiceps*) eine regionale Art zu der *K. ciliata* und *gracilis* vorstellt und in ähnlicher Weise auch die *K. caudata*. Beide Arten sind vorwiegend Mediterran-Arten, die letztere nur auf die iberische Halbinsel beschränkt. In manchen Distrikten treten sie konstant auf, doch mitunter bilden sie (dies gilt besonders von der ersten Art) der *K. gracilis* und *ciliata* analoge Formen, die zwar gut gesammelt stets ziemlich leicht zu bestimmen sind, bei denen es aber manchmal schwer ist, den ganzen Eindruck der Pflanze, der auf ihre Zugehörigkeit oft am besten urteilen lässt, in Worte zum Ausdruck zu bringen. Dort, wo beide Arten zusammentreffen oder wo die eine in den Verbreitungsgrenzen der anderen wächst, sind sie gewöhnlich minder typisch entwickelt, im Osten zeigen sich auch Anklänge an die *K. glaucovirens*.

In Ganzen sind aber die Arten dieser Gruppe, deren Gliederung folgendermassen durchgeführt werden kann, sehr charakteristisch.

#### *K. caudata*

Lk. in Linnaea XVII. 405 (1843) sub *Airochloa*, STEUD. Syn. glum. I. 293 (1855). HACKEL Catal. 21 (1880), RICHTER Pl. europ. I. 74, *K. splendens* A. *caudata* ASCHERS. et GR. Syn. II. 360 (1900), *K. crassipes* LGE. in Pl. exsicc. Europ. Austral. Nr. 45a (1851—52) et Pug p. 42 (1860). WILLKOMM LANGE Prodr. Fl. Hisp. I. 76 (1861), NYMAN Consp. 815.

*Dense caespitosa, culmis hand numerosis glabris gracilibus basi conspicue bulbosis saepe geniculatim ascendentibus, foliis radi calibus brevibus rigidis glaucis glabrisque saepe ad marginem longe ciliatis curvatim revolutis, vaginis glabris tantum securiusculis inter dum pubescensibus, culmis subhumilibus 2—3 dm, altis rarius etiam altitudinem 6 dm superantibus superne longe nudis nitidis in spicam semper densam (haud interruptam) angustum 2—20 cm, longam spiculis fere sessilibus glabrescentibus vel brevissime puberulis rarius praesertim in glumarum nervo dorsali longe peptinato-ciliatis vel unacum glumellis superne ± hirsutis (f. *pubiflora* m.) constantem abeuntibus, glumis conspicue inaequalibus late lanceolatis, glumellis obtusiusculis, spiculis semper pallidis diminutis tantum 4—5 mm, longis bifloris rarius trifloris. Ligula brevis truncata «dense ciliata» indicatur, sed saepissime lateraliter solum ciliata esse videtur.*

Floret VI. VII.

Habitat in collibus aridis, silvis siccis et in campis graminosis (solo praeceipue calcareo) in Hispania et Algeria.

Ich sah sie aus Spanien (el Escorial, leg. J. LANGE 1851—52! H. de D., ibidem leg. HACKEL 1876, H. de D., Cantabria leg. GANDOGER 1898 f. *pubiflora* m. H. de D., Grenada, leg. ÉL. REVERCHON 1902 in A. KNEUCKER Gram. exs. XII. Lief. Nr. 347. H. U. B., leg. BARE 1900 in ÉL. REVERCHON, Plantes d'Espagne 1900 Nr. 1205 H. de D.)

var. *nevadensis*

HACK, Ö. B. Z. p. 123 (1877). WILLK. Suppl. Pr. Fl. Hisp. 21 (1893).

*Foliis retrorsum curratis longe ciliatis et callose marginatis, panicula compacta, ovato-oblonga.*

So in Nevada (leg. HACKEL 1876 H. de D.)  
var. *algeriensis* m.

*Planta clata circa 50 cm. et plus atta, foliis radicalibus typice glaucis et rigidis, sed strictis hand revolutis longioribus, laminis vaginisque glaberriminis, culmo 4—5 foliato, foliis caulinis laminis vaginas fere aequalibus culmo subadpressis instructis, folio supremo paniculam longam densam inferne rarius subinterruptam tenuissimam adaequante vel superante, ligulis conspicue longioribus protractis usque 1.5—2 mm. longis haud vel parum laciniosis.*

So in Algerien (La Zaécar de Miliana, BATANDIER Pl. d'Algérie 1886, H. de D., H. M. B.).

### *K. splendens*

PRESL, I. e. sensu stricto. *K. spl.* B. *eusplendens* Aschers. et Gr. Syn. II, 360 (1900). *K. splendens* Auct. p. p. max.

*Planta plerumque robusta rarius gracilis rhizomatibus nunc conspicue bulbosis nunc tantum minus incrassatis, caespitibus duris rarius multiculmibus, culmis 2—9 dm. altis pro more usque ad paniculam glaberriminis, foliis basilaribus rigidiusculis saepe planis latioribus vel angustioribus saepe glabris et rix ad margines ciliatis, foliis caulinis planis brevibus, ligulis brevissimis erosive, panicula cylindrica compacta rarius laxiori lobata pallida splendenti spiculis 4½—8½ mm. longis (quoad formam eum *K. ciliata* saepius congruis), glumis conspicue inaequalibus, glumellis tenuiter acuminatis usque fere aristatis late hyalino-marginalis.*

*Tota planta + glauca.* Floret V. VI.

Habitat praecipue in regione Mediterranea in declivibus apriis calidis, in rupinibus et lapidosis, in regionem alpinam (usque 2000 m.) ascendens.

### Sbsp. *K. grandiflora*.

BERTOL. in ROEM. et SCHULT. Mant. II, 345 (1824). *Aira grandiflora* BERT. Fl. It. I, 436 (1833).

*Planta robusta culmis saepe clatis, panicula robustiori, spiculis semper maioribus, 5—8.5 mm. longis.* Floret V—VII.

var. *pyramidalis* m.

*Planta robustissima, foliis latioribus saepeque longioribus rigidiusculis culmis robustis prominule striatis, vaginis glabris culmum laxe ambientibus, panicula magna usque 20 cm. longa multiflora grandispiculata lobata ramis ramulisque saepe longioribus, spiculis maioribus raro longitudinem 5 mm. haud superantibus. Rhizoma interdum subbulbosum.*

So seltener, z. B. in Istrien (bei Abbazia 1902 leg. v. DEGEN, bei Veprinač leg. v. DEGEN 1902), Sicilien (bei Busambra leg. TODARO, H. de D.).

subvar. *elongata* m.

*Minus stricta* el. *glauca*, *foliis radicalibus elongatis* (usque 4 dm.) *lacinis*, *culmis allissimis foliatis*, *panicula angusta valde lobata* *laxiori usque 30 cm. longa*.

So nur in Montenegro (Danilovgrad c. 40 m. leg. ROHLENA 1903). Uebergänge zum Typus auf der Lješanska nahija. c. 200 m., leg. ROHLENA 1903.

subvar. *fallacina* m.

Praecedenti similis, sed *rhizomatibus vir incrassatis*, *foliis radicalibus mollibus sed brevioribus*: a *K. ciliata* var. *pyramidalata* *solum fere culmis ad apicem glaberrimis*, *panicula nitenti*, *foliis glaucescentibus differe videtur*.

So in *Croatien* (Bucari gen San Cosmo, leg. v. DEGEN 1902, *Fiume* (zwischen S. Nicolo und Dolčić, leg. v. DEGEN 1902), *Montenegro* Bar, leg. ROHLENA 1900)

var. *genuina*

Magnitudine cum var. praecedenti convenit, sed *panicula* (*semper grandispiculata*) *densiori* *haud vel vir lobata* *praesertim post anthesin contracta*, *foliis brevioribus rigidioribus* differe videtur.

So z. B. in *Italien* (Aprutii: m. Morrone, Rigo Iter Ital. V. a. 1899 Nr. 19, H. R. H. de D., ibidem leg. GROVES, H. de D., bei Volterra leg. ? 1851, ex Herb. Horti Pisani, H. de D., *Sicilien* (leg. JAGONI 1888, H. D.), *Bosnien* und *Hercegovina* (locis pluribus leg. VANDAS 1886–1889), *Croatien* (Carlopagi, leg. Smoquina 1903, H. de D.), *Fiume* (zwischen Tersatto und Martinsčića leg. v. DEGEN 1902), *Montenegro* (locis pluribus leg. ROHLENA 1900–1903), *Griechenland* (Attica: Pentelicon, De HELDREICH Herb. Graec. norm. Nr. 1397, H. de D., Pindus Tymphaeus: Berg Zygós oberhalb Metzovó, leg. v. HELDREICH 1885, H. de D.).

f. *subpubescens* Rohlena in BÖHM. Ges. Wiss. II. Cl. XXXIX. 27 (1902).

*Vaginis* *molliter dense pilosis*.

So in Montenegro (ROHLENA 1900) und Bosnien (Trebović pr. Sarajevo, leg. VANDAS 1889)

f. *colorata* m.

*Glumis* *glumellisque* *virenti-violaceo tinctis*.

So in Bosnien (VANDAS 1889).

Obzwar die Färbung der Aehrenchen nicht besonders intensiv ist, so verdient diese Form doch erwähnt zu werden, da bei der *K. grandiflora* die Rispen auch in den höheren Lagen ihre blasse Farbe und den charakteristischen Glanz in der Regel bewahren.

f. *interrupta* m.

*Panicula* pro more tota *verticillato-interrupta*.

In Montenegro (Bar, leg. ROHLENA 1900) und nicht so typisch (*ramulis longioribus*) in Dalmatien bei Spalato (leg. STUDNIČKA 1874, H. de D.).

f. *humilis* m.

*Culmis humilioribus circa 2–3 dm. altis gracilioribus, panicula interdum laxiori, spiculis pro more tantum c. 5 mm. longis.*  
Transit in Sbsp. *subcaudata* m.

So in *Croatien* (auf dem Berge Nehaj bei Zengg, leg. v. DEGEN 1902), *Serbien* (leg. PANČIĆ 1885, H. de D.), *Croatien* (Porto Ré, leg. v. DEGEN 1902), *Fiume* (Kostrena Sta Barbara, leg. v. DEGEN 1902), *Hercegovina* (leg. VANDAS 1889).

var. *subaristata*

PANČIĆ Elenchus pl. vascul. Crna Gora p. 97 (1875), *K. eusplendens* A. b. *subar.* ASCHERS. et GR. Syn. II. 360 (1900).

*Glumellis in mucronem longiusculum productis aut soluto infra apicem nervo mediano sub apice aristulatis.*

So in Montenegro (ROHLENA 1900) und bei Fiume (leg. v. BORBÁS 1884, misit VANDAS).

f. *verticillata* ROHLENA l. c.

*Ramulis paniculae brevissimis, spiculis in axi paniculae subsessilibus verticillos remotos formantibus.*

So in Montenegro mit dem Typus (ROHLENA 1900).

var. *pseudorigidula* m.

*Culnis gracilioribus nitidis densissime caespitosis conspicue bulbosis, caespitibus duris, foliis radicalibus brevibus rigidis glaucis glabrisque anguste setaceis convolutis vel complicatis, foliis culmeis paucis laminis vix 2 em. longis instructis, culnis superne longe nudis, panicula pro more grandispiculata intense nitenti.*

So in *Istrien* (Pola, als. K. crassipes leg. FREYN 1875, H. D.), *Albanien* (BALDACCI Iter Albanicum Epiroticum III. a. 1895 Nr. 209 H. de D.), *Griechenland* (Aetolia, leg. v. HELDREICH 1896, H. de D., Euboea, leg. LEONIS 1901, H de D.), *Bulgarien*<sup>25)</sup> bei Šumla leg. MILDE 1894, H. de D.).

Sbsp. *subcaudata*.

*K. eusplendens* A. *grandiflora* II. *subcaud.* ASCHERS. et GR. Syn. II 360 (1900), *K. gracilis* A. KERN. Fl. exs. austrohung. Nr. 695, non PERS. *K. cristata* var. *bulbosa* BORBÁS Hb. 1883.

*Planta humilior 20–55 cm. alta, culnis gracillimis teretibus haud striatis, foliis basilaribus brevioribus angustioribus glaucis planis sed complicatis intermixtis culnis superne longe nudis, laminis foliorum culmeorum brevibus unacum vaginis glabris, ligula brevi, panicula angusta cylindrica ± densa, spiculis conspicue minoribus tantum 3·5–5 mm. longis.*

<sup>25)</sup> Podpera hat in Verh. Z. B. Ges. Wien 679 (1902) eine *K. grandiflora* BERTOL. Sbsp. *Skorpili* Podp. beschrieben, die auf derselben Lokalität ebenfalls von MILDE gesammelt wurde und die in einigen Merkmalen (radice densissime caespitosa, panicula cylindracea, spiculis subtrifloris etc.) mit unserer Varietät übereinstimmt. Da aber die von Podpera beschriebene Pflanze überdies «*vaginis adpresso pilosis, auriculis rigidis in apicem hyalinam protractis*» gekennzeichnet wird, kann sie mit der var. *pseudorigidula* keineswegs identisch sein.

In formis nonnullis praecipue iis, quae e Montenegro oriuntur, *K. caudatae* nimis affinis.

So in *Croatien* (Vellebith, leg. PICHLER, Fl. exs. austro-hung. Nr. 695, H. de D., Carlopago, leg. SMOQUINA 1903, H. de D., ad *grandifloram* vergens ad *Fiume* (leg. v. BORBAS 1883 als *K. cristata* var. *bulbosa* BORB., H. de D.), Montenegro (Podgorica, Katunska nahija, Zarmaki, leg. ROHLENA 1900), Bosnien und Herzegovina (auf mehreren Stellen leg. VANDAS 1886).

subvar. *pseudogracilis* m.

*Rhizomatibus minus incrassatis, culmis gracillimis fere nudis, foliis radicalibus angustis ad margines longe ciliatis, vaginis ciliato-pubescentibus, spiculis paniculaque uti in forma typica*

So in Venetien (leg. RIGO 1886 als *K. gracilis*, H. de D.).

Sbsp. *canescens*

*K. cristata* ♂ *canescens* VIS. Fl. dalm. I. 71 (1842), *K. australis* KERN. ÖBZ. XVII. 8 (1867), NYM. Consp. 816, Suppl. 335, *K. australis* ♀ *velutina* FREYN ZBG. Wien XXVII. 465 (1877), *K. splendens* γ *canescens* G. v. BECK Glasn. Zem. muz. u Bosni i Herceg. XV. 1903, 30, *K. eusplendens* B. *canescens* ASCHERS. et GR. Syn. II. 361 (1900), *K. caudata* b. *australis* RICHTER Pl. europ. I. 74.

*Planta subhumilis* K. subcaudatae vix robustior, *foliis radiocalibus* saepe *brevibus* revolutis pro more convolutis vel complicatis glaucisque raro planis et fere obscure viridibus (sic specimen originale!), *panicula* *densa*, *spiculis brevissime pedicellatis*, *glumis saepius* *floribus brevioribus* *valde viloso hirsutis*.

Ich sah sie aus *Istrien* (Rovigno, auf rotem Lehmboden leg. A. KERNER 1864, H. de D., bei Pola, leg. HUTER 1867, H. de D. forma panicula laxiori sublobata), bei Pola leg. NEUGEBAUER in Fl. exs. austro-hung. Nr. 694, H. de D., bei Pola leg. FREYN 1897, H. D.) und Herzegovina (leg. VANDAS 1886 in einer Form mit bedeutend schwächer behaarten Spelzen).

Neuerdings hat ADAMOVIĆ eine offenbar in den Formenkreis der *Koel. splendens* angehörige Form in dieser Zeitschrift (III. p. 138—139 [1904]) als neue Art. (*Koel. compacta* ADAMOV. [*K. vallesiaca* PANČ. non GAUD!], *K. setacea* PETROV. non DC. !]) beschrieben. Wie ADAMOVIĆ war auch ich überzeugt, dass das, was PANČIĆ und GAUDIN unter der *K. vallesiaca* verstanden, zwei gar nicht verwandte Formen sind. Ich hatte ja auch in H. de D. die Gelegenheit gehabt ein Originalexemplar der PANČIĆSCHEN *K. vallesiaca* zu sehen; das selbe konnte ich (s. oben) nicht anders als *Koel. grandiflora* f. *humilis* m. bezeichnen. Wenn man jetzt aber die Diagnose ADAMOVIĆS näher analysiert, so ersicht man, das sie auf jene Form, die PANČIĆ für die *K. vallesiaca* erklärte, nicht ganz genau passt. Abgesehen davon, dass die in H. de D. enthaltene Originalpflanze teilweise zusammengerollte Blätter hat (andere sind aber wieder ganz flach), soll die *Koel. compacta* im Vergleiche mit dieser Form «*foliis basi*

*villosis in parte superiore pubescentibus» charakterisiert sein, welches Merkmal unserer Pflanze natürlich nicht zukommt. Da aber sonst die ganze Diagnose mit der *K. grandiflora* ganz gut übereinstimmt, halte ich es führ sicher, dass die *K. compacta* ADAMOV. eine allem Anschein nach neue Form der *K. grandiflora* vorstellt, die dann als *K. grandiflora* f. vel var. ADAMOVIÉI m. zu bezeichnen wäre.*

(Schluss folgt.)

### «In verba magistri jurare fallax»<sup>1)</sup>.

Autore V. de Borbás (Kolozsvár).

Német munkák nyomán még 1872-ben kijelentettem<sup>2)</sup>, hogy a systematica a morfologiának kivonata. Ezt a *Silenaceák* és *Gentianaceák* parallelismusa cími cíkkemben szem előtt tartva belső szerkezetöket, mint eikkemhez szorosan hozzá nem tar tozót, szándékosan mellőztem (az ilyent ezentúl is az anatomia kutatójára bizom; örülnék, ha sok, más-irányú szükségesebb tervemet megvalósíthatnám). Csak olyant, ill. néhol mégis többet közöltem, a mennyire most élő elsőrangú növénysystematicus kiterjeszkedni szokott. Hazai botanikusaink ENGLER rendszerét valon túlmagasztalják, pedig ő ezt mikroskopiummal, különösen ilyen-nemű saját kutatásaival nem igazolja. Ezt neki senki fel nem hánlya, tölem, a ki a munkafelosztás elvéről más-irányú és hazai-érdeklő kutatásra vállalkoztam, valószínileg bizonyos inspiratiók hatása alatt. a *felsőbb botanikánknak* írója is mikroskopumi vizsgálatot követel. Elvégre más az anatomia és más a systematica főadata, iránya, tere és kutató eszköze, ha szükségét láttam volna, a kellöt, az irodalomból talán épen olyan «mesteri kézzel» lefordítottam volna, mint a hogy FUTÓ MÍHÁLY is esupán más (nem saját) vizsgálataival kardoskodik. Munkám nem «floristai»; van olyan systematicai apparatussal megalkotva, a minővel a külföldi systematica dolgozik.

Támadó eikkben nem elegendő az anatomiai mester szavára esküdni. Megengedem, hogy SOLEREDEB közleménye nagyjában, bizonyos csoportokra és fajokra megfelelő, de vajon gondolt-e ő ilyen, a kiilső szervezet megegyezősége kívánta összehasonlításra? Ha akár ő, akár F. M. az emlitett példáimnak egy-egy ellenkezőjét, a jeleztem szempontból anatomailag újra megvizsgálta volna, remélhető, hogy tetemes különbségek ellenére is, a részletekben, legalább egy-egy fajon, bukkant volna olyan vonatkozásokra, ha nem sokra is, amelyek a belső szervezetnek valamelyes parallelismusát, megegyezését vagy ősi kapcsolatát igazolnák a kiilső szervezettel. A mig F. M. ezt nem teszi, systematicai eikkemre amugy

<sup>1)</sup> Válasz Futó M.-nak a Magy. Bot. Lapok 205. old. közölt eikkére. Erwiederung auf M. Futó's Artikel auf S. 205. der Ung. Bot. Bl.

<sup>2)</sup> Tanáregyl. Közl. V. 1872., 142. old.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Domin Karl [Karel]

Artikel/Article: [Fragmente zu einer Monographie der Gattung Koeleria.](#)  
[254-281](#)