© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

azonban nem ajánlanám azon okból, mert a *K. gracilis* név 1805 óta általános használatban áll, s mert a *K.* «*cristata*» nevet eddig vagy a *K. ciliatá*-ra ruházták, vagy pedig a gyüjtő név gyanánt használták, s igy a változás csak zavarólag hatna s talán összetévesztésekre is szolgáltatna alkalmat, ezenkívül pedig csak a Spec. plant. első kiadásában leírt «Aira cristata» felel meg a Koeleria gracilisnak, ellenben Linné e nevet későbben tágabb értelemben is használta (felölelvén vele nemcsak a *Koel. ciliatát*, de még más alakokat, sőt egy más nemzetséghez tartozó füvet is!). Igy tehát voltaképen egy «mixtum compositum»-mal állunk szemben; czélszerűbb tehát a *K. cristata* (L.) nevet az egész rokonság, s nem egyes typusnak megjelölésére használni.

A *Koeleria ciliata* Kern. régibb neve a *K. pyramidata* (Lam.), ezt elejtenünk nincsen okunk.

Közleményem megfogalmazása közben Degen Árpád dr. úr szives volt bold. Borbás Vincze tanár úrnak egy a *Koeleriákra* vonatkozó befejezetlen s kéziratban hátrahagyott czikkét velem közölni. Ezen kézirat főbb pontjait a következőkben foglalom össze s teszem közzé:

1. A *Koeleria pyramidata* Lam.-nak feltétlen prioritása van a *K. ciliata* Kern előtt. Utóbbi voltaképen csak Ascherson és Graebner Synopsisában lett először leírva

2. Borbás tanár úr tisztán bibliographiai tanulmányok alapján azon eredményre jutott, hogy Linné *Aira cristatá*ja nem lehet más, mint a *Koeleria gracilis* Pers.; utóbbi tehát *K. cristata* (L.) névvel jelölendő.

3. A prioritás elvének szigorú alkalmazása mellett a *Koeleria valesiaca* Gaud. (= *K. vallesiana* [All.]) *Koeleria splendens* Pourret (1788) sub *Festuca* névvel jelölendő. Allioni neve ugyanis 1789-ből való. Megjegyzem, hogy ezt a nevet már Druce G. C. 1905. évi november havában a Journ. of Botany-ben visszaállitotta jogaiba.

4. Borbás a füzérkék hossza szerint megkülönbözteti a *K. gracilis*-t vagyis *cristatá*-t (4—4½ mm hosszú füzérkékkel), a *K. majoriflorát* Borb. (5—6 mm. hosszú füzérkékkel) s a *K. pyramidata* t Lam. (7—8 mm. hosszú füzérkékkel.)

5. Borbas szerint a «Gesammtspecies» fogalmának alkalmazása s két névvel jelölése, mint azt eddigi dolgozataimban tettem, nem helyes, mert ezen elvont fogalomnak a természetben nincsen megfelelő objectuma.

Liparis Loeselii Rich. in Bosnien (Boszniában)

Von: / Irta: } Max Wetschky (Gnadenfeld).

Am 3. Juni 1905 traf ich in Jajze, der ehemaligen bosnischen Königsstadt, ein, welche am Einfluss der Pliva in den Vrbas, zweier bedeutender Gebirgsflüsse, schön gelegen ist.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kurz vor der Vereinigung mit dem Vrbas bildet die Pliva, über ausgewaschene Nagelfluhwände, die von Epheu malerisch umrankt sind, in 6 bis 8 Armen einen etwa 30 M. hohen prachtvollen Wasserfall.

Asplenium viride Huds., u. *Trichomanes* L. *Cystopteris fragilis* Bernh., *Erysimum panonicum* Cr., u. *Corydalis ochroleuca* Koch. waren hier hie u. da zu finden, während ich an der dem Falle gegenüber liegenden Bergwand in Menge *Polygala Murbeckii* Degen, *Myosotis sparsiflora* Mik. u. sehr vereinzelt *Orchis Simia* Lam. beobachtete.

Am nächsten Tage fand ich Zeit, noch eine flüchtige Excursion nach dem etwa 10 Km. von Jajze entfernten Jezero zu unternehmen, einem kleinen Ort mit mohamedanischer Bevölkerung, an der Pliva gelegen. Der Weg dorthin führt westlich von Jajze im Thale der Pliva aufwärts, an den beiden schönen Seen vorüber, die der Fluss hier bildet. Weiter gegen Jezero hin ist das linke Ufer des Flusses sumpfig, am Rande mit Schilf und *Cladium Mariscus* bewachsen und von ausgedehnten Sümpfen und sumpfigen Wiesen umgeben, auf welchen ich zahlreich *Liparis Loeselii* Rich. fand, meines Wissens neu für die bosnische Flora, in Gesellschaft von *Carex distans* L. u. *C. Hornschuchiana* H., *Menyanthes*, *Pedicularis palustris* L., *Aspidium Thelypteris* Sw., *Orchis laxiflora* Lamk. u. *Scilla pratensis* W. K.

Letztere Art bemerkte ich um Jezero auch zahlreich auf höher gelegenen, trockeneren Wiesen; in Getreidefeldern viel *Conringia perfoliata* Link. u. *Calepina Corvini* Desv.

Közli a czímben megnevezett fajnak Boszniában a Jaize mellett levő Jezero (tó) partján történt felfedezését.

Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

«Schollera paludosa var. nana» Baumg. En. stirp. transs. I. p. 331.

A legújabb irodalmunk szerint az *Oxycoccus*-ok közül csak a *palustris*-t ismertük az országból. Mult év junius havában azonban Kozma Dénes, a budapesti magvizsgáló állomás assistense meglátogatta az erdélyi flóraterület egyik igen érdekes pontját a Kukojszás fellápot Tusnád fürdő közelében (Csikmegye). Egyéb érdekes láp-

Schollera paludosa var. nana» Baumg. En. stirp. transs. I. p. 331.

Nach unserer neuesten Litteratur ist aus unserem Lande aus der Gattung *Oxycoccus* nur eine Art, *O. palustris* bekannt. Im Juni v. J. besuchte Herr Dénes Kozma, Assistent der K. ung. Samenkontrol-Station einen sehr interessanten Punkt des siebenbürg. Florengebietes, das Hochmoor «Kukojszás» bei Tusnád (Com. Csik). Nebst an-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ungarische Botanische Blätter

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Wetschky Max

Artikel/Article: Liparis Loeselii Rich in Bosnien (Boszniában) 336-337