

densiori (vaginae foliaque pilis densis longis reversim subpatentibus canescunt), sed praecipue spiculis parvis 4 mm. vel paulo minus longis bifloris, glumis inaequalibus flosculis brevioribus acutis (nec acuminatis), glumella flosculi primi pro more obtuse acuta (raro subacuta) flosculi secundi subacuta.

Habitat in arenosis ad *Greibenácz* cum praecedenti.

4. *K. splendens* PRESL. var. **albanica** DOM. v. n.

Densissime caespitosa, culmis c. 30 cm. altis gracilioribus sub paniculis tractu c. 1 cm. longo pubescentibus, foliis radicalibus brevissimis c. 1 cm. longis angustissimis convolutis valde rigidis glabris sed pluribus breviter dense pubescentibus intermixtis, vaginis foliorum culmeorum infimorum breviter dense pubescentibus caeteris omnibus glaberrimis, laminis foliorum culmeorum brevibus juxta vaginam planis apice convolutis glabris, paniculis cylindricis subdensis c. 4 cm. longis et 1 cm. latis, spiculis bifloris c. 5 mm. longis pallidis, glumis undique molliter hirsutis, glumellis longe acuminatis insuper hirsutis.

Habitat in *Albania*: Crni-vrh-planina (Scardus) leg. O. BIERBACH, comm. A. de DEGEN.

Varietas egregia a typo valde aberrans indumento spicularum var. *canescenti* (= *K. australi*) maxime affinis!

Előzetes jelentés hazai mohflóránknak egy újabb polgáráról.

Az *Amphidium lapponicum* (Hedw.) Schimp. — cfret. felfedezése a Magas-Tátrában.

Ueber die Entdeckung des *Amphidium lapponicum* (Hedw.) Schimp. — cfret. in der Hohen-Tátra.

Irta: (Györffy István (Makó).

Von:

Hazánknak egyik leggendosabbban átkutatott területéről. a Magas-Tátráról, még mindig kerülnek elő olyan növények. amelyek sporadicus fellépésük-nél fogva vagy kevés helyről vagy hazánk-ból egyáltalában nem ismeretese.

Mint érdekes újdonságot sorolhatjuk az *Amphidium lapponicum* (HEDW.) SCHIMP. — cfret. apró kis mohát ezentúl hazai flóránknak ritka tagjai közé, melyet bryologiai gyűjtéseim

In der Hohen-Tátra, einer der am gründlichsten durchforschten Gegenden Ungarns. kann man noch immer Pflanzen finden, welche zufolge ihres sporadischen Vorkommens nur von wenigen Orten oder aus Ungarn überhaupt noch nicht bekannt sind.

So eine interessante Neuigkeit ist *Amphidium lapponicum* (HEDW.) SCHIMP. — cfret., welches ich diesen Sommer in der Hohen-Tátra in geringer

közben ez év nyarán sikerült a Magas-Tátrában feltalálnom; s pedig a KÉSMÁRKI ZÖLD-TÓ völgyében a «Kupferbank» (Rézpad) alján gránitszikla repedéseiben apró gyepeket alkotva, melyeket a «Kupferbank»-ról leömlő vízesés porrá töredezett hideg vize áztatott.

Kis mennyiségben gyűjtöttem 1906 aug. 8-án körülbelül 1600 m. t. sz. f. m.-ban.

Hazánk flórájára új adat.

Egyéb tulajdonságairól részletesen majd egy más alkalommal fogok megemlékezni.

Menge sammelte; und zwar im (Késmárker) GRÜNEN-SEE-TAL, unter der «Kupferbank», wo es in den Granitspalten kleine Rasen bildet, welche das eiskalte Wasser des von der Kupferbank herabstauenden herrlichen Wasserfalls durchtränkt.

Den 8. August 1906, ca 1600 M. ü. d. M.

Für Ungarn neu.

Ausführlicher werde ich darüber ein anderesmal berichten.

Bryum Hažslinszkyanum n. sp. a magyarországi flóra egy új lombos moh-faja.

Irta: Péterfi Márton (Déva.)

(Táblával.)

Mesophyta.

Gyepje tömött 4—9, igen ritkán 10—14 mm. magas, sárgászínű—szürkészöld. Szárai csokoládészinű barna és erősen szemölcsös rhizoidoktól bőven egyenletesen szőszösek. A szősz révén a szárok egymáshoz tapadva, összeálló gyepeket képeznek. A szárok mérsékeltlen, az ivaros-tájak aljából ágaznak el. Aljukon levéltelenek, közepükön igen apró levelűek, végükön tömötten, majdnem rózsásan levelesek. Anatómiai szerkezetük minden tekintetben azonos a rokon fajokéval. A stereoma vereses-színű barna és meg lehetős vékonyfalú sejtekből való, 3—6 rétegű, az epidermis nem differenciálódott; az axilis edénynyaláb egyszerű: bryoid. Sejtjei csakis a szárok felső — táplált — részeiben pettyesfalúak, egyebütt falaik simák.

A szárok és ágak alján, illetőleg tövén lévő aljlevelek igen aprók, pikkelyformák, lándzsás-tojásdadok, eretlenek (az alsók), vagy gyenge és alig kifutó erűek (a felsőbbek). Sejt szövetségük olyan, mint a lombszelekeké, de a sejtek falai többnyire a levelek egész lemezében vagy a lemez egész alsó felében vörösek, chlorophyll nincsen bennük.

Lombszelekei tojásdad-lándzsásak, 3—5-ször oly hosszúak, mint a milyen szélesek; átlagos méreteik: $1,5-3,0 \times 0,5-0,8$ mm.; kissé domborúak, kihegyezettek, az alsók kisebbek, felfelé fokozatosan nagyobbak. Száraz állapotban észrevehetően a szár körül csavarodnak, rügyformán összeállanak, nedves állapotban hegyes (25°-35°) szög alatt mereven elállanak. A levelek lemeze nem

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Györfy Stephan [István]

Artikel/Article: [Elzetes jelentés hazai mohflóránknak egy újabb polgáráról. 285-286](#)