

magis *C. banaticae* accedit, appendices longiores, basi sensim in basim angustiorem attenuatis, magis rigidae etc.

Hab. in graminosis et pratis inter Loveč et Trojan.

C. bulgarica URUM. et J. WAGN. sp. nov.

Habitu *C. stenolepidis* KERN., caule paullum araneoso, foliis caulinis lanceolatis, mediis circa 4 cm. longis 1 cm. latis. margine minute denticulatis; inflorescentia terminali, paniculato-racemosa, oligocephala: capitulis ovoideis, circa 12 mm. longis, basi 10 mm. diam.; appendicibus squamarum extimarum triangularibus, regulariter pectinatim ciliatis, ciliis tenuibus, longis; pars reliqua appendicis orbicularis; appendicibus interioribus confluenti-membranaceis. Appendices parte plumosaarent, qua de causa vix crediderim eam e hybridisatione *C. Jaceae* et *C. stenolepidis* ortam esse.

Prope Elena legit Urumoff.

C. Zlatarskyana URUM. et J. WAGN. sp. nov.

Proxime affinis *C. Jaceae*. Humilis, 7—30 cm. alta; foliis inferioribus longe petiolatis, ellipticis, caulinis mediis petiolatis vel sessilibus, ellipticis, 2—5 cm. longis, 1—2 cm. latis, viridibus. Capitulis gracilibus 10—13 mm. longis, 3—8 mm. diam. Squamis exterioribus valde elongato-triangularibus, regulariter et distanter pectinato-ciliatis, superioribus in appendicem membranaceam sensim crescentem desinentibus; intimis iis *C. Jaceae* similibus.

Prope Karlovo legit URUMO-F.

C. balcanica URUM. et J. WAGN. sp. nov.

Perennis. Caule circa 50 cm. alto, ramoso, angulato et sulcato, fere laevi vel parte superiore aspero. Foliis radicalibus florendi tempore jam emarcidis, caulinis inferioribus pinnatipartitis, pauci-jugis, partitionibus distantibus circa 3—5 mm. latis; mediis 3—4 jugis, partitionibus inferioribus angustis, lobo terminali magno, circa 1 cm. lato, apice obtuso vel rotundato, apiculato; summis 1—6 lobis vel integris, 2—3 mm. latis, 1·5—2 cm. longis, omnibus viridibus, paullo asperulis. Capitulis circa 15 mm. longis, 12 mm. diam, ovatis; ungue squamarum visibili, striato, appendicibus basi eciliata atris, vix ultra 1 mm. latis, acuminatis, triangularibus, circa 3 mm. longis, margine regulariter et pectinatim 5—6 ciliatis, basi membranula brunnea auctis; flosculis lilacinoroseis; achaenio?

Similis *C. affini* FRIV. (*C. tartareae* VEL.) sed bene differt: habitu minus ramoso (ramis densius foliosis, foliis multo latioribus, viridioribus, squamis elongato-triangularibus, angustis, ciliis magis distantibus, recte patentibus).

Hab. in declivibus apricis supra Vraea.

Additamenta nova Florae Hungaricae.

Auctore: Ludovico de Thaisz (Budapest.)

1. *Heleochnloa schoenoides* (L.) Host. In praedio Kerektó, prope pagum Beodra, (com. Torontál).

2. *Beckmannia erucaeformis* (L.) HOST. In praedio «Kerektó», «Akacs» et «Paktó», prope pagum Beodra, (com. Torontál).
3. *Hordeum Gussoneanum* PARL. In campis pagorum: Beodra, Oroszlámos, Karlova et Valkány (com. Torontál).
4. *Hordeum Gussoneanum* PARL. f. *hirtellum* DEG. In praedio Kopánes, prope opp. Makó (com. Csanád).
5. *Carex pseudo-Cyperus* L. Ad ripas insulae «Csepel», pagi Soroksár oppositas (com. Pest).
6. *Carex nutans* HOST. In lacu montis «Kőlegy», supra pagum Pomáz (com. Pest).
7. *Carex disticha* Huds. In uliginosis turfosis campi Rákos, loco «Angyalföld» dicto, ad Budapestinum. Item in similibus locis paludis «Nádastó», quae ad confines pagi Rákos-Palota oppidique Budapest extenditur.
8. *Cyperus pannonicus* JACQ. In locis salsis rivi exsiccati «Száraz ér» dicti, ad pagum Tót-Komlós (com. Békés).
9. *Ornithogalum tenuifolium* GUSS. In pratis humidiuseculis salsis pagorum Nadab, Fazekas-Varsánd et Simánd (com. Arad).
10. *Ornithogalum refractum* WILLD. In praedio Gerendás, ad opp. B.-Csaba (com. Békés); item ad pagum Apácsa, M.-Bánhegyes, Kunágota et ad praedium Mezőhegyes (com. Csanád).
11. *Sternbergia colchiciflora* W. K. In locis herbidis dominii comitis Apponyi, praedii «Gerendás» prope Békés-Csaba; item in similibus locis pagi Csorvás (com. Békés).
12. *Chenopodium rubrum* L. var. *botryodes* (Sm.) SOND. In locis humidis salsis, ad pagum Simánd (com. Arad).
13. *Chenopodium murale* L. Secus vias, ad pagos Simánd et Szt.-Márton (com. Arad).
14. *Plantago Schwarzenbergiana* SCHUR. In pratis humidiuseculis salsis praedii «Kerektó», prope pagum Beodra (com. Torontál).
15. *Aster dracunculoides* LAM. In fruticetis ad pagum Kis-Jenő, loco «Bökönypuszta» dicto (com. Arad). Civis nova, verosimiliter introducta Florae Hungaricae.
16. *Achillea crithmifolia* W. K. Secus fluvium Danubium, ad pagum Zebegény (com. Hont). Monente dr. de Degen haec planta nuperrime etiam in planicie Hungaricae magnae ad moles Szegedinas ab am. Prof. Emerico Szabó detecta est.
17. *Artemisia salina* WILLD. ssp. *patens* NEILR. var. *oligantha* WALLR. subvar. *pendula* SCHUR. In pratis salsis ad pagum Beodra, loco «Pa. Kerektó» dicto (com. Torontál).
18. *Asclepias syriaca* L. Copiose sponte crescit stirps haec, ad nos olim culturae causa introducta in locis humidiuseculis insulae Danubii, ad pagum Haraszti (com. Pest).
19. *Centaurium uliginosum* (W. K.) BECK. In locis humidis salsis, sub monte «Siva-brada» (com. Scsep.) (CZAKÓ exss!).
20. \times *Brunella bicolor* G. BECK. (= *B. lacinata* \times *grandiflora*).

In pratis silvulae «Berek» inter parentes, ad pagum Drassó (com. Alba-infer.); item in monte «Kecskehegy», ad Budapestinum.

21. *Ajuga Laxmanni* (L.) BTH. Ad margines viarum ad pagum Csorvás, versus pagum Orosháza (com. Békés). In comitatu Békésiensi non est introducta sicut BORBÁS in «Békés vármegye flórája» p. 76 affirmat. In vicino comitatu Csanádiensi etiam secus margines viarum solo arenoso-argilloso multis in locis occurrit nempe ad pagos: Földeák, Apácza, Tót-Bánhegyes, Magyar-Bánhegyes, Kunágota, Kevermes, Dombegyháza, Battonya, ad opp. Makó, ad praedium Mezőhegyes. Vidi etiam ex silva Monorieusi (com. Pest). (CZAKÓ exs.!).

22. *Salvia nutans* L. Plantam hanc in planicie hungarica rarissimam legi secus margines viarum ad oppidum B.-Csaba, versus pagum Csorvás (com. Békés).

23. *Phlomis tuberosa* L. Plantam hanc montanam legi pluribus in locis planicie: nempe in deserto Hortobágy (com. Hajdu); ad pagum Csorvás (com. Békés); ad pagos Tót-Bánhegyes, Dombegyháza et Battonya (com. Csanád).

24. *Myosotis sparsiflora* MIK. In silvulis secus fluvium Maros, ad pagum Szerb-Csanád (com. Torontál).

25. *Cuscuta Epilinum* WHE. In Lino usitatissimo, ad pagum Simánd (com. Arad).

26. *Solanum fluvium* Kit. In locis cultis, ad pagum Simánd (com. Arad).

27. *Linaria kösensis* SIMK. Secus margines viarum, ad pagum Csorvás (com. Békés).

28. *Trochiscunthes nodiflorus* (ALL.) KOCH quam VIKTOR JANKA in Linnaea anno 1859 p. 572 e territorio olim «Banatus» dicto ex errore publicavit, in Hungaria non crescit. Planta quam JANKA cum *Trochiscanthide* confusit, fuit verosimiliter *Ferula Heuffelii* GRISEB. deflorata. Vide etiam publicationem meam in «Növénytani Közlemények» 1900. 2. p. 278 – 9.

29. *Oenanthe media* GRISEB. In pratis uliginosis salsis deserti Hortobágy (com. Hajdu); similibus locis ad pagum Beodra, loco «Pa. Paktó» dicto (com. Torontál).

30. *Crassula Magnolii* DC. (Syn. *Sedum deserti-hungarici* SIMK. Aradm. fl.) In pratis siccis salsis, ad pagum Nagy-Majlát et ad oppidum Makó, loco «Pa. Kopánes» dicto (com. Csanád); ad pagum Tót-Komlós (com. Békés).

31. *Ranunculus lateriflorus* DC. In pratis humidis salsis, ad oppidum Makó, loco «Pa. Kopánes» dicto, et ad pagos Nagy-Majlát et Alberti (com. Csanád).

32. *Fumaria Schleicheri* SOY. et WILLM. Ad Baldócz (com. Scépus). (CZAKÓ exs.).

33. *Coronopus verrucarius* (GAURS.) MUSCHL. et THELL. In vias publicas solo argilloso salso nigro, hungarice «fekete vagy

szurkos szík» dicto, ad pagos Valkány et Beodra, loco «Pa. Bikács» dicto (com. Torontál).

34. *Calepina irregularis* (Asso) THELL. [Syn: *Calepina Corvini* (ALL.) DEW. Secus viam ferream, ad oppidum Szolnok (com. J.-K.-Szolnok).

35. *Arabis Turrita* L. var. *eriocarpa* SCHUR. In silvis ad Thermae Herculis (com. Krassó-Szörény).

36. *Euphorbia acuminata* LAM. Inter segetes, ad pagum Drassó (com. Alba-afer.); similibus locis ad pagum Simánd (com. Arad); et ad oppidum Makó (com. Csanád). (HALÁSZ exss!) sub nomine *E. falcatae* L. qua cum similitate magna saepe confunditur.

37. *Tribulus orientalis* KERN. In locis arenosis secus viam ferream, ad pagum Csorvás (com. Békés).

38. *Lythrum tribracteatum* SALZM. In pratis humidis salsis, ad pagum Beodra, locis «Pa. Kerektó» et «Pa. Aladár» dictis (com. Torontál).

39. *Trifolium ochroleucum* Huds. In locis arenosis, ad pagum Csorvás (com. Békés).

40. *Trifolium resupinatum* L. In locis salsis campi Rákos, versus Kis-Pest, ad Budapestinum (CZAKÓ exss!)

41. *Trifolium angulatum* W. K. In pratis salsis, ad oppidum Makó et ad pagum Nagy-Majlát (com. Csanád).

42. *Trifolium dubium* SIBTH. (Syn.: *T. minus* Sm.) In inundatione fluvii Marusii, ad oppidum Makó, et ad pagum Cs.-Palota (com. Csanád).

43. *Trifolium parviflorum* EHRH. In pratis salsis ad pagos Földeák, Alberti, Nagy-Majlát, et ad oppidum Makó (com. Csanád).

44. *Trifolium striatum* L. In pratis salsis ad pagum Battanya, et ad oppidum Makó, loco «Pa. Kopánes» dicto (com. Csanád).

45. *Vicia striata* M. B. var. *stenophylla* BORB. (Békésm. fl. p. 105.) Secus fluvium Maros ad pagum Apátfalva (com. Csanád).

46. *Vicia serratifolia* JACQ. In locis arenosis, ad pagum Oroszlámós (com. Torontál).

47. *Lotus gracilis* W. K. In pratis humidis salsis ad pagum Beodra, loco «Pa. Akaes» dicto (com. Torontál).

48. *Trigonella monspeliaca* L. In pratis arenosis, ad pagum Apáenza (com. Csanád).

49. *Trigonella monspeliaca* L. var. *lamprocarpa* BORB. Ad oppidum Kun-Félegyháza (com. Pest). (J. WAGNER exs!)

50. *Lathyrus Nissolia* L. In pratis humidis secus rivum Hortobágy, prope loco «Hortobágyi esárda» dicto (com. Hajdu).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Thaisz Lajos von

Artikel/Article: [Additamenta nova Florae Hungaricae. 166-169](#)