

Néhány Cyperacea Késmárk környékéről.

Einige Cyperaceen aus der Umgebung von Késmárk.

Irta: { Nyárády E. Gyula (Késmárk).
 Von: }

A «Flora Carpatorum Centralium», eme a Magas-Tátra növényzetét eléggé behatóan tárgyaló floristikus munka Késmárk környékét is beleilleszti tárgyalási keretébe. Utóbbi terület növényleplét azonban korlátolt részletességgel taglalja s egész seregével tenyészeknek itt olyan növények, a melyeket szerzők innen nem említenek.

Az alábbiakban a sásokból említék fel olyanokat, melyek Késmárk környékén gyakoriak, de a melyek innen eddig nem, vagy csak a szomszédos területekről ismeretesek.

1. **Carex Davalliana** SM. Megfelelő termőhelyen mindenütt közönséges. Így bőven a Rókusz—Sz.-Béla közötti tőzeglápon Tiefergrundban (Késmárk mell.), Forbergi patak és a Weisswasser mentén, Mühlgr. (Rókusz).

2. **Carex vulpina** L. Késmárk—Hunfalu közötti réteken.

3. **Carex muricata** L. Dürrerberg, Barlangliget felett a Kobili vrch tetején (Hohe Ebene), Koronahegy (Pieninek).

4. **Carex diandra** SCHRANK (*syn.*: *C. teretiusecula* GOOD.). Rókusz—Szepes-Béla közötti tőzegláp. Sublechnicnél a Dunajecz jobb partján (Saure Wiese).

5. **Carex stellulata** GOOD. Hosszúerdő (Késm.). Tátraháza.

6. **Carex canescens** L. E növényt SAG. et SCHN. nem említik a Poprád síkjáról, pedig adataik lettek volna, mert feljegyzi azt SCHERFEL is, meg SIMONKAI is (Emlékkönyv). Található: Hunfalu mell., a késmárki Hosszúerdőben, sarpaneci erdőszéleken, Schwarzbach mentén a Rókusz—Sz.-Béla-i tőzeglápon, Rókuszi fellápos területen.

7. **Carex caespitosa** L. Nagy mennyiségben Késmárk—Hunfalu közötti réteken, Tiefergrund (Késm. mell.). Található a késmárki Hosszúerdőben is, hol méternyi magas szárazakat növel.

8. **Carex montana** L. Tiefergrund (Késm. mell.) szárazabb martjai. Goldsberg. Jeruzsálemhegy. (E helyet, hol található, Galgenbergnek is nevezik). Utóbbi lelőhelyen a *var. flavida* WAISE. alakban nő. Bizonyára még több helyütt is nő, noha SAG. et SCHN. SCHERFEL egyetlen adatán kívül a többit, így WAHLENBERG feljegyzését határozottan kétségbevonja.

9. **Carex caryophyllea** LATOURETTE (*syn.*: *C. verna* VILL.). SAG. et SCHN. szerint ezen faj itt kevésbé elterjedt. Módomban van WHLBR. közlését megerősíteni, mert e növény csakugyan mindenütt közönséges. Poprádi Schlösschen, Kobili vrch (Hohe-Ebene), Goldsberg, Forbergi patak völgye. Késmárk—Hunfalu közötti rétek,

Tiefergrund (Késm.), Jeruzsálemhegy, Weisswasser, Nagybara (Sz.-Tepl.—Luesivna között).

10. *Carex longifolia* Host. (*syn.*: *C. polyrrhiza* WALLR., *C. umbrosa* auct. plur. non Host.). Hosszúerdő, Goldsberg.

11. *Carex caryophyllea* × *longifolia* (*umbrosa*). A. u. G. *Syn.* II. p. 128. A Poprád jobbpártján Goldsberg alatt és a Hosszúerdőben gyűjtött alakok erősen érdes levelükkel és a régibb levelek elpusztulásából eredő dús rostüstökükkel tövükön, az umbrosához ütnek. Füzérkéjük alakulása a *caryophyllea*-éval egyezik. A Schwarzbach mentén a Sz.-Béla—Rókusz közötti tőzeplápon gyűjtöttek pedig, minden bélyegükben inkább az umbrosához hasonlítanak.

12. *Carex ornithopoda* Willd. A Weisswasser völgyében gyakori. A hozzá hasonló *C. digitata* L.-t itt nem láttam, de egybeült közönséges, p. o. a rókuszi fellápos területen.

13. *Carex glauca* Murr. Landok mellett a Palenica lábánál bőven.

14. *Carex flava* L. Nagylomnicznál a Tarpatok mentén, Tiefergrund (Késm.), Mühlgr. (Rókusz), Landok a *C. glauca*-val. Sz.-Béla—Rókusz közötti tőzeplápon.

15. *Carex silvatica* Huds. Késmárki Hosszúerdő.

16. *Carex acutiformis* Ehrh. Hunfalú—Késmárk között a vasútvonal mentén. Fehérvíz völgyében Késmárk és Tátraháza között.

17. *Eriophorum latifolium* Hoppe. Landok, Schwarzbach, Sz.-Béla—Rókusz között, Rókuszi fellápos terület.

18. *Blysmus compressus* (L.) Panz. Sublechnicnél a Duna-jez jobbpártján (Saure Wiese), Rókuszi fellápos terület.

19. *Heleocharis pauciflora* (Lightf.) Lk. Schwarzbach a Rókusz—Sz.-Béla-i tőzeplápon bőven. Rókuszi fellápos terület.

Zwei mutmassliche Hybriden aus Tirol.

Von: Dr. J. Murr (Feldkirch.)

1. *Cerastium pseudalpinum* Mh. In der Deutschen bot. Monatsschrift 1899 S. 21 gab ich vom Platzerberg bei Gossensass am Brenner (bei ca. 17—1800 m.) als von mir gefunden das *Cerastium alpinum* L. var. *glabratum* Hartm. an, korrigierte aber diese Angabe bereits S. 132 desselben Jahrganges auf eine inzwischen erfolgte Revision durch Prof. Dr. Correns hin in *Cerastium fontanum* Baumg. var. *glabrescens*, indem ich bemerkte, dass meine Exemplare ganz gleich seien mit solchen, die Dr. Correns auf der Petzen im Unterkärnten gesammelt und mir freundlichst überlassen hatte. In den vegetativen Teilen sieht nun meine Pflanze tatsächlich einem kahlen *C. fontanum* Baumg. täuschend ähnlich; trotzdem war mein Urteil bezüglich ihrer völligen Gleichheit unberechtigt; denn das Exemplar von Correns besteht durchwegs aus bereits fruchtreifen Individuen, während meine Stücke erst am

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Nyarady E.Gyula

Artikel/Article: [Néhány Cyperacea Késmárk környékéről. Einige Cyperaceen aus der Umgebung von Késmárk. 173-174](#)