

42. *Frullania Tamarisci* (L.) DUM. — Siebenbürgen: Aranyos-Tal, zwischen Vidaly und Offenbánya. 11. 5. 1902 (GYÖRFFY).
Wien, 28. XII. 1908.

Magyarországi májmohok.

Irta: Dr. Schiffner Victor tanár (Wien).

Dr. GYÖRFFY feldolgozásra küldött részemre egy kis májmoha-gyűjteményt, e vizsgálat eredményét Dr. GYÖRFFY kérésére e helyen közlöm. E kis munkának talán mégis van valami értéke, mert a legtöbb növény olyan termőhelyről származik, amely helyek eddigelé bryologiaiailag átkutatva nem voltak, de meg másrészt akad közte egynehány ritka faj, amelyeknek az illető termőhelyeken való előfordulása vagy új, vagy általános érdekű. Emé adatok a következők:

1. *Riccia glauca* L. — Magas-Tátra: Szepesbela vidékén a «Rohrwiesen» részen. 700 m.; 1908. VII. 1. (GYÖRFFY).

2. *Sauteria alpina* (NEES et BISC.) MONT. — Magas-Tátra: Bélai mészhavasok «Vaskapu» részén. Substr. mész. 1603 m. t. sz. f. m.; c. fr. 1907. VIII. 4. (GYÖRFFY).

3. *Reboulia hemisphaerica* (L.) RADD. — Magas-Tátra: «Brehi»-hegy Zsdjár mellett. Substr. conglomeratum. 1100 m. t. sz. f. m.; c. fr. 1908. VII. 18. (GYÖRFFY).

4. *Neesiella carnica* (MASS.) SCHFFN. — Magas-Tátra: Bélai mészhavasok «Vaskapu» részén. Substr. mész. 1603 m. t. sz. f. m.; c. fr. 1908. VII. 8. (GYÖRFFY).

Jegyzet. Igen érdekes termőhely, az első Magyarországra és emellett első az Alpések területén kívül!)

5. *Conocephalus conicus* (L.) DUM. — Magas-Tátra: Barlangliget környékén a «Schwarzbach» partján. 800 m. t. sz. f. m.; ster. 1905. VIII. 15. (GYÖRFFY).

6. *Chomocarpon quadratus* (SCOP.) LINDB. — Liptó megye: Račkova-völgy Pribilina mellett; c. fr. 1908. VI. 8. (DEGEN Á.). — Magas-Tátra: Zár mellett «Kempental». Substr. mész; c. fret. 1908. VII. 18. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Zár mellett a «Brehi»-n. Substr. conglomeratum, 1000—1200 m. t. sz. f. m.-ban; c. fret. 1908. VII. 18. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Bélai mészhavasok a Rygliany-patak mentén. Substr. mész. Körülbelül 1300 m. t. sz. f. m.; c. fr. 1908, VII. 18. (GYÖRFFY).

7. *Bucegia romanica* RADIAN. — Magas-Tátra, Késmárki Zöld-tó völgye a «Kupferbank»-on. Substr. granit. 16—1700 m.; c. fr. 1908. VIII. 6. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Menguszfalvi-völgy, a «Vadorzó hágó» magyarországi oldalán. Substr. gneisz. 2200—2250 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 25. (GYÖRFFY).

1) I. A német szöveghez csatolt idézetben.

Jegyzet. Az első termőhelyen a *Bucegia*-t már 1906-ban gyűjtötte volt Dr. GyÖRFFY (l. SCHIFFNER «Über das Vorkommen von *Bucegia romanica* in Ungarn» — in Magy. Bot. Lapok 1908. p. 36 — und «Untersuchungen über die Marchantiaceen-Gattung *Bucegia*» — in Beih. z. Botan. Centralbl. XXIII. 1908. p. 276). A «Vadorzó hágó»-n való előfordulása új adat, s amellet érdektes tekintélyes tengerszínfeletti magasságánál fogva.

8. *Marchantia polymorpha* L. — var. *aquatica* NEES. — Magas-Tátra: Szepesbéla vidékén a «Rohrwiesen» részen, tőzegen. 720 m. t. sz. f. m.; c. fr. 1907. VII. 1. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Zsdjár mellett a «Kempental»-ban. Substr. mész. 1100—1200 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 18. (GYÖRFFY).

Jegyzet. A «Kempental»-ból eredő növények átmeneti alakok a var. *aquatica* és var. *alpestris* közt és hol egyik, hol másik alakhoz közelednek inkább.

— var. *alpestris* NEES. — Magas-Tátra: Fehérvízvölgyben lévő «Kressebrunnen» vizében. Substr. granit. 1213 m. t. sz. f. m.; c. fr. 1904. VIII. 28. (GYÖRFFY).

9. *Metzgeria furcata* L. (em. LINDB.) — Erdély: Vlegyásza-hegység 1600—1700 m. t. sz. f. m.; 1902. IX. 10. (GYÖRFFY).

10. *Metzgeria conjugata* LINDB. — Erdély: Topánfalva mellett a Podur-erdőben; 1902. V. 9. (GYÖRFFY).

11. *Metzgeria pubescens* (SCHRANK) RADDI. — Magas-Tátra: Rothbaumgrund-völgy. Substr. mész. Körülbelül 1000 m. t. sz. f. m.; 1906. VII. 13. (GYÖRFFY). — Erdély: Vlegyásza hegység. 1600—1700 m. t. sz. f. m.; 1902. IX. 10. (GYÖRFFY).

12. *Blasia pusilla* L. — Magas-Tátra: Szepesbéla mellett a «Rohrwiesen» részen. 650—700 m. t. sz. f. m.; ster. 1907. VII. 1. (GYÖRFFY).

13. *Pellia Fabbrioniana* RADDI (= *P. endiviaefolia* [DICKS.] DUM) — Magas-Tátra: Késmárki Zöldtő-völgye, «Deutsche Leiter». Substr. granit. 1700 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VIII. 6. (GYÖRFFY). — Szepes megye: Szepesbéla mellett a «Pfaffenwiese» részen. 700 m. t. sz. f. m. ♂; 1907. VI. 28. (GYÖRFFY).

Jegyzet. A telep közepére hossz-metszetén a sejtek gyűrűs-megvastagodását nem látjuk, így e sterilis növénynek a *P. Fabbrioniana*-hoz való tartozandósága egészen bizonyos. E mészkedvelő növénynek ösközeten való előfordulását, ha nem is új, de mégis különösen ki kell emelnünk.

— var. *pelvetioides* SCHFFN. n. var. — Frons *cartilagineo-carnosa*, *brunnescens*, *rigida*, 5—8 cm. *longa*. *sed* + 3 mm. *tantum lata*, *irregulariter dichotoma*, *ramis divaricatis*, *supra canaliculata*. *Costa lata*, *crassa* (altid. 15 cellul.) *ab alis angustis bene discreta*, *inferne valde convexo-prominens*, *rhizoïdis sparsis obsita*.

Víz alá merült ú. n. «vízi alak», amely természetben és nagyságában hasonlít az északvidéki tengeri algához a: *Pelvetia cana-*

liculata-hoz.*) — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgyében a «Kressebrunnen» vizében. Substr. granit. 1213 m. t. sz. f. m.; 1907. VII. 8. (GYÖRFFY).

14. *Gymnomitrium concinatum* (LIGHTF.) CORDA. — Magas-Tátra: «Trümental»=Omladék-völgy. Substr. granit. 1800—1850 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 26. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Poduplasky-völgy, «Svistovka Dolina». Substr. granit. 1800—2000 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 26. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Késmárki Zöldtó, «Deutsche Leiter». Substr. granit. 1600—1650 m. t. sz. f. m.; 1908. VIII. 6. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Felkai völgy, a Hosszú-tó és a Lengyel-nyereg közt. Substr. granit. 1953—2208 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 26. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Kistarpataki völgy, Öt-tó. Substr. granit. 2016 m. t. sz. f. m.; 1904. VIII. 25. (GYÖRFFY).

15. *Aplozia nana* (NEES) DUM. — Magas-Tátra: A Lengyel-nyereg és a Hosszú-tó közt. Substr. granit. 2208—1953 m. t. sz. f. m.; c. per. 1908. VII. 26. (GYÖRFFY).

Jegyzet. Lehetséges, hogy e növény az *A. lurida* DUM. (sensu J. BREIDLER)-hez tartozik; érett sporogiumok hiánya miatt biztosan eldönteni nem lehet.

16. *Lophozia inflata* (HUDS.) HOWE. — Magas-Tátra: Poduplasky-völgy, «Svistovka Dolina». Substr. granit. 1800—2000 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VII. 26. (GYÖRFFY). — Erdély: Verespatak m. Cetatye-hegyen. Substr. rhyolithus. Körülbelül 800 m.; 1902. V. 11. (GYÖRFFY).

17. *Lophozia alpestris* (SCHLEICH) EVANS. — Magas-Tátra: Morskie Oko. Substr. granit. 1300 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 26. (GYÖRFFY).

18. *Lophozia Floerkei* (WEB. et M.) SCHFFN. — Magas-Tátra: Menguszfalvi völgy, a Poprádi tó partján. Substr. Granit. 1503 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VI. 28. (GYÖRFFY).

19. *Lophozia quadriloba* (LINDB.) EVANS. — Magas-Tátra: Késmárki Zöld-tó völgye, a Kék-tó felett. Substr. granit. 1800—1900 m. t. sz. f. m.; ster. 1907. VIII. 11. (GYÖRFFY).

Jegyzet. Emeritka északi havasi faj Magyarországon való előfordulásának kimutatása igen fontos bryogeographiai jelentőségű és érdekű.

20. *Sphenobolus Michauxii* (WEB.) LINDB. — Erdély: Vlegyásza-hegység, korhadt fán, c. per et ♂. 1500—1700 m. t. sz. f. m.; 1901. VI. 11. (GYÖRFFY).

21. *Leptoscyphus anomalus* (HOOK.) LINDB. — var. *subremotus* SCHFFN. (Krit. Bem. z. V. Ser. der Hep. eur. exs.) — Magas-Tátra: Menguszfalvi völgy, a Poprádi-tó partján. Substr. granit. 1503 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VI. 28. (GYÖRFFY).

22. *Leptoscyphus Taylora* (HOOK.) MITT. — Magas-Tátra:

*) A fenti leírás egy, az alsóausztriai májmohokról szóló kéziratból van kivéve. Eme érdekes alakot én már régóta ismerem (Alsó-Ausztriából (Moosbrunn) s annak idején a «Hepaticae eur. exsicc.»-ban kifogom adni.

Késmárki-Zöldtó. Substr. Granit. 1500 m.; 1903. VIII. 13. (GYÖRFFY).
 — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgye. Substr. granit. 1200—1300 m. t. sz. f. m. ster. *Bazzania tricenata*-val. 1908. VIII. 6. (GYÖRFFY). —
 — Magas-Tátra: Morskie Oko. Substr. gneiss. 1384 m. t. sz. f. m.; c. per. 1908. VII. 26. (GYÖRFFY).

23. *Lophocolea heterophylla* (SCHRAD.) DUM. — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgy. Substr. Granit 1200—1300 m. t. sz. f. m.; c. fr. 1908. VIII. 6. (GYÖRFFY). — Galiczia: Pienninek. Korona-hegy. Körülbelül 1500 m. *Nowellia curvifolia* és *Ptilidium pulcherrimum*-mal; 1902. VIII. 15. (GREISIGER M.)

24. *Chiloscyphus polyanthus* (L.) CORDA. — Erdély: Topánfalva és Zalatna közt; ster. 1902. V. 11. (GYÖRFFY).

— var. *erectus* SCHFFX. — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgy, «Kressebrunnen». Substr. granit. 1213 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 8. (GYÖRFFY).

25. *Cephalozia Lammersiana* (HÜB.) SPRUCE. — Magas-Tátra: Menguszfalvi-völgy. Subst. granit; gyengéd alak *Sphagnum* közt c. per. 1200—1300 m. t. sz. f. m.; 1908. VI. 28. (GYÖRFFY).

26. *Nowellia curvifolia* (DICKS.) MITT. — Galiczia: Pienninek, Koronahegy. Körülbelül 1500 m. t. sz. f. m.; c. per. *Ptilidium pulcherrimum*-mal. 1902. VIII. 15. (GREISIGER M.).

27. *Pleuroclada albescens* (HOOK.) SPRUCE. — Magas-Tátra: Trümental=Omladék-völgy, a Jég-tó partján. Substr. granit, 1935 m. t. sz. f. m. ster.; 1908. VII. 24. (GYÖRFFY).

28. *Lepidozia reptans* (L.) DUM. — Magas-Tátra: Menguszfalvi-völgy. Substr. granit. Körülbelül 1100 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 26. 1908. (GYÖRFFY).

29. *Bazzania tricenata* (WAHLENB.) PEARS. — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgye. Substr. granit. 12—1300 m. t. sz. f. m. ster. *Leptoscyphus Taylori*-val. 1908. VIII. 6. (GYÖRFFY).

30. *Bazzania triangularis* (SCHLEICH.) LINDB. — Magas-Tátra: Bélai mészhavasok, Tscheckengrund. Körülbelül 900—1000 m. t. sz. f. m.; 1905. VIII. 10. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Késmárki Zöld-tó völgye, a Kék-tónál. Substr. granit. 1872 m. t. sz. f. m.; 1907. VIII. 11. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Trümental=Omladék-völgy. Substr. granit. 1700—1900 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 24. (GYÖRFFY). — Erdély: Vlegyásza-hegység. 1600—1800 m. t. sz. f. m.; 1901. VI. 11. és 1902. IX. 10. (GYÖRFFY).

31. *Bazzania trilobata* (L.) GRAY. — Erdély: Vlegyásza-hegység 1700—1800 m. t. sz. f. m. *B. triangularis*-szal; 1901. VI. 11. (GYÖRFFY).

32. *Kantia trichomanis* (L.) GRAY. — var. *Neesiana* MASS. et CAR. Magas-Tátra: Bélai Mészhavasok, Tscheckengrund. 900 m. t. sz. f. m. ster.; 1906. VIII. 16. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgye. Substr. granit. 1300—1400 m. t. sz. f. m. ster.; 1908. VII. 8. (GYÖRFFY).

33. *Ptilidium ciliare* (L.) HAMPE — Magas-Tátra: Fehérvíz-

völgye. Substr. granit. 1300 m. t. sz. f. m. ster.; 1908. VII. 8. (GYÖRFFY).

34. *Ptilidium pulcherrimum* (WEB.) HAMPE — Magas-Tátra: Barlangliget környékén. 700 m. t. sz. f. m.; 1907. VII. 11. (GYÖRFFY). — Erdély: Vlegyásza-hegység. 1500—1700 m. t. sz. f. m.; c. per. 1902. IX. 10. (GYÖRFFY). — Galiczia: Pienninek, Koronahegy. Körülbelül 1500 m. t. sz. f. m.; 1902. VIII. 15. (GREISER M.).

35. *Diplophyllum albicans* (L.) DUM. — Erdély: Vlegyásza-hegység. 1700 m. t. sz. f. m.; c. per. 1901. VI. 11. (GYÖRFFY).

36. *Diplophyllum taxifolium* (WAHLENB.) DUM. — Magas-Tátra: Trümental=Omladék-völgyben a Jég-tó partján. 1935 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VII. 24. (GYÖRFFY).

37. *Scapania curta* (MART.) DUM. — var. *rosacea* (CORDA) CARRINGT. Erdély: Vlegyásza-hegység 1500—1600 m. t. sz. f. m.; pl. ♂ 1901. VI. 11. (GYÖRFFY).

38. *Scapania uliginosa* (Sw.) DUM. — Magas-Tátra: Trümental, a Jég-tó közelségében. Substr. granit. 1800—1900 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VII. 24. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgye, Substr. granit. 1200—1300 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VIII. 6. (GYÖRFFY).

39. *Scapania undulata* (L.) DUM. — Magas-Tátra: Fehérvíz-völgye, Substr. granit. Körülbelül 1200—1300 m. t. sz. f. m.; 1908. VII. 8. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: Trümental=Omladék-völgy. Substr. granit. 1600—1700 m. t. sz. f. m.; ster. 1908. VII. 24. (GYÖRFFY). — Magas-Tátra: a Tölcsér-tó vidékén a «Koethe forrás» közelében. Substr. granit. 1800 m. t. sz. f. m.; ster. 1907. VII. 24. (GYÖRFFY).

40. *Madrothea laevigata* (SCHRAD.) DUM. — Erdély: Kolozsvár vidéke a Hideg-Szamos-völgyben; 1905. VII. 11. (GYÖRFFY).

41. *Frullania dilatata* (L.) DUM. — Erdély: Topánfalva mellett a «Podur» erdőben c. fr.; 1902. V. 9. (GYÖRFFY).

42. *Frullania Tamarisei* (L.) DUM. — Erdély: Aranyos-völgye Vidaly és Offenbánya közt; 1902. V. 11. (GYÖRFFY).

Wien, 1908. decz. hó 28-án.

A *Trifolium Lupinaster* L. felfedezése Magyarországon.

Ueber die Entdeckung von *Trifolium Lupinaster* L. in Ungarn.

Irta: }
Von: } Hulják János (Pereczesbánya).

Az 1908. évi augusztus első napjaiban egy rég tervezett botanikai kirándulást valósítottam meg. Így 1-én Turóczmegyében, a Blatnica melletti gyönyörű szépségű Gagyeri-völgyben, 2-án a

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Schiffner Viktor Ferdinand auch Felix

Artikel/Article: [Magyarországi májmohok. 29-33](#)