



Beobachtungen zu Frühjahrszug, Brutzeit und Herbstzug 2009 sowie Winter 2009/2010 in der Steiermark

zusammengestellt von

Hartwig W. Pfeifhofer & Sebastian Zinko

Folgende Kürzel wurden verwendet: „ad.“ für adult(e), „dj.“ für diesjährig(e), „vj.“ für vorjährige, „Ex.“ für Exemplar(e), „Bp.“ für Brutpaar(e), „Ind.“ für Individuen/Individuum, „immat.“ für immatur(e), „juv.“ für juvenil(e), „KJ“ für Kalenderjahr, „PK“ für Prachtkleid, „WK“ für Winterkleid, „JK“ für Jugendkleid, „SK“ für Schlichtkleid, „subad.“ für subadult(e), bei Möwen werden die Abkürzungen „So.“ für Sommer(kleid) und „Wi.“ für „Winterkleid“ benutzt.

Taxonomie, Reihenfolge der Arten, deutsche Artnamen, sowie die wissenschaftlichen Namen richten sich nach der aktuellsten Version der Checkliste der Vögel Österreichs vom Juli 2010 (http://www.khil.net/AFK/Artenliste_Oesterreich.pdf).

Beobachter und Beobachterinnen

Für diese Zusammenstellung wurden die Meldungen von 48 Beobachtern und Beobachterinnen verwendet:

AKU Alfred Kuntner	GWÖ Günter Wöss	MDU Max Dumpelnik
AOF Aaron Ofner	HAU Heinz Auer	MFO Max Fochtmann
ATI Andreas Tiefenbach	HJA Helmut Jaklitsch	MTI Michael Tiefenbach
CFU Christiane Fuchs	HKU Hansjörg Kunze	MWE Matthias Weißensteiner
CNE Christoph Neger	HPH Hartwig Pfeifhofer	OSA Otto Samwald
CPF Christine Pfeifhofer	HWA Helga Waltl	RJA Rudolf Janoschek
CZE Christian Zechner	JBR Johann Brandner	RPA Roya Payandeh
EAL Ernst Albegger	JFÜ Johannes Frühauf	SBA Sabine Bauer
EBA Erich Bauer	JLS Josef Lassacher	SBE Sophie Berger
ESA Erich Sabathy	JLZ Josefine Lanz	SPA Simin Payandeh
FEG Fritz Eger	JMO Josef Moosbrugger	SUR Sebastian Url
FSA Franz Samwald	JPU Johann Puntigam	SZI Sebastian Zinko
GGR Gerhard Graggaber	JRI Josef Ringert	TPF Thomas Pfeifhofer
GMD Günter Maderbacher	KMÜ Klaus Mühlböck	UFL Ursula Flem
GPU Günter Pucher	LKH Leander Khil	VMA Volker Mauerhofer
GTR Gertrud Tritthart	MBR Martin Brader	WST Willi Stani

Sterntaucher (*Gavia stellata*): Am 2.1.2009 wurde im Grazer Feld 1 Ind. am Schwarzlsee beobachtet (CNE). Im Herbst rastete im Leibnitzer Feld von 30.10.-3.11. 1 ad. am Planksee bei Wagendorf; ein weiterer ad. Sterntaucher wurde am 26.11. am Aldrianteich bei Tillmitsch beobachtet, wo sich auch von 14.12.-16.12. bis zu 1 ad. und 2 juv. aufhielten (WST, SZI). Im Grazer Feld konnte je 1 juv. am 27.12. 2009 am Schotterteich beim Cargo-Center Wundschuh und am 17.1.2010 am Stausee Mellach beobachtet werden (EAL, SZI).

Prachtaucher (*Gavia arctica*): An den Schotterteichen im Grazer Feld rasteten 1 vj. Ex. von 1.10.-3.10. und 1-2 juv. von 7.11.-23.12. (SZI). Im Leibnitzer Feld rastete am 16.12. 1 ad. am Aldrianteich bei Tillmitsch, und am 7.1. 2010 schwamm 1 ad. am Murstau Lebring (WST).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): Im Jahr 2009 gelangen zahlreiche Beobachtungen in allen Landesteilen. Brutnachweise wurden aus dem unteren Murtal von den Fischteichen bei Halbenrain (8 Bp. mit 21 pulli), vom Schwabenteich (3 Bp. mit 7 pulli), von den Brunnseer Teichen (1 Bp. mit 3 pulli) und von den Schotterteichen bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau (5 Bp. mit 15 pulli) gemeldet, aus der Oststeiermark vom Saazer Teich (2 Bp. mit 4 pulli) und von den Teichen in Kirchberg/Raab (5 Bp. mit 14 pulli) und aus der Weststeiermark vom Spiegelteich bei Preding (1 Bp. mit 2 pulli). Im unteren Murtal wurden auch die größten Trupps beobachtet; sie umfassten 71 Ind. am 3.8. an den Schotterteichen bei Seibersdorf und 75 Ind. am 2.9. am Schwabenteich (MFO, AKU, JLZ, JMO, HPH, CPF, RPA, SPA, BRO, WST, ATI, SZI).



Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Anfang 2009 wurde je 1 Ind. am 6.1. am Murstau Obervogau, am 8.1. an den Schotterteichen bei Eichfeld/St. Veit am Vogau und von 27.1. bis 30.1. am Murstau Gralla beobachtet (WST). Brutnachweise, teils mit Zweitbruten, wurden aus der Oststeiermark von den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (5 Bp. mit 25 pulli), von den Neudauer Teichen (1 Bp. mit 5 pulli), von den Kirchberger Teichen (1 Bp. mit 3 pulli) und vom Saazer Teich (2 Bp. mit 5 pulli) gemeldet, aus dem unteren Murtal vom Pöltener Teich (2 Bp. mit 5 pulli), von den Halbenrainer Teichen (2 Bp. mit 6 pulli), vom Röksee in Gosdorf (1 Bp. mit 1 juv.), von den Schotterteichen bei Eichfeld (4 Bp. mit 11 pulli), vom Schwabenteich in Oberrakitsch (3 Bp. mit 7 pulli), vom Weinburger Teich (1 Bp. mit 3 pulli) und von den Teichen beim Schloss Brunnsee (3 Bp. mit 9 pulli), aus dem Leibnitzer Feld vom Planksee bei Wagendorf (1 Bp. mit 1 pullus), von den Schotterteichen in Tillmitsch (4 Bp. mit 9 pulli) und vom Frühwaldteich in Lebring (1 Bp. mit 3 pulli), aus der Weststeiermark vom Spiegelteich bei Preding (4 Bp. mit 13 pulli), aus dem Grazer Feld vom Schotterteich beim Cargo-Center Wundschuh/Großsulz (1 Bp. mit 3 pulli) und vom Kratochwillteich in Neuwindorf (2 Bp. mit 8 pulli) und aus der Obersteiermark vom Furtnersteich (2 Bp. mit 3 pulli).

Von 25.12.2009 bis 17.1.2010 überwinterten 7-9 Ind. am Aldrianteich in Tillmitsch, von 2.1.-31.1.2010 hielten sich bis zu 15 Ind. an den Schotterteichen im Grazer Feld auf und je 1 Ind. am 12.1. an den Schotterteichen in Eichfeld, am 25.1. am Stausee Gralla und am 26.1.2010 am Stausee Lebring (MFO, JLZ, JMO, RPA, SPA, HPH, KPO, RPO, JPU, JRI, BRO, FSA, WST, ATI, GWÖ, SZI).

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*): Am 27.11.2009 wurden 2 Ind. an den Schotterteichen im Grazer Feld beobachtet (JPU).

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*): Am 11.10. schwamm 1 ad. im Grazer Feld im Privatbadesees Hautzendorf (SZI).

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): Am Heimzug rastete 1 ad. am 23.4. im Leibnitzer Feld am Aldrianteich bei Tillmitsch und 4 ad. besuchten am 3.5. den Mühlteich in Kirchberg an der Raab (HPH, SZI). Im unteren Murtal rastete am Wegzug von 12.7.-20.7. 1 ad. und von 2.9.-3.9. 1 juv. am Schwabenteich (WST, SZI). Von 1.8.-13.8. rasteten in Summe 3 ad. und 5 juv. an den Schotterteichen bei Seibersdorf (HPH, SPA, WST, SZI) und am 4.8. besuchte 1 ad. die Schotterteiche bei Eichfeld (WST, SZI). Recht spät erschienen 2 ad. am 4.12. an den Schotterteichen im Grazer Feld, wo sich 1 Ind. noch von 21.12.2009 bis 3.1.2010 aufhielt (EAL, FSA, SZI).

Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*): Am 28.8. überflog 1 Ind. Lichendorf Richtung Nordwest (H. Koppin)!

Krauskopfpelikan (*Pelecanus crispus*): Am 26.2.2010 wurde 1 ad. Krauskopfpelikan von am Murstau Gralla entdeckt (JBR). Es handelt sich um den ersten Nachweis für Österreich! Der Pelikan verweilte am Stausee bis zum 27.2. und konnte von zahlreichen VogelbeobachterInnen aus Steiermark, Kärnten, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Slowenien beobachtet werden.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): Vom Kormoran gelangen zwischen 2.1.2009 und Ende Februar 2010 zahlreiche Beobachtungen in allen Landesteilen. Die größten Trupps umfassten je 90 Ind. am 12.3.2009 am Murstausee Gralla und am 16.3.2009 an den Neudauer Teichen. Am 3.11.2009 flogen abends 200 Ind. bei Fürstenfeld nach Südosten und 212 Ind. saßen an einem Schlafplatz bei Großwilfersdorf (FSA). Von 4.11. bis 7.11.2009 fischten 90 Ind. bei Speltenbach/Fürstenfeld, 90 Ind. am 12.12.2009 am Stausee Mellach und 100 Ind. am 4.1.2010 am Schlafplatz am Stausee Gralla (MFO, GMD, JMO, SPA, HPH, KPO, RPO, JPU, BRO, FSA, WST, ATI, SZI).

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*): Der überwiegende Teil der Beobachtungen gelang an der Mur: Am 6.1.2009 rastete 1 ad. bei der Feuerweherschule Lebring (WST), am 24.11. rastete 1 ad. auf einem Stein in der Mur beim Augarten in Graz, wo auch am 3.2. 1 Ind. beobachtet werden konnte (SZI) und von 23.12.2009-16.3.2010 hielten sich bis zu 16 Ind. (4 ad., 12 juv.) an der Mur zwischen Mellach und Obervogau auf (HPH, CPF, TPF, FSA, WST, ATI, SUR, SZI). In der Oststeiermark wurde am 15.3.2009 1 ad. beim Schloss Hainfeld (ATI) gesehen und am 28.8.2009 1 juv. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*): Einzelne Rohrdommeln konnten in den Herbst- und Wintermonaten beobachtet werden. Am 16.1.2009 wurde 1 Ind. am Murstau Gralla aufgegriffen (WST). In der Oststeiermark fischte am 20.9. und 18.10. je 1 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA). Am 2.11. rastete je 1 Ind. bei Vasoldsberg (RPA) und an den Teichen beim Schloss Brunnsee (WST). Am 9.12.2009 rastete 1 Ind. am Schwabenteich in Oberrakitsch (SZI) und 1 Ind. überwinterte von 17.1.-21.2.2010 am Murstau Obervogau (WST, SZI).

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*): Brutnachweise wurden im Jahr 2009 in der Oststeiermark an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (1 Paar mit 2 juv.) und an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (2 Paare mit 5 juv.) sowie im unteren Murtal an den Teichen beim Schloss Brunnsee (1 Paar mit 2 juv.) und an den Stürgkhteichen bei Halbenrain (1 Paar mit juv.) erbracht (JLZ, RPA, SPA, FSA, WST, SZI).



Weitere Beobachtungen betreffen je 1 ♂ am 1.6. an den Neudauer Teichen (FSA) und am 27.6. am Sieldorfer Teich (SZI) und 1 juv. von 13.8.-23.8. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST, SZI). Am 16.8. wurde die Rupfung eines Ind. am Schwabenteich in Oberrakitsch gefunden (WST).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Im Raabtal rasteten von 3.4. bis 7.4. 2-5 ad. beim Schloss Hainfeld, wo auch am 10.5. 1 Ind. beobachtet wurde (KMÜ, ATI) und 1 ad. am 19.4. bei Hohenbrugg an der Raab (ATI). Am Murstau Gralla wurde am 28.4. 1 ad., am 7.6. 1 vj. und am 8.7. 1 Ind. gesehen (JBR, CNE, FSA, SZI). Zwischen 8.5.-18.6. wurde immer wieder 1 Ind. bei Vasoldsberg gehört (RPA, SPA).

Ab 31.5. wurde mindestens ein adultes Paar an den Brunnseer Teichen beobachtet, das offensichtlich dort oder in der näheren Umgebung brütete; ab 7.7. wurde es nämlich von 3 frisch flüggen juv. begleitet. Diese Familie verweilte beim Schloss Brunnsee bis 9.8.2009. Zusätzlich hielten sich dort am 6.6. 2 vj. und am 12.7. und 8.8. je 1 vj. auf (HPH, RPA, SPA, WST, CZE, SZI).

Im Raabtal wurde am 4.7., 2.8. und 15.9. je 1 juv. an den Teichen in Kirchberg beobachtet (GMD, RPA, SPA, SZI). Im Feistritztal riefen 1-2 Ind. am 5.7. und 24.7. in Fürstenfeld (FSA) und je 1 juv. rastete am 18.7. und 30.8. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf. In Altenmarkt bei Fürstenfeld wurden am 30.7. 4 juv. gesehen, wovon 1 juv. tot in einer Astgabel hing (FSA). Im unteren Murtal hielten sich am 7.7. und von 1.8. bis 16.8. jeweils 1-2 juv. am Schwabenteich auf (HPH, RPA, SPA, WST, SZI) und am 15.7. rastete 1 Ind. am Sieldorfer Teich (MFO). In der Weststeiermark wurden zwischen 17.8. und 24.8. 2-4 Ind. an den Waldschacher Teichen (JPU) beobachtet.

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*): Von 11.5. bis 15.5. verweilte 1 ad. an einem Fischteich in Speltenbach bei Fürstenfeld (E. Kober, FSA) und 1 juv. rastete von 28.7. bis 1.8. an den Brunnseer Teichen (WST, HPH, SPA, SZI).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Am Heimzug wurden in der Weststeiermark zwischen 17.4. und 9.5. 1-3 ad. an den Waldschacher Teichen (JPU, WST, SZI) beobachtet. Im unteren Murtal konnte am 9.5. 1 Ind. bei Halbenrain (ATI) gesehen werden und in Leitersdorf im Raabtal zwischen 9.5. und 11.5. 1-2 ad. beim Schloss Hainfeld (ATI, SZI). Im Grazer Feld rastete an den Schwarzlzeichen je 1 ad. am 15.5. und 6.6. (JPU, SZI). Am Wegzug rastete je 1 Ind. am 6.7. am Murstausee Gralla (WST), am 12.7. am Schwabenteich in Oberrakitsch (SZI) und am 18.9. am Weinburger Teich (WST). 2 Ind. verweilten am 19.9. im Grazer Feld am Schwarzlsee (SZI).

Silberreiher (*Casmerodius albus*): Vom Silberreiher gelangen zwischen Anfang Jänner 2009 und Ende Februar 2010 zahlreiche Beobachtungen aus vielen Teilen der Steiermark, wobei der Schwerpunkt im südöstlichen Alpenvorland lag. Die größten Trupps umfassten am Heimzug 28 Ind. am 2.3.2009 bei Sieldorf und 24 Ind. am 15.3. am Weinburger Teich. Im Herbst 2009 umfassten die größten Trupps im unteren Murtal je 45 Ind. am 10.10. am Rabenhofer Teich und am 14.10. am Herrschaftsteich in Halbenrain, 70 Ind. am 22.10. am Schwabenteich und 75 Ind. am 30.10. an den Teichen beim Schloss Brunnsee. An den Schottergruben im Grazer Feld wurden 44 Ind. am 30.10. und in Speltenbach bei Fürstenfeld 32 Ind. am 7.11. beobachtet (JBR, MDU, MFO, RJA, JLS, GMD, CNE, RPA, SPA, HPH, JPU, BRO, ESA, FSA, WST, ATI, SZI).

Graureiher (*Ardea cinerea*): Obwohl Graureiher in vielen Teilen der Steiermark beobachtet wurden, trafen nur wenige Meldungen über Bruten ein: In der Kolonie in Kirchberg an der Raab wurden 11 besetzte Horste gezählt, je eine Kolonie mit vier besetzten Horsten in Oberhall bei Admont und Frauenberg bei Admont und 1 ad. mit 2 flüggen juv. am 9.5. in Altenmarkt bei Fürstenfeld (JMO, FSA, SZI).

Die größten Trupps am Heimzug umfassten bis zu 31 Ind. zwischen 4.3. und 30.3. am Schwabenteich in Oberrakitsch; am Wegzug waren es je 40 Ind. am 10.10. am Rabenhofer Teich und am 11.10. an den Waldschacher Teichen. Im Raum Hainsdorf-Oberrakitsch hielten sich 45 Ind. am 3.11. und 60 Ind. am 7.11. auf (HAU, RJA, JLS, VMA, JMO, HPH, KPO, RPO, JPU, BRO, FSA, WST, ATI, SZI).

Purpureiher (*Ardea purpurea*): Am Heimzug rastete im unteren Murtal 1 ad. am 8.5. an den Brunnseer Teichen (SZI), 1 vj. am 9.5. bei Halbenrain (ATI) und 1 Ind. am 24.5. am Rabenhofer Teich (WST). Am 31.5. flogen abends 2 vj. aus einer Feuchfläche im Sugaritzwald auf und zogen Richtung Nordosten ab (SZI).

Am Wegzug rasteten 1-3 juv. von 28.7.-6.10. am Schwabenteich (WST, SZI), 1-3 juv. von 30.7.-30.8. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA), 1-2 juv. von 1.8.-8.8. und am 2.9. an den Brunnseer Teichen (HPH, SPA, WST, SZI). Jeweils 1 juv. war am 2.8. an den Waldteichen in Kirchberg/Raab (SZI), am 5.8. am Gaishorner See (RPA, SPA), am 7.8. am Fuchsschweifteich bei Neudau (FSA) und am 9.8. an den Schotterteichen bei Seibersdorf (WST) zu sehen.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*): Von 15.3.-2.9. trafen zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-9 Ind. aus vielen Teilen der Steiermark ein (SBE, JBR, UFL, MFO, JMO, RJA, AKU, HKU, JLS, VMA, CNE, RPA, SPA, HPH, JPU, BRO, ESA, FSA, WST, ATI, GWÖ, SZI), erfolgreiche Bruten wurden aber nur aus dem oberen Feistritztal (1 Bp. mit mind. 3 juv.), dem oberen Lafnitztal und der Umgebung von Murau (1 Bp. mit 2 juv.) gemeldet (SBE, VMA, GMD, BRO).



Höckerschwan (*Cygnus olor*): Von folgenden Orten wurden Brutnachweise gemeldet: aus dem Lafnitztal vom Fuchsschweifteich bei Neudau (1 Bp. mit 6 pulli); aus dem unteren Murtal von den Teichen beim Schloss Brunnssee (1 Bp. mit 8 pulli), vom Schwabenteich in Oberrakitsch (1 Bp. mit 4 pulli), von den Halbenrainer Teichen (1 Bp. mit 8 pulli) und vom Sieldorfer Teich (1 Bp. mit 5 pulli); aus dem Leibnitzer Feld vom Aldrianteich in Tillmitsch (1 Bp. mit 3 pulli); aus dem Raabtal vom Saazer Teich (1 Bp. mit 3 pulli), vom Reither Teich (1 Bp. mit 1 pullus) und vom Mühlteich in Kirchberg (1 Bp. mit 6 pulli); aus dem Palental vom Gaishorner See (1 Bp. mit 4 pulli) sowie aus dem Ennstal von der Enns bei Admont (1 Bp. mit 3 pulli) und von der Grieshoflacke (1 Bp. mit 7 pulli) (JMO, RPA, SPA, WST, SZI).

Die größten Trupps umfassten bis zu 118 Ind. am Murstau Mellach zwischen 2.1. und 24.1.2009, bis zu 117 Ind. am Schwabenteich zwischen Mai und September 2009, 85 Ind. am Stausee Gralla zwischen 27.12.2009 bis 2.1.2010 und bis zu 124 Ind. am Murstau Mellach von 31.1. bis 25.2.2010 (JPU, WST, SZI).

Saatgans (*Anser fabalis*): Am 14.11. überflog ein rufender Trupp um 21:45 Uhr die Burg Deutschlandsberg in Richtung Westen (SZI) und am 20.1. rasteten 11 Ind. (ssp. *rossicus*) im Mürztal bei St. Marein (MDU).

Blässgans (*Anser albifrons*): Am 17.2.2009 flogen um 19.30 Uhr mehrere Blässgänse rufend über den Lustbühel in Graz und bei Schneefall überflogen am 19.3. 28 Ind. den Lustbühel nach Osten (SZI).

Graugans (*Anser anser*): Beobachtungen von Wildvögeln: Am 31.1.2009 zogen 11 Ind. über Vasoldsberg nach Osten (RPA, SPA), am 22.3. rastete 1 Ind. auf den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (RPO, KPO) und 2 Ind. waren am 5.4. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab zu sehen (ATI). Am 6.4. zog im Grazer Feld 1 Ind. bei Neuwindorf nach Osten und am 10.10. überflogen 4 Ind. den Schwarzlsee (SZI). Im Leibnitzer Feld zogen am 15.12.2009 29 Ind. über den Aldrianteich in Tillmitsch nach Süden (SZI), und am 21.12. rasteten dort 2 Ind. (WST). Zwischen 23.1.2010 und 25.2.2010 rasteten am Stausee Gralla 1-6 Ind. der ssp. *anser* (WST, SZI), am 13.2. überflogen 40 Ind. Bad Radkersburg in Richtung Westen (MFO) und am 27.2. zogen 55 Ind. über Thien nach Osten (RPA, SPA).

Beobachtungen von der verwilderten Population: Ein Paar, das sich ab 9.3.2009 an den Rabenhofer Teichen aufhielt, wurde dort ab 24.5.2009 mit fünf pulli beobachtet (WST). Ab 9.4.2009 hielten sich 6 ad. an Löschteichen in Gratkorn auf; davon wurde ein Paar ab 27.4. mit drei pulli beobachtet (SZI). Am Gaishorner See wurden ab 14.4.2009 3 ad. festgestellt; ein Paar erbrütete dort 3 juv. (RPA, SPA, SZI). An den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau hielten sich 2 ad. von 14.4. bis 19.4. auf (WST, SZI), am Schwabenteich 1 ad. am 17.4. und von 21.6. bis 16.8. (HPH, SPA, WST, SZI). Am 10.5. wurde ein Paar mit einem pullus an den Wundscher Teichen beobachtet (RPA, SPA) und am 7.6. 3 ad. am Frühwaldteich in Lebring (SZI).

Beobachtungen von Flüchtlingen, die vermutlich nicht mit der verwilderten Population in Verbindung stehen: 2 Ind. hielten sich von 5.4. bis 16.5.2009 im Ennstal am Dreherteich auf (KPO, RPO), je 1 Ind. von 6.4.2009 bis 27.2.2010 am Stausee Gralla und von 6.4.-20.4.2009 am Murstau Obervogau (WST, SZI). Am Mühlteich in Kirchberg/Raab verweilte 1 ad. von 2.10. bis 3.10. und der dort schon seit Jahren anwesende Vogel wurde zwischen 2.1.2009 und 25.2.2010 an der Copacabana-Freizeitanlage südlich von Graz beobachtet (SZI).

Kanadagans (*Branta canadensis*): Am 15.3. hielten sich 4 Ind. an den Waldschacher Teichen auf (CNE).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*): Am 15.3. und 21.7.2009 sowie am 2.1. 2010 wurde ein gelb beringter, zahmer ad. wieder beim Neuschloss Wundschuh beobachtet, wo dieser Vogel seit 2006 immer wieder gesehen worden war (HPH, SZI). Am 11.2.2010 rastete ein unberingtes, scheues vj. Ind. kurz am Murstau Obervogau (WST); zwischen 13.2. und 2.3.2010 wurde dort hingegen ein zutrauliches, aber unberingtes ad. Ind. beobachtet (HPH, CPF, TPF, WST, SZI).

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*): Am 24.1., 25.1. und am 27.2.2010 hielt sich 1 ad. am Murstau Gralla auf (HPH, WST, SZI, u. v. a.).

Brandgans (*Tadorna tadorna*): Am 8.5.2009 rasteten 3 ♂, 1 ♀ am Mühlteich in Kirchberg/Raab (ATI, SZI), am 27.6. landeten 1 ♂, 2 ♀ am Saazer Teich (SZI), 1 ad. ♀ rastete am 9.11.2009 am Weinburger Teich (WST) und von 4.1. bis 31.1.2010 überwinterte 1 ♀ am Murstau Mellach (GMD, SZI).

Mandarinente (*Aix galericulata*): Am 27.2.2009 wurde 1 Ind. in Vasoldsberg gehört, wo am 25.4. 1 ♂, 1 ♀ und am 5.8. 1 ♀ beobachtet werden konnten (RPA, SPA). Im Bezirk Murau wurde am 22.4. 1 Ind. mit Züchterraing tot am Furtner Teich gefunden (BRO). In Graz schwamm am 17.12.2009 ein Paar in der Mur nahe der Puntigamer Brücke (SZI), am 2.1.2010 1 ♂ am Stausee Gralla (HPH, SZI) und am 9. und 10.2.2010 hielten sich 14 ♂, 7 ♀ an der Mur im Grazer Murfeld (SZI) auf.

Brautente (*Aix sponsa*): Am 9. und 10.2.2010 wurde ein Paar gemeinsam mit Mandarinenten an der Mur im Grazer Murfeld beobachtet (SZI).



Pfeifente (*Anas penelope*): Je ein überwinterndes ♀ konnte am 5.1.2009 am Stausee Gralla (WST) und am 13.1. an der Lafnitz bei Fürstenfeld (FSA) gesehen werden und 1 ad. ♂, 2 ♀ hielten sich von 18.1.-24.1. am Stausee Mellach (SZI) auf.

Im Grazer Feld rastete am Heimzug 1 ad. ♂ am 8.3. am Samitzteich (SZI). Im Raabtal rasteten am 15.3. 1 ♂, 3 ♀ und am 30.4. 2 ♂, 1 ♀ am Mühlteich in Kirchberg (ATI) sowie am 22.3. 1 ♀ am Reither Teich (ATI). Im Unteren Murtal besuchte am 15.3. 1 ad. ♂ den Teichmeister-Teich im Sugaritzwald (WST), und 2 vj. ♂ waren am 6.4. am Stausee Gralla (SZI) zu sehen. In der Obersteiermark rastete am 28.3. ein Paar am Dreherteich bei Weißenbach (RPO, KPO), und 1 ♂ wurde am 15.4. am Grundlsee (RPA, SPA) beobachtet.

Der Wegzug machte sich als erstes im Grazer Feld bemerkbar, wo 1 juv. am 17.9. westlich von Kalsdorf (SZI) gesehen wurde. In weiterer Folge hielten sich zwischen 10.10.2009 und 9.2.2010 bis zu 39 Ind. an den Schotterteichen südlich von Graz (HPH, FSA, SZI) auf. Im Bezirk Murau rasteten 1-2 Ind. von 18.9. bis 24.9. an der Dobler Lacke (BRO). Im Unteren Murtal waren zwischen 18.9. und 22.10. bis zu 10 Ind. am Schwabenteich (WST, SZI) zu beobachten, den Weinburger Teich besuchten 6 Ind. am 30.10. (SZI), und 3 Ind. rasteten am 3.12. an den Schotterteichen in Eichfeld (WST). Im Leibnitzer Feld rasteten zwischen 29.9.2009 und 2.1.2010 bis zu 27 Ind. am Stausee Gralla (HPH, WST, SZI), zwischen 1.10.2009 und 3.1.2010 bis zu 17 Ind. am Aldrianteich bei Tillmitsch (WST, SZI) sowie zwischen 3.11.2009 und 3.1.2010 bis zu 47 Ind. am Golfplatz Lebring (FSA, WST, SZI). Im Raabtal besuchte 1 ♀ am 2.10. den Saazer Teich (SZI), und 5-7 Ind. rasteten am 2. und 3.10. am Mühlteich in Kirchberg (SZI). Zwischen 4.10. und 15.11. rasteten 2-7 Ind. an den Neudauer Teichen im Lafnitztal (GMD, FSA) und im Feistritztal waren am 7.11. 1 ad. ♂ und 2 juv. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA) zu sehen. Im Ennstal rasteten 1 juv. ♂ und 1 ♀ am 22.11. am Stiftsteich Admont (JMO).

Einige Pfeifenten überwinterten an der Mur: Am Stausee Mellach wurden von 13.12.2009 bis 27.2.2010 bis zu 12 ♂, 10 ♀ (GMD, HPH, CPF, TPF, FSA, SZI) beobachtet, ein Paar am 16.1.2010 bei Sieldorf (WST), bis zu 2 ♂, 4 ♀ zwischen 17.1. und 19.2.2010 am Murstau Obervogau (HPH, WST, SZI), 1 vj. ♂, 1 ♀ am 13.2. bei der Murecker Schiffsmühle (SZI) und 2 ad. ♂, 1 ♀ am 21.2.2010 am Stausee Gralla (WST).

Schnatterente (*Anas strepera*): An der Mur überwinterten zwischen 2.1. und 17.3.2009 bis zu zwei Paare am Murstau Obervogau (WST), zwischen 5.1. und 19.3.2009 bis zu drei Paare am Stausee Gralla (WST, SZI), und ein Paar wurde am 18.1. am Stausee Mellach (SZI) beobachtet. Im Ennstal hielt sich zwischen 1.1.-10.6.2009 sowie von 5.8. bis 17.12.2009 1 ♂ beim Grabnerhof bei Weng (JMO) auf.

Am Heimzug wurde im unteren Murtal je ein Paar am 15.2.2009 an den Schotterteichen bei Eichfeld (JBR), von 2.3. bis 4.3. an den Brunenseer Teichen (WST) und am 2.3. am Weinburger Teich (WST) beobachtet. Am Teichmeister-Teich im Sugaritzwald rasteten am 15.3. zwei Paare (WST) und ein Paar von 14.4. bis 11.5. am Schwabenteich (WST, SZI). Im Raabtal waren von 20.3. bis 9.5. 2 ♂, 1 ♀ am Mühlteich in Kirchberg (CNE, FSA, ATI, SZI) zu sehen und in der Weststeiermark ein Paar am 5.4. am Spiegelteich in Preding (RPA, SPA). Ebenfalls ein Paar hielt sich am 5.4. im Grazer Feld am Privatbadensee Hautzendorf (SZI) auf. Im Lafnitztal verweilte zwischen 10.3. und 20.3. ein Paar an den Neudauer Teichen (FSA), wo noch recht spät 1 ♀ am 13.6. beobachtet werden konnte (FSA).

Der einzige steirische Brutplatz, die Fischteiche bei Halbenrain, waren ab 28.3. mit bis zu 10 ♂, 9 ♀ gut besetzt; hier wurden ab 15.6. 5 ♀ mit 26 pulli festgestellt (CNE, FSA, ATI, SZI).

Der Wegzug begann am 6.7. mit je 1 ♂ am Aldrianteich in Tillmitsch und am Murstau Gralla (WST). In der Folge rasteten im unteren Murtal am Schwabenteich in Oberrakitsch zwischen 25.7.-10.10. 1-4 Ind. (WST, SZI) und am Weinburger Teich am 22.10. 1 ♀ (WST). Im Raabtal besuchte 1 Ind. am 15.9. die Waldteiche in Kirchberg (GMD), wogegen sich im Leibnitzer Feld an den Schotterteichen bei Tillmitsch zwischen 10.10.2009 und 1.1.2010 bis zu 9 ♂, 6 ♀ aufhielten (JBR, WST, SZI). An den Schotterteichen im Grazer Feld rasteten von 30.10. bis 22.12.2009 bis zu 5 ♂, 5 ♀ (SZI) und im Feistritztal an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf von 17.12.2009 bis 1.1.2010 bis zu 9 ♂, 5 ♀ (FSA). Im Ennstal wurden am 28.11. am Dreherteich bei Weißenbach 2 ♂, 4 ♀ beobachtet (KPO, RPO). An der Mur hielten sich zwischen 30.10.2009 und 27.2.2010 bis zu 6 ♂, 4 ♀ am Stausee Gralla auf (HPH, FSA, WST, CZE, SZI), bis zu 3 ♂, 2 ♀ zwischen 4.1.2010 und 25.2.2010 am Murstau Mellach (GMD, SZI), bis zu 4 ♂, 3 ♀ am Murstau Obervogau zwischen 5.1.2010 und 23.2.2010 (HPH, CPF, TPF, WST, SZI) und am 12.1.2010 schwamm 1 ♂ in der Mur auf Höhe der Murecker Schiffsmühle (WST).

Krickente (*Anas crecca*): Von der Krickente liegen zahlreiche Beobachtungen zwischen 2.1. und 5.5.2009 sowie zwischen 23.6.2009 und 27.2.2010 vor. Die größten Trupps umfassten 93 Ind. am 13.1. und 102 Ind. am 20.1.2009 am Murstau Obervogau, 39 Ind. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf am 21.8., 57 Ind. am Schwabenteich am 2.9., 50 Ind. am Privatbadensee Hautzendorf bei Graz am 30.10. und 100-122 Ind. zwischen 11.1.2010 und 13.2.2010 am Murstau Obervogau (MFO, GMD, JMO, CNE, SPA, HPH, KPO, RPO, JPU, BRO, FSA, WST, ATI, SZI). Brutnachweise wurden nicht gemeldet.

Spießente (*Anas acuta*): An der Mur wurde je ein überwinterndes ♀ von 18.1. bis 13.2.2009 am Murstau Obervogau (WST), am 18.1. am Murstau Mellach (SZI) und am 21.1. und 12.3. am Stausee Gralla (WST, SZI) beobachtet sowie 1 ♂ am 24.1. am Stausee Mellach (SZI).

Am Heimzug rasteten am 2.3. 2 Ind. und am 15.3. ein Paar am Samitzteich im Grazer Feld (CNE, SZI). Im Raabtal verweilte je 1 ♂ am 9.3. sowie am 14. und 15.3. am Mühlteich in Kirchberg (ATI) und im Ennstal ebenfalls 1 ♂ am 14.3. auf den Rosswiesen bei Weißenbach (RPO, KPO).



Am Wegzug rasteten im unteren Murtal 1-2 ♀ von 29.8. bis 2.9. am Schwabenteich in Oberrakitsch (WST, SZI) und je 1 ♂ am 18.10. an den Schotterteichen in Eichfeld sowie am 22.10. und 2.11.2009 am Weinburger Teich (JBR, WST). In einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf am Schwarzaubach hielten sich am 18.9. 2 juv. auf (SZI). Im Raabtal rastete 1 Ind. am 2.10. am Mühlteich in Kirchberg (SZI) und im Leibnitzer Feld 1 ♀ am 16.12. am Aldrianteich in Tillmitsch (WST). Im Grazer Feld wurden am Schwarzlsee am 10.10. 12 Ind., am 30.10. 13 Ind. und am 13.12.2009 5 Ind. (SZI) beobachtet. Eine Reihe von Beobachtungen gelang an der Mur, wo am Stausee Gralla 1 ♂, 1 ♀ am 10.10., 1 ♀ von 23.12.2009 bis 21.2.2010 und 1 ♂ am 24.1.2010 gesichtet wurden (HPH, FSA, WST, SZI). Zwischen 21.12.2009 und 11.2.2010 hielt sich 1 ♀ am Murstau Obervogau auf (WST, SZI) sowie am 31.1.2010 2 ♀ am Stausee Mellach, wo am 19.2.2010 auch 1 ♂ beobachtet werden konnte (GMD, SZI).

Knäkente (*Anas querquedula*): Vom Heimzug, der von 9.3. bis 9.5.2009 dauerte, wurden zahlreiche Beobachtungen aus vielen Teilen der Steiermark gemeldet. Der Zughöhepunkt lag um Mitte März mit 58 Ind. am 14.3. an den Fischteichen im Raabtal und 43 Ind. am 15.3. an den Schotterteichen im Grazer Feld (VMA, JMO, KMÜ, CNE, RPO, KPO, FSA, WST, ATI, SZI). Zur Brutzeit wurde im unteren Murtal am Schwabenteich ein Paar am 18.5. und je 1 ♀ am 4.6. und 9.7. beobachtet. An den Teichen in Halbenrain wurde am 27.6. 1 ♂ beobachtet (WST, SZI). Brutnachweise wurden aber keine gemeldet.

Der Wegzug begann am 25.7. und dauerte bis 30.10.2009, wobei die größten Trupps 57 Ind. am 1.8., 72 Ind. am 3.8. und 38 Ind. am 7.8. am Schwabenteich umfassten; 30 Ind. wurden am 11.8. am Murstau Gralla gesehen (SPA, HPH, FSA, WST, SZI).

Löffelente (*Anas clypeata*): Je 1 ♂ hielt sich am 20. und 21.1.2009 am Murstau Obervogau (WST) auf und am 8.2. am Schotterteich beim Cargo-Center bei Wundschuh (SZI).

Am Heimzug rasteten von 9.3.-30.4.2009 bis zu 4 ♂, 5 ♀ an den Fischteichen des Raabtales (KMÜ, ATI, SZI) und an den Schotterteichen im Grazer Feld bis zu 5 ♂, 5 ♀ zwischen 9.3.-23.4.2009 (SZI). Im Feistritzal verweilten am 13.3. 2 ♂ und am 5.4. 2 ♂, 1 ♀ an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA). Im unteren Murtal wurde am 28.3. 1 ♂ an den Schotterteichen in Eichfeld und 1 ♀ an den Halbenrainer Fischteichen beobachtet (CNE, SZI), und 1 ♂ besuchte am 9.4. den Pöltener Teich (MFO). In der Weststeiermark rasteten 11 Ind. am 5.4. am Spiegelteich bei Preding (RPA, SPA) und ein Paar am 11.4. an den Neudauer Teichen (FSA). Vergleichsweise spät wurden im unteren Murtal am 24.5. 2 ♂, 1 ♀ am Schwabenteich (JBR, WST) und im Grazer Feld am 6.6. 1 ♂, 1 ♀ am Privatbadesee Hautzendorf beobachtet (SZI).

Am Wegzug rasteten im unteren Murtal zwischen 25.7.-22.10.2009 bis zu 6 Ind. am Schwabenteich in Oberrakitsch. Je 1 juv. ♀ rastete am 22.8. und 28.8.2009 im Feistritzal an den Großwilfersdorfer Schotterteichen, wogegen dort am 2.10. 1 juv. ♂ beobachtet werden konnte (FSA). Im Leibnitzer Feld hielten sich am Aldrianteich bei Tillmitsch am 10.10. 4 Ind. und am 30.10. 1 Ind. auf; zwischen 8.12. und 15.12.2009 rasteten dort bis zu 12 ♂, 8 ♀ (JBR, WST, SZI). Im Murstau Gralla schwammen 7 Ind. am 3.9. und 3 Ind. am 21.10. (SZI). An den Schotterteichen im Grazer Feld rasteten 1-3 Ind. zwischen 14.9. und 10.10., 41 Ind. am 30.10. und 2 ♂, 1 ♀ am 15.12. (SZI). In der Obersteiermark rastete je 1 ♀ am 4.10. und 28.10. an der Enns beim Grabnerhof bei Weng (JMO).

Im Winter gelang am 23.12. die Beobachtung eines Weibchens am Schwarzlsee und am 2. und 3.1.2010 am Murstau Gralla (HPH, FSA, SZI). Je 1 ♂ wurde am 27.12.2009 und von 15.1.-20.1.2010 am Schotterteich beim Cargo-Center Wundschuh, von 2.1.-6.1.2010 am Aldrianteich in Tillmitsch und am 31.1. am Murstau Mellach gesehen (HPH, WST, SZI).

Kolbenente (*Netta rufina*): Von 17.1.-9.2.2009 überwinterten bis zu 3 ♂, 2 ♀ an der Mur am Stausee Mellach (JPU, SZI), am 27.1. schwamm ein Paar am Stausee Lebring (ATI). Im Grazer Feld hielten sich zwischen 8.3. und 20.3. bis zu 3 ♂, 3 ♀ am Schotterteich beim Cargo-Center in Wundschuh auf (SZI) und von 15.3. bis 19.3. 1 ♂ am Privatbadesee Hautzendorf (SZI). Von 17.4. bis 22.4. besuchte ein Paar den Schwabenteich in Oberrakitsch (CNE, WST, SZI), wo sich 1-2 juv. von 30.7. bis 16.8. sowie 1-3 „♀“ von 2.10. bis 18.10.2009 aufhielten (HPH, SPA, WST, SZI). Im Feistritzal rastete von 28.8.-30.8. 1 juv. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA). Im Leibnitzer Feld wurde an den Schotterteichen in Tillmitsch 1 juv. ♀ zwischen 18.10. und 27.11.2009 beobachtet, zwischen 4.12. und 17.12.2009 ein Paar und 1 ♀ am 1.1.2010 (WST, SZI). Im Grazer Feld hielt sich von 9.12.2009-3.1.2010 ein zahmes juv. ♂ mit Züchtering am Schwarzlsee auf (FSA, SZI) und am 11.12. 1 ♂ am Schotterteich beim Cargo-Center in Wundschuh (SZI). An der Mur überwinterten von 2.1. bis 25.2.2010 1-2 ♀ am Stausee Mellach (GMD, HPH, CPF, TPF, SZI) und 1 ♂ wurde am 17.2.2010 an der Mur bei Kellerdorf gesehen (WST).

Tafelente (*Aythya ferina*): Von der Tafelente gelangen von Jänner 2009 bis Februar 2010 zahlreiche Beobachtungen. Brutnachweise wurden von den Halbenrainer Teichen (4 ♀ mit 21 pulli), von den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (2 ♀ mit 8 pulli) und vom Fuchsschweifteich in Neudau (2 ♀ mit 16 pulli) gemeldet (FSA, SZI). Die größten Trupps umfassten bis zu 535 Ind. am Aldrianteich in Tillmitsch am 11.12.2009 und 480 Ind. am Murstausee bei Mellach am 25.2.2010 (MFO, JLZ, JMO, CNE, RPA, SPA, KPO, RPO, FSA, WST, ATI, SZI).



Tafel-x Moorente (*Aythya ferina x nyroca*): Das räumliche und zeitliche Verteilungsmuster der Beobachtungen lässt darauf schließen, dass immer dieselben beiden ♂ beobachtet wurden. Ein Männchen wurde in der Oststeiermark beobachtet, und zwar am 11.4. und 9.6.2009 im Lafnitztal am Fuchsschweifteich in Neudau (FSA) sowie am 7.11. im Feistritztal an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA, AOF). Im Grazer und Leibnitzer Feld wurde ebenfalls 1 ♂ von 14.9. bis 6.10.2009 am Kratochwillteich in Neuwindorf (SZI), am 25.11., 11.12. und 23.12.2009 an den Schotterteichen in Tillmitsch (SZI), am 23.12. am Murstausee Lebring, von 27.12.2009 bis 15.1.2010 am Privatbadeseesee Hautzendorf und am 31.1. am Murstau Obervogau beobachtet (HPH, SZI). Von 21.12.2009 bis 25.2.2010 wurden 1-2 ♂ am Murstau Gralla beobachtet (HPH, WST, SUR, SZI).

Moorente (*Aythya nyroca*): Im Jahr 2009 kam es zu einem überdurchschnittlich starken Auftreten der Moorente in der Steiermark: Am 6.1.2009 hielten sich 2 Ind. am Murstau Gabersdorf auf (WST), am 14.3. 1 ♀ am Mühlteich in Kirchberg/Raab (ATI) und am 15.3. 1 ♂ am Murstau Lebring (SZI). Im unteren Murtal hielt sich von 24.5. bis 31.5. und am 21.6. ein Paar am Schwabenteich in Oberrakitsch auf. Zwischen 30.7. und 15.10.2009 waren dort bis zu 25 Ind., wobei die Zahlen stark schwankten und in Summe in diesem Zeitraum mind. 17 ad. und 31 juv. rasteten (HPH, SPA, WST, SZI). Bei Halbenrain wurden am 15.6. 2 Ind. beobachtet (ATI) und je 1 juv. am 3.8., 13.8. und 3.11. an den Schotterteichen bei Seibersdorf (WST, SZI). Im Raabtal wurde am 2.8. 1 ♂ an den Waldteichen in Kirchberg gesehen (SZI), im Feistritztal von 4.8. bis 30.8. sowie am 23.9. und 2.10. 1-5 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (GMD, FSA, SZI) und im Lafnitztal 1-2 Ind. am 7.8., 18.9., 4.10. und 10.10. an den Neudauer Teichen (FSA). Im Leibnitzer Feld hielten sich von 13.9. bis 23.12.2009 bis zu 10 Ind. an den Schotterteichen in Tillmitsch auf (JBR, WST, SZI) und an den Schotterteichen im Grazer Feld rasteten bis zu 7 Ind. zwischen 14.9. und 30.10.2009 (SZI). Im Winter wurde je 1 ♂ von 23.12.2009 bis 4.1.2010 am Murstausee Lebring, zwischen 2.1. und 25.2.2010 am Stausee Mellach, am 3.1.2010 am Murstau Gralla und am 9.2.2010 am Murstau Gabersdorf (GMD, FSA, SZI) beobachtet.

Tafel-x Reiherente (*Aythya ferina x fuligula*): Im Lafnitztal wurde am 23.5. 1 Ind. im Fuchsschweifteich in Neudau beobachtet (RPA, SPA).

Moor-x Reiherente (*Aythya nyroca x fuligula*): Am 18.9. hielt sich 1 ♂ im Grazer Feld am Kratochwillteich in Neuwindorf auf (SZI).

Reiherente (*Aythya fuligula*): Von der Reiherente gelangen zwischen Jänner 2009 bis Februar 2010 zahlreiche Beobachtungen. Brutnachweise wurden von den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (3 ♀ mit 7 pulli), vom Großen Neudauer Teich (1 ♀ mit 1 pullus), von den Schotterteichen bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau (1 ♀ mit 6 pulli), vom Kratochwillteich in Neuwindorf (1 ♀ mit 9 pulli), vom Murstau Obervogau (ein nicht flügger juv.), von den Waldteichen in Kirchberg/Raab (2 ♀ mit 6 pulli), von den Teichen beim Schloss Brunnsee (1 ♀ mit 6 pulli) und von der Enns bei Admont (3 ♀ mit 14 pulli) gemeldet (JMO, FSA, WST, SZI). Die mit Abstand größten Ansammlungen wurden vom Murstausee Mellach gemeldet: Hier konnten am 18.1.2009 294 und am 25.2.2010 310 Ind. gezählt werden (GMD, CNE, RPA, SPA, HPH, BRO, FSA, WST, ATI, SZI).

Reiher-x Bergente (*Aythya fuligula x marila*): Am 2.1. wurde 1 ♀ im Murstau Mellach beobachtet (HPH, SZI).

Bergente (*Aythya marila*): Ein juv. ♂ wurde am 18.1.2009 am Stausee Mellach und am 27.1. am Stausee Lebring beobachtet (ATI, SZI). Im Herbst/Winter 2009/10 kam es in der Steiermark zu einem überdurchschnittlich starken Auftreten von Bergenten. Abgesehen von einem sehr frühen ad. ♀, das am 21.9. die Waldteiche in Kirchberg an der Raab aufsuchte (ATI) wurden die übrigen Bergenten im Grazer und Leibnitzer Feld beobachtet: Von 24.11.2009 bis 1.1.2010 hielten sich bis zu 4 juv. ♂, 6 juv. ♀ am Aldrianteich bei Tillmitsch auf (HPH, WST, SZI) und von 25.11.2009 bis 24.1.2010 waren bis zu 7 juv. ♂, 5 juv. ♀ (bei stark wechselnden Zahlen) am Privatbadeseesee Hautzendorf zu sehen (HPH, FSA, SUR, SZI). Am 31.12.2009 wurde eine weibliche Bergente am Privatbadeseesee Hautzendorf von „Waidmännern“ angeschossen; sie verendete etwa dreieinhalb Wochen später im zufrierenden Gewässer. An der Mur wurde am 2.1.2010 1 juv. ♂ am Stausee Lebring gesehen (SZI) und 1 ad. ♂ von 21.2.-25.2.2010 am Stausee Gralla und am Stausee Lebring (HPH, SUR, SZI). Ein vj. ♂ blieb von 21.2. bis 17.3.2010 am Samitzeich südlich von Graz (HPH, FSA, SUR, SZI). Insgesamt waren an diesem Einflug mindestens 40 Bergenten beteiligt!

Trauerente (*Melanitta nigra*): Am 21.12.2009 rastete 1 ♀ am Murstau Gralla (WST).

Samtente (*Melanitta fusca*): Am 23.12.2009 erschienen 2 juv. ♂ am Schotterteich beim Cargo-Center Wundschuh und blieben dort bis 27.12.2009. Dieselben 2 juv. ♂ schwammen von 3.1.-4.1.2010 am Schwarzlsee, besuchten am 5.1. den Aldrianteich bei Tillmitsch und überwinterten in der Folge bis 31.3.2010 auf der Freizeitanlage „Copacabana“ bei Kalsdorf (EAL, JPU, FSA, SZI). Von 8.2.-9.2.2010 rastete 1 juv. ♀ am Murstau Obervogau (WST, SZI).

Schellente (*Bucephala clangula*): Überwinternde Schellenten wurden in erster Linie an der Mur beobachtet, und zwar von 6.1. bis 10.3.2009 bis zu 5 ad. ♂, 15 ♀ an der Mur bei Obervogau; am Stausee Gabersdorf 1 ♀ am



6.1. und 1 ad. ♂, 2 ♀ am 28.1. (WST); je 1 ad. ♂ am 8.1. und 20.1. am Stausee Gralla und ebenfalls in Gralla 1 ♀ war am 24.1. (SZI) und 1 ad. ♂, 2 ♀ am 26.1. (JBR, WST); 1 ad. ♂, 2 ♀ hielten sich am 17.1.2009 an der Mur bei Mitterling (WST) auf. Abseits der Mur wurde 1 ♀ am 22.2. westlich von Feldbach (ATI) beobachtet und 1 ad. ♂ rastete am 9.3. am Samitzteich im Grazer Feld (SZI).

Am Wegzug rastende Schellenten konnten hauptsächlich im Grazer und Leibnitzer Feld beobachtet werden. Am 30.10.2009 wurden erstmals 1 ad. ♂, 2 ad. ♀ an den Schotterteichen im Grazer Feld gesehen (SZI) und am 13.12. rasteten 2 ad. ♂, 1 ad. ♀ am Aldrianteich Tillmitsch sowie 1 ad. ♀ am Privatbadensee Hautendorf (JBR, WST, SZI). Von 14.12.-16.12.2009 hielt sich 1 ad. ♀ an den Schotterteichen in Tillmitsch auf (WST, SZI) und am 24.12. waren 3 Ind. beim Neuschloss Wundschuh zu sehen (JPU). Im Feistritztal rastete am 23.11. 1 ad. ♂ an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA).

Auch im Winter 2009/2010 gelangen Beobachtungen von Schellenten hauptsächlich an der Mur: Zwischen 21.12.2009 und 21.2.2010 hielten sich bis zu 3 ad. ♂, 3 ♀ am Stausee Gralla auf (HPH, CPF, TPF, FSA, WST, SZI), von 21.12.2009 bis 14.3.2010 waren bis zu 10 ad. ♂, 12 ♀ an der Mur bei Obervogau zu sehen (JBR, HPH, WST, SZI), von 18.1. bis 21.2.2010 konnten bis zu 3 ad. ♂, 1 ad. ♀ am Stausee Lebring beobachtet werden (GMD, FSA, WST) und von 9.2.-21.2.2010 hielten sich bis zu 2 ad. ♂, 4 ad. ♀ am Stausee Gabersdorf auf (HPH, WST, SZI). Abseits der Mur schwammen 2 ad. ♂ und 1 ad. ♀ am 23.1.2010 am Schotterteich beim Cargo-Center Wundschuh (SZI).

Zwergsäger (*Mergus albellus*): Zu ungewöhnlicher Jahreszeit schwamm am 17.5. ein Paar am Mühlteich in Kirchberg an der Raab (ATI). Von 25.11.2009 bis 1.1.2010 verweilte 1 ad. ♀ an den Schotterteichen in Tillmitsch (WST, SZI) und am 31.1.2010 besuchte 1 ad. ♂ den Murstau Obervogau (WST, SZI).

Mittelsäger (*Mergus serrator*): Im Grazer Feld schwamm je 1 ♀ am 30.10.2009 und 3.1.2010 im Privatbadensee Hautendorf (FSA, SZI).

Gänsesäger (*Mergus merganser*): Zwischen 2.1.2009 und 27.2.2010 gelangen zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-16 Ind. an der Mur, der Enns und unteren Sulm. Brutnachweise wurden nur vom Stausee Gralla (3 ♀ mit 17 pulli) gemeldet (JBR, MFO, JMO, RPA, SPA, HPH, JPU, FSA, WST, SZI).

Abseits der oben genannten Flüsse waren im unteren Murtal am 17.1.2009 3 Ind. am Liebmannteich in Neudörf zu sehen (WST), bis zu 5 ♂, 12 ♀ von 12.2. bis 15.3. 2009 an den Schotterteichen in Eichfeld (JBR, WST, SZI), bis zu 3 ♂, 2 ♀ von 4.3. bis 6.3.2009 an den Teichen beim Schloss Brunnsee (WST) und 1 juv. am 9.11.2009 am Weinburger Teich (WST). Im Raabtal wurde je 1 ♀ am 15.3. und 5.4.2009 beim Schloss Hainfeld beobachtet und von 8.3.-20.4.2010 waren 1 ♂, 2 ♀ an den Teichen in Kirchberg zu sehen (ATI). Am Golfplatz Lebring hielten sich drei Paare am 13.12.2009 und 6 ad. ♂, 12 ♀ am 3.1.2010 auf (FSA, WST, SZI). Im Müritzal wurden am 26.12.2009 2 ♂, 1 ♀ an der Grassauer Lacke beobachtet, 1 ♀ am 15.1.2010 in Kapfenberg und 3 ♀ am 28.1. 2010 in Hafendorf (MDU). Im Grazer Feld hielt sich von 27.12.2009 bis 2.1.2010 1 ♀ am Kratochwillteich in Neuwindorf auf (SZI) und im Leibnitzer Feld am 3.1. 1 ad. ♂ am Aldrianteich in Tillmitsch (FSA, SZI). Am 23.2.2010 schwamm 1 ♀ im Schwarzaubach bei Pichla (WST).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): Die ersten am Heimzug waren je 1 Ind. am 14.4. über Wagna und am Schwabenteich (WST). In der Folge gelangen viele Zug- und Brutzeitbeobachtungen von 1-14 Ind. aus vielen Teilen der Steiermark bis 16.8.2009 (RPA, SPA, WST, FSA, ATI, SZI). Es wurde nur ein Brutnachweis (1 Bp. mit 1 juv.) aus Graz-St. Peter gemeldet (JPU). Der Wegzug verlief unauffällig mit wenigen Beobachtungen von 1-4 Ind. von Mitte August bis 8.10. (JLS, JPU, WST).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): Mit einer Ausnahme wurden immer einzelne Individuen gesehen. Im Frühling kreiste am 12.4. 1 ad. am Remschnigg (WST), je 1 Ind. wurde am 24.4. bei Johnsdorf (ATI), am 2.5. in Bad Radkersburg (MFO), am 3.5. in Kalsdorf bei Graz (JPU), am 5.5. in Vasoldsberg (RPA, SPA), am 8.5. in Oberhall bei Admont und am 9.5. in Unterhall (JMO, FEG) beobachtet, 2 Ind. hingegen am 22.5. südlich von Graz (JPU). Im Sommer gelangen Beobachtungen von je 1 Ind. am 2.7. bei Unterrohr (SZI) und am 9.8. in Tauplitz (RPA, SPA). Spät zogen 1 Ind. am 1.11.2009 am Buchauer Sattel (JMO) und 1 ad. am 7.12.2009 über Wagna (WST).

Rotmilan (*Milvus milvus*): Am 14.2.2009 wurde 1 vj. bei Niederwölz beobachtet (BRO) und am 18.4. zog 1 Ind. am Flughafen Graz-Thalerhof nach Norden (HPH, SZI).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Im unteren Murtal wurde am 17.1.2009 1 Ind. bei Kellendorf beobachtet (WST), je 1 immat. Ind. am 17.1. und 8.3.2009 am Schwabenteich und am 2.11. am Weinburger Teich (GPU, WST). Außerdem wurden zwischen 12.2. und 9.11.2009 immer wieder 2 ad. Seeadler im Raum Brunnsee-Oberrakitsch-Halbenrain beobachtet (JBR, CNE, GPU, JPU, WST, SUR, SZI).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): Der Heimzug erstreckte sich von 24.3. bis 5.6.2009. In dieser Zeit konnten in vielen Teilen Steiermark insgesamt 81 Ind. beobachtet werden (AKU, VMA, CNE, RPA, SPA, HPH, JPU, BRO, WST, ATI, GWÖ, CZE, SZI). Ein herum streifendes Individuum wurde am 5.7. im oststeirischen Hügelland bei



Empersdorf beobachtet (RPA, SPA). Der Wegzug erstreckte sich von 11.8. bis 10.10. und war, wie üblich, weit schwächer als der Heimzug. Insgesamt konnten 28 ziehende Ind., überwiegend juv., beobachtet werden (AKU, GMD, RPA, SPA, BRO, WST, SZI).

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Im ersten Halbjahr 2009 wurde je 1 „♀“ am 17.1. bei Eichfeld, am 20.1. bei Bärnbach, am 3.2. bei Hohenbrugg/Raab, am 22.2. bei Goritz, am 9.3. an der Dobler Lacke (Bez. Murau), am 27.3. über Graz und am 22.4. am Furtnerreich beobachtet (MFO, JPU, BRO, ATI, WST, SZI). Nur am 16.3. konnte 1 ♂ am Fuchsschweifich bei Neudau beobachtet werden (FSA).

Am Wegzug und im Winter wurde je 1 „♀“ am 18.10. bei Tillmitsch, am 2.11. bei Vasoldsberg, am 3.11. bei Hainsdorf und Unterpremstätten, am 7.11.2009 und am 23.1.2010 bei Fürstenfeld, am 1.2.2010 bei Goritz, am 13.2.2010 bei Gralla und am 17.2.2010 bei Dedenitz beobachtet (MFO, RPA, FSA, WST, SZI). Je 1 ad. ♂ war am 28.11.2009 im Ennstal beim Grabnerhof und beim Grieshof, am 12.1.2010 in Wagna, am 8.2.2010 in Untergralla, am 17.2.2010 bei Brunsee und am 28.2.2010 bei Goritz zu sehen (MFO, JMO, WST).

Steppenweihe (*Circus macrourus*): Am Abend des 10.5. suchte 1 vj. einen Rohrweihen-Schlafplatz am Flughafen Graz-Thalerhof auf (CZE, SZI).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Schon am 8.4.2009 kreiste 1 Ind. bei Scheifling (JLS), doch die meisten Beobachtungen gelangen wieder zwischen Mitte April und Mitte Mai. Am Flughafen Graz-Thalerhof jagte am 25.4. 1 ad. ♀, am 2.5. 1 vj. ♀ und am 10.5. 1 vj. ♂ (HPH, CZE, SZI). Im Raabtal zog 1 ad. ♀ am 2.5. über den Mühlteich in Kirchberg und in Graz zog am 9.5. 1 vj. ♀ über den Lustbühel (SZI). Im unteren Murtal jagte am 11.5. 1 vj. ♂ südlich von Oberrakitsch (SZI) und am 15.5. jagte im Lafnitztal 1 ♀ nahe der Weinseißmühle bei Burgau (FSA).

Habicht (*Accipiter gentilis*): Je 1 Ind. war am 4.2. im oststeirischen Hügelland in Ferbersdorf (RPA, SPA), am 31.3. bei Kulm am Zirbitz (BRO), am 5.4. und 11.4. bei Mariahof (JLS) und am 9.5. (1 ♀) in Graz östlich von Schloss Lustbühel (RPA, SPA, HPH, SZI) zu sehen. Brutpaare wurden von Hitzendorf (Brut erfolgreich), Hengsberg (Brut erfolgreich), St. Oswald, Priebing, Gams, Pircha, Gleisdorf (Brut erfolgreich), Deutsch Goritz (Brut erfolgreich) (JPU), Tobisberg (SZI) und Dedenitz (MFO) gemeldet.

Am 31.7. und 2.8. wurde je 1 juv. bei Weng im Gesäuse (JMO) und bei Labuch/Gleisdorf (SZI) gesehen. Am 17.8. schlug 1 ad. ♂ bei Gratkorn eine Dohle (SZI). Im Bezirk Murau wurde am 3.9. 1 Ind. bei St. Georgen ob Murau beobachtet und am 14.9. besuchte 1 juv. die Dobler Lacke (BRO). Im oststeirischen Hügelland überflog am 10.10.2009 1 juv. Vasoldsberg (RPA, SPA) und am 14.10. kröpfte 1 juv. Beute an den Neudauer Teichen (GMD). Am 20.10. wurde 1 Ind. am Lubekogel/Windische Bühel von Kolkraben attackiert (WST). Im Winter wurde am 31.1.2010 1 vj. am Murstau Obervogau (SZI) beobachtet und am 23.2.2010 1 ad. ♀ östlich von Fürstenfeld (FSA).

Sperber (*Accipiter nisus*): Vom Sperber gelangen von 4.1.2009 bis 28.2.2010 Beobachtungen von jeweils 1-7 Ind. aus vielen Teilen der Steiermark (RPA, SPA, GPU, JPU, BRO, ATI, SZI). Brutnachweise wurden aus Graz-St. Peter, Schachenwald, Gössendorf, Windorf, Krummegg (JPU) und Schelchenberg (RPA, SPA) gemeldet.

Falkenbussard (*Buteo buteo vulpinus*): Am 7.11. zog 1 ad. der fuchsroten Morphe über die Teiche beim Schloss Brunsee nach Süden (SZI).

Raufußbussard (*Buteo lagopus*): Am 21.12. zog 1 juv. über den Lustbühel in Graz nach Südwesten, ca. 1,5 Stunden später saß vermutlich derselbe juv. auf einem Acker östlich von Unterpremstätten (SZI). Am 14.2. ras-tete je 1 ad. ♂ südlich von Hainsdorf und westlich von Kalsdorf-Großsulz (HPH, SZI).

Schreiadler (*Aquila pomarina*): Am 19.4. zog 1 Ind. über den Flughafen Graz-Thalerhof nach Osten (CNE, HPH, SZI).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): Am 21.2. wurden 2 Ind. bei Stadl/Mur (BRO) beobachtet und am 18.4. 1 immat. Ind. am Gwöhnlistein/Tauplitz (RPA, SPA). Je 2 Ind. waren am 24.5. bei St. Peter/Kammersberg (BRO) zu sehen und am 1.7. in Vordernberg (JPU). Am 10.8. flog 1 vj. über Gratkorn nach Norden (SZI), am 23.8. wurden 1 ad., 1 juv. im Schwarzenseebachtal (JMO) beobachtet und am 4.10. kreiste 1 Ind. über der Dobler Lacke bei Kulm am Zirbitz (BRO).

Zwergadler (*Aquila pennata*): Am 1.5. zog 1 Ind. der dunklen Morphe über die Waldteiche in Kirchberg an der Raab (ATI).

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Am Heimzug konnte je 1 Ind. am 20.3., 28.3., 7.4. und 13.4.2009 an den Teichen in Kirchberg an der Raab beobachtet werden (KMÜ, CNE, ATI, SZI). Weitere einzeln Ziehende konnten im März in Kulm am Zirbitz (SBA), am 28.3. am Reither Teich (ATI) und in Brunsee (CNE, SZI), am 31.3. und 16.5. an den Neudauer Teichen (FSA, GWÖ), am 4.4. am Saazer Teich (ATI), am 5.4. in Pölsen/Radkersburg



(MFO) und am Spiegeteich Preding (RPA, SPA), am 6.4. am Flughafen Thalerhof und am Schwabenteich (SZI) und am 10.5. am Forsterteich Wundschuh (RPA, SPA) beobachtet werden.

Am Wegzug zog 1 juv. am 4.9. über den Flughafen Graz-Thalerhof nach Westen (SZI). Am 15.9. kreiste 1 Ind. über den Waldteichen in Kirchberg/Raab (GMD). Je 1 Ind. war am 20.9. an den Waldschacher Teichen (JPU) und in Kulm am Zirbitz (BRO) zu sehen. Am 24.9. zog 1 Ind. über Wagna nach Süden (WST) und am 2.10. kreiste 1 juv. über dem Saazer Teich (SZI).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Am 26.4. überflog 1 ad. ♀ den Lustbühel in Graz (SZI), am 1.5. war 1 Ind. südlich von Neudau zu sehen (GWÖ), am 4.5. jagten 2 ad. ♂ und 1 ad. ♀ westlich von Kalsdorf (SZI) und am 10.5. jagten 1 ad. ♂ und 1 vj. ♂ östlich von Fürstenfeld (FSA). Die einzige Herbstbeobachtung gelang bei der Dobler Lacke (Bezirk Murau), als am 18.9. 1 juv. auf einer Leitung saß (BRO).

Merlin (*Falco columbarius*): Am 3.1. und 4.1.2009 jagte 1 Ind. am Bergfinkenschlafplatz bei Lödersdorf (ATI) und am 23.2.2009 rastete 1 ♂ auf einem Hausdach in Oberblumegg/Lannach (CFU, HPH).

Im Herbst wurde am 5.10. 1 juv. im Schigebiet Lachtal (HJA) beobachtet. Weitere Beobachtungen stammen aus dem Grazer und Leibnitzer Feld, wo je 1 „♀“ am 19.10. bei Altgralla, am 25.11.2009 am Flughafen Graz-Thalerhof, am 9.2.2010 im St. Peter Stadtfriedhof in Graz und am 15.2. bei Kalsdorf beobachtet wurde (SZI). 1 ad. ♂ jagte am 5.1.2010 bei Landscha (WST).

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Von 11.4.-17.9.2009 gelangen zahlreiche Beobachtungen von 1-4 Ind. in vielen Teilen der Steiermark (HKU, JLS, VMA, JMO, RPA, SPA, JPU, BRO, FSA, WST, ATI, SZI). Brutnachweise wurden aus Graz-Windorf, Vasoldsberg, Hart bei Graz, von der Leber/Graz und bei Gratkorn gemeldet (RPA, SPA, JPU). Am 1.6. wurde ein schwer verletzter Altvogel, vermutlich mit Schussverletzung (!), am Jakominiplatz in Graz aufgegriffen und beim Verein „Wildtiere in Not“ abgegeben; trotz veterinärmedizinischer Behandlung erlag er dort aber in der Folge seinen Verletzungen (M. Großmann, SZI).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): Von 2.1.-29.1.2009 jagten 1-2 Ind. am Bergfinkenschlafplatz bei Lödersdorf im Raabtal (CNE, ATI, SZI). Im Leibnitzer Feld hielten sich von 2.1.-2.2.2009 bis zu 1 ad., 1 juv. am Stausee Gralla auf, am 11.1.2009 war 1 ad. ♀ bei Wagna, wo am 26.1. 1 Ind. jagte und am Murstau Obervogau war am 13.1. 1 Ind. zu sehen (WST). Je 1 ad. jagte am 13.1. und 3.2. bei Fürstenfeld (FSA) und am 14.3. nordöstlich von Miesenbach/Birkfeld (VMA). Aus dem Bezirk Murau wurde am 25.3. 1 Ind. von der Härterhöhe bei Mariahof gemeldet (BRO). Am 23.4. rastete 1 ad. ♀ der ssp. *calidus* bei Neuwindorf (CZE, SZI) und am 16.5. jagte 1 ad. ♀ in Gratkorn (SZI). Am 2.8. kreiste 1 Ind. über der Kleeberg-Aussichtswarte nahe Gleisdorf (SZI). Aus dem Grazer Bergland und dem Steirischen Randgebirge wurden acht Brutpaare gemeldet, wovon mindestens zwei erfolgreich gebrütet haben (VMA, GMD, JPU).

Die erste Beobachtung vom Wegzug war 1 juv., der im unteren Murtal am 3.8.2009 erfolglos am Schwabenteich jagte (WST). Von 14.10.2009 bis 15.2.2010 hielt sich ein adultes Paar im Grazer Stadtgebiet auf (CZE, SZI), wo am 13.11.2009 auch 1 juv. den St. Peter Stadtfriedhof überflog (SZI). Am Stausee Gralla konnte am 17.10.2009 1 ad. ♂ und am 2.1.2010 1 vj. ♂ beobachtet werden (SZI) und am 12.11.2009 zogen 2 juv. über Wagna nach Süden (WST). Je 1 Ind. wurde am 23.11.2009 bei Köflach (MBR) und am 13.12.2009 in Mellach beobachtet (SZI) und am 15.12.2009 rastete 1 ad. ♀ bei Pichla (WST). Von 21.12.2009 bis 14.2.2010 wurde mehrmals 1 ad. am Murstau Obervogau gesehen (HPH, WST, SZI), am 17.1.2010 1 Ind. an der Mur bei Badl (HPH, CPF) und am 20.1.2010 kröpfte 1 ad. ♀ eine Dohle bei Neuwindorf (SZI).

Haselhuhn (*Bonasa bonasia*): Je 1 Ind. wurde am 18.4. auf der Stupalpe (JPU) und am 22.9. bei Ratten (GMD) beobachtet. Am 30.9. waren 3 Ind. am Reithkogel bei Fischbach zu sehen (GMD).

Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus*): Am 3.5. wurde 1 Ind. bei Falkendorf/Payerhöhe beobachtet (BRO) und am 28.6. wurde 1 brütendes ♀ am Hauseck/Großer Bösenstein entdeckt (GTR).

Birkhuhn (*Tetrao tetrix*): Am 22.4.2009 flog 1 Ind. auf der Hebalm auf (JPU), am 9.5. balzte 1 ♂ auf Vorauer Schwaig/Hochwechsel (AKU) und am 11.5. wurde 1 Ind. auf der Ploden/Eisenerzer Alpen (JMO) beobachtet. Im Herbst wurde am 19.10. 1 ♀ im Steirischen Randgebirge auf der Alpler Schanz gesehen (GMD).

Auerhuhn (*Tetrao urogallus*): Im oberen Feistritztal wurde je 1 ♂ am 10.4. südlich von Falkenstein und am 13.4. südöstlich von Rabendorf (VMA) beobachtet. Zwei Ind. wurden am 22.4. auf der Hebalm gesehen (JPU), auf dem Hochwechsel flogen am 9.5. 3 Ind. südöstlich der Vorauer Schwaig auf (AKU) und 1 Ind. wurde am 23.8. bei der Mödlinger Hütte/Admonter Reichenstein beobachtet (JMO). In den Fischbacher Alpen wurde je 1 ♂ am 9.9. am Teufelstein, am 30.9. am Reithkogel und am 30.11. bei Ratten beobachtet (GMD).

Rebhuhn (*Perdix perdix*): Im Grazer Feld wurde am 11.2. eine Kette aus 10 Ind. beobachtet (JPU). Zwischen 15.3. und 8.6.2009 wurden in diesem Gebiet vier Paare festgestellt (SZI) und je zwei Paare zwischen 6.4. und 17.4.2009 im unteren Murtal bei Hainsdorf sowie im Leibnitzer Feld bei Tillmitsch (WST, SZI). Je ein Paar wurde am 28.3. beim Schwabenteich (SZI), von 27.4. bis 17.7. bei Obervogau (WST) und am 29.4. bei Eichfeld



(SZI) gesichtet. Am 10.4. konnten 1 Ind. bei Laafeld (MFO), am 10.5. 1 ♂ bei Fürstenfeld (FSA) und am 17.10. 2 ad., 5 juv. bei Hainsdorf (SZI) beobachtet werden.

Wachtel (*Coturnix coturnix*): Aufgrund ihres Verhaltens wurden hauptsächlich rufende Wachteln beobachtet: In der Weststeiermark rief 1 ♂ am 10.5. in Hasenberg/Aflenz a. d. Sulm (JBR); im Grazer Feld riefen 1-3 ♂ zwischen 15.5. und 23.5. am Flughafen Graz-Thalerhof (JPU). Im Lafnitztal riefen bei Burgau am 15.5. 3 ♂ und am 1.6. 1 ♂ (FSA) sowie 1 ♂ am 11. und 12.6. bei Wörth/Lafnitz (SZI). Im oststeirischen Hügelland rief je 1 ♂ am 18.5. bei Ferbersdorf (RPA), von 1.6. bis 3.8. in Reinberg/Vorau (SBE), am 28.6. bei Ehrensachsen (AKU) und am 26.7. bei Strallegg (VMA). Im Bezirk Murau riefen von 10.5.-10.6. 1-3 ♂ in Judendorf bei Kulm a. Zirbitz (SBA, BRO), 1-2 ♂ riefen von 18.5.-12.6. bei Mariahof (JLS, BRO) und je 1 ♂ am 12.6. an der Dobler Lacke sowie am 17.6. bei Niederwölz (BRO). Im unteren Murtal rief je 1 ♂ am 23.5. in Laafeld, am 2.6. bei Dedenitz (MFO) und am 17.7. bei Bad Radkersburg (MFO). Im Leibnitzer Feld rief 1 ♂ am 21.6. bei Kaindorf a. d. Sulm (JBR) und am 11.7. ca. 20 ♂ in der Umgebung von Bärnbach (JPU).

Am Wegzug wurde am 5.9. 1 ♀ in Graz in der Schippingerstraße aufgegriffen und vom Verein „Wildtiere in Not“ in Pflege genommen; es konnte am 20.9. am Flughafen Graz-Thalerhof wieder ausgewildert werden (M. Großmann, SZI). Ein rastendes Ind. wurde am 13.9. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf beobachtet (SZI).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): Zur Brutzeit riefen in der Obersteiermark je 1-2 Ind. am 18.4. an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz, am 22.4. am Furtnersee (BRO), am 24.4. an der Enns bei Admont, von 24.4.-21.5. beim Grabnerhof (JMO), am 17.6. bei Niederwölz (BRO) und am 19.7. in Aigen bei Admont (JMO). Im unteren Murtal wurden 2-3 Ind. am 14.6. an den Halbenrainer Teichen (JPU) und 1 Ex. am 27.6. an den Brunner Teichen (SZI) vernommen.

Am Wegzug rasteten bei Neutersdorf mind. 2 ad. und 1 juv. von 5.8. bis 23.8. in einem überschwemmten Maisacker (WST, SZI). Von 26.9. bis 3.10. rasteten 1-3 Ind. am Saazer Teich (SZI). Je 1 Ind. wurde in Graz am 31.10. in der St. Georgengasse und am 14.12.2009 in der Karl-Morre-Straße aufgegriffen und zu „Wildtiere in Not“ gebracht. Beide waren aber unverletzt und konnten am selben Tag wieder ausgewildert werden (SZI, M. Großmann). Ein bis zwei überwinterte Vögel riefen am 28.12.2009 und 17.1.2010 an der Mur bei Landschaft (WST).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*): Am Frühjahrzug rastete am 20.4. 1 Ind. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (ATI) und zwischen 12. und 18.5. rief 1 Ind. am Furtnersee (BRO). Von 15.8.-3.9. rasteten bis zu 2 ad. und 2 juv. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (HPH, WST, CZE, SZI). Am 14.9. rief 1 Ind. an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz (BRO) und am 10.10. rastete 1 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA).

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*): Am 7.7. wurde ein Paar mit 2 pulli an den Stürgkhteichen bei Halbenrain beobachtet (CZE, SZI). Von 11.8.-18.9. rasteten mind. 1 ad. ♂, mind. 1 ad. ♀ und bis zu 7 juv. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (HPH, WST, CZE, SZI). Von 13.9.-20.9. hielt sich 1 juv. an den Teichen beim Schloss Brunnsee (JBR, GPU, WST, CZE, SZI) und am 25.9. 1 juv. am Rabenhofer Teich (WST) auf.

Wachtelkönig (*Crex crex*): Von 7.5.-28.5. rief in der Oststeiermark 1 ♂ auf der Kring bei Vorau (SBE). Zwischen 11.5.-13.6. riefen 1-2 ♂ in den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen; hier konnten am 30.7. gesamt 10 juv. beobachtet werden (RPO, KPO). Von 30.5.-7.6. rief 1 ♂ in Labitschberg bei Gamlitz (JBR, WST, CZE, SZI). Am 10.9. kollidierte 1 Ind. in Hart bei Graz mit einer Fensterscheibe und verstarb noch am selben Tag in Pflege (M. Großmann, SZI).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): Brutnachweise wurden von den Teichen beim Schloss Brunnsee (7 Bp. mit pulli/juv.), vom Murstau Gralla (1 Bp. mit 6 pulli), von den Halbenrainer Teichen (8 Bp. mit pulli/juv.), vom Saazer Teich (1 Bp. mit 5 pulli), von den Schotterteichen bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau (2 Bp. mit 5 juv.), vom Fuchsschweifteich in Neudau (mehrere Bp. mit pulli/juv.) und von der Enns bei Admont (1 Bp. mit 1 juv.) gemeldet. Die größten Ansammlungen umfassten 50 Ind. am 1.8. an den Teichen beim Schloss Brunnsee und 68 Ind. am 4.10. an den Neudauer Teichen (JMO, FSA, WST, SZI).

Kranich (*Grus grus*): In Graz überflogen am 3.1.2009 2 Ind. den Lustbühel und am 14.3. zogen dort 2 ad., 2 vj. nach Norden (SZI). In der Obersteiermark wurde am 24.3. 1 Ind. in Frauenberg bei Admont beobachtet (JMO). Am Wegzug riefen mehrere ziehende Ind. am 12.10. um 22:00 Uhr über dem Lustbühel in Graz (SZI), 18 Ind. zogen am 28.10. über Fürstenfeld nach Süden (FSA) und am 30.10. riefen mehrere Ind. um 19:00 Uhr über Vasoldsberg (RPA, SPA). Am 31.10. zogen 180 Ind. über Ligist nach Westen (H. Pirker) und 200 Ind. zogen über Leibnitz ebenfalls nach Westen (JBR).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*): Von 28.3.-30.3. 3. rastete 1 ad. ♂ an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (CNE, ATI, SZI).



Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*): Im Grazer Feld rasteten am 25.7. 3 ad. am Privatbadensee Hautzendorf (HPH, SZI).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*): Der Heimzug erstreckte sich von 15.3. bis 4.6.2009. Dabei wurden jeweils 1-8 Ind. im unteren Murtal am Schwabenteich, an den Schotterteichen bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau und bei Eichfeld, im Raabtal an den Waldteichen in Kirchberg, am Saazer Teich, am Reither Teich, an den Schotterteichen im Grazer Feld, im Mürztal an der Graschnitzlacke, in der Weststeiermark an den Waldscharer Teichen, bei Preding und im ehemaligen Bergbau bei Voitsberg-Tregist sowie bei Fohnsdorf beobachtet (JPU, FSA, WST, ATI, SZI).

Brutpaare wurden von den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (1 Bp. mit 1 pullus), von den Schotterteichen in Eichfeld (1 Bp. mit 2 pulli), vom Privatbadensee Hautzendorf (1 Bp. mit 1 pullus), von Altenmarkt bei Fürstenfeld (1 ♀ verleitet am 16.6.) und von den Schotterteichen bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau (1 Bp., erfolglos) gemeldet (FSA, WST, SZI). Am Wegzug rasteten 3 Ind. am 7.7. an den Schotterteichen in Tillmitsch (JBR) und 6 ad. und 3 juv. am 18.7. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA). Je 1 juv. war am 26.8. im überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST), von 14.9.-19.9. an den Schotterteichen im Grazer Feld (SZI) und am 20.9. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA, SZI) zu sehen.

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*): Von 17.9.-20.9. rastete 1 juv. am Schwarzlsee und am 2.10. 2 juv. südlich von Wagendorf (SZI). Am 10.10. überflogen 7 Ind. tief den Schwarzlsee (SZI) und am 18.10. rasteten 2 juv. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*): Während des Frühjahrszugs rasteten am 4.3. 2 Ind. an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz (BRO) und je 1 ad. am 28.3. südlich von Oberrakitsch (CNE, HPH, SZI) und am 29.3. bei Großwilfersdorf (FSA).

Im Herbst rastete 1 juv. am 2.10. bei Seibersdorf (WST) und am 6.10. 6 juv. südlich von Hainsdorf (WST, SZI). Am 11.10. wurden 3 juv. westlich von Kalsdorf beobachtet und am 13.12. zogen 19 Ind. bei Neuwindorf nach Süden (SZI). Am 23.12.2009 wurde 1 juv. bei Eichfeld von einem Sperber geschlagen (WST).

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): Am 19.8. überflog um 21.15 Uhr 1 Ind. rufend die Klosterwiesgasse in Graz (SZI) und je 1 juv. rastete am 1.10. und am 11.10.2009 im Grazer Feld am Privatbadensee Hautzendorf (SZI).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Am Heimzug gelangen die ersten Beobachtungen am 22.2. mit 11 Ind. im Raabtal bei Berndorf (ATI) und im oststeirischen Hügelland mit 1 Ind. am 28.2. bei Vasoldsberg (RPA, SPA). In der Folge gelangen vom Heimzug viele Beobachtungen in vielen Teilen der Steiermark. Die größten Trupps umfassten 333 Ind. am 4.3. im unteren Murtal bei Hainsdorf, 95 Ind. am 5.3. an der Dobler Lacke bei Kulm am Zirbitz und 325 Ind. am 15.3. im Grazer Feld (EBA, SBA, MFO, JLZ, JMO, CNE, RPA, SPA, KPO, RPO, JPU, BRO, WST, ATI, SZI). Erfolgreiche Bruten wurden nur von Feldkirchen bei Graz (1 Bp. mit 3 pulli), von Kalsdorf bei Graz (2 Bp. mit 8 pulli) und von Seibersdorf/St. Veit am Vogau (1 Bp. mit 2 pulli) gemeldet (SZI).

Der Wegzug erstreckte sich von 7.8.-1.11.2009, wobei die größten Trupps 55 juv. am 3.9. am Stausee Gralla, 80 Ind. am 11.10. bei Neuwindorf und 355 Ind. am 30.10. bei Unterpremstätten umfassten (RPA, JPU, BRO, WST, SZI).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*): Am 13. und 14.5. rastete 1 ad. im unteren Murtal an den Schotterteichen bei Seibersdorf (WST, SZI).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*): Am 10.5. rastete 1 ad. in der Weststeiermark bei Preding (SZI).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*): Am 18.7. rastete 1 ad. im Feistritztal an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Alpenstrandläufer wurden erst in der zweiten Jahreshälfte 2009, d.h. am Wegzug, beobachtet. Im unteren Murtal rastete am 5.8. 1 ad. sowie am 18.9. 1 ad., 1 juv. an den Schotterteichen bei Seibersdorf (WST, SZI), am 29.9. war 1 ad. an den Teichen beim Schloss Brunnsee (WST) und am 17.10. verweilten 2 juv. am Schwabenteich, wo auch am 22.10. 1 Ind. rastete (WST, SZI). Am 9.8. flog 1 ad. von einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf/Schwarzaubach auf; am 18.9. rasteten dort 2 juv. (WST, SZI). Im Leibnitzer Feld konnten am 2.10. 2 juv. bei Wagendorf beobachtet werden und von 16.10.-18.10. rasteten 1-2 juv. am Aldrianteich bei Tillmitsch (JBR, WST). An den Schotterteichen im Grazer Feld rasteten 1-3 juv. zwischen 14.9. und 20.9. (SZI). Im Raabtal konnte am 2.10. 1 juv. am Mühlteich in Kirchberg/Raab und 1 ad., 1 juv. am Saazer Teich beobachtet werden (SZI), und im Feistritztal besuchte 1 juv. am 18.10. die Schotterteiche bei Großwilfersdorf (FSA).

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*): Im Lafnitztal rastete am 7.8. 1 ad. an einem Schotterteich bei Neudau (FSA)!



Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Am Heimzug rastete am 10.3. 1 ♂ auf der Härterhöhe bei Mariahof (BRO), 2 ♂ rasteten am 20.3. im Grazer Feld bei Gradenfeld (SZI) und 1 ♂ besuchte am 27.3. die Schotterteiche bei Großwilfersdorf, wo am 9.5. auch 6 ♀ rasteten (FSA). Je 1 ♀ verweilte am 16.4. und 25.4. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (ATI). Im unteren Murtal rasteten zwischen 23.4. und 14.5. bis zu 45 Ind. am Schwabenteich (WST, SZI), an den Schotterteichen in Eichfeld hielten sich am 23.4. 14 ♀ und am 13.5. 1 ♀ auf (WST, SZI) und von 23.4. bis 13.5. rasteten 1-2 ♀ an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (SZI). In der Weststeiermark verweilte am 23.4. 1 ♂ und am 9.5. 3 Ind. an den Waldschacher Teichen (JPU, WST) und von 10.5.-12.5. rasteten im Grazer Feld bis zu 18 ♀ am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI).

Am Wegzug rasteten 1-2 juv. von 21.8.-23.8. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST, SZI), und 1 juv. ♀ war am 10.10. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau zu sehen (SZI).

Zwergschnepe (*Lymnocyptes minimus*): Am 15.1. wurde 1 Ind. in Walkersdorf von Kindern mit der Hand gefangen (FSA). Am 22.3. rastete 1 Ind. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (HPH, FSA, CZE). Von 27.4.-30.4. hielt sich 1 Ind. bei Großwilfersdorf auf (ATI). Am 9.9. rastete 1 Ind. in einer Gärtnerei in Breitenhilm/Vasoldsberg (SPA) und je 1 Ind. flog am 10.10. bei den Rabenhofer Teichen (HPH, SZI) und am 7.12. beim Schloss Vasoldsberg (SPA) auf. Im Mürztal wurden am 11.1.2010 3 Ind. an der Grassauer Lacke beobachtet (MDU).

Bekassine (*Gallinago gallinago*): Überwintert haben wahrscheinlich je 1-2 Ind., die am 9.1. und 13.1. bei Fürstenfeld (FSA), am 12.1., 15.2. und 12.3. in Judendorf bei Kulm a. Zirbitz (EBA) und am 3.2. bei Fehring (ATI) beobachtet wurden. Am Heimzug rasteten 1-2 Ind. zwischen 7.3. und 30.4.2009 am Schwabenteich in Oberrakitsch (CNE, GPU, WST, SZI). Zwischen 14.3. und 1.5.2009 wurden jeweils 1-3 Ind. in den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (JMO, KPO, RPO) beobachtet. Im Raabtal rasteten an den Teichen in Kirchberg zwischen 22.3. und 22.4. jeweils 1-3 Ind., je 1 Ind. am 28.3. am Saazer Teich (CNE, SZI) und am 7.4. am Reither Teich (ATI) sowie 3 Ind. am 4.4. bei Hohenbrugg (ATI). Zwischen 27.3. und 27.4. wurden im Feistritztal jeweils 1-4 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf beobachtet (FSA, ATI) und in der Weststeiermark 1 Ind. am 18.4. bei Voitsberg (SZI). An der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz wurde zwischen 18.4. und 21.4. 1 Ind. beobachtet, das auch Balzflüge zeigte (BRO). Die letzten Frühjahrsbeobachtung (2 Ind.) gelang am 1.5. bei Burgau (FSA, SZI).

Am Wegzug rasteten im Feistritztal zwischen 27.7. und 23.11.2009 1-4 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA) und am 22.8. 1 Ind. bei Fürstenfeld (FSA). Im unteren Murtal hielten sich zwischen 1.8.-15.12.2009 1-8 Ind. am Schwabenteich auf (SPA, HPH, WST, SZI), 4-9 Ind. zwischen 13.9. und 29.9. beim Schloss Brunnsee (WST), 12 Ind. am 22.10. beim Weinburger Teich (WST) und je 1 Ind. am 10.10. und von 3.11.-6.11. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST, SZI). Von 4.8.-2.10.2009 rasteten bis zu 40 Ind. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (HPH, WST, SZI) und zwischen 6.10. und 11.12.2009 bis zu 20 Ind. an den Rabenhofer Teichen (HPH, SZI). Im oststeirischen Hügelland wurden zwischen 10.9.2009 und 4.1.2010 wurden mehrmals jeweils 1-2 Ind. bei Vasoldsberg (RPA, SPA) beobachtet und am Flughafen Graz-Thalerhof rasteten 1-4 Ind. von 13.9. bis 1.10. (SZI). Im Bezirk Murau wurde am 12.9. 1 Ind. und von 17.10.-20.10. 4-8 Ind. an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz beobachtet (BRO). An den Neudauer Teichen rasteten 5 Ind. am 20.9. (GMD) und am Saazer Teich 1-3 Ind. von 26.9. bis 3.10. (SZI). Jeweils 1-2 Ind. konnten von 1.10.-4.10. an den Waldschacher Teichen (JPU) und zwischen 6.10. und 27.11.2009 an den Teichen in Tillmitsch beobachtet werden (WST, SZI).

Überwintert haben wahrscheinlich 1-3 Ind., die zwischen 21.12.2009 und 19.1.2010 bei Fürstenfeld (FSA) beobachtet wurden und 1 Ind., das am 28.1.2010 an den Teichen beim Schloss Brunnsee (WST) gesehen wurde.

Waldschnepe (*Scolopax rusticola*): Am Heimzug rastete 1 Ind. am 17.2.2009 am Lustbühel in Graz (SZI). Zur Brutzeit wurde je 1 Ind. am 22.4. auf der Hebaln (JPU) und am 6.6. im Sugaritzwald (SZI) beobachtet. Am Wegzug rastete je 1 Ind. am 30.9. am Zeiseleck und am 29.10. südlich von Strallegg (GMD). Am 12.11. wurde 1 Ind. tot beim Göstinger Forsthaus gefunden (via SZI). In Graz wurde je 1 Ind. am 18.10. in der Mariatroster Straße, am 4.11. am Südtiroler Platz und am 30.11. bei den Barmherzigen Brüdern verletzt aufgegriffen und zur Pflege zum Verein „Wildtiere in Not“ gebracht (M. Großmann, SZI).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Je ein überfliegendes Ind. rief am 27.7. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA), am 21.8. über Graz-Jakomini (SZI) und am 22.8. über Leibnitz-Linden (WST). Zwischen 12.9. und 18.10. rasteten bis zu 19 Ind. an den Schotterteichen im Grazer Feld (JPU, SZI). Am 12.11. zog 1 Ind. über Wagna nach Süden (WST) und am 21.12.2009 rastete 1 Ind. bei starkem Frost am Murstau Obervogau (WST).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*): Am Heimzug rastete je 1 ad. am 14.4. an den Schotterteichen bei Seibersdorf (WST) und am 21.4. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (ATI). Am Wegzug rasteten von 21.8. bis 30.8. 2-3 juv. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST, SZI). Je 1 Ind. überflog rufend am 26.8. Fürstenfeld (FSA), am 13.9. Hainsdorf (SZI) und am 26.9. den Süden von Graz (JPU).



Rotschenkel (*Tringa totanus*): Am Heimzug rastete jeweils 1 ad. von 28.3.-30.3., von 6.4.-7.4. und am 30.4. am Schwabenteich in Oberrakitsch (CNE, HPH, WST, SZI). Im Feistritztal besuchte am 29.3. 1 ad. die Schotterteiche bei Großwilfersdorf (FSA) und im Ennstal überflog 1 Ind. am 17.4. Weißenbach bei Liezen (RPO, KPO). Am Wegzug wurde je 1 Ind. am 18.7. bei Großwilfersdorf (FSA), am 26.7. am Schwabenteich in Oberrakitsch und am 4.8. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST) beobachtet.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Am Heimzug rasteten in der Weststeiermark zwischen 18.4. und 3.5. jeweils 1-6 Ind. an den Waldschacher Teichen (JPU). Im unteren Murtal wurden von 19.4.-23.4. 1-3 ad. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (CNE, SZI) beobachtet und 3 ad. am Schwabenteich am 23.4. sowie 1 ad. von 13.-14.5. (WST, SZI). Von 21.4.-4.5. rasteten 1-3 ad. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (ATI, SZI) und 1 Ind. hielt sich von 21.4.-24.4. an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz auf (BRO). Im Grazer Feld wurde zwischen 23.4. und 13.5. 1 ad. am Privatbadensee Hautzendorf beobachtet (SZI). Je 1 ad. rastete am 23.4. am Stausee Gralla (SZI) und am 6.5. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA) und 2 ad. rasteten am 28.4. im ehemaligen Bergbau Voitsberg-Tregist (SZI). Der erste Grünschenkel am Wegzug war 1 ad., der am 27.6. an den Halbenrainer Teichen rastete (SZI). Je 1 Ind. hielt sich am 18.7. und 16.8. im Feistritztal an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf auf (FSA). Je 1 Ind. überflog am 26.7. und 9.8. den Schwabenteich (WST) und am 5.8. Fürstenfeld (FSA). Je 1 Ind. rastete am 3.8. im Leibnitzer Feld am Planksee bei Wagendorf (WST) und am 6.8. im Grazer Feld am Privatbadensee Hautzendorf (JPU). Von 5.8.-14.9. wurden jeweils 1-2 juv. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf beobachtet (WST, SZI). Von 29.8.-3.9. hielten sich 1-3 juv. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau auf (WST, SZI) und je 1 juv. rastete am 14.9. im Grazer Feld beim Neuschloss Wundschuh und am 2.10. am Mühlteich in Kirchberg an der Raab (SZI).

Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*): Von 26.8.-29.8. rasteten 2-3 juv. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST) und von 29.8.-3.9. hielten sich 1-3 juv. an den Schotterteichen bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau auf (HPH, WST, SZI).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Ein Überwinterer wurde am 17.1.2009 an der Mur bei Donnersdorf beobachtet (WST). Am Heimzug, der sich von 6.3.-30.4.2009 erstreckte, sowie am Wegzug, der am 26.5. einsetzte und bis 9.11.2009 dauerte, gelangen zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-8 Ind. in allen Teilen der Steiermark (JBR, CNE, RPA, SPA, HPH, KPO, RPO, BRO, FSA, WST, ATI, SZI). Überwinterer waren je 1 Ind. am 23.12.2009 bei der Murecker Schiffmühle (WST), am 19.1.2010 am Hühnerbach bei Fürstenfeld (FSA), am 31.3.2010 am Murstausee Mellach (SZI) und am 17.2.2010 an der Mur bei Donnersdorf (WST) sowie 1-2 Ind. von 31.1.-6.3.2010 in Speltenbach/Fürstenfeld (FSA).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*): Am Heimzug rasteten zwischen 29.3. und 9.5.2009 1-8 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA, ATI, GWÖ). Zwischen 5.4. und 11.5. hielten sich 1-15 Ind. an den Teichen in Kirchberg an der Raab auf (JPU, ATI, SZI). Am 10.4. besuchte 1 ad. die Graschnitzlacke im Mürztal (SZI) und von 13.4.-28.4. 1-2 Ind. die Dobler Lacke bei Kulm am Zirbitz (BRO). An den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau rasteten zwischen 14.4. und 8.5. 1-12 ad. (CNE, WST, SZI), 1-15 ad. am Schwabenteich zwischen 14.4. und 18.5. (WST, SZI) und zwischen 23.4. und 13.5. rasteten 1-6 ad. an den Schotterteichen in Eichfeld (WST, SZI). In der Weststeiermark konnten bei Preding von 17.4.-18.4. 1-3 Ind. beobachtet werden (SZI), 2-19 ad. zwischen 18.4. und 4.5. an den Waldschacher Teichen (JPU, WST, SZI) und am 18.4. rasteten 7 ad. bei Voitsberg (SZI). Je 1 ad. rastete von 23.4. bis 29.4. am Stausee Gralla, am 25.4. im Grazer Feld, am 29.4. am Saazer Teich und bei Halbenrain (SZI), am 1.5. am Furtnersteich und am 5.5. bei Mariahof (BRO). Von 1.5.-15.5. hielten sich im Lafnitztal 1-2 ad. bei Burgau auf (FSA, SZI).

Am Wegzug rasteten im Lafnitztal von 2.7.-5.7. 9-12 ad. bei der Neudauer Hammermühle (FSA, SZI) und im Feistritztal wurden zwischen 30.7. und 30.8. jeweils 1-2 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA) beobachtet. Im unteren Murtal hielten sich zwischen 9.7. und 23.8. 1-4 Ind. am Schwabenteich auf (SPA, HPH, WST, SZI) und zwischen 1.8. und 3.9. 1-8 juv. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (RPA, SPA, HPH, WST, SZI). Am 29.7. rief 1 Ind. in Tillmitsch (WST) und an einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf rasteten zwischen 3.8. und 18.9.2009 bis zu 3 ad. und 51 juv. (HPH, WST, SZI).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): Der Heimzug erstreckte sich ohne erkennbares Maximum von 28.3. bis 14.5.2009, wobei bei zahlreichen Beobachtungen aus der gesamten Steiermark jeweils 1-5 Ind. beobachtet wurden. Der Wegzug begann am 4.7. und dauerte bis 20.9., wobei Trupps bis zu 8 Ind., maximal aber 12-16 Ind. von 8.8.-11.8. in Gralla, beobachtet wurden (MFO, VMA, CNE, RPA, SPA, HPH, RPO, KPO, JPU, BRO, FSA, WST, ATI, GWÖ, SZI). Außerhalb der Zugzeiten rastete 1 ad. am 15.6. am Sieldorfer Teich (ATI), 1 Ind. von 1.11. bis 7.11. am Planksee bei Wagendorf (WST, SZI) und von 3.1.-27.2.2010 überwinterte 1 Ind. an der Mur bei Lebring (FSA, SZI).

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*): Am Heimzug rastete je 1 ad. am 22.3. und 25.3. am Reither Teich (ATI, SZI), am 27.4. waren 2 ad. am Schwarzlsee und am 8.5. rastete 1 vj. am Mühlteich in Kirchberg/Raab (CZE, SZI). Am Wegzug konnten 4 ad., 1 vj. am 27.6. am Mühlteich in Kirchberg/Raab (SZI), 1 ad. am 9.7. und 1 juv. am 28.7. am Schwabenteich (WST) und 1 ad. am 11.11.2009 am Schwarzlsee (SZI) beobachtet werden. Außergewöhnlich war das Auftreten einer Schwarzkopfmöwe, die am 29.1.2010 an der Frei-



zeitanlage „Copacabana“ südlich von Graz auftauchte (SZI) und von 31.1. bis 25.2.2010 am Murstausee Gralla überwinterte (HPH, CPF, TPF, FSA, WST, SUR, SZI)!

Zwergmöwe (*Larus minutus*): Im unteren Murtal rasteten am Heimzug am 23.4. 25 ad., 1 vj. an den Schotterteichen in Eichfeld, am selben Tag auch 4 ad. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST, SZI) und am 4.5. 1 ad., 1 vj. am Schwabenteich in Oberrakitsch (SZI). Im Grazer Feld jagten am 29.4. 255 ad., 10 vj. und am 30.4. 6 ad. am Schwarzlsee (WST, SZI). Am Wegzug rasteten 2 ad. am 1.10. am Schwarzlsee (SZI), von 17.10.-18.10. 1 juv. am Schwabenteich (JBR, WST, SZI), am 18.10. 1 ad. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA) und am 15.12. 1 ad. am Samitzteich (SZI).

Überraschender Weise folgte eine Serie von Mittwinterbeobachtungen: Am 12.1.2010 hielten sich 2 ad. bei der Murecker Schiffsmühle und 1 ad. an den Schotterteichen in Tillmitsch (WST) auf und am 15.1. 2 ad. an den Schotterteichen im Grazer Feld (MWE, SZI).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*): Von 2.1.2009 bis 27.2.2010 gelangen zahlreiche Beobachtungen in vielen Teilen der Steiermark (MFO, JLZ, CNE, RPA, SPA, CPF, TPF, HPH, JPU, BRO, FSA, WST, ATI, SUR, SZI). Die größten Trupps umfassten am Heimzug 47 Ind. am 8.3. bei Unterpemstätten (SZI), 141 Ind. am 23.4. an den Schotterteichen in Eichfeld (WST, SZI) und 53 Ind. am 8.5. am Schwabenteich (SZI). Am Wegzug wurden maximal 121 Ind. am 27.6. am Mühlteich in Kirchberg/Raab, 370 Ind. am 10.10. und 360 Ind. am 30.10. am Schwarzlsee (SZI) gesehen.

Sturmmöwe (*Larus canus*): Von 8.1.-10.2. hielten sich 1 ad., 1 Ind. im 2. Wi. und 1 vj. am Stausee Gralla auf (JBR, WST, SZI) und am 11.1. wurde 1 Ind. und am 18.1. 1 ad. und 1 vj. am Stausee Mellach beobachtet (JPU, SZI).

Die ersten am Wegzug waren 12 Ind. am 26.9. und 2 ad., 4 juv. an den Schotterteichen im Grazer Feld (JPU, SZI), wo zwischen 13.12.2009 und 20.1.2010 bis zu 21 Ind. beobachtet werden konnten sowie am 25.2.2010 7 ad., 2 vj. Ind. (HPH, CPF, TPF, JPU, FSA, SZI). Regelmäßig anzutreffen waren Sturmmöwen auch am Stausee Gralla mit bis zu 52 Ind. zwischen 13.12.2009 und 27.2.2010 (HPH, CPF, TPF, FSA, WST, SUR, SZI), am Aldrianteich in Tillmitsch mit bis zu 10 ad., 9 juv. von 13.12. bis 20.12.2009 (WST, SZI) und am Murstau Obervogau mit bis zu 8 ad., 3 vj. zwischen 17.12.2009 und 21.2.2010 (WST, SZI). Abseits davon wurden 1 ad., 1 immat. am 16.11.2009 an den Schotterteichen in Eichfeld (WST), 4 ad., 2 immat. am Stubenbergsee (ESA), 2 ad. am 19.12. über Fürstenfeld (FSA), 2 Ind. am 24.12.2009 an den Waldschacher Teichen (JPU), 1 ad. am 31.1.2010 an der Mur in Graz und 4 ad. am 13.2.2010 am Stausee Gabersdorf (SZI) beobachtet.

Heringsmöwe (*Larus fuscus*): Am 18.7. rasteten 8 juv. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau und 14 juv. am Aldrianteich in Tillmitsch (WST). Je 1 ad. ssp. *fuscus* wurde am 10.10. und 3.11. am Schwarzlsee gesehen, am 7.11.2009 rasteten dort 3 ad. ssp. *intermedius* (SZI). Am Murstausee Gralla hielt sich am 27.2.2010 1 Ind. im 1. Wi. auf (HPH, SZI).

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*): Am 7.11.2009 rastete 1 ad. am Schwarzlsee. Von 23.12.2009-17.1.2010 hielt sich 1 juv. an den Schotterteichen im Grazer Feld auf, wo auch am 15.1. 1 ad. rastete (SZI). Am 25.12.2009 hielten sich 14 ad., 3 immat. am Stausee Gralla auf, wo zwischen 23.1. und 27.2.2010 bis zu 6 ad., 6 immat. verweilten (HPH, FSA, WST, SUR, SZI). Am Murstau Obervogau wurde 1 Ind. im 2. Wi. am 31.1.2010, 1 ad., 1 vj. am 8.2., 1 vj. am 13.2. und 1 ad. am 14.2.2010 gesehen (WST, SZI). Im Mürztal wurde am 25.1. die Rupfung eines ad. bei St. Marein gefunden (MDU).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*): Am 2.1.2009 rasteten 1 ad., 1 vj. und am 10.2. 1 ad. am Stausee Gralla (WST). Das Grazer Brutpaar war ab 1.3.2009 bis in den August hinein anwesend und brütete auch im Jahr 2009 erfolgreich, Anfang Juli wurden 2 juv. flügge. Während der Brutsaison erschienen die beiden Altvögel auf Nahrungssuche nördlich von Graz bis Stübing und südlich von Graz bis Obervogau (CNE, RPA, SPA, JPU, WST, SZI). Darüber hinaus wurde das Männchen des Brutpaares auch am 13.12.2009 und am 2.1.2010 am Stausee Gralla beobachtet.

Am Heimzug hielten sich im unteren Murtal zwischen 2.3. und 6.3. bis zu 2 ad., 1 immat. (2. Wi.), 2 vj. am Schwabenteich auf und an den Schotterteichen in Eichfeld 1 vj. am 15.3., 1 immat. (2. So.), 1 vj. am 17.4. und 4 Ind. am 14.5. (WST). In der Oststeiermark wurden 1 Ind. am 7.4. und 2 Ind. am 10.5. am Saazer Teich (ATI) gesehen und je 1 vj. am 3.5. und 11.5. am Mühlteich in Kirchberg an der Raab (SZI). Am Murstau Obervogau wurden am 9.4. 3 immat. (2. So.) (WST) beobachtet, und an den Schotterteichen im Grazer Feld rasteten 1 ad. am 23.4., 1 immat. (3. So.) am 8.5. und 1 immat. (2. So.), 1 vj. am 10.5. (SZI).

Am Wegzug wurden 4 ad. am 13.7. am Grundlsee (RPA, SPA) beobachtet. Im unteren Murtal gelang die Beobachtung von 1 ad., 1 juv. am 18.7. und 1 juv. am 5.8. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST, SZI), am Schwabenteich war am 7.8. 1 juv. zu sehen und am 2.11. überflogen 2 ad. die Schotterteiche bei Eichfeld (WST). Am 21.7. besuchte 1 ad. die Schotterteiche im Grazer Feld, wo am 10.10. 4 immat. (2. Wi.), am 30.10. 2 ad., 13 juv. und am 3.11. 1 ad., 1 immat. (2. Wi.) rasteten. Im Raabtal besuchten am 2.10. 2 immat. (3. Wi.), 5 juv. den Fischteich beim Schloss Hainfeld (SZI) und am 25.10. rastete 1 juv. am Stausee Gralla (WST). Im Leibnitzer Feld hielt sich 1 ad. von 3.11.-4.11. am Aldrianteich in Tillmitsch auf, am 10.11. flogen dort



2 juv. nach Norden (WST, SZI). Ein großer Trupp von 47 ad. flog am 16.12.2009 über Wagna nach Süden (WST) und am Stausee Gralla hielten sich am 13.2. 1 ad., 1 immat. (2. Wi.), 1 vj. und am 27.2. 5 immat. (2. Wi.) und 22 vj. (HPH, WST, SZI) auf.

Silbermöwe (*Larus argentatus*): Am 10.10.2009 verweilte 1 Ind. im 4. Wi. und am 30.10. 1 ad. der *omissus*-Variante am Schwarzlsee (HPH, SZI). Am Murstau Gralla wurde am 23.1.2010 1 Ind. im 1. Wi. (SZI) und von 24.1.-25.1.2010 2 ad., davon 1 ad. der *omissus*-Variante, und 1 Ind. im 1. Wi. beobachtet (HPH, WST, SUR). Ein weiterer Altvogel rastete hier am 21.2.2010 (FSA, WST).

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*): Am 31.3. besuchte 1 vj. die Schotterteiche bei Großwilfersdorf (FSA, HKU).

Raubseeschwalbe (*Sterna caspia*): Im Grazer Feld rastete 1 ad. am 2.5. am Privatbadensee Hautzendorf (HPH, SZI).

Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*): Am Heimzug rasteten je 2 ad. am 30.3.2009 an den Schotterteichen in Großwilfersdorf (FSA) und am 15.5. am Mühlteich in Kirchberg an der Raab (ATI). Am Wegzug hielten sich zwischen 25.7. und 13.8. jeweils 1-3 ad. am Schwabenteich auf, und am 4.8. jagte 1 ad. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST, SZI).

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisea*): Am 18.10. jagte 1 juv. am Schwarzlsee (LKH, HPH, SZI).

Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybridus*): Am 24.4. jagte 1 ad. am Saazer Teich (FSA).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Der Heimzug setzte am 12.4. ein, als das erste ad. Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA) beobachtet wurde, dort wurden am 29.4. 3 ad. (GWÖ) und am 5.6. 1 ad. (KMÜ) gesehen. Im Leibnitzer Feld jagten zwischen 23.4. und 1.5. jeweils 1-2 ad. am Aldrianteich in Tillmitsch (WST, SZI). Das Maximum an Durchzüglern wurde am 29.4. festgestellt, als neben den bereits erwähnten Ind. in Großwilfersdorf und Tillmitsch 69 ad. im Grazer Feld am Privatbadensee Hautzendorf jagten (SZI), 18 ad. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST) und 2 ad. am Furtnersteich (BRO). An den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau hielten sich überdies von 11.5.-13.5. 4-9 ad. und am 4.6. 3 ad. auf (WST). Am Furtnersteich wurde je 1 ad. auch am 11.5. und 19.5. gesehen (AKU, BRO). Im Raabtal wurden zwischen 30.4. und 24.5. jeweils 1-6 ad. am Mühlteich in Kirchberg und am 30.4. und 1.5. 8-17 ad. am Saazer Teich beobachtet (ATI, SZI). Im unteren Murtal jagten am Schwabenteich 12 ad. am 4.5., 2 ad. am 14.5. und 1 ad. am 29.5. (WST, SZI) und 10 ad. waren am 13.5. an den Schotterteichen in Eichfeld zu sehen (WST). Am Wegzug wurden am 4.8. 9 ad. am Schwarzlsee, 5 ad. am Aldrianteich in Tillmitsch, 1 ad. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau und 2 ad., 1 juv. am Schwabenteich beobachtet, wo auch 3 juv. am 5.8. und 1 ad. am 8.8. rasteten (WST, SZI). Am 19.9. rastete 1 Ind. am Saazer Teich (JPU).

Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*): Am 23.4. jagten 3 ad. am Aldrianteich bei Tillmitsch und 14 ad. an den Schotterteichen bei Seibersdorf (WST, CZE, SZI). Am 29.4. wurden 7 ad. am Furtnersteich (BRO), 2 ad. am Mühlteich in Kirchberg/Raab und 1 ad. an den Schotterteichen bei Seibersdorf (SZI) beobachtet. Am Murstausee Gralla rastete 1 ad. von 2.5.-3.5. (JBR, HPH, WST, SZI) und am 24.5. jagte 1 ad. am Mühlteich in Kirchberg/Raab (SZI).

Hohltaube (*Columba oenas*): Im Mittwinter hielten sich am 6.1.2009 60 Ind. bei Hainersdorf auf und 40 Ind. am 13.1.2009 bei Fürstenfeld (FSA). Von 12.2.-13.12.2009 gelangen zahlreiche Beobachtungen in der Süd- und Oststeiermark. Die größten Trupps umfassten 100 Ind. am 2.3. bei Pichla, bis zu 400 Ind. von 12.9.-1.10. bei Neuwindorf und 100 Ex. am 15.11. bei Leibnitz (MFO, AKU, VMA, RPA, SPA, JPU, ESA, FSA, WST, GWÖ, SZI). Überwinterer waren bis zu 39 Ind. zwischen 3.1.-21.2.2010 im Grazer Feld (SZI), 5 Ind. am 20.1. bei Tillmitsch (WST), 70 Ind. von 26.1.-8.2.2010 bei Fürstenfeld (FSA), 1 Ind. am 4.2.2010 an der Pötzmühle (ESA) und 5 Ind. am 14.2.2010 bei Pichla (WST).

Ringeltaube (*Columba palumbus*): Von der Ringeltaube gelangen zwischen 5.1.2009-12.2.2010 zahlreiche Beobachtungen in allen Landesteilen. Die größten Trupps umfassten 2.000 ziehende Ind. am 16.10.2009 bei Wagna und am 18.10. 3.320 ziehende Ind. bei Vasoldsberg und 1.500 ziehende Ind. bei Tillmitsch (SBA, UFL, MFO, RJA, AKU, JLS, GMD, RPA, SPA, KPO, RPO, BRO, ESA, FSA, WST, SZI).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): Im Lafnitztal wurde je 1 Ind. am 19.4., 1.5. und 23.5. an den Neudauer Teichen beobachtet (RPA, SPA, FSA, SZI) sowie zwei Paare von 11.6.-13.6. bei Wörth/Lafnitz (SZI). Im Leibnitzer Feld hielten sich zwischen 29.4. und 7.6. 1-2 rufende ♂ bei den Schotterteichen in Tillmitsch auf (WST, SZI). Aus dem unteren Murtal trafen die meisten Beobachtungen ein: 1 Ind. wurde am 30.4. bei Zeltling festgestellt (MFO), zwischen 8.5. und 4.8. 1-2 Paare am Schwabenteich (HPH, SPA, WST, SZI), bis zu 30 Ind. bei Pichla/Mureck zwischen 11.5. und 18.7. (WST, SZI), je 1 singendes ♂ von 25.6.-7.7. bei Halbenrain und am 27.6. am Sichel-dorfer Teich (JPU, SZI) und 1-5 Ind. von 18.7.-1.8. bei Seibersdorf (HPH, SPA, WST, SZI). Am 23.5. wurden 2 Ind. bei Priebing beobachtet und am 25.5. 3 Ind. bei Pößnitz (JPU, WST). Bei Neutersdorf hielten sich zwi-



schen 5.8. und 11.8. bis zu 11 Ind. auf (WST, SZI) und die Letzte des Jahres war ein Jungvogel, der von 17.9.-20.9. bei Neuwindorf gesehen wurde (CZE, SZI).

Kuckuck (*Cuculus canorus*): Vom Kuckuck langten zwischen 2.4. und 13.6.2009 zahlreiche Beobachtungen von 1-3 rufenden ♂ aus vielen Teilen der Steiermark ein (SBA, JBR, MFO, AKU, HKU, JLS, GMD, HPH, KPO, RPO, GPU, JRI, BRO, FSA, WST, SZI). Am Wegzug hielt sich 1 Ind. zwischen 7.8. und 21.8. bei Hütt auf (WST) und am 7.8. wurde 1 juv. bei Burgau beobachtet (FSA).

Zwergohreule (*Otus scops*): Am 17.4. wurde 1 Ind. in Gleisdorf aufgegriffen und zum Verein „Wildtiere in Not“ gebracht. Der unverletzte Vogel konnte am selben Tag am Lustbühel in Graz wieder ausgewildert werden (M. Großmann, HPH, SZI). Am 23.7. rief 1 Ind. in Graz-Waltendorf (SZI).

Uhu (*Bubo bubo*): Reviere wurden aus dem oberen Murtal (2 Rev.), dem mittleren Murtal (2 Rev.), dem steirischen Randgebirge (2 Rev.), dem Grazer Bergland (3 Rev.) und dem Vorland (4 Rev.) gemeldet (HKU, HPH, TPF, JPU, BRO, FSA, SUR, SZI). Brutnachweise (1 Bp. mit 1 juv., 2 Bp. mit je 3 juv. und 1 Bp. mit 4 juv.) wurden an vier Örtlichkeiten im Vorland erbracht (JPU, ATI, CZE, SZI).

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*): Je 1 Ind. rief im weststeirischen Riedelland am 7.2.2009 bei Hitzendorf, im steirischen Randgebirge am 5.4. und 10.4. auf der Stubalpe, am 22.4. auf der Hebalm, am 24.4.2009 bei St. Jakob-Breitenau und am 2.2.2010 bei Birkfeld sowie im Grazer Bergland am 6.4. bei Eibisberg und am 25.4. bei Frohnleiten (GMD, JPU). In den Zentralalpen riefen am 3.4. 3 Ind. in der Karchau (BRO). Je 1 Ind. wurde am 22.3. bei Kulm am Zirbitz, am 15.8. bei Predlitz, am 20.9. am Hochwechsel und am 5.10. bei St. Georgen ob Murau beobachtet (HPH, BRO, FSA, SZI).

Waldkauz (*Strix aluco*): Brutnachweise wurden aus Krast/Arnfels (1 Bp. mit 3 juv.), aus Vasoldsberg (1 Bp. mit 3 juv.), aus Gratkorn (1 Bp. mit 2 juv.), aus Fürstenfeld (1 Bp. mit 2 juv.) und aus Wagna (1 Bp. mit 2 juv.) gemeldet (RPA, SPA, GPU, FSA, WST, SZI).

Waldohreule (*Asio otus*): Am 4.1.2009 jagte 1 Ind. bei Lödersdorf im Raabtal (ATI). An einem Schlafplatz in Fürstenfeld hielten sich von 4.1. bis 30.1.2009 bis zu 20 Ind. und von 2.11.2009 bis 14.2.2010 3-7 Ind. auf (FSA). An einem Schlafplatz in St. Veit am Vogau konnten von 5.1.-17.2. 2-3 Ind. beobachtet werden (WST). Am 16.3. und 17.3. wurde je 1 überfahrenes Ind. in Nestelbach und Leibnitz gefunden (GPU). Reviere bestanden südlich von Friedberg (1 Paar balzend am 9.3.), auf der Hebalm (2 rufend am 22.4.), bei Kalsdorf (1 rufend am 23.5.) im Sugaritzwald (1 ad. jagend am 31.5.) und bei St. Peter/Kammersberg (2 Ind. am 13.6.) (AKU, JPU, BRO, SZI). Brutnachweise wurden aus Neuwindorf (1 Bp. mit mind. 3 juv.), von den Wundschuher Teichen (1 Bp. mit 1 juv.) aus Vasoldsberg (1 Bp. mit 1 juv.) und aus Fürstenfeld (2 Bp. mit 5-6 juv.) gemeldet (RPA, SPA, FSA, SZI).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*): Im Grazer Feld zog am 11.11.2009 1 Ind. bei Unterpremstätten nach Westen (SZI).

Raufußkauz (*Aegolius funereus*): Am 13.4. riefen 2 ♂ SE. Rabendorf (VMA) und am 11.2.2010 saß 1 Ind. in einer Fichtengruppe im Gratkorn Stadtpark (SZI).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*): Beobachtungen gelangen wiederum nur in den südlichen Landesteilen (unteres Murtal bzw. Randgebiete): Je 1 ♂ schnurrte von 7.5.-19.6.2009 im Sugaritzwald (JBR, CZE, SZI) und von 11.5.-14.6.2009 im Schweinsbachwald (JBR). Am 12.8.2009 wurde 1 ad. ♂ bei Lichendorf beobachtet (H. Koppin).

Mauersegler (*Apus apus*): Die ersten des Jahres wurden am 12.4. am Lustbühel in Graz (1 Ind.) und am 14.4. in Bad Radkersburg und Wagna (je 2 Ind.) beobachtet (MFO, WST, SZI). Die letzte Beobachtung des Jahres gelang am 3.9. in Wagna, als 1 Ind. über Wagna nach Westen zog (WST).

Eisvogel (*Alcedo atthis*): Vom Eisvogel liegen aus vielen Teilen der Steiermark zahlreiche Beobachtungen von 1-3 Ind. zwischen 4.1.2009 und 13.2.2010 vor; es wurden aber keine Brutnachweise gemeldet (SBA, EBA, JBR, MBR, JLZ, VMA, GMD, RPA, SPA, JPU, FSA, WST, ATI, SZI).

Bienenfresser (*Merops apiaster*): Am 31.5. überflog 1 ad. Gratkorn (SZI) und am 7.6. jagten 2 ad. an den Schotterteichen in Tillmitsch (WST).

Blauracke (*Coracias garrulus*): Im Brutgebiet wurden im Jahr 2009 11 Paare festgestellt, aber es kam beinahe zu einem Totalausfall der Brut: Nachdem zwischen 24.6. und 26.6. schon ein paar juv. ausgeflogen waren, wurden am 3.7. infolge Schlechtwetters und Dauerregens 35 juv. tot in den Nisthöhlen aufgefunden (MTI, OSA)! Am 23.8. wurde noch je 1 ad. bei Dirnbach und Stainz b. Straden beobachtet (WST)



Wiedehopf (*Upupa epops*): Die ersten Beobachtungen des Jahres gelangen am 5.4.: Je 1 Ind. konnte bei den Schotterteichen bei Großwilfersdorf, in Neuwindorf und auf den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen beobachtet werden (JMO, HPH, FSA, SZI). Am 15.4. wurden 2 Ind. in Gössl am Grundlsee und 1 Ind. in Krast/Arnfels beobachtet (RPA, SPA, JPU), je 1 Ind. am 17.4. bei Riegersberg, am 27.4. in Kitzelsdorf und bei Schlossberg (SBE, GPU). Von 1.5.-3.5. hielt sich 1 Ind. bei Weng im Gesäuse auf (JMO). Im Bezirk Hartberg wurde 1 ad. bei Unterrohr am 28.5. beobachtet und futtertragend auch am 2.7. (FSA). Am 4.7. hielt sich 1 ad. in Fürstenfeld auf (FSA).

Wendehals (*Jynx torquilla*): Am 5.4. riefen 2 Ind. in Fötschach/Leutschach (JBR, HPH, CPF, GPU, WST, CZE, SZI). Je 1 Ind. wurde am 6.4. in Leibnitz, am 18.4. bei Voitsberg, am 26.4. am Montikogel/Leutschach, am 29.4. in Kogelberg/Leibnitz, am 2.5. in Glanz/Leutschach, am 6.5. am Demmerkogel, am 8.5. in Stallhofen, am 12.5. und 16.5. in St. Georgen ob Murau, am 23.5. in Mariahof-Berg und am 27.6. in Klösch beobachtet (JBR, MFO, JLS, GPU, JPU, BRO, WST, SZI).

Am Wegzug rastete je 1 Ind. am 2.9. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau und am 17.9. im Grazer Feld beim Cargo-Center Wundschuh (SZI).

Grauspecht (*Picus canus*): Vom Grauspecht gab es erfreulicher Weise wieder mehr Beobachtungen: Am 15.1.2009 wurde 1 ♂ in Fürstenfeld gesehen (FSA), je 1 Ind. wurde am 6.2. in Hitzendorf, am 16.2. in St. Georgen/Stiefing, am 17.2. in Frauenberg/Feldbach, am 20.2. in Krast/Arnfels, am 23.2. in Kitzelsdorf/Saggau, am 1.3. in der Kühau bei Wagner, am 14.3. in Weng, am 20.3. in Hohenbrugg/Raab, am 19.4. bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau, am 20.4. in der Puxer Au, am 24.4. am Remschnigg und am 18.5. beim Schloss Brunnsee festgestellt (JMO, GPU, JPU, BRO, WST, ATI, SZI). Ein rufendes Ind. hielt sich von 9.3.-14.3. und von 14.5.-15.5. bei Riegersberg/Vorau auf (SBE), 1-2 Ind. am 12.3., 1.5. und 7.6. bei Hausmannstätten und von 15.3.-9.4., am 14.5. und 18.10. bei Vasoldsberg (RPA, SPA). Je 2 rufende ♂ waren am 14.3. beim Stift Vorau (SBE) zu hören, am 5.4. in den Rosswiesen bei Weißenbach/Liezen (JMO) und am 10.4. beim Gasthof Bodenbauer/Hochschwab (SZI). Ein Paar hielt sich an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab von 16.3.-4.7. auf (RPA, SPA, ATI, SZI) und 2 Ind. waren am 6.5. bei Katsch (BRO). Im Winter wurde 1 ♂ am 23.12.2009 und 1 rufendes Ind. am 19.2.2010 am Stausee Lebring (GMD, SZI) beobachtet, 1 Ind. rief am 29.1.2010 am Murstau Obervogau und 2 Ind. riefen am 25.2.2010 am Stausee Mellach (SZI).

Blutspecht (*Dendrocopos syriacus*): Am Lustbühel in Graz fütterte am 20.6. 1 ♀ 1 juv., und zwar offensichtlich einen Hybriden Bunt- x Blutspecht (SZI). Je 1 ♂ wurde am 22.9.2009 in Fürstenfeld (FSA) und am 16.1.2010 am Lustbühel in Graz beobachtet; letzterer war offenbar mit einem Buntspecht-♀ verpaart (SZI).

Weißrückenspecht (*Dendrocopos leuctos*): Am 10.4. wurden zwei trommelnde und ein rufendes Ind. beim Gasthof Bodenbauer/Hochschwab beobachtet (CNE, SZI).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*): Im ersten Halbjahr 2009 wurde je 1 ♂ von 4.1.-13.2. bei Weng (JMO), von 11.1.-9.5. in Fürstenfeld (FSA), am 23.1. in Ferbersdorf/Vasoldsberg (RPA, SPA) und am 31.3. beim Wasserwerk Feldkirchen (SZI) beobachtet. Je 1 Ind. konnte am 5.2. bei Dürnberg/Empersdorf (SPA), am 15.3. und 15.4. in Friedberg und am Murstau Obervogau, am 5.4. am Plattensteig/Graz, am 10.4. bei Birkfeld und von 11.4.-18.4. beim Grabnerhof/Weng festgestellt werden (AKU, HKU, VMA, JMO, WST). Je ein Paar hielt sich am 22.3. an den Waldteichen in Kirchberg/Raab und am 6.4. am Murstau Obervogau (FSA, SZI) auf. Im zweiten Halbjahr 2009 wurde je 1 Ind. am 12.7. beim Schloss Brunnsee, am 1.8. bei Vasoldsberg und am 23.9. am Lubekogel/Windische Bühel (RPA, WST, SZI) beobachtet und je 1 ♂ am 18.7. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA) und von 26.12.-27.12. in Weng (JMO).

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*): Je 1 Ind. trommelte am 15.4. und 17.9. auf der Tauplitz und am 16.4. beim Salza-Stausee bei Bad Mitterndorf (RPA, SPA). Am 16.6. wurden 4 Ind. auf der Fensteralpe gehört (JPU) und am 15.8. war 1 Ind. bei Predlitz zu sehen (BRO).

Haubenlerche (*Galerida cristata*): Von der Haubenlerche gelangen zwischen 6.1.2009 und 25.2.2010 zahlreiche Beobachtungen von 1-8 Ind. aus dem bekannten Verbreitungsgebiet (MFO, RPA, SPA, GPU, JPU, ESA, WST, ATI, SZI). Es wurde nur ein Brutnachweis von den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (1 Bp. mit 2 flüggen juv.) und ein Bruthinweis aus Seibersdorf (1 Paar mit Nistmaterial) gemeldet (WST, SZI).

Heidelerche (*Lullula arborea*): Am 12.3. überflog 1 Ind. die Eichfelder Schotterteiche (SZI), am 18.10.2009 zogen 4 Ind. bei Tillmitsch nach Westen und am 17.2.2010 wurde 1 Ind. bei Zeltling beobachtet (WST).

Feldlerche (*Alda arvensis*): Wohl Überwinterer waren 40 Ind. am 8.1.2009 bei Eichfeld (WST), 10 Ind. am 22.1. bei Laafeld (MFO), 5 Ind. von 2.2.-3.2. bei Hohenbrugg an der Raab, 3 Ind. am 6.2. bei Berndorf im Raabtal (ATI) und 1 Ind. am 17.2. südlich von Oberrakitsch (WST).

Der Heimzug dauerte von 2.3.-13.4., es wurden zumeist kleine Gruppen und Trupps bis 50 Ind. beobachtet. Die größten Trupps umfassten je 100 Ind. am 9.3. und 20.3. bei Unterpremstätten (AKU, VMA, JMO, RPA, SPA,



BRO, WST, ATI, SZI). Reviere bestanden am Flughafen Graz-Thalerhof (1-4 ♂ singend von 5.4.-25.4.), bei der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz (2-3 ♂ singend von 13.4.-21.5.), bei Mariahof (3-5 ♂ singend von 13.4.-12.6.), bei Riegersdorf (1 ♂ singend von 21.4.-30.4.), bei Weinburg (2 ♂ singend am 22.4.) und bei Laafeld (1 ♂ singend am 2.6.) (MFO, BRO, WST, SZI). Der relativ schwache Wegzug setzte am 10.10. ein und dauerte bis 7.11.2009. Es wurden vor allem im Murtal zwischen Graz und Mureck Einzelvögel und Trupps bis 50 Ind. beobachtet, wobei der mit Abstand größte Trupp 180 Ind. am 7.11. bei Unterpremstätten umfasste (WST, SZI). Abseits davon rasteten 20-30 Ind. von 15.10.-20.10. an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz (BRO) und 1 Ind. am 28.10. bei Vasoldsberg (RPA).

Im Winter hielten sich 7 Ind. am 15.12.2009 bei Hainsdorf, 6 Ind. am 16.1.2010 bei Sieldorf und 12 Ind. am 14.2.2010 bei Weinburg auf. Wohl schon Heimzügler waren 30 Ind. bei Neuhummersdorf/Radkersburg, 25 Ind. bei Unterau/Dietzen und 120 Ind. bei Goritz am 17.2. (WST).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): Die ersten am Heimzug waren 7 Ind. am 23.4. am Stausee Gralla, wo in der Folge bis 13.5. immer wieder 50-100 Ind. jagten (WST). Am 27.4. wurden 150 Ind. am Saazer Teich beobachtet (ATI), je 1 Ind. am 28.4. an den Schotterteichen in Eichfeld und an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST), 30 Ind. am 16.5. am Mühlteich in Kirchberg/Raab (ATI) und 26 Ind. am 25.5. bei Donnersdorf (MFO).

Brutkolonien bestanden an den Schotterteichen in Tillmitsch (2 Kolonien mit bis zu 110 Röhren von 25.4.-7.7.), an den Schottergruben bei Neuwindorf (2 Kolonien mit bis zu 150 Röhren von 25.4.-4.7.), an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (1 Kolonie mit bis zu 95 Röhren von 10.5.-12.7.), am Sieldorfer Teich (1 Kolonie mit ca. 100 Röhren ab 16.5.) und bei Wundschuh (1 Kolonie mit über 20 Paaren am 20.7.). Die Brutkolonien an den Schotterteichen in Tillmitsch, bei Neuwindorf und an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau hatten anscheinend keinen Bruterfolg, da die Brutwände teils wegen des starken Regens, teils wegen Baggerarbeiten Ende Juni/Anfang Juli abrutschten (MFO, JPU, WST, ATI, SZI).

Vielleicht schon am Wegzug waren bis zu 50 Ind. von 21.6.-26.7.2009 am Schwabenteich und 50 Ind. am 23.6. am Stausee Gralla sowie 1 Ind. am Murstau Obervogau (WST). Vom eigentlichen Wegzug im August/September liegen keine Daten vor!

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*): Am 3.3.2009 überflog 1 Ind. den Lustbühel in Graz (SZI) und am 16.3. waren 3 Ind. bei Katsch zu sehen (BRO). Bei Krenhof wurden am 5.4. 2 Ind. und am 11.7. 1 Ind. beobachtet (JPU). Ebenfalls 2 Ind. wurden am 8.4. am Gösser, am 10.4. bei Falkenstein, am 1.5. in Triebendorf und am 28.5. in der Raabklamm festgestellt (VMA, JPU, BRO, FSA).

Am 17.6. flogen 4 Ind. vor der Roten Wand, am 6.10. wurden dort 20 Ind. gezählt (FSA) und am 30.8. waren 50 Ind. an der Puxer Wand zu sehen (BRO).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): Die ersten des Jahres waren 3 Ind. am 12.3. bei Peggau (JPU) und 5 Ind. am 20.3. am Mühlteich in Kirchberg/Raab (ATI). Die größten Trupps umfassten am Heimzug 200 Ind. bei Seibersdorf und 100 Ind. bei Eichfeld am 23.4. (WST). Vor dem Wegzug fielen je 150 Ind. am 22.8. über Leibnitz und am 4.9. über Wagna auf sowie je 200 Ind. am 13.9. über Wagna und am 14.9. am Schwabenteich (WST). Es gelangen verhältnismäßig viele Beobachtungen im Oktober: Am 4.10. jagten 30 Ind. am Remschnigg, am 8.10. zog 1 Ind. über Wagna nach Süden (WST), am 10.10. jagten 5 Ind. am Planksee bei Wagendorf (SZI) und am 11.10. besuchten 15 Ind. die Dobler Lacke bei Kulm am Zirbitz (BRO). Je 1 Ind. war am 17.10. am Furtnerteich und am Aldrianteich in Tillmitsch zu sehen (BRO, SZI). Am 18.10. hielt sich noch 1 juv. im Ennstal in Weng auf und 4 Ind. am Aldrianteich (JMO, JBR, WST) und zuletzt jagte am 19.10. 1 Ind. im Grazer Feld am Privatbadensee Hautzendorf (SZI).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*): Die ersten des Jahres waren 7 Ind. am 28.3. an der Mur bei Mitterling (MFO) und je 2 Ind. am 29.3. am Mühlteich in Kirchberg/Raab und an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (ATI, FSA). Die letzten des Jahres waren ca. 50 Ind. am 4.10. am Remschnigg (WST), 1 Ind. am 14.10. am Fuchschweifteich bei Neudau (GMD) und 2 Ind. an den Schotterteichen in Tillmitsch am 18.10. (WST).

Brachpieper (*Anthus campestris*): Am Heimzug rasteten 2 Ind. am 18.4. im ehemaligen Bergbau bei Voitsberg (SZI) und 1 Ind. am 5.5. auf der Härterhöhe bei Mariahof (BRO). Am Wegzug wurden 3 Ind. im Schigebiet Lachtal am 5.10. beobachtet (HJA).

Baumpieper (*Anthus trivialis*): Der erste des Jahres wurde am 5.4. bei Glanz beobachtet (WST). In der Folge gab es vom Heimzug praktisch keine Meldungen. 1-3 singende ♂ wurden bei Gschaid, bei Rabendorf, bei Strallegg, in der Raabklamm, bei Vasoldsberg, am Schenkenberg bei Frohnleiten, bei Bärnbach, auf der Koralpe, am Remschnigg, auf der Fensteralm, am Krummsee und in St. Peter am Kammersberg beobachtet (VMA, RPA, SPA, JPU, BRO, WST). Vom Wegzug wurden nur jeweils 1-6 Ind. von 26.8.-23.9. aus Neutersdorf, Wagna, Leibnitz, Glanz und vom Remschnigg gemeldet (WST).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*): Überwinterer waren 1 Ind. am 17.1.2009 bei Kellendorf (WST), 15-20 Ind. von 2.2.-3.2. in Hohenbrugg/Raab und 5 Ind. am 3.2. bei Fehring (ATI). Der Heimzug, der sich von 8.3.-9.5.2009 erstreckte, war zwar relativ unauffällig, es liegen aber doch zahlreiche Meldungen von jeweils 1-10



Ind. aus allen Teilen der Steiermark vor. Die größten Trupps umfassten 19 Ind. am 5.4. am Schwabenteich, 20-25 Ind. am 7.4. und 8.4. bei Vasoldsberg und 40 Ind. am 18.4. bei Tauplitz (AKU, VMA, JMO, RPA, SPA, KPO, RPO, JPU, BRO, WST, ATI, SZI). Der einzige Bruthinweis betraf ein Paar mit Nistmaterial am 16.4. im Krunglmoos/Bad Mitterndorf (RPA, SPA). Ungewöhnlich war die Beobachtung eines Individuums am 26.7. bei Strallegg (VMA).

Ähnlich wie der Heimzug verlief auch der Wegzug relativ unauffällig. Zwischen 9.9. und 15.11.2009 gelangen Beobachtungen von jeweils 1-10 Ind. in vielen Teilen der Steiermark. Die größten Trupps umfassten 20 Ind. am 20.9. am Hochwechsel, 35 Ind. am 1.10. am Stuhleck, 30-50 Ind. von 10.10.-28.10. bei Vasoldsberg und 20 Ind. am 15.10. bei Hainsdorf (GMD, RPA, SPA, JPU, BRO, WST, SZI). Im Winter 2009/10 gelangen wieder einige Beobachtungen von überwinternden Wiesenpiepern: 1 Ind. wurden am 15.12. bei Unterpremstätten beobachtet (SZI), je 2 Ind. am 21.12.2009 bei Obervogau (WST), am 29.12. bei Vasoldsberg (RPA), am 16.1.2010 in Bad Radkersburg und am 28.1.2010 in Mureck. Zwischen 16.1. und 17.2.2010 hielten sich 3-4 Ind. in Kellendorf auf und 1 Ind. am 17.2. in Donnersdorf (WST).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*): Von 23.4.-4.5.2009 rasteten 2-3 ad. bei den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST, SZI) und am 4.10. überflog 1 Ind. rufend Fernitz (RPA).

Bergpieper (*Anthus spinoletta*): Überwinterer waren je 2 Ind. am 17.1.2009 an der Mur bei Kellendorf und Mitterling (WST) und 1 Ind. am 18.1. in Bad Radkersburg (MFO). Am unauffälligen Heimzug wurden abseits der Obersteiermark 1 Ind. am 8.3. am Saazer Teich (ATI), je 5 Ind. am 30.3. und 30.4. am Schwabenteich und 3 Ind. am 9.4. bei Wagna beobachtet (WST). Abseits der Brutgebiete wurden nur wenige Wegziehende gemeldet: Im Leibnitzer Feld rasteten am 30.9. 10 Ind. bei Leibnitz, 1-3 ziehende Ind. hielten sich von 1.10.-8.10. bei Wagna auf und 5 Ind. am 18.10. bei Tillmitsch. Im unteren Murtal rasteten 4 Ind. am 22.10. am Schwabenteich sowie 4-6 Ind. von 2.11.-6.11. an den Brunnseer Teichen und an den Schotterteichen in Eichfeld (WST). Die mit Abstand größten Trupps umfassten bis zu 400 Ind. von 7.11.-9.11. bei Hainsdorf (WST, SZI) und 75 Ind. am 7.11. bei Seibersdorf (SZI).

Im Winter 2009/10 überwinterten überraschend viele Bergpieper: Am 6.1.2010 waren 8 Ind. an der Mur in Gratkorn zu sehen (SZI), am 16.1. 20 Ind. bei Kellendorf, wo am 17.2. noch 15 Ind. gezählt wurden. Ebenfalls am 16.1. wurden 2 Ind. in Bad Radkersburg beobachtet (WST). Im mittleren Murtal konnten am 17.1. 3 Ind. und am 13.2. 2 Ind. an der Mur bei Badl beobachtet werden und südlich von Graz 1 Ind. ebenfalls am 17.1.2010 an der Mur bei Mellach (HPH, CPF, SZI). Je 2 Ind. hielten sich am 19.1. bei Speltenbach und Fürstenfeld auf (FSA) und je 1 Ind. am 9.2. am Murstau Obervogau, am 13.2. an der Mur bei Rabenstein und bei der Murecker Schiffsmühle (SZI). In Graz wurden am 10.2. 6 Ind. bei der Puntigamer Brücke gesehen (SZI) und am 17.2. 3 Ind. in Donnersdorf (WST).

Schafstelze (*Motacilla flava flava*): Am Heimzug rastete die erste, 1 ♂, am 31.3. auf einem Acker in Graz-Liebenau (SZI). In der Folge wurden von 4.4.-17.4. regelmäßig bis zu 21 Ind. auf den Rosswiesen beobachtet (RPO, KPO), von 5.4.-19.4. 1-8 Ind. an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (FSA), von 7.4.-29.4. 1-4 Ind. am Schwabenteich (WST, SZI), von 17.4.-14.5. bis zu 35 Ind. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (CNE, WST, SZI), von 18.4.-21.5. 1-12 Ind. am Flughafen Graz-Thalerhof (JPU, SZI) und von 22.4.-14.5. 1-10 Ind. an den Schotterteichen in Eichfeld (WST, SZI). Abseits davon wurde je 1 Ind. am 21.4. in Ferbersdorf (SPA) und am 23.4. an den Waldschacher Teichen (WST) festgestellt. Je 10 Ind. rasteten am 24.4. und 1.5. beim Grabnerhof und an denselben Tagen bei Weng im Gesäuse (JMO), 7 Ind. rasteten am 25.4. bei Fehring (ATI), 4-15 Ind. waren von 5.5.-6.5. in Judendorf/Kulm a. Zirbitz zu sehen (SBA, EBA) und 4 Ind. rasteten am 9.5. am Niederwechsel (AKU).

Am Wegzug rasteten von 21.8.-3.9. 1-3 Ind. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST, SZI), von 29.8.-13.9. 1-14 Ind. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (WST, SZI) und von 2.9.-4.10. 2-14 Ind. südlich von Oberrakitsch (WST, SZI). Am Flughafen Graz-Thalerhof rasteten jeweils 1-3 Ind. von 3.9.-11.10. (SZI), 1-3 Ind. waren am 5.9. und 15.9. bei Leibnitz zu sehen (WST) und 12 Ind. rasteten am 12.9. auf der Tauplitz (RPA, SPA). Je 1 Ind. wurde am 13.9. bei Tillmitsch und am 16.9. auf der Planneralm festgestellt (SPA, SZI) und 6 Ind. rasteten am 2.10. bei Wagendorf (WST, SZI).

Nordische Schafstelze (*M. flava thunbergi*): 1 ♂ rastete am 17.4. bei Preding (SZI) und am 29.4. hielten sich 11 ♂ an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau sowie 1 ♂ am Schwabenteich (WST, SZI) auf. Am 2.5. besuchten 4 ♂, 3 ♀ den Flughafen Graz-Thalerhof (HPH, SZI) und am 9.5. war 1 ♂ westlich des Niederwechsels zu sehen (AKU).

Aschköpfige Schafstelze (*M. flava cinereocapilla*): In der Weststeiermark rastete am 17.4. 1 ♂ bei Preding (SZI).

Maskenstelze (*M. flava feldegg*): Am 18.4. rastete je 1 ♂ bei Preding und im ehemaligen Bergbau Bärbach (HPH, SZI). Zwischen 19.4. und 29.5. verweilte 1 singendes ♂ an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau, wo am 11.5. auch 1 ♀ beobachtet werden konnte. Das ♂ verhielt sich am 14.5. territorial gegenüber anderen Schafstelzen und wurde am 29.5. auch futtertragend angetroffen. Bruterfolg konnte aber dennoch



nicht festgestellt werden (HPH, WST, CZE, SZI). Außerdem rastete 1 ♀ am 23.4. am Schwabenteich (WST) und 2 ♂ waren am 6.5. in Judendorf bei Kulm a. Zirbitz zu sehen (SBA, EBA).

Zitronenstelze (*Motacilla citreola*): Am 24.4. rastete 1 ad. ♂ in einer Schottergrube südwestlich von St. Marein im Müürztal (MDU).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*): Brutnachweise wurden aus Schöder (1 Paar mit 2 juv. am 20.5.) und vom Stift Vorau (1 Paar füttert 4 juv. im Nest am 11.6.) gemeldet (BRO, SBE).

Bachstelze (*Motacilla alba*): Überwinterer waren je 1 Ind. am 2.1.2009 in Graz an der Mur beim Kalvarienberg (SZI), am 17.1. an der Grenzmuir bei Donnersdorf, Radkersburg und Mitterling, am 19.1. am Stausee Gralla, von 19.1.-8.2.2009 in Altgralla, am 1.2. bei Gosdorf (WST) und 2 Ind. am 2.2. in Hohenbrugg an der Raab (ATI). Im strengen Winter 2009/10 überwinterten erstaunlich viele Bachstelzen in der Steiermark: Von 21.12.2009 bis 22.2.2010 hielten sich 1-9 Ind. am Stausee Gralla auf (HPH, GPU, FSA, WST, SZI), an der Mur bei Mitterling von 8.1.-10.2. 1-5 Ind. (MFO, WST) und von 11.1.-21.2. waren 1-3 Ind. am Murstau Obervogau (WST, SZI). Am 10.2. wurden 9 Ind. in Graz an der Mur zwischen Puntigamer Brücke und dem Augarten (SZI) beobachtet, am 17.2. 8 Ind. an der Mur bei Donnersdorf und 10 Ind. an der Mur bei Kellendorf und am 19.2. 1 Ind. in Wagna (WST).

Seidenschwanz (*Bombicilla garrulus*): Von 27.11.2008-9.5.2009 gelangen im Zuge eines Einfluges zahlreiche Beobachtungen. Eine gesonderte Auswertung dieses Einfluges folgt. Im nächsten Winter (2009/10) gab es nur zwei Sichtungen: Am 25.1.2010 hielten sich 7 Ind. und am 20.2.2010 2 Ind. in Graz-Waltendorf auf (SZI).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*): Brutnachweise wurden aus Birkfeld (1 futtertragender ad. am 2.5.), aus Gratkorn (1 ad. füttert 2 flügge juv. am 16.5.) und vom Grundsee (1 ad. füttert 2 flügge juv. am 13.7.) gemeldet (VMA, RPA, SPA, SZI).

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*): Beobachtungen abseits der Brutgebiete: Wohl Überwinterer waren je 1 Ind. am 6.1. bei der Pötmühle, am 13.1. in Fürstenfeld, am 21.1. bei Dietzen und am 4.2. in Wagna (MFO, FSA, WST). 1-2 Ind. überwinterten von 26.1. bis 27.3.2009 in einem Garten im Stiftingtal in Graz (RJA, UFL). Am Heimzug wurde je 1 Ind. am 11.3. und von 24.3.-26.3. in Fürstenfeld festgestellt (FSA), am 20.3. am Mühlteich in Kirchberg/Raab und am 21.3. in Ferbersdorf (RPA, ATI). Am 15.3. rasteten 3 Ind. am Murstau Obervogau und am 25.3. 7 Ind. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (WST, SZI). Zu ungewöhnlicher Zeit sang 1 ♂ am 11.6. bei Wörth/Lafnitz (SZI).

Am Wegzug wurden 2 Ind. am 23.9. und 3 Ind. am 20.10. bei Glanz beobachtet, je 1 Ind. am 29.9. in Brunensee und am 5.10. in Leibnitz (WST). Am 6.10. wurden 5 Ind. in Wagna festgestellt und am 18.10. 3 Ind. in Tillmitsch (WST).

Im Winter 2009/10 hielten sich 2 Ind. am 12.1.2010 in Tillmitsch auf und je 1 Ind. am 14.1.2010 in Frauenberg (WST), am 17.1. an der Mur bei Rabenstein (HPH, CPF), am 19.1. und 23.2. bei Fürstenfeld (FSA), von 30.1.-17.3.2010 bei Vasoldsberg (RPA, SPA), von 4.2.-10.2. am Grazer Kalvarienberg (SZI) und am 17.2.2010 in Kellendorf (MFO).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*): Die einzige gemeldete Alpenbraunelle wurde am 29.7.2009 am Zirbitzkogel beobachtet (SZI).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): Je 1 ♂ sang von 9.5.-16.5. in Altenmarkt bei Fürstenfeld (FSA) und am 18.5. an der Mur südlich der Bertha von Suttner-Friedensbrücke in Graz (SZI).

Blauehlchen (*Luscinia svecica*): Am 22.3. rastete 1 ♂ (weißsternig) an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (FSA, CZE), am 7.4. rastete 1 ♀ am Saazer Teich (KMÜ, ATI) und am 3.9. besuchte 1 ♂ einen überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (HPH, SZI).

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Überwinterer waren je 1 Ind. am 16.1.2009 in Ferbersdorf bei Vasoldsberg (SPA), von 17.1.2009-18.2.2009 in Fürstenfeld (FSA) und am 2.2.2009 in Hohenbrugg an der Raab (ATI).

Im Winter 2009/10 hielt sich 1 ♂ am 3.1. am Flughafen Graz-Thalerhof auf (FSA, SZI), am 27.1. 1 ♂ in Graz-Geidorf (SZI) und am 4.2. 1 Ind. in Fürstenfeld (FSA). Am 10.2. wurde 1 ♂ an der Mur beim Augarten in Graz und am 13.2. 1 Ind. an der Mur bei Lebring beobachtet (SZI).

Haus-x Gartenrotschwanz (*Phoenicurus ochruros x Ph. phoenicurus*): Von 2.5.-5.5.2009 sang 1 ♂ in Bad Radkersburg (MFO).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*): Vom Gartenrotschwanz gelangen zwischen 5.4. und 8.7. erfreulich viele Beobachtungen. Wenn nicht anders angegeben, waren es einzelne singende Männchen, die an folgenden Orten beobachtet wurden: Glanz, am Remschnigg (3 ♂ singend), Lieschen/Oberhaag, Aflenz/Sulm



(2 ♂ singend), Ottenberg/Ratsch, Zieregg, Pößnitz, am Demmerkogel (3 ♂ singend), Bierbaum/Auersbach, Perbersdorf (1 ♂ singend, 1 ♀), Stiwoll, Gratkorn, Graz-Mariatrost, auf der Platte/Graz, Laßnitzhöhe, Vasoldsberg (2 ♂ singend), Kirchberg/Raab, Thien/Gnas, Riegersburg, Siegersdorf/Herberstein, Friedberg, Gamsgebirg, an der Roten Wand, Tauplitz (2 ♂ singend), Klachau, Mariahof und Murau (AKU, HKU, JLS, RPA, SPA, JPU, BRO, FSA, WST, SZI). Brutnachweise wurden aber nur aus Aflenz/Sulm (1 ♀ mit 6 Eiern am 10.5.), aus Raining/Gnasbach (1 ♂ mit 2 juv. am 28.6.) und vom Friedhof Tauplitz (1 Paar mit 2 juv. am 7.7.) gemeldet (JBR, RPA, SPA).

Am Wegzug rastete 1 Ind. am 9.8. in Tauplitz (RPA, SPA), 1 ♂ am 10.8. und je 1 ♀ am 18.8. und 12.10. in Gratkorn (SZI) und je 1 ♂ am 11.8. in Mariahof-Berg (JLS), am 14.9. in Klachau (RPA), am 15.9. in Leibnitz (WST) und am 10.10. am Planksee bei Wagendorf (SZI).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): Vom Braunkehlchen gelangen am Heimzug zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-10 Ind. zwischen 9.4. und 21.5.2009 in allen Teilen der Steiermark. Die größten Trupps umfassten 26 Ind. am 2.5. bei Birkfeld und 20 Ind. am 3.5. am Flughafen Graz-Thalerhof (SBA, AKU, HKU, JLS, VMA, JMO, RPA, SPA, KPO, RPO, JPU, BRO, WST, ATI, GWÖ, SZI).

Es wurde nur je ein Brutnachweis und Bruthinweis sowie eine Brutzeitbeobachtung gemeldet: Am 28.6. wurde ein futtertragendes Paar bei St. Peter/Kammersberg beobachtet (BRO). Ein Paar und ein singendes ♂ wurden am 10.5. bei Aigen/Admont festgestellt und dort warnte 1 Ind. am 12.7. (JMO). Bei Mariahof hielt sich am 20.6. 1 ♂ auf (JLS).

Am Wegzug zwischen 9.8. und 22.9.2009 wurden 24 Beobachtungen von jeweils 1-12 Ind. aus vielen Teilen der Steiermark gemeldet. Die größte Ansammlung umfasste 27 Ind. bei Tauplitz (GMD, RPA, SPA, BRO, WST, SZI).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*): Wohl überwinterer waren 1 ♂ am 8.1. bei Kaindorf/Sulm (JBR) und 1 ♀ am 29.1. bei Feldbach (ATI). Am Heimzug und zur Brutzeit gelangen zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-10 Ind. in allen Teilen der Steiermark zwischen 7.3. und 1.8. (SBA, MFO, AKU, HKU, VMA, JMO, CNE, RPA, SPA, HPH, KPO, RPO, JPU, BRO, WST, ATI, GWÖ, SZI). Brutnachweise wurden lediglich vom Flughafen Graz-Thalerhof (1 Paar futtertragend am 11.5.), von den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (2 Paare futtertragend am 11.5.) und vom Krunglmoos/Bad Mitterndorf (1 Paar futtertragend am 9.7.) gemeldet (RPA, SPA, SZI). Der nur schwach ausgeprägte Wegzug setzte am 14.8. ein und dauerte bis 18.10.2009; es wurden nur wenige Beobachtungen von jeweils 1-4 Ind. gemeldet (JMO, RPA, SPA, JPU, BRO, WST). Spät hielten sich noch 1 ad. ♂ auf der Bärenalalm/Koralpe am 29.10. (WST), 2 Ind. von 5.11.-12.11. bei Vasoldsberg (RPA, SPA) und 1 ad. ♂ am 5.12. bei den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau auf (WST).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): Am Heimzug wurden zwischen 27.3. und 14.5.2009 zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-6 Ind. aus vielen Teilen der Steiermark gemeldet (MFO, CNE, RPA, SPA, KPO, RPO, BRO, FSA, WST, SZI). Im Brutgebiet bei Bärnbach wurde mehrmals ein Paar und mindestens 1-2 weitere ♂ zwischen 18.4. und 14.6. beobachtet. Am 7.6. trug 1 ♀ Futter, das Nest befand sich zwischen Flussbausteinen, und am 25.7. wurden 3 juv. im Gebiet festgestellt (GGR, HPH, CPF, TPF, JPU, SZI). Zwischen Hoch- und Niederwechsel wurden am 9.5. 17 Ind. gezählt (AKU). Am Wegzug gelangen zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-10 Ind. zwischen 7.8. und 11.10. in vielen Teilen der Steiermark (GMD, RPA, SPA, JPU, BRO, WST, SZI).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): Am 12.2. rastete 1 ad. ♂ der skandinavischen Nominatform *torquatus* am Lustbühel in Graz (SZI).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*): Abseits Brutgebietes gelangen von der Wacholderdrossel zwischen 6.1. und 26.3.2009 sowie zwischen 30.10.2009 und 15.2.2010 zahlreiche Beobachtungen. Die größten Trupps umfassten im Zeitraum 6.1.-26.3.2009 je 400 Ind. am 7.1. in Graßnitzberg/Zieregg und am 3.2. in Fürstenfeld, 2.000 Ind. am 2.3. beim Weinburger Teich und je 500 Ind. am 6.3. bei Oberrakitsch, am 9.3. beim Weinburger Teich sowie am 12.3. und 15.3. bei Eichfeld; im Zeitraum 30.10.2009-15.2.2010 fielen bei insgesamt deutlich schwächerem Auftreten 200 Ind. am 11.11. bei Glanz auf (MFO, AKU, CNE, RPA, SPA, GPU, ESA, FSA, WST, ATI, SZI).

Singdrossel (*Turdus philomelos*): Überraschender Weise gelangen einige Winterbeobachtungen: Am 7.1.2009 hielt sich 1 Ind. in Weingärten bei Wielitsch auf, am 8.1. 1 Ind. in Seibersdorf/St. Veit am Vogau und je 1 Ind. am 17.1. im unteren Murtal in Neudörfel, Mitterling und Kellendorf (WST). Am 26.1. waren 2 Ind. am Lustbühel in Graz zu sehen (SZI), am 27.1. wurde 1 Ind. bei Schlossberg beobachtet (GPU) und am 13.2. 1 Ind. bei Landscha (WST).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*): Vom 2.1.-2.4.2009 trat die Rotdrossel außergewöhnlich stark in Erscheinung: Am 2.1. wurde 1 Ind. in Gratkorn beobachtet und von 6.1.-2.4. hielten sich durchgehend 1-38 Ind. in Graz-Waltdorf und Graz-St. Peter auf, wo am 31.1. ca. 310 Ind. zusammen mit ca. 300 Wacholderdrosseln in einem Obstgarten verweilten (CNE, RPA, SPA, SZI). In Wagner wurden 1-2 Ind. von 7.1.-9.2. beobachtet, in Zieregg



1 Ind. am 7.1. (WST), in Feldbach 40 Ind. am 2.2. (ATI) und in Fürstenfeld 1-2 Ind. von 16.2.-19.2.2009 (FSA). Am Heimzug hielten sich 50 Ind. von 17.3.-21.3. in Judendorf bei Kulm am Zirbitz auf (EBA, SBA, HPH), am 25.3. rastete 1 Ind. bei Hausmannstätten (RPA), von 25.3.-28.3. verweilten 1-5 Ind. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (CNE, SZI) und am 29.3. war 1 Ind. bei Friedberg zu sehen (AKU).

Am Wegzug rastete sehr früh, am 29.8., 1 Ind. bei Neutersdorf (WST). Von 26.10.-1.11. hielten sich 1-18 Ind. in Wagna auf, wo am 15.12. 3 Ind. beobachtet werden konnten (WST). Am 29.10. wurden 6 Ind. auf der Koralpe beobachtet (WST) und in Graz bis zu 20 Ind. zwischen 31.10. und 16.11.2009 (SZI). Im südweststeirischen Weinland wurden am 10.11. und 11.11. 5-15 Ind. bei Glanz festgestellt und je 1 Ind. am 10.11. bei Gamlitz und am 12.11. in Eichberg (WST). Je 1 Ind. hielt sich am 13.11. bei Hausmannstätten (RPA), am 15.12. am Schwarzlsee (SZI) und am 16.12. bei Lebring (WST) auf sowie 3 Ind. am 16.11. bei Vasoldsberg (RPA, SPA). Zwischen 11.1.-20.2.2010 wurden an mehreren Stellen in Graz 1-3 überwinternde Ind. beobachtet (RPA, SPA, SZI), je 1 Ind. war am 9.2. bei Gabersdorf und am 14.2. in Brunnsee zu sehen (WST, SZI) und 2 Ind. am 28.2.2010 bei Burgau (FSA).

Feldschwirl (*Locustella naevia*): Von 10.5.-13.6. sangen 2-3 ♂ bei Weißenbach/Liezen (RPO, KPO). Je 1 ♂ sang am 10.5. an den Waldschacher Teichen (SZI) und am 24.5. im Schweinsbachwald (JBR), und 2 singende ♂ waren von 12.6.-13.6. bei Wörth/Lafnitz zu hören (SZI).

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*): Je 1 ♂ sang am 26.5. östlich von Ehrensachsen (AKU) und am Petersbach in Graz (SZI). 1-3 singende ♂ waren von 31.5. bis 6.6. im Sugaritzwald zu hören (SZI). Von 11.6. bis 13.6. sangen 5 ♂ bei Wörth/Lafnitz (SZI) und je 1 ♂ sang am 2.7. bei Unterrohr und am 6.7. östlich von Fürstenfeld (FSA).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*): Von 29.4.-7.7.2009 hielten sich 1-2 singende ♂ an den Halbenrainer Teichen auf, wo am 7.7. auch ein futtertragendes Paar beobachtet wurde (CZE, SZI). Je 1 singendes ♂ wurde von 8.5. bis 11.5. an den Ratschendorfer Teichen, am 8.5. am Schwabenteich (SZI), von 23.5. bis 10.6. am Fuchsschweifteich bei Neudau (AKU, FSA) und am 29.5. bei Mureck (SZI) beobachtet.

Mariskensänger (*Acrocephalus melanopogon*): Am Wegzug rastete je 1 Ind. am 26.9. am Saazer Teich (HPH, GPU, CZE, SZI), am 3.10. am Mühlteich in Kirchberg/Raab und am 6.10. an den Halbenrainer Teichen (SZI).

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*): Am 2.4. wurde der erste ziehende Schilfrohrsänger an den Neudauer Teichen angetroffen (FSA). Am Heimzug hielten sich von 30.4. bis 11.5. 1-2 singende ♂ am Mühlteich in Kirchberg/Raab auf (ATI, SZI), im Grazer Feld wurden am 3.5. 2 Ind. beobachtet (JPU). Je 1 ♂ sang von 4.5. bis 29.5. am Schwabenteich (WST, SZI), von 13.5. bis 14.5. an den Brunnseer Teichen (WST) und am 29.5. am Stausee Gralla (SZI). Eine wahrscheinliche Brut wurde von den Schotterteichen bei Großwilfersdorf gemeldet: Am 29.4. und 7.7. wurde 1 singendes ♂ und am 30.7. 1 futtertragender ad. beobachtet; am 15.8. waren noch 2 Ind. dort (GMD, FSA, GWÖ).

Am Wegzug rasteten am 1.8. 2 Ind. und am 2.9. 1 Ind. an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau (SZI, HPH, SPA) und je 1-2 Ind. am 1.8., am 15.8. und von 4.10. bis 21.10. am Schwabenteich (WST, SZI). Von 9.8. bis 2.9. hielten sich bis zu 20 Ind. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf auf (HPH, WST, CZE, SZI) und je 1 Ind. wurde am 13.9. auf der Ökofläche Kirchgraben/Oberrakitsch und am 14.9. an den Waldschacher Teichen (SZI) beobachtet.

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*): Von 1.5. bis 9.7.2009 trafen 10 Meldungen von 1-6 singenden ♂ aus allen Teilen der Steiermark ein (MFO, AKU, VMA, GMD, JMO, BRO, WST, SZI).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*): Am 30.4. wurden 2 Ind. am Mühlteich in Kirchberg/Raab beobachtet (ATI) und am 1.5. 3 singende ♂ an der Enns bei Admont. Am Ennsaltarm beim Grabnerhof/Weng hielten sich 1-3 singende ♂ von 3.5. bis 12.7. auf (JMO). An den Halbenrainer Teichen sang 1 ♂ am 27.6., und 1 Ind. rastete am 12.10. an einem Gartenteich in Gratkorn (SZI).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*): Brutnachweise: Ab 27.4. sang 1 ♂ am Saazer Teich, ab 27.6. wurde dort ein futtertragendes Paar beobachtet (RPA, SPA, JPU, ATI, SZI). An den Halbenrainer Teichen sangen die ersten 3 ♂ am 29.4.; ab 27.6. wurden dort acht futtertragende Paare gezählt (JPU, SZI). Am Mühlteich in Kirchberg/Raab wurden 1-3 ♂ ab 30.4. und ab 27.6. ein futtertragendes Paar festgestellt (ATI, SZI). An den Waldteichen in Kirchberg/Raab sangen ab 5.5. 2-5 ♂ und ab 27.6. trugen fünf Paare Futter (JLZ, RPA, SPA, JPU, ATI, SZI). Ab 11.5. wurde 1 singendes ♂ an den Brunnseer Teichen und ab 27.6. ein futtertragendes Paar beobachtet (WST, SZI). Erst spät wurde am 27.6. ein singendes ♂ an den Schotterteichen in Seibersdorf/St. Veit am Vogau bemerkt; es war aber sicher schon länger anwesend, da bereits ab 7.7. ein futtertragendes Paar beobachtet werden konnte (SPA, HPH, WST, SZI). Reviere bestanden über längere Zeit an der Enns bei Admont (1 ♂ singend von 1.5. bis Mitte Juni), am Ennsaltarm beim Grabnerhof (1 singendes ♂ von 3.5.-7.6.), an den Ratschendorfer Teichen (1 ♂ singend von 11.5.-14.6.), an den Neudauer Teichen (1 ♂ singend von 23.5.-13.6.), am Sichelndorfer Teich (1-3 ♂ singend von 3.6.-30.6.) und an den Schotterteichen bei Großwilfersdorf (1 singendes ♂ von 28.6.-8.7.), es gab aber keine Brutnachweise oder konkrete Bruthinweise



(MFO, JMO, RPA, SPA, JPU, FSA, SZI). Nur am Heimzug und überwiegend in untypischem Habitat war je 1 singendes ♂ am 2.5. und 15.5. bei Neuwindorf, am 8.5. und 14.5. an den Schotterteichen in Eichfeld, am 18.5. in Graz an der Mur beim Puchsteg und am Zierteich beim Center West, am 19.5. am Furtnersteich, am 21.5. an den Waldschacher Teichen, am 29.5. bei Mureck und am 7.6. an den Schotterteichen in Tillmitsch (AKU, JPU, WST, SZI). Am Wegzug rastete 1 Ind. von 7.8.-11.8. in einem überschwemmten Maisacker bei Neutersdorf (WST, SZI).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Außergewöhnlich früh sang am 13.4. ein Durchzügler südöstlich von Rabendorf (VMA). Weitere am Heimzug waren je 1 Ind. am 10.5. bei Preding, am 13.5. bei Fürstenfeld, am 14.5. im Grazer Augarten, am 15.5. in Neuwindorf, Schachenwald, Leibnitz und Bad Blumau und am 26.5. wieder in Leibnitz (JBR, JPU, FSA, SZI). Am Wegzug wurde je 1 Ind. am 9.8. und 17.8. in Gratkorn und am 11.8. und 2.9. in Graz am Lustbühel beobachtet (SZI).

Weißbartgrasmücke (*Sylvia cantillans*): Am 11.4. rastete 1 ad. ♂ am Lustbühel in Graz. Es handelt sich hierbei um den ersten Nachweis für die Steiermark (SZI).

Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*): Am 2.9. kollidierte 1 juv. in Graz-Waltendorf mit einer Fensterscheibe, blieb aber unverletzt und konnte sofort wieder freigelassen werden (SZI).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): Je 1 ♂ sang am 8.4. in Fürstenfeld (FSA), von 11.4.-20.4. in Wagner (WST), am 13.4. und 2.5. in Graz-Waltendorf (SZI), am 13.4. in Limbach (AKU), am 16.4. in Mitterling (MFO), am 24.4. und 4.5. bei Neuwindorf (JPU, SZI), am 27.4. in Wenisbuch (HKU), am 2.5. in Judendorf bei Kulm am Zirbitz (SBA), am 3.5. und 16.6. auf der Koralpe (JPU, WST), von 5.5. bis 16.5. in Gratkorn (SZI), am 8.5. in Ferbersdorf (RPA, SPA), am 9.5. auf der Vorauer Schwaig/Niederwechsel (AKU), am 26.5. bei Zeltling und am 30.5. in Bad Radkersburg (MFO). Je 1 Ind. wurde am 28.6. bei Mitterdorf, am 15.7. bei St. Georgen ob Murau, am 21.7. in Triebendorf und am 28.7. in Katsch beobachtet (BRO).

Am Wegzug wurden 1-6 Ind. von 9.8. bis 18.8. in Gratkorn, 1-3 Ind. von 2.9. bis 3.9. bei Seibersdorf (SZI) und je 1 Ind. am 15.9. in Leibnitz (WST), am 18.9. am Schwabenteich (SZI) und am 20.9. in einem Obstgarten bei Kulm am Zirbitz beobachtet (BRO).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): Am Heimzug rasteten je 1-2 Ind. am 19.4., 25.4., 2.5. und 15.5. bei Neuwindorf (JPU, SZI), am 19.4. und 23.4. bei Tillmitsch (WST, SZI), am 20.4. in Wagner (WST), am 8.5. bei Seibersdorf (SZI), am 14.5. am Schwabenteich (WST) und am 18.5. im Grazer Augarten (SZI). Wohl Brutvögel waren je 1 singendes ♂ am 1.5. und 2.7. bei Burgau (FSA, SZI), am 18.5. bei Stainz/Straden und von 11.6.-13.6. bei Wörth/Lafnitz (SZI) sowie je 2 Ind. am 20.5., 7.6., 11.6. und 11.7. im Bergbaugesamt bei Bärnbach (HPH, JPU).

Am Wegzug wurden 1-3 Ind. von 9.8.-17.8. in Gratkorn (SZI), 1 Ind. am 9.8. in Tauplitz (RPA, SPA), 1 Ind. am 2.9. bei Hainsdorf und 2 Ind. bei Seibersdorf (SZI), sowie je 2 juv. am 15.9. in Leibnitz, am 18.9. am Schwabenteich und am 20.9. bei Großwilfersdorf beobachtet (WST, SZI).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*): Am 22.5. wurde 1 Ind. bei Kalsdorf (JPU) und je 1 Ind. am 11.6., 22.6. und 31.7. bei Mariahof (JLS) beobachtet. Bei Wörth/Lafnitz sangen 2 ♂ am 13.6. (SZI) und 1 Ind. wurde am 1.7. in Triebendorf festgestellt (BRO). Am Wegzug rastete 1 Ind. am 9.8. in Gratkorn (SZI), je 1 Ind. am 11.8. in Mariahof und am Lustbühel in Graz (JLS, SZI), 2 Ind. rasteten am 1.9. in Katsch und 1 Ind. am 20.9. in einem Obstgarten bei Kulm am Zirbitz (BRO).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*): Im Winter wurde je 1 ♂ am 13.2.2009 in Graz bei der Herz-Jesu-Kirche und am 16.1.2010 beim Schloss Lustbühel beobachtet (SZI).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*): Am Heimzug rastete je 1 Ind. am 18.4. und 25.4. bei Mariahof (JLS) und am 26.4. in Graz-Mariatrost (SZI). Am Wegzug wurde 1 Ind. am 6.9. in Mariahof-Berg beobachtet (JLS).

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*): Je 1-3 ♂ sangen am 12.4., 17.5. und 9.6. am Remschnigg (WST), von 14.4. bis 9.5. am Lustbühel in Graz (SZI), von 15.4.-1.5. an den Waldteichen in Kirchberg an der Raab (ATI, SZI), am 17.4. in Fürstenfeld (FSA), am 20.4. am Murstau Obervogau und in der Grazer Klosterwiesgasse (WST, SZI), am 25.4. in Vasoldsberg (RPA, SPA), am 1.5. in Mariahof (BRO), am 3.5. auf der Platte in Graz (HKU) und am 16.5. am Gratkorner Hausberg (SZI). Am Wegzug wurde je 1 Ind. am 9.8., 27.8. und 27.9. in Wagner beobachtet (WST), von 21.8.-2.9. 1-3 Ind. bei Neutersdorf (WST, SZI), am 27.8. je 1 Ind. bei Weil und Maierhof, am 29.8. 2 Ind. am Schwabenteich und am 4.10. 1 Ind. am Remschnigg (WST).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*): Je ein Überwinterer wurde am 15.1.2010 bei Großsulz und am 28.1.2010 im Botanischen Garten der Universität Graz beobachtet (SZI).

Fitis (*Phylloscopus trochilus*): Je 1 ♂ sang am 26.3. bei Bad Radkersburg (MFO), am 31.3. im Grazer Augarten (SZI), am 5.4. auf der Platte in Graz (HKU), am 9.4. und 5.5. in Wagner (WST), am 9.4. in Gratkorn (SZI),



von 13.4.-28.4. an der Dobler Lacke (BRO), am 25.4. am Rattenberger Teich (SZI), am 1.5. und 19.5. am Furt-
nerteich (AKU, BRO), am 3.5. auf der Koralpe und am 9.6. am Remschnigg (WST).

Am Wegzug wurde 1 Ind. am 13.8. in Strallegg beobachtet (GMD) und am 2.9. 2 Ind. bei Seibersdorf und 1 Ind.
bei Neutersdorf (SZI). Je 1 Ind. rastete am 14.9. bei Neuwindorf (SZI) und am 15.9. in Leibnitz (WST) und
5 Ind. wurden am 20.9. in einem Obstgarten bei Kulm am Zirbitz beobachtet (BRO).

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*): In Graz sang je 1 ♂ am 19.3. am Lustbühel und am 31.3. bei
der Puntigamer Brücke (SZI). Ebenfalls je 1 ♂ sang am 13.4. in Ehenschachen, am 3.5. beim Schöcklkreuz
(AKU), am 11.5. in Kulm am Zirbitz (BRO) und von 12.6.-13.6. in Wörth/Lafnitz (SZI). Am Remschnigg wurden
zwischen 12.4. und 9.6. insgesamt 10 singende ♂ gezählt, und auf der Koralpe sangen 5 ♂ am 3.5. (WST).

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*): Die erste Beobachtung des Jahres gelang sehr früh, nämlich am 16.4. am
Lustbühel in Graz (SZI). Regelmäßige Beobachtungen folgten ab 25.4. (MFO, JLS, WST). Der Letzte des Jah-
res rastete am 20.9. in einem Obstgarten bei Kulm am Zirbitz (BRO).

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*): Am 16.5. sang 1 ♂ am Gratkorn Hausberg (SZI).

Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*): Die ersten des Jahres wurden am 5.4. im Leibnitzer Stadtpark und
am Spiegelteich bei Preding beobachtet (JBR, RPA, SPA). Weit abseits der bekannten Brutgebiete rastete 1 ♂
am 24. und 25.4. in Judendorf bei Kulm am Zirbitz (SBA).

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*): Am Heimzug rasteten von 14.4. bis 18.4. 1-3 ♂ am Lustbühel in Graz
(SZI). Am Wegzug war je 1 ♂ am 24.7. beim Grieshof und am 26.7. beim Grabnerhof zu sehen (JMO). Am 4.9.
rasteten 2 Ind. in Hausmannstätten und 1 Ind. in Ferbersdorf, am 12.9. rastete 1 Ind. am Gaishorner See (RPA,
SPA) und 1 juv. am 20.9. in Mönichwald (SZI).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): Am Heimzug rasteten 5 Ind. am 13.4. bei Gratkorn (CNE). Wohl lokale Brut-
vögel waren 1 ad., 1 juv. am 2.7. bei Unterrohr (SZI) und 2 juv. am 30.7. bei Speltenbach (FSA). Am Wegzug
rasteten 5 Ind. am 2.10. am Mühlteich in Kirchberg/Raab, 1-10 Ind. am 2./3.10. am Saazer Teich und 3 Ind. am
2.10. bei Tillmitsch (SZI). Zwischen 3.10. und 26.10. wurden im Grazer Feld bei Neuwindorf jeweils 1-8 Ind. be-
obachtet (JPU, SZI) und zwischen 4. und 26.10. jeweils 1-3 Ind. am Schwabenteich (WST, SZI). Am 4.10. ras-
teten 3 Ind. bei Seibersdorf und 7 Ind. am Fuchsschweifteich bei Neudau (FSA, SZI). Am 6.10. rasteten 7 Ind.
in Halbenrain (SZI), je 2 Ind. am 12.10. bei Großwilfersdorf (FSA) und am 21.10. am Stausee Gralla (SZI) und
1 Ind. am 26.10. an den Brunenseer Teichen (WST).

Pirol (*Oriolus oriolus*): Die ersten drei wurden am 24.4. auf der Platte in Graz beobachtet (HKU). Abseits der
regelmäßigen Brutgebiete sang je 1 ♂ am 3.5. beim Grabnerhof und bei Admont (JMO).

Neuntöter (*Lanius collurio*): Am Heimzug und zur Brutzeit gelangen von 6.5. bis 3.8.2009 zahlreiche Beobach-
tungen von jeweils 1-6 Ind. in allen Teilen der Steiermark (SBA, MFO, HKU, JLS, VMA, RPA, SPA, KPO, RPO,
JPU, BRO, WST). Brutnachweise wurden von Spielfeld (1 Bp.), von Neutersdorf (1 Bp. mit 3 juv.), vom Lustbühel
in Graz (1 Bp. mit 2 juv.), von Schelchenberg (1 Bp. mit 2 juv.), von den Schötterteichen bei Großwilfersdorf
(1 Bp. mit 5 juv.), von Vorau (3 Bp.), von Riegersberg (3 Bp.), von Strallegg (1 Bp. mit 2 juv.), von Tauplitz
(1 Bp. mit 2 juv.), von St. Peter/Kammersberg (1 Bp. mit 2 juv.) und von Mariahof-Berg (1 Bp. mit 2 juv.) gemel-
det (JLS, VMA, RPA, SPA, BRO, FSA, WST, SZI). Am relativ schwach ausgeprägten Wegzug wurden zwi-
schen 1.8. und 20.9. jeweils 1-2 Ind. in vielen Teilen der Steiermark beobachtet (SBE, RPA, SPA, HPH, JPU,
BRO, WST, SZI).

Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*): Am 18.5. rastete 1 ad. ♂ bei Stainz b. Straden (MTI, ATI, CZE, SZI) und
am 7.6. 1 ad. im ehemaligen Bergbau Bärnbach-Oberdorf (HPH, TPF, CPF, GGR).

Raubwürger (*Lanius excubitor*): Im Leibnitzer Feld wurde je 1 überwinterndes Ind. am 3.1. bei Stangersdorf
(WST) und am 15.2. in Wagendorf (JBR) beobachtet. Im unteren Murtal hielt sich je 1 Ind. am 17.1. bei Per-
bersdorf (WST), am 17.1. bei Unterpurkla (WST), am 26.1. bei Goritz (MFO) und am 1.2. bei Mureck (WST)
auf. In der Weststeiermark wurde am 20.1. 1 Ind. bei Bärnbach gesehen (JPU), in der südwestlichen Steier-
mark am 9.2. 1 Ind. bei Kitzelsdorf/Saggau (GPU) und am Rand des Grazer Feldes 1 Ind. am 30.1. bei Wildon
(JPU). Im oststeirischen Grabenland wurde je 1 Ind. am 4.2. bei Bierbaum/Auersbach (JPU) und von 21.2. bis
15.3. in Frannach beobachtet (JPU).

Am Heimzug rastete je 1 Ind. am 28.2. in Vasoldsberg (RPA, SPA), am 1.3. in Lafnitz (AKU), am 2.3. bei Eich-
feld, am 4.3. bei Oberrakitsch (WST), von 6.3.-23.3. an der Dobler Lacke bei Kulm a. Zirbitz (BRO), am 8.3. bei
Friedberg (AKU), am 15.3. in Pölsen (MFO), am 21.3. in Judendorf bei Kulm a. Zirbitz (EBA, SBA, HPH), am
31.3. in Speltenbach und Neudau (FSA) und von 2.4.-3.4. in Mariahof-Berg (JLS).

Am Wegzug und im Winter 2009/10 wurde je 1 Ind. in den folgenden Regionen und Orten gesehen: Im Ennstal
von 19.11.-28.11.2009 bei Weißenbach/Liezen (KPO, RPO); im Bezirk Murau am 12.10. an der Dobler Lacke



bei Kulm am Zirbitz (BRO); im Lafnitztal am 2.12.2009 in Wörth/Lafnitz (FSA); im Feistritztal am 20.9. in Mairhofen (FSA, SZI), von 7.11.2009 bis 25.2.2010 bei Fürstenfeld (FSA), am 7.11. in Speltenbach (FSA), am 23.11.2009 bei Altenmarkt/Fürstenfeld (FSA), am 4.2.2010 bei Blaindorf (ESA) und am 7.2.2010 bei Illensdorf (ESA); im oststeirischen Hügelland von 20.9.-4.10.2009 bei Vasoldsberg (RPA, SPA), am 3.10. in Radersdorf/Bez. Feldbach (HPH, SZI), am 2.12. in Unterrohr (FSA); im Ilztal am 16.11. bei Gnies (FSA); im Rittscheintal am 11.11. bei Übersbach (FSA) und am 12.11. bei Gillersdorf (FSA); im Grazer Feld vom 6.10.2009 bis 15.2.2010 im Raum Gradenfeld-Kalsdorf-Wundschuh (JPU, SZI) und am 24.1.2010 bei Grambach (JPU); im Leibnitzer Feld am 21.9. in Kaindorf a. d. Sulm (JBR), von 23.10.-11.12.2009 im Raum Bachsdorf-Tillmitsch (JBR, SZI) und am 3.1.2010 am Golfplatz Lebring (SZI); in der West- und Südweststeiermark am 15.11. bei Waldschach (JPU), am 14.12. in Gamlitz (JPU), am 23.12. Buchegg/Saggau (GPU), am 1.1.2010 bei Michlgleinz (JPU) und im Kainachtal am 2.12. bei Zwaring (JPU); im oststeirischen Grabenland am 2.10. bei Neutersdorf (WST, SZI), am 2.10. in Hart bei Straden (JPU), am 8.11. bei Leitersdorf (JPU), am 11.11. bei Grasdorf (JPU), am 3.12. und 24.12.2009 bei Edla/Auersbach (JPU), am 12.12. bei Wolfsberg i. Schwarzaul (JPU) und am 24.12.2009 bei Bierbaum am Auersbach (JPU); im unteren Murtal von 29.9.-6.11. bei Pichla (WST, SZI), von 2.10.-9.12. bei Oberrakitsch (WST, SZI), von 6.10.-3.11. (auch singend!) und am 28.1. bei Seibersdorf (WST, HPH, SZI), am 3.12. am Weinburger Teich (JPU, WST), am 23.12. bei Mureck (WST), am 18.1.2010 beim Auslauf des Drauchenbaches (MFO) und am 21.2.2010 bei Goritz (MFO).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*): Am 8.6. wurde 1 ad. ♂ in einer Schottergrube bei Seiersberg beobachtet (SZI), am 1.7. wurde 1 ad. ♀ bei Rohr/Lafnitz gesehen (G. Kaiser) und am 17.7. rastete 1 ad. ♂ auf den Rossweiden bei Weißenbach/Liezen (JFÜ).

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*): Am Morgen des 15.1.2009 war ein zutrauliches Ind. der östlichen Unterart *macrorhynchus* in der Grazer Ruckerlberggasse zu sehen, konnte aber am Nachmittag nicht mehr gefunden werden (SZI).

Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*): Am 14.10. kreiste 1 Ind. rufend über dem Grazer Dom und flog nach kurzer Zeit Richtung Norden (SZI).

Star (*Sturnus vulgaris*): Am 26.1.2009 gelang die erste Beobachtung des Jahres (1 Ind.) in Speltenbach (FSA). Die größten Trupps am Heimzug umfassten 1.000 Ind. am 12.3. bei Eichfeld (SZI) und je 3.000 Ind. am 13.3. bei Halbenrain und am 18.3. bei Mitterling (MFO). Am 10.6. kamen 5.000 Ind. zu einem Schlafplatz am Fuchschweifteich bei Neudau (FSA). Die letzten Stare des Jahres waren 30 Ind. am 22.12.2009 bei Kitzelsdorf (GPU).

Schneesperling (*Montifringilla nivalis*): Am 29.7. riefen mind. 3 Ind. am Scharfen Eck in den Seetaler Alpen (SZI).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*): Von Jänner bis Februar 2009 bestand bei Lödersdorf bei Feldbach ein Schlafplatz mit ca. 5 Millionen Ind. (ATI, MTI, FSA, OSA u. v. a.). Diese Vögel verteilten sich zur Nahrungssuche in einem großen Gebiet, Trupps von 1.000 bis über 500.000 Ind. wurden bis St. Peter a. Ottersbach, Wagna, Graz und Fürstenfeld beobachtet (FSA, WST, SZI, u. v. a.). Im Herbst/Winter 2009/10 flogen dagegen viel weniger Bergfinken ein. Die größten Trupps umfassten je 200 Ind. am 3.11.2009 bei Untergralla (WST) und am 25.3.2010 bei Miesenbach (GMD).

Girlitz (*Serinus serinus*): Die erste Girlitz-Beobachtung des Jahres gelang am 16.3. in Wagna, die letzte des Jahres am 31.10. ebenfalls in Wagna (WST).

Stieglitz (*Carduelis carduelis*): Ein großer Trupp von 200 Ind. wurde am 11.10. aus Wies gemeldet (HWA).

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*): Überwintert haben vermutlich 8 Ind., die am 25.1. am katholischen Friedhof in Radkersburg (MFO) beobachtet wurden und 6 Ind., die sich am 3.2. in Hohenbrugg/Raab aufhielten (ATI). Am Heimzug rasteten am 9.3. 5 Ind. im Kainachtal bei Zwaring, im unteren Murtal bei Seibersdorf/St. Veit am Vogau am 12.3. 4 Ind. (SZI), am 28.3. 70 Ind. und am 6.4.2009 12 Ind. (CNE, SZI), bei Eichfeld am 28.3. 8 Ind. und 27 Ind. bei Oberrakitsch (CNE, SZI), im Saggautal am 19.3. 20 Ind. bei Kitzelsdorf (GPU), im Raabtal am 20.3. 50 Ind. bei Gniebing und im Grazer Feld am 20.3. 25 Ind. bei Unterpremstätten (ATI, SZI). Der größte Trupp umfasste 150 Ind. und wurde am 30.3. bei Goritz (MFO) beobachtet und relativ spät rastete 1 singendes vj. ♂ am 19.4. am Flughafen Graz-Thalerhof (SZI).

Am Wegzug rasteten 100-150 Ind. von 17.10. bis 18.10. und 30 Ind. am 15.12. bei Hainsdorf (WST, SZI), 15 Ind. am 17.10. bei Tillmitsch (SZI), 6 Ind. am 20.10. an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz (BRO) sowie 50-100 Ind. von 2.11.-3.11. und 30 Ind. am 23.12. bei Eichfeld (WST, SZI). Überwinterer waren 200 Ind. am 20.1.2010 bei Kalsdorf, 35 Ind. am 13.2.2010 bei Weitersfeld, 4 Ind. am 14.2.2010 bei Neuwindorf (SZI) und 70 Ind. am 17.2.2010 bei Neuhummersdorf (WST).



Birkenzeisig (*Carduelis flammea*): Abseits der Brutgebiete wurden 2 Ind. am 23.1. im Grazer Feld (JPU) und je 1 Ind. am 18.10. und 10.11. bei Tillmitsch beobachtet (WST).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*): Am 7.3. suchten ca. 250 Ind. eine Futterstelle in Schlossberg auf (GPU).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*): Abseits der Brutgebiete hielten sich von 1.1.-11.2.2009 2-15 Ind. in Graz im Stiftingtal auf (RJA, UFL) und von 2.1.-9.1.2009 sowie von 28.10.-2.11.2009 1-5 Ind. bei Wagner (WST). In Graz-St. Peter wurden am 6.1.2009 8 Ind. und am 16.1.2010 1 Ind. beobachtet (CNE, RPA, SPA, SZI). Am 12.1.2009 hielten sich 8 Ind. in Fürstenfeld auf (FSA), am 19.1.2009 1 Ind. in Labitschberg (WST) und am 9.5. 4 Ind. sowie am 21.11. 6 Ind. in Hardegg (GPU). Am 23.9. wurden 5 Ind. und am 20.10. 8 Ind. bei Glanz festgestellt (WST) und am 26.2.2010 2 Ind. beim Schloss Klingenstein (RPA, SPA).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*): Zwischen 26.5. und 12.7. sangen 1-2 ad. ♂ westlich von Aigen bei Admont, zwischen 31.5. und 7.6. sang 1 ad. ♂ östlich von Admont und am 8.6. sang 1 vj. ♂ östlich von Grieshof (JMO). Am Gaishorner See wurden 6 singende ♂, 1 ♀ am 7.7. und 1 ♂, 1 juv. am 5.8. beobachtet (RPA, SPA).

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*): Abseits der Brutgebiete wurden 6 Ind. am 4.1.2009 im Kurpark Radkersburg beobachtet (MFO), bis zu 2 ♂, 2 ♀ von 6.1. bis 3.2.2009 in Graz-Waltendorf und 1 ♂, 1 ♀ am 15.3. am Stausee Lebring (SZI). In Graz hielten sich 2 Ind. am 2.4. und 1 Ind. am 12.4. im Stiftingtal auf (RJA, UFL), 4 Ind. am 11.11. in Glanz, 1 Ind. am 29.12. im Sulztal (WST) und 1 ♂, 1 ♀ am 2.1. am Stausee Mellach (SZI).

Eine Reihe von Beobachtungen betraf nordische „Trompetergimpel“: 1-6 Ind. hielten sich von 6.1. bis 2.4.2009 in Graz-Waltendorf auf (SZI), 1-7 Ind. von 10.1.-21.2.2009 in Wagner (WST), ein Paar am 15.1.2009 in Fürstenfeld (FSA) und 1 ♂ besuchte am 18.1. den Stausee Mellach (SZI). Je 1 Ind. wurde zwischen 28.1. und 7.2.2009 am Murstau Obervogau festgestellt und am 30.1. am Stausee Lebring (WST). Im Hartberger Gmoos wurden am 1.2. 5 Ind. beobachtet (AKU) und von 9.2.-2.3.2009 1-2 Ind. bei Vasoldsberg (RPA, SPA). Im Herbst/Winter 2009/10 wurde 1 Ind. am 13.11. bei Ferbersdorf beobachtet (RPA), 1 ♂ am 17.12. in Gratkorn (SZI) und 1 Ind. am 5.1. in Leibnitz (WST). In Landscha hielten sich am 5.1. 3 ♀ und am 11.1. 2 ♂ auf (WST), beim Schloss Klingenstein von 20.1.-25.2.2010 4 ♂, 2 ♀ (RPA, SPA) und am 24.2.2010 am Hauenstein in Graz 2 Ind. (SZI).

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*): Im Raabtal rastete 1 Ind. von 6.2.-7.2. bei Berndorf (ATI).

Zippammer (*Emberiza cia*): Am 1.6. sang 1 ♂ in der Weizklamm (JPU).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*): Überwinterer waren 14 Ind. am 16.1. bei Gillersdorf (FSA), 1 Ind. am 18.1. bei Großsulz (SZI) und 12 Ind. am 17.2. bei Seibersdorf (WST).

Am Heimzug gelangen zwischen 2.3. und 6.4.2009 zahlreiche Beobachtungen in allen Teilen der Steiermark. Die größten Trupps umfassten bis zu 100 Ind. von 8.3.-18.3.2009 an der Dobler Lacke/Kulm am Zirbitz. Ein spätes ♂ wurde noch am 26.5. am Reither Teich beobachtet (SBA, MFO, JLZ, JMO, RPA, SPA, KPO, RPO, BRO, FSA, WST, ATI, SZI). Reviere bestanden im Ennstal an der Gamperlacke (2 ♂ singend) und bei Weißenbach/Liezen (4 ♂ singend) sowie am Gaishorner See (1 ♂ singend) und bei Wörth/Lafnitz (1 ♂ singend); es wurde nur ein Brutnachweis (1 Futter tragendes Paar am 11.6.) von einem Schotterteich bei Neudau gemeldet (RPA, SPA, KPO, RPO, SZI). Am Wegzug gelangen zwischen 4.10. und 23.12.2009 zahlreiche Beobachtungen von jeweils 1-15 Ind. in vielen Teilen der Steiermark (JMO, RPA, SPA, BRO, WST, SZI). Vermutlich Überwinterer waren 4 Ind., die sich von 4.1. bis 7.1.2010 bei Vasoldsberg aufhielten (RPA, SPA), 1-2 Ind., die zwischen 6.1.-14.2.2010 an den Schotterteichen im Grazer Feld beobachtet wurden (HPH, CPF, TPF, SZI), 1 ♂ am 16.1.2010 bei Kellendorf (WST), 17 Ind. am 19.1.2010 bei Fürstenfeld (FSA), 20 Ind. am 17.2.2010 bei Dedenitz (WST) und 3 Ind. am 25.2.2010 bei Hainsdorf (SZI).

Graumammer (*Emberiza calandra*): Am 25.4. wurde 1 Ind. am Flughafen Graz-Thalerhof gesehen, am 24.5. sang dort 1 ♂ (HPH, JPU, SZI). 1-2 Ind. hielten sich zwischen 16.5. und 11.6. im ehemaligen Braunkohlebergbau bei Bärnbach auf (HPH, JPU, FSA) und 1 ♂ sang am 26.5. bei Sinnersdorf (AKU).

Anschriften der Verfasser:

Dr. Hartwig W. Pfeifhofer
Am Steinergrund 37
8047 Hart bei Graz
hartwig.pfeifhofer@uni-graz.at

Sebastian Zinko
Am Hofacker 2
A-8010 Graz
sebastian.zinko@gmx.at

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Nachrichten aus Ostösterreich](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [0022_1-2](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeifhofer Hartwig Wilfried, Zinko Sebastian

Artikel/Article: [Beobachtungen zu Frühjahrszug, Brutzeit und Herbstzug 2009 sowie Winter 2009/2010 in der Steiermark 19-45](#)