



**VNP–Schriften 9**  
**Schriftleitung: Prof. Dr. Thomas Kaiser**  
**Niederhaverbeck 2015**



ISSN 1867-1179

**Stefan Wormanns**

unter Mitarbeit der  
Mitglieder der Naturkundlichen Arbeitsgruppe

**Vogelkundlicher Jahresbericht 2014**

**Naturschutzgebiet Lüneburger Heide**



## Impressum

### VNP-Schriften, Band 9

Niederhaverbeck 2015

Herausgeber: Verein Naturschutzpark e. V.  
Niederhaverbeck 7  
29646 Bispingen

Schriftleitung: Prof. Dr. Thomas Kaiser

Adresse des Autors: Stefan Wormanns, Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide, Niederhaverbeck 7, 29646 Bispingen

Titelfoto: Schwarzkehlchen (Foto: Sven Kleinert)

ISSN 1867-1179

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Die in den Beiträgen dieser Schriftenreihe geäußerten Absichten und Meinungen müssen nicht mit denen des Herausgebers übereinstimmen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Vereins Naturschutzpark e. V.

Bezug über Verein Naturschutzpark e. V., Niederhaverbeck 7, 29646 Bispingen, Tel. 05198/987030, Fax 05198/987039.

Zitiervorschlag:
------------------

WORMANN, S. (2015): Vogelkundlicher Jahresbericht 2014 – Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften 9: 88 S.; Niederhaverbeck.
---

## Inhalt

	Seite
<b>1. Einleitung</b>	9
<b>2. Spezieller Teil</b>	11
1. Höckerschwan ( <i>Cygnus olor</i> )	11
2. Kanadagans ( <i>Branta canadensis</i> )	11
3. Weißwangengans ( <i>Branta leucopsis</i> )	12
4. Graugans ( <i>Anser anser</i> )	12
5. Nilgans ( <i>Alopochen aegyptiacus</i> )	13
6. Mandarinente ( <i>Aix galericulata</i> ) (oder Brautente) ( <i>Aix sponsa</i> )	13
7. Schnatterente ( <i>Anas strepera</i> )	13
8. Krickente ( <i>Anas crecca</i> )	13
9. Knäkente ( <i>Anas querquedula</i> )	14
10. Löffelente ( <i>Anas clypeata</i> )	14
11. Tafelente ( <i>Aythya ferina</i> )	14
12. Reiherente ( <i>Aythya fuligula</i> )	14
13. Schellente ( <i>Bucephala clangula</i> )	15
14. Wachtel ( <i>Coturnix coturnix</i> )	15
15. Jagdfasan ( <i>Phasianus colchicus</i> )	16
16. Rebhuhn ( <i>Perdix perdix</i> )	16
17. Birkhuhn ( <i>Tetrao tetrix</i> )	17
18. Zwergtaucher ( <i>Tachybaptus ruficollis</i> )	21
19. Kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> )	22
20. Silberreiher ( <i>Casmerodius albus</i> )	23
21. Graureiher ( <i>Ardea cinerea</i> )	24
22. Schwarzstorch ( <i>Ciconia nigra</i> )	24
23. Weißstorch ( <i>Ciconia ciconia</i> )	25
24. Fischadler ( <i>Pandion haliaetus</i> )	25
25. Wespenbussard ( <i>Pernis apivorus</i> )	25
26. Wiesenweihe ( <i>Circus pygargus</i> )	25
27. Kornweihe ( <i>Circus cyaneus</i> )	25
28. Rohrweihe ( <i>Circus aeruginosus</i> )	26
29. Habicht ( <i>Accipiter gentilis</i> )	26
30. Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> )	27
31. Schwarzmilan ( <i>Milvus migrans</i> )	27
32. Rotmilan ( <i>Milvus milvus</i> )	27
33. Seeadler ( <i>Haliaeetus albicilla</i> )	28
34. Merlin ( <i>Falco columbarius</i> )	28
35. Baumfalke ( <i>Falco subbuteo</i> )	28
36. Wanderfalke ( <i>Falco peregrinus</i> )	29
37. Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> )	29

---

	Seite
38. Kranich ( <i>Grus grus</i> )	30
39. Wasserralle ( <i>Rallus aquaticus</i> )	30
40. Teichhuhn ( <i>Gallinula chloropus</i> )	30
41. Blässhuhn ( <i>Fulica atra</i> )	30
42. Kiebitz ( <i>Vanellus vanellus</i> )	31
43. Flussregenpfeifer ( <i>Charadrius dubius</i> )	32
44. Großer Brachvogel ( <i>Numenius arquata</i> )	32
45. Waldschnepfe ( <i>Scolopax rusticola</i> )	32
46. Zwergschnepfe ( <i>Lymnocyptes minimus</i> )	33
47. Bekassine ( <i>Gallinago gallinago</i> )	33
48. Waldwasserläufer ( <i>Tringa ochropus</i> )	33
49. Silbermöwe ( <i>Larus argentatus</i> )	34
50. Hohltaube ( <i>Columba oenas</i> )	34
51. Turteltaube ( <i>Streptopelia turtur</i> )	34
52. Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )	34
53. Schleiereule ( <i>Tyto alba</i> )	34
54. Raufußkauz ( <i>Aegolius funereus</i> )	35
55. Sperlingskauz ( <i>Glaucidium passerinum</i> )	35
56. Waldohreule ( <i>Asio otus</i> )	36
57. Uhu ( <i>Bubo bubo</i> )	37
58. Waldkauz ( <i>Strix aluco</i> )	37
59. Ziegenmelker ( <i>Caprimulgus europaeus</i> )	37
60. Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )	38
61. Eisvogel ( <i>Alcedo atthis</i> )	38
62. Wiedehopf ( <i>Upupa epops</i> )	38
63. Wendehals ( <i>Jynx torquilla</i> )	39
64. Grünspecht ( <i>Picus viridis</i> )	40
65. Schwarzspecht ( <i>Dryocopus martius</i> )	41
66. Mittelspecht ( <i>Picoides medius</i> )	41
67. Kleinspecht ( <i>Picoides minor</i> )	41
68. Pirol ( <i>Oriolus oriolus</i> )	42
69. Neuntöter ( <i>Lanius collurio</i> )	43
70. Raubwürger ( <i>Lanius excubitor</i> )	43
71. Elster ( <i>Pica pica</i> )	45
72. Dohle ( <i>Corvus monedula</i> )	45
73. Rabenkrähe ( <i>Corvus corone</i> )	46
74. Nebelkrähe ( <i>Corvus cornix</i> )	46
75. Kolkrabe ( <i>Corvus corax</i> )	46
76. Heidelerche ( <i>Lullula arborea</i> )	47
77. Feldlerche ( <i>Alauda arvensis</i> )	47
78. Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )	48
79. Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbica</i> )	49
80. Waldlaubsänger ( <i>Pylloscopus sibilatrix</i> )	51
81. Feldschwirl ( <i>Locustella naevia</i> )	51

---

	Seite
82. Schilfrohrsänger ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	51
83. Teichrohrsänger ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	51
84. Gelbspötter ( <i>Hippolais icterina</i> )	51
85. Klappergrasmücke ( <i>Sylvia curruca</i> )	51
86. Dorngrasmücke ( <i>Sylvia communis</i> )	52
87. Seidenschwanz ( <i>Bombycilla garrullus</i> )	52
88. Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )	52
89. Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )	52
90. Ringdrossel ( <i>Turdus torquatus</i> )	52
91. Grauschnäpper ( <i>Muscicapa striata</i> )	52
92. Trauerschnäpper ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	53
93. Braunkehlchen ( <i>Saxicola rubetra</i> )	53
94. Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola torquata</i> )	54
95. Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )	54
96. Gartenrotschwanz ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )	54
97. Steinschmätzer ( <i>Oenanthe oenanthe</i> )	55
98. Haussperling ( <i>Passer domesticus</i> )	56
99. Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )	56
100. Brachpieper ( <i>Anthus campestris</i> )	57
101. Baumpieper ( <i>Anthus trivialis</i> )	57
102. Wiesenpieper ( <i>Anthus pratensis</i> )	57
103. Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	57
104. Wiesenschafstelze ( <i>Motacilla flava</i> )	58
105. Stieglitz ( <i>Carduelis carduelis</i> )	58
106. Bluthänfling ( <i>Carduelis cannabina</i> )	58
107. Birkenzeisig ( <i>Carduelis flammea</i> )	58
108. Rohrammer ( <i>Emberiza schoeniclus</i> )	58
<b>3. Kartenteil</b>	<b>60</b>

## Verzeichnis der Abbildungen

	Seite
Abb. 1: Anzahl erfasster Kanadagans-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	11
Abb. 2: Anzahl erfasster Schellenten-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	15
Abb. 3: Anzahl erfasster Rebhuhn-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	17
Abb. 4: Anzahl der Birkhühner im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	18
Abb. 5: Anzahl der Birkhähne im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	18
Abb. 6: Anzahl der Birkhennen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	19
Abb. 7: Anzahl der Birkhennen im Radenbachtal.	19
Abb. 8: Anzahl der Birkhühner am Wilseder Berg.	20
Abb. 9: Anzahl der Birkhähne am Wilseder Berg.	20
Abb. 10: Anzahl der Birkhühner im Wümmegebiet und in der Rabingsheide.	21
Abb. 11: Anzahl der Birkhühner in der Osterheide.	21
Abb. 12: Anzahl erfasster Zwergtaucher-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	22
Abb. 13: Anzahl der Kormorane an den Holmer Teichen.	23
Abb. 14: Anzahl der Silberreiher an den Holmer Teichen.	23
Abb. 15: Anzahl der Graureiher an den Holmer Teichen.	24
Abb. 16: Anzahl erfasster Habicht-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	27
Abb. 17: Anzahl erfasster Turmfalken-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	29
Abb. 18: Anzahl erfasster Kranich-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	30
Abb. 19: Anzahl erfasster Kiebitz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	31
Abb. 20: Anzahl erfasster Brachvogel-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	32
Abb. 21: Anzahl erfasster Bekassinen-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	33
Abb. 22: Anzahl erfasster Turteltauben-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	34
Abb. 23: Anzahl erfasster Raufußkauz-Reviere-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	35
Abb. 24: Anzahl erfasster Sperlingskauz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	36

---

	Seite
Abb. 25: Anzahl erfasster Ziegenmelker-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	38
Abb. 26: Anzahl erfasster Wendehals-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	39
Abb. 27: Anzahl erfasster Grünspecht-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	40
Abb. 28: Anzahl erfasster Schwarzspecht-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	41
Abb. 29: Anzahl erfasster Kleinspecht-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	42
Abb. 30: Anzahl erfasster Pirol-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	43
Abb. 31: Anzahl erfasster Neuntöter-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	43
Abb. 32: Anzahl erfasster Raubwürger-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	44
Abb. 33: Anzahl erfasster Kolkraben-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	46
Abb. 34: Anzahl erfasster Heidelerchen-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	47
Abb. 35: Anzahl erfasster Feldlerchen-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	47
Abb. 36: Anzahl besetzter Rauchschnäpper-Nester im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	49
Abb. 37: Anzahl besetzter Mehlschnäpper-Nester im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	50
Abb. 38: Anzahl erfasster Waldlaubsänger-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	51
Abb. 39: Anzahl erfasster Star-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	52
Abb. 40: Anzahl erfasster Trauerschnäpper-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	53
Abb. 41: Anzahl erfasster Braunkehlchen-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	53
Abb. 42: Anzahl erfasster Schwarzkehlchen-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	54
Abb. 43: Anzahl erfasster Gartenrotschwanz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	55
Abb. 44: Anzahl erfasster Steinschmätzer-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	55
Abb. 45: Anzahl erfasster Feldsperling-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	56

Seite

Abb. 46:	Anzahl erfasster Baumpieper-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	57
Abb. 47:	Anzahl erfasster Stieglitz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.	58

### Verzeichnis der Karten

Seite

Karte 1:	Wachtel.	60
Karte 2:	Rebhuhn.	61
Karte 3:	Kranich.	62
Karte 4:	Waldschnepfe.	63
Karte 5:	Hohltaube.	64
Karte 6:	Kuckuck.	65
Karte 7:	Raufußkauz.	66
Karte 8:	Ziegenmelker.	67
Karte 9:	Wendehals.	68
Karte 10:	Grünspecht.	69
Karte 11:	Schwarzspecht.	70
Karte 12:	Kleinspecht.	71
Karte 13:	Pirol.	72
Karte 14:	Neuntöter.	73
Karte 15:	Heidelerche.	74
Karte 16:	Feldlerche.	75
Karte 17:	Waldlaubsänger.	76
Karte 18:	Klappergrasmücke.	77
Karte 19:	Dorngrasmücke.	78
Karte 20:	Star.	79
Karte 21:	Grauschnäpper.	80
Karte 22:	Trauerschnäpper.	81
Karte 23:	Schwarzkehlchen.	82
Karte 24:	Gartenrotschwanz.	83
Karte 25:	Feldsperling.	84
Karte 26:	Baumpieper.	85
Karte 27:	Wiesenschafstelze.	86
Karte 28:	Stieglitz.	87
Karte 29:	Bluthänfling.	88

## 1. Einleitung

Die Vogelkartierungen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ werden fast ausnahmslos ehrenamtlich durchgeführt. Innerhalb des Naturschutzgebietes gestaltet sich die Kartierungsintensität deshalb sehr unterschiedlich und auch die Kenntnisse und Erfahrungen der einzelnen Kartiererinnen und Kartierer unterscheiden sich. Einzelne Flächen werden systematisch untersucht, andere Bereiche werden gar nicht begangen und zahlreiche Feststellungen sind auf Zufallsbeobachtungen zurückzuführen. Deshalb kann nur bei wenigen Arten wie dem Kranich oder dem Raubwürger von einer annähernd vollständigen Bestandserfassung innerhalb des Naturschutzgebietes „Lüneburger Heide“ ausgegangen werden.

Dank des Engagements der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer entwickelte sich im Laufe der Jahre dennoch ein guter Gesamtüberblick über die Avifauna des Schutzgebietes. Dieser Überblick bezieht sich vor allen Dingen auf die Vogelarten, die die Heideflächen und die Wald-Heide-Übergangsbereiche zu ihren Lebensräumen zählen.

Im vorliegenden Bericht können nur bei einigen Arten Bestandszahlen oder Bestandsentwicklungen angegeben werden. Die Revierzahlen im Text, in den Tabellen und Diagrammen sind in aller Regel als durch Beobachtungen belegte Mindestzahlen zu verstehen, da die ehrenamtlichen Untersuchungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können.

Für die Datenerhebungen im Jahre 2014 und deren Weiterleitung an den Verein Naturschutzpark sei folgenden Beobachterinnen und Beobachtern herzlich gedankt (Auf-listung in alphabetischer Reihenfolge):

Ahlers, Heinz	Bühring, Eckedard	Frohnberg	Herold, Hermann
Albers, Hans-Dieter	Büttinghaus, Carsten	Fuhrhop, Dorothee	Hessing, Frank
Albers, Steffen	Büttinghaus, Marie	Gerdau	Heuer, Horst
Allmer, Frank	Buhr, Johannes	Gräber, Reinhild	Hinsch, Harald
Anders, Manfred	Buttmann, Christian	Grapentin, Regina	Höchtel, Franz
Baranowski, Karl	<u>Dierschke, Volker</u>	Grapentin, Sven	Hoffmann
Bartels, Andreas	Drücke	Grapentin, Wilfried	Hoffmeier, Samuel
Bauermeister, Karin	Ebbighausen	Greiner, Elisabeth	Holsten, Bettina
Becker, Michael	<u>Eggert, Bernd</u>	Gröhn, Stephan	<u>Hüfner, Martin</u>
<u>Beelte, Kathrin</u>	Eggert, Hans-	Groothoff, Moritz	Jahn, Axel
Binder, Gaby	Heinrich	Hallmann, Julia	Jungemann, Wilhelm
Blauth, Helmut	Eick	Hartig, H	Kaufmann, Michael
Böhm	<u>Fahne, Ingo</u>	Hauck, Ottmar	Kinder
Böttger	Faß, Steffen	Hedenkamp	Kirst, Frau
<u>Bokampe, Michael</u>	<u>Felten, Christoph</u>	Heer, Sigfried	Kleinert, Sven
Brandt, Martin	Fleer	Heine, Friedrich	Klippel
Brenken, Heike	Fleischer, Thilo	Heine, Markus	Knifka, Wolfgang
Broocks, Carsten	Flügge, Dirk (†)	Hellberg, Thorsten	Koch, Mathias
Brunkhorst	Frerichs, Andrea	Herold, Andrea	Kock, Stefan

Köhler, Jens	Melching	Richter, Oliver	Stolz, Christian
Körbel, Susanne	Mertens, Dirk	Riechert, Christoph	Stolz, Janek
Köster, Angela	Meyer, Joachim	Rieckmann, Ingo	Storm, Uwe
<u>Kohls, Karsten</u>	Meyer, Rudolph	Rinas, Ursula	Strauß, Egbert
Komorski von, Charlotte	Von Mickwitz, Gottfried	Röhrs, Uwe	<u>Stühmer, Frank</u>
Koopmann, Andreas	Mieth, Christiane	Runge, Christoph	Stutzmann, Bernhard
Korthoff	Mittmann, Jörg	Runte, Bernd	<u>Südbeck, Peter</u>
Kowalski, Heinz	Mühlberg, Dorothee	<u>Ryslavy, Thorsten</u>	Thieme, Wulf
Kringel, Sabine	Müller, Erika	Salomon, Oswald	Tillmann, Jörg
Krohn, Jeremy	NABU AG Vögel	Sach, Wibke	Torkler, Arne
Kruse, Claudia	Hanstedt	Sander, Marc	Trepel, Michael
Kruse, Dieter	<u>Natterer, Stefan</u>	Sander, Thomas	Tünsmeyer, Georg
Kühn, Frau	Neubauer, Denis	<u>Saß, Danilo</u>	Vogel, Sebastian
Kuhn	Niebuhr, Angelika	Sauerwein, Carsten	Wawerek, Michael
Kulow	<u>Oberwestberg, Guido</u>	Sauerwein, Fynn	<u>Wilkening, Fritz</u>
Kunz, Britta	Otto	<u>Schirarend, Carsten</u>	Wille, Ingrid
Kuschinski	Pantelmann, Matthias	Schmidt, Frank- Ulrich	Willmann
Lauszus, Gerd	Peper, Werner	Schneider, Eva	Wormanns, Stefan
LBV Ortsgruppe München	Putensen, Hans- Heinrich	Schönefeld, Silvio	Wosnitza, Ina
Leinecker, Benjamin	Quante, Uwe	Schreiner, Johann	Wundram, Angela
Lippschuss, Clemens	Rathgeber, Stephan	Schröder, Christoph	Wundram, Jörg
Looß, Michael	Quinn, Ryan	Schulz	Zachow, Anne
Ludowig	Ratsch	Siebert, Armin,	Zahn, Franz
Lüchow	Reckebeil	Siebert, Heita	Zimmermann,
Maaß, Bruno	<u>Reimann, Mathias</u>	Sierk, Knut	Mathias
Mahlzahn	Rettig, Klaus	Sorge, Jens	Zisenis, Ralf
Marquart, Hermann	Richter, Horst	Späth, Thorsten	<u>Zirpel, Stephan</u>
		Stein, Hans-Jürgen	

Die Beobachterinnen und Beobachter, deren Beobachtungsdaten ausschließlich aus [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) übernommen wurden, sind unterstrichen dargestellt.

## 2. Spezieller Teil

### 1. Höckerschwan (*Cygnus olor*)

16.01. 5 Ind. auf einer Ackerfläche südlich des Bockheberer Moores nach Nahrung suchend (Marquart).

27.02. 3 Ind. auf den Holmer Teichen (Sander, T.).

### 2. Kanadagans (*Branta canadensis*)

4 Brutpaare + 4 Reviere:

2 Brutpaare an den Ölteichen und 1 Brutpaar in der H-Wiese (Holmer Teiche) (Kleinert, Kringel, Sander, T., Wormanns).

1 Brutpaar am Silvestersee in der Osterheide mit 1 Juv. (Putensen, Wormanns).

1 Revierpaar im Bereich Schwarze Beeke Wiesen im Rindergatter/Teich Hartig's Wiesen/Radenbachteiche (Eick, Heuer, Putensen, Rieckmann, Sander, M., Stein, Wormanns).

1 Revierpaar an den Döhler Klärteichen/Döhler Wiesen (Kruse, D., Wormanns).

1 Revierpaar im Tütsberger Grünland (Krohn, Sander, M., Wormanns).

1 Revierpaar im Nordosten des Pietzmoores (Wormanns).




Abb. 1: Anzahl erfasster Kanadagans-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Brutzeitfeststellungen:

01.05. 2 Ind. an Seeveteichen südlich Wehlen (Heuer).

26.04. 2 Ind. auf Weide beim Walderlebniszentrum Ehrhorn (Wormanns).

10.04. 2 Ind. an den Hörpeler Heide Teichen (Wormanns).

02.04. u. 19.04. 2 Ind. Nahrungssuche auf den Haverbeckewiesen nördlich des Surhorn (Jungemann, Wormanns).

26.03. u. 19.04. 2 Ind. im Twieselmoor (Wormanns).

- 12.04. 2 Ind. rufend am Teich Rabingsheide-West (Wormanns).  
 15.05. 2 Ind. rufend im Bockheberer Moor (Eggert, H.-H.).  
 06.04. 2 Ind. rufend am Teich in der Osterheide nördlich des Möhrer Moores (Wormanns).  
 29.03. 2 Ind. auf den Tonkuhlen im Möhrer Moor (Röhrs).  
 25.03. 2 Ind. Pietzmoor-Süd (Kringel).

Weitere Beobachtungen:

- 06.03. 3 Ind. Pietzmoor-Süd (Kleinert).  
 An der Blänke südlich des Feriendorfes Schäferhof zwischen dem 06.03. und dem 26.03. mehrfach zwischen 10 und 18 Ind. (Broocks, Kringel, Kühn). Am 26.04. hier noch 4 Ind. (Bauermeister, Fröhnberg, Rathgeber).  
 12.03. 7 Ind. im Holmer Teichgebiet (Mertens).  
 Am 16.02. 4 Ind. und vom 13.04. bis zum 31.05. immer wieder zwischen 3 und 8 Ind. an bzw. auf der Blänke im Tütsberger Grünland zu sehen (Blauth, Kringel, Sauerwein, C. u. F.).  
 18.04. 16 Ind. Nordrand Pietzmoor (Felten).  
 18.04. 18 Ind. im Pietzmoor bzw. Randbereich, Ort nicht näher beschrieben (Rettig)  
 26.04. 8 Ind. auf Wiesen südlich Hof Möhr (Becker).  
 28.03. 3 Ind. auf Pietzteich (Kringel).  
 20.06. 20 Ind. im Pietzmoor bzw. Randbereich, Ort nicht näher beschrieben (Putensen)  
 10.08. 10 Ind. seit einigen Tagen immer mal wieder bis zu 10 Ind. auf dem Pietzteich (Becker).

**3. Weißwangengans (*Branta leucopsis*)**

- 05.04. 2 Ind. über die Osterheide in Richtung Norden fliegend (Bauermeister).

**4. Graugans (*Anser anser*)**

- 8 Brutpaare + 3 Reviere  
 7 Brutpaare im Holmer Teichgebiet, ein Paar mit 2 Juv. (Sander, T., Wormanns).  
 1 Brutpaar am Feuerlöschteich Wilsede (Wormanns).  
 1 Revierpaar im Grünland an der Haverbecke nördlich des Surhorn (Jungemann, Wormanns).  
 2 Revierpaare im Tütsberger Grünland (Blauth, Broocks, Kringel, Sauerwein, F., Wormanns).

Brutzeitfeststellungen:

- 13.04. 2 Ind. auf den Wiesen am Weseler Bach nördlich von Wesel (Wormanns).  
 21.03. 1 Ind. am Sprengbach südlich der Hörpeler Heide rufend (Wormanns).

Weitere Beobachtungen:

- 12.03. mehr als 20 Ind. im Holmer Teichgebiet (Mertens).  
 01.04. täglich rund 30 Ind. im Holmer Teichgebiet (Sander, T.).

08.04. 5 Ind. auf den Wiesen am Sprengbach südlich der Hörpeler Heide (Wormanns).

22.02. 4 Ind. im Grünland Haverbecke nördlich Surhorn (Jungemann).

### **5. Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)**

1 Brutpaar + 4 Reviere

1 Brutpaar mit 7 Jungvögeln in den Döhler Wiesen zwischen den Döhler Klärteichen und der Hörpeler Heide (Buttmann, Kruse, D., Lippschuss, Rieckmann, Sander, M., Wormanns).

1 Revierpaar Holmer Teiche (Sander, T.).

1 Revierpaar im Bereich Schwarze Beeke Wiesen im Rindergatter/Teich Hartig's Wiesen/Radenbachteiche (Jahn, Späth, Wormanns).

1 Revierpaar im Tütsberger Grünland (Blauth, Kringel, Krohn, Meyer, J., Wormanns).

1 Revierpaar Teich Benninghöfer Heide-Ost (Kringel, Schönefeld, Wormanns).

Brutzeitfeststellungen:

30.04. 1 Paar auf den Radenbachteichen (Wormanns).

20.05. 1 Paar im Giebel des Schafstalles am Hillmershof sitzend (Wormanns).

26.02. 1 Paar auf den Teichen im Möhrer Moor (ehemalige Tonkuhlen) (Wormanns).

28.03. 1 Paar auf den Pietzteich (Kringel).

### **6. Mandarinente (*Aix galeri culata*) (oder Brautente) (*Aix sponsa*)**

Knapp außerhalb des NSG:

13.02. 1 W auf der Seeve oberhalb der Holmer Mühle, fahl gefärbt und sofort bachaufwärts flüchtend (Thieme).

17.02. 2 W wieder auf der Seeve oberhalb der Holmer Mühle, wieder 1 Ind. fahl gefärbt, ein anderes normal gefärbt, aber wieder sehr scheu und sofort auffliegend (Thieme).

### **7. Schnatterente (*Anas strepera*)**

Heimzug:

13.04. ein Paar auf dem Silvestersee (Stolz, C.).

06.03. ein Paar auf dem Wulfsberger Heideweiher (Thieme).

Wegzug:

28.07. 1 Ind. im Pietzmoor (Fahne).

### **8. Krickente (*Anas crecca*)**

9 Reviere

Alle ermittelten Reviere befinden sich im Pietzmoor (Allmer, Mertens, Röhrs, Wormanns).

Heimzug:

11.04. 2 Ind. im Holmer Teichgebiet (Wormanns).

13.03. 3 M, 1 W auf dem Kommateich (Thieme).

- 13.04. 1, M, 1 W auf dem Silvestersee (Stolz, C.).  
 06.04. 1 M auf dem Silvestersee (Wormanns).  
 20.03. 2 M, 2 W auf dem Silvestersee (Wormanns).  
 29.03. ein Paar auf den Tonkuhlen im Möhrer Moor (Röhrs).  
 28.03. 3 Paare und 1 M auf dem Pietzteich (Kringel).  
 25.03. 11 Paare und 2 M im Pietzmoor vom Bohlensteg aus gesehen (Kringel).

Brutzeitfeststellungen/Heimzug:

- 26.04. noch 2 Paare im Pietzmoor (Bauermeister, Frohnberg, Rathgeber).  
 15.04. 34 Ind. über mehrere Tage im Pietzmoor gesehen (Rettig).

**9. Knäkente (*Anas querquedula*)**

- 27.03. 1 Ind. im Pietzmoor (Beelte).

**10. Löffelente (*Anas clypeata*)**

Brutzeitfeststellungen/Heimzug:

- 13.04. 1 M auf dem Silvestersee (Stolz, C.).  
 16.04. 1 Paar im Pietzmoor (Rettig).

**11. Tafelente (*Aythya ferina*)**

Heimzug:

- 12.03. 1 Ind. im Holmer Teichgebiet (Mertens).

**12. Reiherente (*Aythya fuligula*)**

1 Brutpaar + 6 Reviere

1 Brutpaar + 5 Revierpaare im Holmer Teichgebiet (Kringel, Thieme, Wormanns).

Im Holmer Teichgebiet konnten zwischen dem 12.03. und dem 31.07. Reiherenten beobachtet werden. Am 22.05. hielten sich hier mind. 25 Ind (15 M, 10 W) auf. Allein auf dem nördlichsten Ölteich waren es 10 M und 6 W (Kringel). Am 19.06., nach der Zugzeit, waren es auf dem Kommateich noch 6 M und 4 W (Thieme). Ein Paar führte am 03.07. 3 Jungvögel (Wormanns).

1 Revierpaar im östlichen Pietzmoor (Röhrs).

Brutzeitfeststellung:

- 29.07. 1 M auf dem obersten Pastorenteich (Putensen).

Heimzug:

- 12.03. 9 Ind. im Holmer Teichgebiet (Mertens).  
 05.05. 1 M auf den Radenbachteichen (Sander, M.).  
 24.04. 3 Ind. auf den Pastorenteichen bei Wesel (Thieme).  
 10.04. 3 M im Pietzmoor (Wormanns).

Wegzug:

- 19.08. 1 Paar auf den Radenbachteichen (Putensen).  
 25.09. 2 W auf dem Pietzteich (Wormanns).

17.10. 1 W im Pietzmoor (Wormanns).

### 13. Schellente (*Bucephala clangula*)

1 Brutpaar + 1 Revier

1 Brutpaar mit 10 Jungvögeln am Feuerlöschteich Niederhaverbeck (Jungemann, Kringel, Mertens, Meyer, J., Wormanns, Zisenis).

1 Revierpaar auf dem Teich südlich Haus Heidetal (Rettig, Wormanns, Wundram).

Brutzeitfeststellung:

24.05. 1 W auf dem Feuerlöschteich Wilsede (Wormanns).




Abb. 2: Anzahl erfasster Schellenten-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Heimzug

29.03. 1 Paar auf den Tonkuhlen im Möhrer Moor (Röhrs).

Ein oder jeweils ein Paar auf dem Benninghöfer Teich vom 19.03. bis zum 26.03. (Kringel, Krohn, Wormanns).

25.03. 1 Paar im Pietzmoor-Süd (Kringel).

09.03. 1 Paar auf den Döhler Klärteichen (Rieckmann).

06.03. 1 Paar im Pietzmoor-Süd (Kühn).

12.04. 1 Paar auf den Radenbachteichen (Beelte, Stange).

Sammlung vor Abzug in die Mausegebiete:

03.06. 2 W auf dem Benninghöfer Teich (Wormanns).

### 14. Wachtel (*Coturnix coturnix*)

(siehe Karte 1)

32 Ruforte (Allmer, Brenken, Gröhn, Kowalski, Kringel, Mertens, Röhrs, Thieme, Wormanns, Zirpel)

Wachteln wurden im Jahr 2014 vor allen Dingen im Bereich des Twieselmoores und in den schütter bewachsenen Heideflächen südlich des Wulfsberges vernommen.

Bereits am 07.04. hörte Dirk Mertens in der Benninghöfer Heide-Nord eine Wachtel!

### **15. Jagdfasan (*Phasianus colchicus*)**

Brutzeitfeststellungen:

20.05. 1 W am Wulfsberg (Zisenis).

05.05. 1 M läuft über einen Weg in einem kleinen Wald südlich der Hörpeler Heide/Sprengbach (Leinecker, Pantelmann).

04.05. 1 M Balzrufe am Westrand der Döhler Fuhren, nördlich des Döhler Weges (Wormanns).

Winterbeobachtungen:

02.12. 1 M an der Straße Heber-Schneverdingen auf Höhe von Hof Möhr (Mertens)

06.12. 1 M kommt seit einiger Zeit zu Hof Möhr um Insekten zu suchen wenn das Laub weggepusht wird (Schreiner).

### **16. Rebhuhn (*Perdix perdix*)**

(siehe Karte 2)

1 Brutpaar + 11 Reviere

(Bartels, Broocks, Eggert, H.-H., Grapentin, Hellberg, Hensing, Jungemann, Kleinert, Looß, Mertens, Pantelmann, Röhrs, Sander, M., Schönefeld, Stolz, J., Zachow, Wormanns).

Im Jahr 2014 konnten 11 Rebhuhnreviere ermittelt werden. Nur an einem Ort, in der Feldflur zwischen der B 3 und Bockheber konnte ein Paar mit Jungvögeln beobachtet werden. Das Paar führte 4 Küken (Schönefeld).

Die Reviere liegen alle im Bereich zwischen der Bockelmanns Heide/Twieselmoor und der südlichen Osterheide (siehe Karte 2). Für den sehr großen verbleibenden Bereich gibt es nur aus der Undeloher/Sahrendorfer Heide eine Beobachtung eines Trupps aus dem Herbst (s.u.).

Brutzeitfeststellung:

02.06. 1 Ind. im Radenbachtal zwischen oberer Radenbachbrücke und dem Marksberg (Mertens).




Abb. 3: Anzahl erfasster Rebhuhn-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Winter- und Herbstbeobachtungen:

21.02. 4 Ind. in der Brunauheide-Nord (Mertens).

02.10. 15 Ind. an einem Weg zwischen der Undeloher und der Sahrendorfer Heide (Leinecker).

13.10. 13 Ind. am Wehsandereich Bockelmanns Heide (Jungemann).

06.11. 13 Ind. im Twieselmoor Nordost (Schönefeld).

### 17. Birkhuhn (*Tetrao tetrix*)

Birkhühner leben meist sehr zurückgezogen und brauchen viel Schutz und Ruhe. Nur zur Balzzeit sind sie in den frühen Morgenstunden gut zu hören, manchmal auch zu sehen. Im Herbst und Winter tauchen die Raufußhühner gelegentlich in Gruppen auf, manchmal auch in Baumkronen.

Deshalb freuen wir uns über jede Birkhuhn-Beobachtung. Die Einhaltung des Wegegebotes im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ versteht sich zum Schutz der Birkhühner von selbst.

(Ahlers, Baranowski, Bartels, Bauermeister, Becker, Binder, Brenken, Buhr, Drücke, Eggert, H.-H., Fler, Fleischer, Grapentin, Greiner, Hallmann, Hartig, Hauck, Hedenkamp, Heine, Herold, Hoffmeier, Holsten, Jungemann, Kaufmann, Kleinert, Köhler, Körbel, von Komorski, Korthoff, Kringel, Krohn, Kruse, C. und D., Kulow, Kunz, Kuschinski, Lauszus, Lippschuss, Looß, Mertens, Meyer, J., Neubauer, Niehuhr, Pantelmann, Putensen, Ratsch, Richter, O., Runge, Runte, Sach, Sauerwein, Schönefeld, Schröder, Schulz, Siebert, Späth, Stein, Stolz, C., Stolz, J., Storm, Strauß, Tillmann, Trepel, Tümsmeyer, Vogel, Willmann, Wormanns, Wundram, Zachow, Zimmermann).




Abb. 4: Anzahl der Birkhühner im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.




Abb. 5: Anzahl der Birkhähne im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.




Abb. 6: Anzahl der Birkhennen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.




Abb. 7: Anzahl der Birkhennen im Radenbachtal.




Abb. 8: Anzahl der Birkhühner am Wilseder Berg.




Abb. 9: Anzahl der Birkhähne am Wilseder Berg.




Abb. 10: Anzahl der Birkhühner im Wümmegebiet und in der Rablingsheide.




Abb. 11: Anzahl der Birkhühner in der Osterheide.

Aus dem Jahr 2014 liegen dem VNP auch Birkhuhnbeobachtungen vor, die außerhalb der bekannten Kerngebiete liegen. Eine Beobachtung gelang zwischen dem Büsenbachtal und den Holmer Teichen und mehr als einmal wurden Birkhühner in der Weseler Heide-Nord, am Nordrand des Totengrundes, in der Bennighöfer Heide und am Nordrand des Pietzmoores gesehen.

### 18. Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

1 Brutpaar + 9 Reviere

1 Brutpaar im Pietzmoor (Allmer, Röhrs).

9 Reviere im Holmer Teichgebiet (Faß, Kringel, Sander, T., Wormanns).

Die Zahl der Zwergtaucherreviere ist im Vergleich zu den beiden Vorjahren zwar wieder angestiegen, doch ist dies allein auf die hohe Revierzahl im Holmer

Teichgebiet zurück zu führen. Nur noch ein Brutpaar konnte außerhalb des Teichgebietes festgestellt werden. Uwe Röhrs und Frank Allmer sahen ein Paar mit 4 bzw. 5 Jungvögeln im Pietzmoor nahe der Bohlenstegkreuzung.




Abb. 12: Anzahl der erfassten Zwergtaucher-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

#### Heimzug:

Steffen Faß und Thomas Sander sahen den ersten Zwergtaucher des Jahres am 13.03. auf den Holmer Teichen.

25.03. 1 Ind. im Nordosten des Pietzmoores intensiv balzend (Kringel).

28.03. 1 Ind. auf dem Pietzteich schwimmend (Kringel).

Am 14.04. schwamm 1 Ind. auf dem Undeloher Dorfteich (Rettig)!

#### Wegzug:

Am 15.09. schwamm noch 1 Ind. im südlichen Pietzmoor (Schneider).

### 19. Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Kormoranbeobachtungen liegen uns aus dem Jahr 2014 nur von den Holmer Teichen vor. An 144 Tagen wurden hier Kormorane dokumentiert (Faß, Pantelmann, Thieme, Wormanns). Fast alle Beobachtungen stammen dabei von Steffen Faß. Bis zu 15 Kormorane konnten zeitgleich gesehen werden (17.09. Faß).




Abb. 13: Anzahl der Kormorane an den Holmer Teichen.

Der Verlauf des Säulendiagrammes könnte sich zum einen mit dem Abzug von Kormoranen zur Brutzeit und mit dem Ablasen der Teiche im Herbst erklären.

## 20. Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Mit Abstand am häufigsten sind Silberreiher innerhalb des NSG an den Holmer Teichen zu sehen. An 109 Tagen sah Steffen Faß hier Silberreiher. Am 19.01. waren es sogar 14 Ind. gleichzeitig. Dabei beschränken sich die Beobachtungen fast ausschließlich auf die ersten 4 Monate des Jahres.




Abb. 14: Anzahl der Silberreiher an den Holmer Teichen.

Von Ende Januar bis Mitte April hielten sich entlang der Schmalen Aue innerhalb des NSG bis zu 8 Silberreiher auf (Buttmann, Eick, Hoffmeier, Kaufmann, Koopmann, Kruse, D., Kunz, Marquart, Rieckmann, Stolz, C., Wormanns).

Von Mitte Februar bis Anfang April waren an den Benninghöfer Teichen fünfmal bis zu 2 Ind. zu sehen (Bartels, Höchtl, Kaufmann, Krohn).

Am 23.10. war ein Silberreiher am Südrand des Bockheberer Moores zu sehen (Bartels).

## 21. Graureiher (*Ardea cinerea*)

7 Brutpaare

7 besetzte Horste befanden sich am Ostrand der Döhler Fuhren (Wormanns, Zisenis)

An knapp 150 Tagen hielten sich Graureiher an den Holmer Teichen auf (Bühning, Faß, Kleinert, Kringel, Mertens, Sander, T., Thieme, Wormanns).




Abb. 15: Anzahl der Graureiher an den Holmer Teichen.

Die über 50 Beobachtungen in den anderen Teilen des NSG verteilen sich mit Ausnahme der Monate Januar und November über das gesamte Jahr. Meist waren es 1-3 Individuen. Nur aus dem Süden des NSG zwischen Scharrl und Deimern liegen uns keine Beobachtungen vor.

## 22. Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Zwischen dem 21.03. und dem 30.08. ist der Schwarzstorch im Jahr 2014 im NSG LüH beobachtet worden. Am 08.08. sah Steffen Faß 2 Ind. zeitgleich an den Holmer Teichen und Andreas Bartels sah 7 Tage später ebenfalls 2 Ind. im Twieselmoor. Darüber hinaus tauchte an über 20 Tagen je 1 Schwarzstorch an den Holmer Teichen auf (Bühning, Faß, Mertens, Sander, T.). Je ein Individuum ließ sich im Schierhorner Moor, westlich von Wesel, bei Wehlen, über dem Wümmemoor und wenige Male im August im Twieselmoor blicken (Grapentin, S., Herold, Kowalski, Mertens, Storm). Eine erfolgreiche Brut scheint in diesem Jahr im NSG „Lüneburger Heide“ nicht stattgefunden zu haben.

**23. Weißstorch (*Ciconia ciconia*)**

01.05. 1 Ind. im Tütsberger Grünland (Hüfner)

03.06. 1 Ind. bei Feldarbeiten südlich von Hof Pietz herumlaufend, wenig scheu (Bartels).

**24. Fischadler (*Pandion haliaetus*)**

1 Revier

1 Revier im Bereich Holmer Teiche (Faß, Kleinert, Kringel, Pantelmann, Wormanns)  
Beobachtungen vom 28.03. bis zum 05.06., dann erst wieder zur Zugzeit im September und Oktober (02.09.-19.10.). Zu einer erfolgreichen Brut scheint es in diesem Jahr im Umfeld der Holmer Teiche nicht mehr gekommen zu sein, da keine Versorgungsflüge mehr beobachtet werden konnten. Von einem besetzten Horst haben wir für das Jahr 2014 zudem keine Kenntnis.

Heimzug:

12.04. 1 Ind. das obere Radenbachtal überfliegend (Beelte).

20.04. 1 M die Radenbachteiche überfliegend (Kohls).

Wegzug:

21.08. 1 Ind. über dem Wilseder Berg (Südbeck).

16.09. 1 Ind. überflog Niederhaverbeck in Richtung Süden (LBV Ortsgruppe München, Wormanns).

**25. Wespenbussard (*Pernis apivorus*)**

Brutzeitfeststellungen:

07.07. 1 Ind. im Stühbusch Wulfsberg fotografiert (Krohn)

11.07. 1 Ind. in Richtung Nordosten über die Holmer Teiche fliegend (Wormanns)

04.08. 1 Ind. über dem Wulfsberg rufend (Wormanns)

11.08. 1 M über das Pietzmoor in Richtung Süden segelnd (Wormanns)

**26. Wiesenweihe (*Circus pygargus*)**

Heimzug:

28.04. 1 Ind. durch die Rabingsheide-Ost gaukelnd (Wormanns).

26.05. 1 M an den Hörpeler Heide-Teichen, nicht ganz sicher, ob Wiesenweihe (Pantelmann).

31.05. 1 M an der Brunau/Tütsberger Grünland, nicht sicher, ob Wiesen- oder möglicherweise noch Kornweihe (Kringel).

**27. Kornweihe (*Circus cyaneus*)**

Heimzug:

16 Beobachtungen zwischen dem 12.01. und dem 06.05. 1 x Heidbrackeler Heide, 1 x Weseler Heide-Nord, 1 x Döhler Wiesen, 1 x Heidetaler Heide, 1 x Osterheide westlich Silvestersee, 1 x Pietzmoor. Ansonsten stammen alle Beobachtungen aus dem Bereich Twieselmoor, Tütsberg, Bockheber und aus der Feldflur zwischen Volkwardingen und der Behringer Heide.

1 x Januar (Schirarend).  
 2 x Februar (Schmidt, Zisenis).  
 10 x März (Albers, S., Broocks, Heine, Kleinert, Kringel, Meyer, J., Thieme, Wormanns).  
 2 x April (Saß, Sauerwein, C.).  
 1 x Mai (Zisenis).

#### Sommerbeobachtung:

Mitten im Sommer, am 02.07., tauchte eine Kornweihe am Nordrand der Rabingsheide-Ost auf (Mertens)!

#### Wegzug bzw. Wintergäste:

22 Beobachtungen zwischen dem 15.09. und dem 19.12. (1 x Feldflur zwischen Undeloh und Sahrendorf, 1 x Heide östlich Hainköpen, 16 x Wümmemoor/Twieselmoor/Feldflur Tütsberg und 4 x Feldflur Bockheber).  
 Am 23.10. sah Joachim Meyer dabei 3 M und 3 W gleichzeitig im Twieselmoor bzw. über den Ackerflächen nördlich davon ! Die Beobachtungshäufigkeit und die Anzahl war hier insgesamt am höchsten.

### **28. Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)**

Von Anfang bis Mitte April tauchte mindestens 4 mal eine Rohrweihe an den Holmer Teichen auf (3 mal ein Männchen) (Faß, Sander, T.). Zu einer Brutansiedlung kam es aber leider nicht. Mitte Juni sah Eckehard Bühring hier nochmals ein Männchen und am 11.07. durchflog eine Rohrweihe das Teichgebiet (Wormanns). Möglicherweise brütet ein Weihenpaar irgendwo in der Umgebung der Holmer Teiche und nutzt die Wasser- und Schilfflächen in diesem Jahr gelegentlich zur Nahrungssuche.

#### Heimzug:

03.04. 1 M Heide östlich Hainköpen (Wormanns).  
 10.04. 1 M Pietzmoor (Wormanns).  
 14.04. 1 W Undeloh Heide (Oberwestberg).  
 26.04. 1 Ind. über dem Wilseder Berg kreisend (Köhler).  
 01.05. 1 Ind. Brunauheide (Hüfner).  
 28.05. 1 Ind. Heide am Langen Berg (Kowalski).

#### Wegzug:

24.07. 1 M aus den Wiesen östlich von Hof Möhr auffliegend (Wormanns).  
 19.08. 1 M durch die Feldflur zwischen Freyersener Moor und Heber fliegend (Wormanns).  
 23.08. 1 M südlich Lindenallee Hof Möhr (Schmidt).

### **29. Habicht (*Accipiter gentilis*)**

Aus dem NSG liegen uns nur wenige Habichtbeobachtungen vor. Die 15 Beobachtungen verteilen sich auf alle Monate (außer Juni und Dezember) und fast

über das gesamte NSG (Ahlers, Becker, Brandt, Kleinert, Kringel, Krohn, Runte, Schmidt, Wormanns).

Habichtreviere lassen sich aus den 4 Beobachtungen zur Brutzeit (März bis Mai) in den Bereichen Holmer Teiche, Wilsede, Niederhaverbeck und Hof Möhr nicht ermitteln.




Abb. 16: Anzahl erfasster Habicht-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

### 30. Sperber (*Accipiter nisus*)

3 Reviere

Im Gegensatz zum Habicht liegen uns vom Sperber mehr als doppelt so viele Beobachtungen vor.

1 Revier Südostrand der Hörpeler Heide (Wormanns).

1 Revier Tütsberg (Kringel, Wormanns).

1 Revier Schäferhof nördlich Pietzmoor (Rettig).

### 31. Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Heimzug:

20.04. 1 Ind. oberes Radenbachtal (Kohls).

Wegzug:

15.09. 1 Ind. über der Ringwallheide (LBV Ortgruppe München, Schneider).

16.09. 2 Ind. über dem Wümmemoor (LBV Ortgruppe München, Schneider).

29.09. 1 Ind. über Bockheber (Reimann).

### 32. Rotmilan (*Milvus milvus*)

2 Reviere + 1 Revier knapp außerhalb des NSG.

1 Revier Döhler Führen-Ost.

1 Revier zwischen Oberhaverbeck und Tütsberg.

Knapp außerhalb des NSG:

1 Revier zwischen Volkwardingen und Borstel in der Kuhle.

Ansonsten liegen uns Rotmilan-Beobachtungen nur aus den Bereich vom Pietzmoor über das Möhrer Moorbis nach Bockheber vor.

(Albers, S., Blauth, Brenken, Broocks, Buttman, Eggert, Groothoff, Hallmann, Höchtl, Kaufmann, Kleinert, Köhler, Kringel, Krohn, Mertens, Meyer, J., Pantelmann, Putensen, Rettig, Richter, H., Rieckmann, Röhrs, Sander, M., Sauerwein, C., Sauerwein, F., Stolz, J., Thieme, Torkler, Wormanns, Wosnitza, Zimmermann, Zisenis).

### **33. Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)**

1 Revier

1 Revier im Umfeld Holmer Teiche (40 Beobachtungen aus 9 Monaten, Beobachtungen fehlen nur aus den Monaten Januar, Oktober und November). Am 13.05. flogen hier 2 Adler und am 03.06. sogar 3 Seeadler (Sander, T.).

Weitere 18 Seeadler-Beobachtungen (jeweils 1 Vogel) verteilen sich auf die Gebiete Radenbachtal (2x), Hörpeler Heide (2x), Wilsede (1x), rund um Haverbeck (6x), Rabingsheide/Bockheber (4x) und auf die ehemaligen RF 3a/b (3x). In diesen Bereichen fehlen Beobachtungen nur aus den Monaten Juni, November und Dezember. (Bartels, Buttman, Grapentin, Kaufmann, Leinecker, Meyer, J., LBV Ortsgruppe München, Richter, O., Rieckmann, Runte, Sander, M., Schmidt, Wormanns).

### **34. Merlin (*Falco columbarius*)**

27.01. 1 Ind. sehr niedrig über die Rabingsheide-West fliegend (Runte).

03.04. 1 Ind. in der Rabingsheide-Ost (Wormanns).

11.10. 1 Ind. über die Schwarze Beeke fliegend (Ryslavy).

### **35. Baumfalke (*Falco subbuteo*)**

2 Brutpaare + 1 Revier

1 Brutpaar Töpsheide-Ost (Mertens).

1 Brutpaar Wilseder Moor/Radenbachheide (Heuer, Kowalski, Wormanns).

1 Revierpaar Jungemanns Heide und die umliegenden Heideflächen (Kowalski, Meyer, J., Wormanns).

Je eine Brutzeitfeststellung aus der Rabingsheide (hier zusätzlich 1 Beobachtung Heimzug) und aus dem Pietzmoor (hier zusätzlich eine Beobachtung Wegzug).

Brutzeitfeststellungen:

25.05. 1 Ind. Rufreihen ausstoßend in der Weseler Nord östlich des Wanderparkplatzes an der K 73, später 1 Ind. aus den Hanstedter Bergen kommend und in Richtung des Rufortes fliegend (Maaß).

17.05. 1 Ind. nördlich der K 27 in der Weseler Heide-Süd Insekten jagend (Maaß).

21.07. 1 Ind. im Bereich der Rabingsfuhren fliegend (Krohn, Wormanns).

15.07. 1 Ind. im Pietzmoor jagend (Wormanns).

19.07. 1 Ind. in den Heideflächen östlich von Grasengrund (Mertens).

Wegzug:

27.09. 1 Ind. im Pietzmoor (Richter, H.).

### 36. Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

08.06. 1 Ind. in der Feldflur nördlich der Sahrendorfer Heide (Ahlers).

Knapp außerhalb des NSG:

21.01. 1 Ind. in der Luft östlich von Hörpel (Klippel).

### 37. Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

2+1 Reviere

1 Revier unteres Radenbachtal (Röhrs).

1 Revier Wulfsberg/Twieselmoor (Röhrs).

Knapp außerhalb des NSG:

1 Revier am Ostrand der Hanstedter Berge (Müller, E.).

Brutzeitfeststellungen:

11.04. 1 Ind. in Straßenbaum bei Höpen zwischen Schierhorn und Drumbergen (Wormanns).

25.04. 1 W über der SW-Ecke der Töpsheide rüttelnd (Stein).

27.04. 1 Ind. flog über oder in den Schafstall Wilsede (Wormanns).

08.04. 1 Ind. in der Hörpeler Heide rüttelnd (Wormanns).

04.07. 2 Ind. am Westrand der Heide westlich des Möhregrundes (Mertens).




Abb. 17: Anzahl erfasster Turmfalken-Revier im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Von den fast 70 Turmfalken-Beobachtungen entfallen beinahe 60 Beobachtungen auf die Monate Januar/Februar und August bis Dezember (Ahlers, Becker, Buttmann, Faß,

Höchtl, Kaufmann, Kleinert, LBV Ortsgruppe München, Mertens, Putensen, Stutzmann, Wormanns).

### 38. Kranich (*Grus grus*)

(siehe Karte 3)

9 Brutpaare + 14 Reviere

(Albers, H.-D., Albers, S., Allmer, Anders, Bartels, Bauermeister, Becker, Blauth, Brandt, Brooks, Buttmann, Eggert, H.-H., Frerichs, Grapentin, Gröhn, Groothoff, Hallmann, Hauck, Herold, Hessing, Hoffmann, Jungemann, Kaufmann, Kinder, Kleinert, Kringel, Krohn, Mertens, Meyer, J., von Mickwitz, Müller, Pantelmann, Peisert, Putensen, Rieckmann, Röhrs, Runte, Sander, M., Sander, T., Schmidt, Schönefeld, Schreiner, Sierk, Storm, Thieme, Wormanns, Wosnitza, Zahn, Zimmermann, Zisenis)




Abb. 18: Anzahl erfasster Kranich-Revierpaare im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

### 39. Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

3 Reviere

3 Reviere Holmer Teiche (Kringel, Sander, T., Wormanns).

Weitere Beobachtungen:

30.03. 1 Ind. im Pietzmoor (Wilkening).

Erstbeobachtung am 19.02. (Sander, T.).

### 40. Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Brutzeitfeststellung:

11.04. 1 Ind. Holmer Teiche (Wormanns).

### 41. Blässhuhn (*Fulica atra*)

3 Brutpaare + 4 Reviere

1 Brutpaar + 6 Reviere im Holmer Teichgebiet (Kringel, Wormanns).

Brutzeitfestellung:

28.03. 1 Ind. auf dem Pietzteich (Kringel).

Weitere Beobachtungen:

12.03. 7 Ind. im Holmer Teichgebiet (Mertens).

Erstbeobachtung am 11.03. (Sander, T.).

#### 42. Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

11+3 Reviere

2 Reviere Hörpeler Heide-Nordrand (Buttmann, Kaufmann, Mertens, Wormanns).

2 Reviere Bocklemanns Heide/nördlich angrenzende Ackerflächen (Kleinert, Kringel, Wormanns).

2 Reviere Twielsemoor (Broocks, Grapentin, Jungemann, Kleinert, Kringel, Röhrs, Thieme, Wormanns).

2 Reviere Tütsberger Grünland (Blauth, Brenken, Broocks, Kleinert, Kringel, Krohn, Sauerwein, F., Wormanns).

2 Reviere Ackerflächen östlich B 3, Höhe Hof Möhr (Bartels, Broocks, Hallmann, Heine, Kringel, Marquart, Mertens, Pantelmann, Wormanns).

1 Revier Heide am Schäferhof (Quinn).




Abb. 19: Anzahl erfasster Kiebitz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Knapp außerhalb des NSG:

3 Reviere südwestlich Pietzmoor (Broocks)

Brutzeitfeststellungen:

Voßmoor/Wilseder Moor: Vom 12.04.-26.04. wurden an 3 Tagen je ein und am 13.04. 5 Ind. gleichzeitig gesehen. Davor und danach wurden hier keine Kiebitze mehr beobachtet (Kleinert, Köhler, Rieckmann, Stolz, C., Wormanns).

04.06. 1 Ind. Ackerflächen südlich Hof Pietz (Bartels).

### 43. Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Heimzug:

28.04. 1 Ind. im Holmer Teichgebiet (Mertens).

### 44. Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

8+1 Reviere

1 Revier Hörpeler Heide-Nordrand (Buttmann, Mertens, Stolz, J.).

1 Revier Wümmemoor (Bauermeister, Eggert, H.-H., Kringel, Salomon, Wormanns).

1 Revier Twieselmoor/Bockelmanns Heide/Brunauheide (Broocks, Grapentin, W., Jungemann, Kleinert, Kringel, Meyer, J., Pantelmann, Röhrs, Sauerwein, C., Storm, Zimmermann).

1 Revier Rabingsheide-Ost (Bauermeister, Hessing, Runte, Vogel, Wormanns).

1 Revier Feldflur Bockheber (Heine, Hallmann, Kringel, Pantelmann, Runte, Sander, Wormanns).

1 Revier Osterheide-Nord (Broocks, Stolz, C.).

1 Revier Osterheide-Süd (Bartels, Bauermeister, Broocks, Höchtl, Röhrs, Wormanns, Zimmermann).

1 Revier Pietzmoor (Broocks, Kringel, Wormanns).




Abb. 20: Anzahl erfasster Brachvogel-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Knapp außerhalb des NSG:

1 Revier Camp Reinsehen (Höchtl, Röhrs).

### 45. Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

(siehe Karte 4)

(Ahlers, Albers, S., Bauermeister, Blauth, Fuhrhop, Heine, Herold, Jungemann, Knifka, Looß, Maaß, Mertens, Meyer, J., Meyer, R., Müller, H., Pantelmann, Riechert, Röhrs, Runte, Sauerwein, C., Schmidt, Stolz, C., Wormanns, Wosnitza).

**46. Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)**

09.09. 1 Ind. im Pietzmoor auffliegend (Wormanns).

18.11. 1 Ind. in der Heide am Westrand der Döhler Fuhren auffliegend (Kaufmann).

**47. Bekassine (*Gallinago gallinago*)**

Brutzeitfeststellungen:

27.04. 1 Ind. balzend im Radenbachtal unterhalb von Undeloh (Köhler).

26.05. 1 Ind. im Twieselmoor (Kowalski).

Heimzug:

23.03. 1 Ind. Nahrung suchend im Tütsberger Grünland (Sauerwein, C.).

20.03. 1 Ind. Möhregrund (Mertens).




Abb. 21: Anzahl erfasster Bekassinen-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Wegzug:

03.11. 1 Ind. im Pietzmoor auffliegend (Wormanns).

**48. Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)**

Brutzeitfeststellungen:

11.04. 1 Ind. im Holmer Teichgebiet (Wormanns).

14.04. 2 Ind. rufend das Tal der Schmalen Aue abwärts fliegend (Wormanns).

12.04. 1 Ind. durch das Wilseder Moor in Richtung Osten fliegend (Stolz, C.).

Heimzug:

17.06. 2 Ind. im Holmer Teichgebiet (Bühning).

11.07. 1 Ind. im Holmer Teichgebiet (Wormanns).

**49. Silbermöwe (*Larus argentatus*)**

Knapp außerhalb des NSG:

13.10. 1 Ind. (2. KJ) in der Feldflur nördlich von Egestorf zusammen mit Rabenkrähe auf Futtersuche (Thieme).

**50. Hohltaube (*Columba oenas*)**

(siehe Karte 5)

**21 Reviere**

(Allmer, Brandt, Flügge, Kringel, Maaß, Müller, E., Röhrs, Thieme, Wille, Wormanns)

**51. Turteltaube (*Streptopelia turtur*)**

1 Revier

1 Revier Pietzmoor-Süd (Röhrs).

Heimzug:

20.04. 1 Ind. am Südrand der Brunauheide, sehr scheu (Kringel).




Abb. 22: Anzahl erfasster Turteltauben-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**52. Kuckuck (*Cuculus canorus*)**

(siehe Karte 6)

44 Reviere

(Ahlers, Becker, Kleinert, Kringel, Krohn, Mertens, Putensen, Röhrs, Sander, T., Sauerwein, C., Schreiner, Stein, Thieme, Wormanns).

**53. Schleiereule (*Tyto alba*)**

Brutzeitfeststellungen:

21.06. 1 Ind. in einem Gebäude in Wehlen sitzend (Groothoff).

30.07. 1 Ind. in der Feldflur östlich von Undeloh fliegend (Kock).

**54. Raufußkauz (*Aegolius funereus*)**

(siehe Karte 7)

1 Brutpaar + 11 Reviere

(Eick, Flüge, Groothoff, Hallmann, Holsten, Knifka, Maaß, Meyer, R., Müller, NABU AG Vögel Ortsgruppe Hanstedt, Pantelmann, Trepel, Wille).

11 Brutzeitfeststellungen (Beelte, Flüge, Maaß, Müller, E., Wille).




Abb. 23: Anzahl erfasster Raufußkauz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Herbstbeobachtungen:

10.08., 15.10., 17.11. je 1 Ind. rufend in den Schierhorner Fuhren-Süd (Riechert).

**55. Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)**

1 Revier

1 Revier 200 Meter südlich der Südwestecke der Töpsheide (Flüge, Maaß, Meyer, R.).

Brutzeitbeobachtungen:

10.04. 1 Ind. erst erregter Reviergesang, geht über in monotonen Reviergesang, am Jesteburger Weg, ehemaliger Windwurf Pilz Nordost, in den Hanstedter Bergen (Flüge, Maaß).

10.04. 1 Ind. monotoner Reviergesang am Jesteburger Weg, Einmündung Gedenksteinweg, in den Hanstedter Bergen (Flüge, Maaß).

12.04. 1 Ind. erst erregter Reviergesang, geht über in monotonen Reviergesang, im südwestlichen Bereich der Hanstedter Berge am breiten Heidestreifen nach 25 (Flüge, Maaß).




Abb. 24: Anzahl erfasste Sperlingskauz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

#### Winter- und Herbstbeobachtungen:

23.02. 1 Ind. im Scharrler Forst nördlich der Nordspitze der ehemaligen Roten Flächen 3b singend (Hellberg).

Mitte und Ende September mehrfach die „Tonleiter“ des Sperlingskauzes im Seevenholz am Ostrand der Weseler Heide gehört (Pantelmann).

28.09. 1 Ind. sang die „Tonleiter“ im Wald zwischen der B 3 und der Ringwallheide (ungefähr Abteilung 121) (Wormanns).

#### **56. Waldohreule (*Asio otus*)**

1 Brutpaar + 1 Revier

1 Brutpaar nördlich Seevenholz, 3 Juv. (Stühmer).

1 Revier Schierhorner Führen-Süd (Albers, H.-D.).

#### Brutzeitfeststellungen:

18.02. 1 Ind. in den Hanstedter Bergen beim Emmenberg singend (Flügge, Maaß, Müller, E.).

14.05. 1 Ind. westlich Twieselmoor (Natterer).

#### Winter- und Herbstbeobachtungen:

07.02. 1 Schlafplatz (Gewölle) in einer Kiefer in der Wümmeheide-West gefunden (Wormanns).

12.02. 6 Ind. aus einer Kiefer in der Töpsheide auffliegend (Mittmann).

05.09. 2 Ind. im Freyersener Moor aufgefliegen (Wormanns).

08.10. jeweils 2 Vögel an 2 Tagen östlich Hof Möhr gehört (Becker).

20.10. 2 Ind. aus Kiefern im westlichen Pietzmoor auffliegend (Wormanns).

**57. Uhu (*Bubo bubo*)**

04.06. 1 Ind. im Südwesten der Brunauheide aus einer Kiefer herausfliegend und nach Westen verschwindend (Schönefeld).

13.08. Feder eines Uhus auf dem Hofgelände Tütsberg gefunden (Wormanns, best. durch Gerd-Michael Heinze).

25.09. Je eine Feder an 2 unterschiedlichen Stellen im Pietzmoor-Südost und auf dem Grünland Pietz gefunden (Wormanns, best. durch Gerd-Michael Heinze).

28.09. 2 Ind. zeitgleich singend, ein Ind. nördlich der Brespa im Dreieck Barrler Kirchweg/Alte Landesstraße und ein Ind. am Nordrand des Möhregrundes (Wormanns).

**58. Waldkauz (*Strix aluco*)**

6 Reviere

1 Revier Döhler Führen-Westrand, nördlich des Döhler Weges (Stolz, C.).

1 Revier Wilsede-Nord (Büttinghaus, Wormanns).

1 Revier Waldbereich westlich Wilsede (Eick, Wormanns).

1 Revier Molthorst (Eick, Wormanns).

1 Revier Tütsberg (Brenken).

1 Revier Hof Möhr (Becker).

Brutzeitfeststellung bzw. noch im Familienverband:

11.02. südlich des Emmenberges in den Hanstedter Bergen singend (Flügge, Maaß, Müller, E., Wille).

23.05. 1 Ind. am Haverbeckhof in Niederhaverbeck singend (Kringel).

02.06. 1 Ind. Oberhaverbecker Holz (Dierschke).

12.06. 1 Ind. Niederhaverbeck (Heer).

07.07. 1 Ind. kam aus einer Futterkrippe westlich der Hörpeler Heide/nördlich des Sprengbaches herausgeflogen, zudem 2 Federn gefunden (Zisenis).

Herbst- und Winterbeobachtungen:

Zwischen August und Dezember waren fast immer „nur“ 1 Waldkauz in den Schierhorner Führen, mitten zwischen dem Schierhorner Moor und der Töpsheide, im Seevenholz, im Wald nordwestlich der Sudermühlener Heide, in Wilsede, in der Molthorst, im Wald auf dem Holzberg, nördlich von Sellhorn, in Oberhaverbeck, in Niederhaverbeck, auf dem Tütsberg und bei Hof Möhr zu sehen bzw. zu hören (Ahlers, Becker, Brenken, Pantelmann, Wormanns, K., Wormanns, S.).

**59. Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)**

(siehe Karte 8)

39 Reviere

(Flügge, Groothoff, Heer, Heine, Kringel, Maaß, Mertens, Meyer, J., Meyer, R., Mieth, Müller, E., AK Vögel NABU Hanstedt, Pantelmann, Riechert, Röhrs, Runte, Sander, M., Sauerwein, F., Wille, Wormanns, K.)




Abb. 25: Anzahl erfasster Ziegenmelker-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

#### 60. Mauersegler (*Apus apus*)

11.07. 1 Ind. über den Holmer Teichen herumfliegend (Wormanns).

#### 61. Eisvogel (*Alcedo atthis*)

2 Reviere

1 Revier Holmer Teiche (Faß, Kringel, Sander, T., Wormanns).

1 Revier Bereich Radenbachtiche (Putensen).

Winter- und Herbstbeobachtungen:

3 Januarbeobachtungen an den Heidetalen Teiche und am Feuerlöschteich Niederhaverbeck (Jungemann, Sorge, Wormanns).

Juli bis Dezember 17 Beobachtungen an den Holmer Teichen (Faß, Kleinert, Thieme, Wormanns).

12.01. 1 Ind. an der Schmalen Aue beim Hof Sudermühlen (Flügge, Maaß).

04.08. 1 Ind. am Mühlteich Sudermühlen (Wormanns).

23.09. 1 Ind. an der Schmale Aue auf Höhe der Hörpeler Heide (Wormanns).

10.09. 1 Ind. am Feuerlöschteich Niederhaverbeck (Hallmann).

16.09. 2 Ind. verfolgten sich längere Zeit am „Dorfteich“ Oberhaverbeck (LBV Ortsgruppe München, Wormanns).

Im Dezember mehrfach am Feuerlöschteich Niederhaverbeck zu sehen (Sander, M.).

#### 62. Wiedehopf (*Upupa epops*)

2 Reviere

1 Revier Wulfsberg-Nord (Krohn, Sauerwein, C., Torkler, Wormanns).

Eine 4-köpfige Wiedehopf-Familie sah Arne Torkler am 11.07. im Umfeld des Wulfsberges.

1 Revier Braunauheide-Süd (Bartels, Bauermeister, Fröhnberg, Krohn, Mertens, Rathgeber, Wormanns).

Am 08.07. sah Dirk Mertens einen Alt- und 2 flügge Jungvögel in der Heide an der Nordspitze des Benninghöfer Forstes.

Der erste Wiedehopf wurde im Jahr 2014 am 10.04. in der Braunauheide von Joachim Meyer beobachtet.

Brutzeitfeststellungen oder Heimzug bzw. im August Wegzug:

12.04. 1 Ind. rief ausdauernd im Mündungsbereich der Schwarzen Beeke im Radenbachtal (Kunz).

17.04. 1 Ind. kurz in Benninghöfen singend (Sauerwein, F.).

26.04. 1 Ind. am Nordrand des Totengrundes singend (Köhler).

27.04. 2 Ind. singen definitiv gleichzeitig in gewissem Abstand zueinander am Wilseder Berg (Köhler).

27.04. 1 Ind. singt an der Straße Wilsede-Undeloh (Höhe Trönshop) (Köhler).

09.06. 1 Ind. in der Rabingsheide an der Nordwestecke des Benninghöfer Forstes.

10.06. 1 Ind. in der Rabingsheide an der Nordwestecke des Benninghöfer Forstes.

08.07. 2 Ind. am Wehsandbereich Bockelmanns Heide (Grapentin, R., Mertens).

12.08. 1 Ind. beim Kreisel in Scharrl am Straßenrand sitzend (Bartels).

Knapp außerhalb des NSG:

24.07. 1 Ind. vom Straßenrand der K 51 nordöstlich von Behringen nahe der Kreuzung mit der K 34 auffliegend (Pantelmann).

05.08. 1 Ind. aus Richtung Blaubeerplantage kommend und über die Kreuzung K 51/L 211 nordwestlich von Behringen weiter in Richtung Nordosten fliegend (Wosnitza).

### 63. Wendehals (*Jynx torquilla*)

(siehe Karte 9)

22 Reviere

(Bauermeister, Broocks, Flüge, Frohnberg, Hellberg, Kleinert, Köhler, Köster, Kringel, Krohn, Mühlberg, Rathgeber, Röhrs, Schmidt, Wormanns)




Abb. 26: Anzahl erfasster Wendehals-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

In den 13 besetzten Wendehals-Nistkästen befanden sich im Laufe der Brutsaison mindestens 95 Eier bzw. bereits geschlüpfte Jungvögel. Wie viele Jungvögel geschlüpft und ausgeflogen sind ist leider nicht vollständig bekannt.

29.04. 4 (!) rufende Ind. Im Nordostteil des Wulfsberger Stühbusches zu hören, davon ein Paar im Duett (Hellberg).

Am 08.07. saß ein Wendehals zeitgleich mit einem Steinschmätzer auf einem Lesesteinhaufen (!) zwischen dem Wulfsberg und dem Tütsberg (Wormanns).

Heimzug:

10.04. 1 Ind. in der Nordspitze der Hörpeler Heide, Nähe Schafstall, singend (Wormanns).

17.04. 1 Ind. am Südrand der Braunauheide am Rand des Tütsberger Grünlandes singend (Sauerwein, F.).

25.04. 1 Ind. in Wilsede nahe Heidemuseum singend (Köhler).

Brutzeitfeststellung:

10.05. 1 Ind. in der Heide an der Nordostspitze des Hainköpen singend (Wormanns).

Wegzug:

18.08. 1 Ind. an der Ostecke des Bockheberer Hofgehölzes in der Heide sitzend und fliegend (Pantelmann).

#### 64. Grünspecht (*Picus viridis*)

(siehe Karte 10)

53 Reviere

(Ahlers, Allmer, Becker, Blauth, Buttman, Flüge, Jungemann, Kaufmann, Kringel, Maaß, Meyer, J., Pantelmann, Putensen, Röhrs, Sander, M., Stolz, C., Thieme, Wormanns)




Abb. 27: Anzahl erfasster Grünspecht-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**65. Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)**

(siehe Karte 11)

29 Reviere

(Ahlers, Albers, H.-D., Bauermeister, Blauth, Flügge, Hessing, Jungemann, Kowalski, Kringel, Maaß, Meyer, J., Müller, E., Putensen, Riechert, Röhrs, Runte, Stein, Stolz, C., Thieme, Wille, Wormanns, Zisenis)




Abb. 28: Anzahl erfasster Schwarzspecht-Reviere im NSG Lüneburger Heide.

**66. Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)**

1 Brutpaar + 1 Revier

1 Brutpaar Oberhaverbecker Holz nahe „Rennbahn“ (Dierschke).

1 Revier in Niederhaverbeck beim Feuerlöschteich (Wormanns).

Brutzeitfeststellungen:

09.03. unmittelbar westlich Forstgut Einem trommelnd (Eggert, B.).

Sommerbeobachtungen:

19.07. 1 Ind. an den Balken des Heidemuseums in Wilsede herum kletternd (Wormanns).

02.08. 1 Ind. in den Bäumen am Feuerlöschteich Wilsede (Putensen).

**67. Kleinspecht (*Dryobates minor*)**

(siehe Karte 12)

13 Reviere

(Hessing, Kringel, Röhrs, Wormanns, Wosnitza).




Abb. 29: Anzahl erfasster Kleinspecht-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Sommer- und Herbstbeobachtungen außerhalb der bekannten Brutreviere:

11.07. 1 Ind. am Ostrand der Holmer Teiche rufend (Wormanns)

04.09. 1 Ind. in Bäumen am Schneverdinger Weg am Südrand der Ringwallheide (Rieckmann).

09.09. je 1 Ind. aus dem zentralen Pietzmoor und vom Südrand des Pietzmoores rufend (Wormanns).

### 68. Pirol (*Oriolus oriolus*)

(siehe Karte 13)

14 Reviere

(Brandt, Köhler, Kowalski, Kringel, Mertens, Mühlberg, Röhrs, Sander, T., Sauerwein, C., Sauerwein, F., Schreiner, Wormanns).

Brutzeitfeststellungen:

23.05. 1 Ind. in einem lockeren Birkenwäldchen auf der westlichen Kuppe des Wilseder Berges singend (Kowalski).




Abb. 30: Anzahl erfasster Pirol-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

### 69. Neuntöter (*Columbarius collurio*)

(siehe Karte 14)

74 Reviere

(Allmer, Gröhn, Hellberg, Herold, Jungemann, Kaufmann, Kleinert, Kowalski, Kringel, Krohn, Mertens, Meyer, J., Mühlberg, Röhrs, Sander, M., Thieme, Wormanns)




Abb. 31: Anzahl erfasster Neuntöter-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

### 70. Raubwürger (*Lanius excubitor*)

3 Brutpaare + 5 Reviere

1 Brutpaar Weseler Heide-Nord (Flügge, Maaß).

1 Brutpaar Meninger Heide (Mertens).

1 Brutpaar Ringwallheide (Jungemann, Kringel, Mertens, Wormanns).

- 1 Revier Twieselmoor (Hellberg, Kowalski, Krohn, Thieme, Wormanns).  
 1 Revier Rabingsheide-Ost (Hessing, Mertens, Rinas, Stolz, J., Vogel, Wormanns).  
 1 Revier Heide südöstlich von Bockheber (Broocks, Heine).  
 1 Revier Osterheide-Nord (Röhrs).  
 1 Revier Osterheide-Süd (Eick, Jahn, Röhrs, Wormanns).  
 1 Revier Kreuzbergheide (Mertens, Wawerek).




Abb. 32: Anzahl erfasster Raubwürger-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

#### Brutzeitfeststellungen:

- 09.05. 2 Ind. im Nordn der Hörpeler Heide (Pantelmann).  
 26.05. 2 Ind. in der Heimbacher Heide (Wormanns).  
 24.06. 2 Ind. in der Nähe von Hannibals Grab sitzend (Sander, M.).  
 26.06. 1 Ind. in der Heidetaler Heide (Sander, M.).  
 19.05. 1 Ind. am Ostrand der Bockelmanns Heide (Stolz, J.).  
 13.04. 1 Ind. auf Lesesteinhaufen im Norden der Benninghöfer Heide (Sauerwein, C.).  
 26.06. 1 Ind. unmittelbar nördlich der Hofstelle Wulfsberg (Krohn).  
 05.04. 1 Ind. westlich der Hofstelle Wulfsberg (Rinas).  
 13.04. 1 Ind. Rabingsheide-West (Runte).  
 10.04. 1 Ind. Feldflur Bockheber (Heine).

Dem VNP liegen nahezu aus allen Heideflächen im NSG Lüneburger Heide Raubwürger-Beobachtungen vor. Und zudem auch aus allen Monaten des Jahres 2014. Aus den Winter- und Herbstmonaten (hier bis Mitte März und ab Ende Juli) fehlen Beobachtungen aus kaum einem Heidebereich.

(Brandt, Flügge, Krohn, Maaß, Mertens, Meyer, J., Pantelmann, Peper, Putensen, Rieckmann, Runte, Sander, M., Schmidt, Thieme, Wormanns).

**71. Elster (*Pica pica*)**

15.02. 1 Ind. durch NHB fliegend (Meyer, J.).  
 20. u. 21.09. 1 Ind. in Wilsede (Wormanns).  
 27.10. 1 x kurz in Niederhaverbeck gehört (Wormanns).  
 Im November bei Hof Möhr (Kaufmann).

**72. Dohle (*Corvus monedula*)**

8 Dohlen-Kolonien (mind. 69 Paare)  
 Altbuchen am Nordrand von Wilsede (Ausfahrt nach Undeloh) (Röhrs).  
 05.01. 10 Ind. über Wilsede und zeitgleich 8 Ind. über der Molthorst kreisend (Wormanns).  
 23.02. 50 Ind. in der Abenddämmerung über den Baumwipfeln von Wilsede herumfliegend (Wormanns).  
 22.03. 34 Ind. saßen vor den Baumhöhlen oder in den Baumkronen (Wormanns), nachmittags saßen 40 Ind. in den Baumkronen am Hillmershof (Wormanns).  
 27.03. 76 Ind. in den Schlafbäumen im Wilseder Hutewald sitzend (Wormanns).  
 09.11. 32 Ind. über Wilsede herumfliegend (Wormanns).  
 Haverbecker Holz am Nordrand von Niederhaverbeck (Röhrs)  
 Altbaumbestand am Eickhof in Niederhaverbeck (Röhrs)  
 13.03. 24 Ind. über Buchen am Eickhof kreisend (Wormanns).  
 31.10. 16 Ind. über der Geschäftsstelle des VNP in Niederhaverbeck herumfliegend (Wormanns).  
 Oberhaverbeck  
 20.02. 4 Ind. in Oberhaverbeck (Wormanns).  
 Tütsberger Hofgehölz (Röhrs)  
 März und April bis zu 36 Ind. im Bereich Tütsberg herumfliegend bzw. im Tütsberger Grünland nach Nahrung suchend (Kringel, Wormanns).  
 Benninghöfen  
 19.03. 14 Ind. über den Baumkronen des Altbuchenbestandes herumfliegend (Wormanns).  
 Bockheberer Hofgehölz (Röhrs)  
 04.11. ca. 40 Ind. auf Acker zwischen der B 3 und Bockheber (Wormanns).  
 Altbuchen Hof Möhr (Röhrs)

**Weitere Beobachtungen:**

08.08. mind. 20 auf Ackerflächen östlich von Undeloh nach Nahrung suchend (Wormanns).  
 19.05. mehrere Ind. aus dem Wald in Jungemanns Heide rufend (Kringel).  
 11.08. ca. 200 (!) Ind. zusammen mit Kolkraben in der Luft über dem Schäferhof (Wormanns).  
 15.10. ca. 30 Ind. auf den Heideflächen am Schäferhof auf Nahrungssuche (Wormanns).  
 30.10. 58 Ind. rufend über das Pietzmoor in Richtung Westen fliegend (Wormanns).  
 08.09. 22 Ind. über den Baumwipfeln auf Hof Pietz herumfliegend (Wormanns).  
 19.10. 23 Ind. fliegen aus der Döhrensbergheide-Nord auf (Schmidt).

### 73. Rabenkrähe (*Corvus corone*)

29.09. 20 Ind. auf Acker nördlich vom Twieselmoor nach Nahrung suchend (Wormanns).

22.10. ca. 50 Ind. mit lauten Rufen über Wilsede herumfliegend (Wormanns).

10.11. 20 Ind. in der Heide am Langen Berg auf Nahrungssuche (Wormanns).

13.11. ca. 30 Ind. auf Acker am Ortsausgang Wesel in Richtung Undeloh (Wormanns).

Knapp außerhalb des NSG:

06.01. 67 Ind. am Nordrand von Inzmühlen (Schlafplatz ?).

### 74. Nebelkrähe (*Corvus cornix*)

27.11. 1 Ind. auf einem Acker zwischen Egestorf und der „Birkenbank“ Nahrung suchend (Thieme).

### 75. Kolkrahe (*Corvus corax*)

9 Reviere

1 Revier Holmer Teiche (Thieme, Wormanns).

1 Revier Rehmbachheide (Thieme, Wormanns).

1 Revier Trönshop (Putensen, Wormanns).

1 Revier Berggestell am Bolterberg (Wormanns).

1 Revier Interessentenforst/Oberhaverbeck (Heer, Wormanns).

1 Revier Hengstberg östlich Tütsberg (Wormanns).

1 Revier Bockheberer Moor (Hessing, Kringel, Wormanns).

1 Revier Wald östlich Osterheide-Nord (Wormanns).

1 Revier Pietzmoor-West (Kringel, Wormanns).




Abb. 33: Anzahl erfasster Kolkrahen-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**76. Heidelerche (*Lullula arborea*)**

(siehe Karte 15)

228 Reviere

(Bauermeister, Blauth, Flüge, Kowalski, Kringel, Krohn, Maaß, Mertens, Putensen, Rieckmann, Röhrs, Schmidt, Stolz, C., Stolz, J., Thieme, Wormanns)




Abb. 34: Anzahl erfasster Heidelerchen-Revier im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**77. Feldlerche (*Alauda arvensis*)**

(siehe Karte 16)

274 Reviere

(Bauermeister, Heine, Kringel, Mertens, Rieckmann, Röhrs, Thieme, Wormanns)




Abb. 35: Anzahl erfasster Feldlerchen-Revier im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**78. Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)**

326 besetzte Nester (Albers)

<b>Ort</b>	<b>Gebäude / Hof</b>	<b>BP Rauchschwalbe</b>
Schneverdingen	Hof Pietz	12
Schneverdingen	Hof Möhr	1
Schneverdingen	Neuer Schafstall Schäferhof	14
Schneverdingen	Alter Schafstall Schäferhof	6
Schneverdingen	Schafstall Osterheide	7
Schneverdingen	Hof Bockheber	14
Schneverdingen	Pferdestall Hof Tütsberg	3
Schneverdingen	Schafstall Hof Tütsberg	10
Schneverdingen	Einem	2
Schneverdingen	Heimbuch	2

Niederhaverbeck	Eickhof	6
Niederhaverbeck	Hof Bartels	4
Niederhaverbeck	Schafstall Geschäftsstelle	4
Niederhaverbeck	Schafstall Heidetal	14
Niederhaverbeck	Hof Hillmer	8

Oberhaverbeck	Hof Bockelmann	12
Oberhaverbeck	Hof Wilhelm Jungemann	2
Oberhaverbeck	Hof J.P. Jungemann	14
Oberhaverbeck	Stimbeckhof	4

Wilsede	Schafstall Hillmershof	10
Wilsede	Schafstall Totengrund / Funck	12
Wilsede	Gasthaus Wilseder Hof	6
Wilsede	Schafstall Hainköpen	1
Wilsede	Pferdestall Witthöft`s Gästehaus	5
Wilsede	Heidemuseum Dat ole Huus	1

Sellhorn	Ort Sellhorn gesamt	4
----------	---------------------	---

Döhle	Schafstall Hörpeler Heide	12
-------	---------------------------	----

Sahrendorf	Schafstall Sahrendorfer Heide	4
Sahrendorf	Hof Sudermühlen	18

Undeloh	Hof Overbeck	6
Undeloh	Hof Markwart	6
Undeloh	Hof Hartig	4

Ort	Gebäude / Hof	BP Rauchschwalbe
Undeloh	Hof Schröder	4
Undeloh	Hof Heins	8
Undeloh	Heidehof	9
Undeloh	Hof Garbers	5
Undeloh	Hotel Heiderose	15
Wesel	Thonhof	6
Wesel	Wehlen	5
Wesel	Schafstall Weseler Heide Süd	4
Wesel	Schafstall Weseler Heide Nord	7
Wesel	Schafstall Inzmühlen	9
Wesel	Hof Meningen	12
Soltau / Deimern	Schafstall Grasengrund	12
Wehlen	Alter Heidehof / Reetz	2
<b>Summe:</b>		<b>326</b>




Abb. 36: Anzahl besetzter Rauchschwalben-Nester im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

## 79. Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)

114 Reviere (Albers)

Ort	Gebäude / Hof	BP Mehlschwalbe
Schneverdingen	Leute-Haus Hof Tütsberg	12
Schneverdingen	Maschinenhalle	1
Niederhaverbeck	VNP-Geschäftsstelle / -remise	5
Niederhaverbeck	VNP-Geschäftsstelle	6
Niederhaverbeck	Landhaus "Haverbeckhof"	2
Niederhaverbeck	Haus Heidetel	6
Niederhaverbeck	Gasthaus Menke	5
Oberhaverbeck	Hof J.P. Jungemann	6

Sahrendorf	Hof Sudermühlen	14
------------	-----------------	----

Undeloh	Hof Markwart	9
Undeloh	Hof Hartig	6
Undeloh	Hof Schröder	5
Undeloh	Heidehof	6
Undeloh	Hotel Heiderose	7

Wesel	Thonhof	10
Wesel	Wehlen	8
Wesel	Hof Meningen	6

---

**Summe:** **114**

---




Abb. 37: Anzahl besetzter Mehlschwalben-Nester im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**80. Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)**

(siehe Karte 17)

78 Reviere

(Bauermeister, Kringel, Wormanns)




Abb. 38: Anzahl erfasster Waldlaubsänger-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**81. Feldschwirl (*Locustella naevia*)**

Heimzug:

12.06. 1 Ind. am Wilseder Berg (Heer).

**82. Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)**

1 Revier an den Holmer Teichen (Wormanns).

**83. Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)**

45 Reviere

Alle Reviere an den Holmer Teichen (Kringel, Wormanns).

**84. Gelbspötter (*Hippolais icterina*)**

3 Reviere

1 Revier Nordspitze Holmer Teiche (Kringel, Wormanns).

1 Revier Wilsede (Wormanns).

1 Revier Hof Möhr (Schreiner).

**85. Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)**

(siehe Karte 18)

25 Reviere

(Bauermeister, Kleinert, Kowalski, Kringel, Röhrs, Wormanns).

**86. Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)**

(siehe Karte 19)

46 Reviere

(Kleinert, Kringel, Röhrs, Wormanns).

**87. Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)**

12.01. 7 Ind. am Westrand des Keemoores zwischen Wilsede und Döhle (Wundram, J.u.A.).

20.01. 5 Ind. Heide am Langen Berg (Krohn, Wormanns).

**88. Star (*Sturnus vulgaris*)**

(siehe Karte 20)

60 Reviere

(Bauermeister, Kleinert, Wormanns).




Abb. 39: Anzahl erfasster Star-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**89. Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)**

Knapp außerhalb des NSG:

Zwischen dem 18.01. und dem 20.02. konnten mehrfach je eine Wasseramsel oder Spuren von ihr an der Holmer Mühle beobachtet werden (Kleinert, Thieme).

**90. Ringdrossel (*Turdus torquatus*)**

Zwischen dem 12.04. und dem 03.05. konnten bis zu 8 Ind entdeckt werden. Die Ringdrosseln hielten sich sowohl im Heidebereich zwischen Wilsede und Undeloh als auch beim Wulfsberg und bei Bockheber auf (Grapentin, Hellberg, Jahn, Kleinert, Köster, Röhrs, Späth, Stolz, C.).

**91. Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)**

(siehe Karte 21)

19 Reviere

(Röhrs, Wormanns).

**92. Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)**

(siehe Karte 22)

28 Reviere

(Bauermeister, Koch, Kringel, Röhrs, Schreiner, Wormanns).




Abb. 40: Anzahl erfasster Trauerschnäpper-Revire im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**93. Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)**

1 Revier

im Schierhorner Moor (Mertens).

Brutzeitfeststellungen:

09.05. 1 M in den Wiesen östlich der Döhler Fuhren (Wormanns).

30.04. 1 Ind. im Tütsberger Grünland singend (Flügge).

25.07. 1 Ind. in Brache östlich des Tütsberger Grünlandes (Wormanns).

03.06. 1 Ind. am Westrand der Bockheberer Feldflur (Wormanns).




Abb. 41: Anzahl erfasster Braunkehlchen-Revire im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Heimzug:

26.04. und 27.04. je 1 M östlich und westlich der Straße zwischen Wilsede und Undeloh (Köhler).

26.04. 2 M, 1 W am Schneverdinger Weg, Südwestecke Ringwallheide (Wormanns).

#### 94. Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

(siehe Karte 23)

116 Reviere

(Bauermeister, Broocks, Flügge, Gröhn, Heer, Kleinert, Kowalski, Kringel, Krohn, Maaß, Mertens, Meyer, J., Pantelmann, Putensen, Röhrs, Wormanns).




Abb. 42: Anzahl erfasster Schwarzkehlchen-Revier im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

#### 95. Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Heimzug:

16.05. 1 Ind. im Wilseder Hutewald singend (Kaufmann).

21.05. 1 Ind. singt am Südostrand der Ringwallheide (Kringel).

#### 96. Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

(siehe Karte 24)

92 Reviere

(Allmer, Bauermeister, Kowalski, Kringel, Röhrs, Sauerwein, F., Schmidt, Thieme, Wormanns).




Abb. 43: Anzahl erfasster Gartenrotschwanz-Revier im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

### 97. Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1 Revier

1 Revier in der Braunauheide-Südwest (Bauermeister, Flügge, Fröhnberg, Hellberg, Kleinert, Kringel, Krohn, Meyer, J., Rathgeber, Thieme).




Abb. 44: Anzahl erfasster Steinschmätzer-Revier im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Im Zeitraum vom 13.04. bis zum 23.09. wurden im NSG LüH im Jahr 2014 Steinschmätzer beobachtet. Die Beobachtungen gelangen im Bereich vom Radenbachtal und der Hörpeler Heide bis zur Osterheide/Camp Reinsehen und der Steinwiese bei Hof Pietz. Besonders häufig tauchten sie im Bereich zwischen dem Wulfsberg und dem Tütsberg auf.

35 der 48 Beobachtungen stammen aus dem April und Mai, die restlichen 13 Beobachtungen liegen in den Monaten Juli bis September. Aus dem Juni liegen keine Beobachtungen vor.

(Albers, S., Bauermeister, Flüge, Frohnberg, Hellberg, Höchtl, Jahn, Kleinert, Kringel, Krohn, LBV Ortsgruppe München, Mertens, Meyer, J., Pantelmann, Putensen, Rathgeber, Röhrs, Thieme, Wormanns,

Am 12.05. sah Joachim Meyer 20 Ind. gleichzeitig in der Brunauheide-Südwest (Meyer, J.).

### 98. Haussperling (*Passer domesticus*)

6 Standorte

Die Haussperlinge sind wahrscheinlich an noch deutlich mehr Orten im NSG Lüh anzutreffen als hier beschrieben. Dokumentiert wurden sie aber nur an den folgenden Orten.

Schafstall Hörpeler Heide mind. 10 Ind., längst nicht mehr so viele wie im vergangenen Jahr (Buttmann).

Wilsede (Bereich Heidemuseum) hier nur am 22.05. 1 W und am 19.08. 1 Paar gesehen (Wormanns).

Wilsede (Bereich Witthöft's Gästehaus hier am 08.11. mind. 10 Ind. notiert (Wormanns).

Niederhaverbeck 1 Paar am Haverbeckhof, 1 Paar an der Geschäftsstelle des VNP (Wormanns).

Oberhaverbeck am 16.09. mind. 7 Ind. (Wormanns).

### 99. Feldsperling (*Passer montanus*)

(siehe Karte 25)

15 Reviere

(Flüge, Wormanns).




Abb. 45: Anzahl erfasster Feldsperling-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

Weitere Beobachtungen:

05.02. 2 Ind. in Feldflur nördlich Oberhaverbeck (Wormanns).

11.11. 3 Ind. in der Feldflur nordwestlich des Tütsberges (Wormanns).

Im Oktober ca. 40 Ind. in der Feldflur am Südwestrand des Pietzmoores (Wormanns).

**100. Brachpieper (*Anthus campestris*)**

05.09. 1 Ind. beim Tütsberg (Bokampe).

**101. Baumpieper (*Anthus trivialis*)**

(siehe Karte 26)

395 Reviere

(Bauermeister, Kringel, Rieckmann, Röhrs, Schmidt, Thieme, Wormanns).




Abb. 46: Anzahl erfasster Baumpieper-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**102. Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)**

4 Reviere

1 Revier Hörpeler Heide-Südost (Wormanns).

1 Revier Wilseder Berg-Süd (Röhrs).

1 Revier Surhorn (Röhrs).

1 Revier Heide am Wulfsberg-Südost (Röhrs).

**103. Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)**

4 Reviere

1 Revier Hof Sudermühlen, Mühlteich (Wormanns).

1 Revier Schmale Aue auf Höhe Hörpeler Heide (Wormanns).

1 Revier Wilsede (Wormanns).

1 Revier Niederhaverbeck (Wormanns).

**104. Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)**

(siehe Karte 27)

18 Reviere

(Flügge, Gröhn, Kleinert, Kringel, Mertens, Röhrs, Wormanns).

**105. Stieglitz (*Carduelis carduelis*)**

(siehe Karte 28)

20 Reviere

(Bauermeister, Hessing, Kleinert, Kringel, Wormanns).




Abb. 47: Anzahl erfasster Stieglitz-Reviere im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“.

**106. Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)**

(siehe Karte 29)

31 Reviere

(Kleinert, Kringel, Röhrs, Wormanns).

**107. Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)**

Zwischen dem 03.04. und dem 20.04. wurden im NSG im gesamten Bereich zwischen dem Radenbachtal und der Osterheide östlich von Schneverdingen Birkenzeisige beobachtet (Köster, Kohls, Röhrs, Stolz, C., Wormanns, Wübbenhorst).

Es waren Einzelvögel oder Trupps von bis zu 60 Ind. Nur in einem Fall hielten sich rund 200 Ind. in Wacholdern bei Niederhaverbeck auf (Wormanns). Einige dieser Vögel waren mit Sicherheit Birkenzeisige, ob es sich allerdings bei dem gesamten Trupp um Birkenzeisige gehandelt hat konnte nicht ermittelt werden. Polarbirkenzeisige konnten nicht angesprochen werden.

Zum Teil sangen die Vögel auch, ob es sich um tatsächliche Revierverteidigungen handelt bleibt aber offen.

**108. Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)**

9 Reviere


Von den 9 Revieren liegen allein 6 Reviere im Gebiet der Holmer Teiche (Kringel, Wormanns).


1 Revier Twieselmoor (Kowalski, Kringel, Wormanns).


1 Revier Benninghöfer Teich (Wormanns).


1 Revier Pietzmoor-Süd (Röhrs).


### 3. Kartenteil























































































**VNP–Schriften**  
**Schriftleitung: Prof. Dr. Thomas Kaiser**  
**Niederhaverbeck**  
**ISSN 1867-1179**



**Bisher erschienene Ausgaben der VNP-Schriften**

- MERTENS, D., MEYER, T., WORMANNS, S., ZIMMERMANN, M. (2007): 14 Jahre Naturschutzgroßprojekt Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **1**: 139 S.; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2008): Strategieentwicklung zur konzeptionellen Integration von Wald und Offenland in der historischen Kulturlandschaft - Pflege- und Entwicklungsplan für die Waldflächen des Vereins Naturschutzpark e. V. im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **2**: 365 S. + 1 Karte; Niederhaverbeck.
- WORMANNS, S. (2012): Vogelkundlicher Jahresbericht 2009 - Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **3**: 74 S.; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (Herausgeber) (2013): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 1. – VNP-Schriften **4**: 412 S.; Niederhaverbeck.
- KOPERSKI, M. (2014): Moose im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **5**: 205 S.; Niederhaverbeck.
- WEGNER, H., MERTENS, D. (2014): Schmetterlinge (Lepidoptera) im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **6**: 95 S.; Niederhaverbeck.
- WORMANNS, S. (2014): Vogelkundliche Jahresberichte 2010 bis 2013 – Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **7**: 206 S.; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (Herausgeber) (2015): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – Natur- und Kulturerbe von europäischem Rang. Teil 2. – VNP-Schriften **8**: 399 S.; Niederhaverbeck.
- WORMANNS, S. (2015): Vogelkundlicher Jahresbericht 2014 – Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **9**: 88 S.; Niederhaverbeck.

**Bestelladresse**

Verein Naturschutzpark e. V., Niederhaverbeck 7, 29646 Bispingen,  
 Tel. 05198/987030, Fax 05198/987039, Email [vnv-info@t-online.de](mailto:vnv-info@t-online.de)  
 oder als kostenloser Download unter [www.verein-naturschutzpark.de](http://www.verein-naturschutzpark.de)

