

Ein Beitrag zur Kenntniss der Laubmoose aus dem Süden des Trentschiner Comitates.

Zusammengestellt von **Franz Matouschek**, Gymnasial-Professor zu Reichenberg in Böhmen.

Herr Josef L. Holuby, evang. Pfarrer in Nemes-Podhrad bei Trentschin, übermittelte mir ein Verzeichnis sämtlicher, durch ihn im Trentschiner Comitате und zwar besonders in dessen südlichem Theile, gesammelter Laubmoose, mit einigen Moosproben aus diesem Gebiete. Er erlaubte mir bei seiner bekannten Bescheidenheit das Verzeichnis zu publicieren. Für all' das spreche ich ihm hier meinen wärmsten Dank aus. Da es sicher wünschenswerth erscheint, alle Moosfunde des so bekannten Botanikers aus obengenanntem Gebiete mitzuth eilen, so übernahm ich mit Freude die Aufgabe, die Funde nach dem Limpricht'schen Systeme zu ordnen und zu publicieren. Herr Pfarrer Holuby hat in früheren Jahren Einiges über Trentschiner Moose bereits veröffentlicht und zwar: 1. im Jahrbuch der „Slovenská Matica“, 1871, II. 16 – 34., betitelt „Prvotiny kvetny mochov listnatých okolia Zemansko Podhradského“ (Erstlinge einer Moosflora der Umgebung von Nemes-Podhrad), 2. im Jahrbuch der „Slovenská Matica“ 1871, I. 1 – 43, betitelt: „Kvetna Javoriny nad Lubinou“ (= Flora der Javorina bei Lubina), wo auch mehrere Moose erwähnt werden. 3. in Dr. Skofitz's „Österreichische botanische Zeitschrift“, XIX. 143 – 146, betitelt: „Zur Moosflora des Inovec“. Inovec ist ein Gneissberg südlich von Trentschin, 1042 m hoch. 4. in derselben Zeitschrift XX. 238 – 241, betitelt: „Die Lebermoose von Nemes-Podhrad“ und 5. in Dr. Kanitz's „Magyar növénytani Lapok, Kolozsvár“, I. 5 – 7, betitelt „Pótdatok Nemes-Podhragy mohvirányához“ (= Nachträge zur Moosflora von Nemes-Podhrad).

Besonders wichtig ist der Umstand, dass J. Juratzka seinerzeit alle Moosfunde Holuby's revidiert hat. Bei den mir gütigst von Herrn Pfarrer Holuby

gesandten Funden, die aus den letzten Jahren stammen, habe ich ein Ausrufzeichen (!) angebracht.

Zum Schlusse erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass ich jederzeit gerne bereit bin, Moossammlungen (Moosherbare) jüngeren und älteren Datums zu revidieren oder zu bestimmen und die Resultate von Fall zu Fall in bestimmten Zeitschriften zu publicieren. Auch gebe ich gerne Jüngern der Bryologie, die sich in diesen Zweig der Kryptogamenkunde einarbeiten wollen, alle hierauf bezüglichen Anleitungen, da es wünschenswerth erscheint, dass auch andere Gebiete des weiten Ungerlandes bryologisch durchforscht werden.

Sphagnum acutifolium Ehrh. Auf steinigem Boden des Wäldchens Kameničné, bisher nur in zwei mächtigen Polstern. (Sphagna scheinen im Gebiete sehr selten zu sein.)

Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hpe. Nemes-Podhrad.

Ephemerella recurvifolia (Dicks.) Schimp. Zerstreut auf feuchten Äckern.

Acaulon muticum (Schreb.) C. Müller. (= Sphaerangium muticum (Schreb.) Schpr. Auf Äckern.

Microbryum Floerkeanum Web. et Mohr. Auf Kleefeldern im Waagthale bei Štvrtek, wo es Herr Pfarrer Holuby vor vielen Jahren für *Geheeb* kurz nach Weihnachten in reinen Rasen gesammelt hat; ferner bei Bošác und Nemes-Podhrad.

Phascum cuspidatum Schreb. Häufig auf Äckern.

P. curvicolium Ehrh. Štvrtek, auf Maulwurfshügeln.

Mildeella bryoides (Phascum Dicks.) Limpr. Gemein an Wegen im Weingebirge.

Astomum crispum (Phascum Hedw.) Hampe, (= Systegium crispum Schpr.) Auf Hügeln unter Gebüsch.

Pleuridium alternifolium (Archidium Schp., Phascum Dicks.) Rabenh. Grasige Abhänge bei Nemes-Podhrad.

Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Brown. Beczkov. Berg Budišová bei Bošác.

H. tortile (Schwägr.) Br. eur. Kalkfelsen der Burgruine Beczkov.

Weisia viridula (L.) Hedw. Gemein in Wäldern auf der Erde.

Eucladium verticillatum (L.) Bryol. eur. An Quellen auf Tuff bei Nemes-Podhrad.

Dichodontium pellucidum (L.) Schimp. Auf Steinen im Walde Lopeník am Bachufer.

Dicranella varia (Hedw.) Schimp. Grabenabhänge, Tuff an Quellen.

Dicranum undulatum Ehrh. In Wäldern, seltener als *D. scoparium* (L.) (= *D. palustre* La Pyl.)

D. Bonjeani de Not. var. *polycladon* Br. eur. Wald Kameničné bei Bošác.

D. scoparium (L.) Hedw. Gemein.

D. Mühlenbeckii Br. eur. Bergwiesen des Bošácer-Thales häufig.

D. longifolium (Hedw.) Ehrh. Berg Inovec auf Gneissfelsen.

Leucobryum glaucum (L.) Schimp. Inovec; Kameničné bei N.-Podhrad.

Fissidens bryoides (L.) Hedw. Štvrtek; Gräben bei Bošác.

F. incurvus St. Begraste Ackerränder bei N.-Podhrad.

F. pusillus Wils. Fand Juratzka in Holuby's Gesellschaft auf nassen Stellen bei einer Quelle in N.-Podhrad (1876).

F. crassipes Wils. Überzieht dicht Steine bei der Mühle nächst dem Pfarrhause zu N.-Podhrad; auch im Bache oberhalb N.-Podhrad.

F. Arnoldi R. Ruthe. Zwischen *F. crassipes* an berieselten Stellen bei der Mühle zu N.-Podhrad.

F. adiantoides (L.) Hedw. Im Erlengebüsch des oberen Bošác-Thales.

F. decipiens de Not. Wald Kameničné und Rešetárovec.

F. taxifolius (L.) Hedw. Gemein in Wäldern.

Seligeria recurvata (Hedw.) Br. eur. Auf Sandsteinen im Bošácer-Thale.

Ceratodon purpureus (L.) Brid. Gemein.

Ditrichum tortile (Schrad.) Lindb. Wald Jastrabské bei Bošác.

D. flexicaule (Schleich.) Hampe. Kalkfelsen bei N.-Podhrad.

D. glaucescens (Hedw.) Hpe. An quelligen steinigen Stellen bei N.-Podhrad.

Pterygoneurum cavifolium (Pottia Ehrh.) Jur. Kleefelder, Felsen.

— *var. incanum* (Br. germ.) Jur. Haluzice, Srnie.

Pottia minutula (Schleich.) Br. eur. Äcker, Schotterbänke der Bäche.

P. truncatula (L.) Lindb. Budišová; Lysica bei Bošác.

P. intermedia (Turn.) Fűrnr. Mit der vorigen.

P. lanceolata (Hedw.) C. Müll. Äcker, Hügel.

P. Starkeana (Hedw.) C. Müll. Wald Budišova; Wäldchen bei der Schule in den Bošácer Rodungen.

Didymodon rubellus (Hoffm.) Br. eur. Am Grunde alter Bäume bei Bošác.

D. tophaceus (Brid.) Jur. An Quellen, selten.

D. rigidulus Hedw. Wald Kameničné; Budišová bei Bošác.

D. spadiceus (Mitten) Limpr. Berg Špámě bei Bošác; am Bache bei N.-Podhrad.

Trichostomum crispulum Bruch. Wald Rešetárovec; Thal Chůmy bei Bošác.

Tortella tortuosa (L.) Limpr. In Wäldern.

Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. Auf Brachen, Feldrändern, an Wegen gemein.

— *var. cuspidata* (Schultz) Br. eur. Štvrtek.

B. fallax Hedw. Wald Kameničné Ivanótzter Wälder.

B. gracilis (Schleich.) Schwgr. Štvrtek, Beczkov, Bohuslavice, N.-Podhrad.

B. convoluta Hedw. Wald Rešetárovec; Bošácer Rodungen.

Aloina rigida (Barbula Hedw. ex p.) Kindb. Štvrtek, auf Kalkfelsen.

A. ambigua (Br. eur.) Limpr. N.-Podhrad.

Tortula muralis (L.) Hedw. Auf Mauern, Steinen häufig; auf Nussbäumen bei N.-Podhrad. c. fr. (det. Matouschek).

T. subulata (L.) Hedw. Überall in Wäldern.

— *var. angustata* (Wils.) Burgruine Beczko.

T. papillosa Wils. Auf alten Pappeln (*Populus pyramidalis*) bei N.-Podhrad.

T. pulvinata (Jur.) Limpr. N.-Podhrad; Halusice; Beczkov.

T. ruralis (L.) Ehrh. Überall auf Strohdächern, am Grunde alter Bäume.

Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. Auf Steinen gemein.

Sch. confertum (Funck) Br. eur. Halusice; Beczkov.

Grimmia pulvinata (L.) Smith. Auf Steinen gemein.

G. commutata Hüb. Kalkfelsen bei Halusice, Beczkov, N.-Podhrad.

Dryptodon Hartmani (Schimp.) Limpr. Gneisfelsen des Inovec.

Racomitrium canescens (Weis) Brid. Auf Hügeln stellenweise massenhaft.

Hedwigia albicans (Web.) Lindb. Kalkfelsen bei N.-Podhrad.

Ulotia Ludwigi (Brid.) Brid. Auf alten Haselstämmen im Wäldchen Kameničné bei Bošác.

U. Bruchii Hornsch. Auf Erlen selten im Bošác-Thale.

U. crispula Bruch. Auf Erlen, Eichen.

Orthotrichum anomalum Hedw. Felsen.

O. cupulatum Hoffm. Auf Felsen.

O. diaphanum (Gmel.) Schrad. Holzgeländer an Gärten bei Bošác.

O. pallens Bruch. Felsen und auch auf Bäumen.

O. stramineum Hornsch. Auf Dächern.

O. patens Bruch. Auf Dächern.

O. pumilum Sw. Dächer, Bäume.

O. fastigiatum Bruch. Dächer.

O. affine Schrad. Dächer, Bäume.

O. speciosum Nees. Ebenda.

O. leiocarpum Br. eur. Ebenda.

O. obtusifolium Schrad. Nuss- und Pappelbäume, häufig.

Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. Thal Chůmy bei Bošác.

E. ciliata (Hedw.) Hoffm. Wald Rešetárovec; Felsen Landrovec bei N.-Podhrad.

E. contorta (Wulf.) Lindb. Felsen des Kalkbruches am Turecko; Wald Kameničné.

Georgia pellucida (L.) Rabenh. (= *Tetraphis pellucida* Hedw.) Ivanótzter Wälder selten; sehr häufig auf morschen Stämmen auf dem Berge Malý Kriván c. fr. VI. 1901 (!)

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. Äcker bei N.-Podhrad, Bošác, Halusice.

Physcomitrium pyriforme (L.) Brid. Štvrtek, am Grund alter Weidenbäume.

Entosthodon fascicularis (Dicks.) C. Müller. Evangelischer Friedhof bei N.-Podhrad.

Funaria hygrometrica (L.) Schimp. Auf Brandstätten gemein.

Leptobryum pyriforme (L.) Schimp. Štvrtek.

Webera elongata (Hedw.) Schwgr. Wald Kameničné.

W. cruda (L.) Bruch. Wälder.

W. nutans (Schreb.) Hedw. Wald Kameničné.

Mniobryum carneum (L.) Limpr. An Quellen selten.

M. albicans (Wahl.) Limpr. An Quellen.

Bryum inclinatum (Sw.) Br. eur. Wald Kameničné.

B. bimum Schreb. Špánie bei Bošác, auf Tuff.

B. capillare L. Auf Hügeln bei Bošác.

B. caespiticiun L. Häufig.

B. atropurpureum Wahl. Sandbänke der Waag bei Štvrtek.

B. Funckii Schwgr. An Quellen bei Bošác.

B. argenteum L. Gemein, auch auf Dächern und Mauern.

B. pallens Sw. Wald Rešetárovec; Ivanótzter Wälder.

B. turbinatum (Hedw.). Schwgr. Am Bache bei Podhrad.

B. pseudotriquetrum (Hedw. ex p.) Schwgr. Auf Tuff im Bošác-Thale mit *Hypnum commutatum* c. fr. 1900 (!)

Rhodobryum roseum (Weis) Limpr. In feuchten Gebüsch des Bošác-Thales.

Mnium serratum Schrad. Wald Lopeník; Rešetárovec.

M. undulatum (L.) Weis. Wälder, Obstgärten.

M. rostratum Schrad. Wald Rešetárovec; Ivanótzter Wald.

M. cuspidatum (L. ex p.) Leyss. Nasse Stellen der Bergwiesen.

M. affine Bland. Quellige Bergwiesen des Bošác-Thales.

M. Seligeri Jur. Quellige Bergwiesen; schön fruchtend auf der Wiese Mičkovka bei N.-Podhrad.

M. stellare Reich. Wälder.

M. punctatum (L.) Hedw. Waldwege.

Meesea Albertini (Alb.) Br. eur. Am Rande eines Sauerlinges auf Tuff im Bošácer-Thale.

Bartramia pomiformis (L. ex p.) Hedw. Wälder.

Philonotis calcarea (Br. eur.) Schimp. An quelligen Bergwiesen, z. B. ad acidulam Haluzicensem, copiose, c. fr. 20. VII. 1901 (!)

P. fontana (L.) Brid. An Quellen auf Kalktuff.

Catharina undulata (L.) Web. et Mohr. Gemein in Wäldern und auf buschigen Hügeln.

Pogonatum nanum (Schreb.) P. Beauv. Wald Kameničné.

P. aloides (Hedw.) P. Beauv. Ebenda; ferner Kálnica, Lopeník.

P. urnigerum (L.) P. Beauv. Wald Kameničné.

Polytrichum formosum Hedw. Ebenda.

P. piliferum Schreb. Ebenda; Wald bei der Schule in den Bošácer Rodungen.

P. juniperinum Willd. Wälder.

P. commune L. Lopeník.

Buxbaumia aphylla L. Einmal in den Bošácer-Rodungen „Dahatné“.

Diphyscium sessile (Schmidel) Lindb. (= *D. foliosum* (L.) Häufig in Wäldern.

Fontinalis antipyretica L. Im Bache oberhalb N.-Podhrad; massenhaft im Waldbache bei Kálnica unterhalb Bečzkov, stellenweise ganze Tümpel ausfüllend. — Kunerád bei Rajec (Dr. V. von Borbás).

Leucodon sciuroides (L.) Schwgr. Gemein; fruchtend aber selten, z. B. N.-Podhrad, auf einem Nussbaume, IV. 1901 (!) und im Bošácer-Thale auf Bäumen, 8. III. 1900 (!)

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. Am Fusse des Inovec-Berges bei Selec.

Neckera pennata (L.) Hedw. Auf Rinden von Waldbäumen.

N. crispa (L.) Hedw. Auf Felsen.

N. complanata (L.) Hüb. Wälder.

N. Besseri (Lob.) Jur. Felsen der Rešetarovec (determ. Sanio).

Homalia trichomanoides (Schreb.) Br. eur. Am Grunde von Baumstämmen im Bošácer-Thale.

Anacamptodon splachnoides (Fr.) Brid. Bošácer-Wald „Jastrabské“ am Stamme einer alten Buche.

Leskea nervosa (Schwgr.) Myrin. Wälder.

L. catenulata (Brid.) Mitten. Wälder.

L. polycarpa Ehrh. Auf Baumstämmen gemein.

Anomodon viticulosus (L.) Hook. et Taylor. Häufig in Wäldern.

A. attenuatus Schreb. (Hüb.) In Wäldern.

A. longifolius (Schleich.) Bruch. Häufig in Wäldern.

Pterigynandrum filiforme (Timm.) Hedw. Wälder.

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Br. eur. Wald Kameničné.

T. delicatulum (Dill.) Mitten. Wälder und Bergwiesen.

T. abietinum (Dill.) Br. eur. Auf Hügeln massenhaft; fruchtend: in dumetis prope Haluzice, 27. IX. 1900 (!)

Pylaisia polyantha (Schreb.) Br. eur. Gemein auf Baumstämmen.

Climacium dendroides (Dill.) Web. et Mohr. Feuchte Wiesen.

Isoetecium myurum (Poll.) Brid. Wälder, Felsen.

Homalothecium sericeum (L.) Br. eur. Auf Kalkfelsen und am Grunde alter Baumstämmen bei N.-Podhrad, Haluzice.

H. Phillippeanum (Spr.) Br. eur. Massenhaft auf Kalkgerölle in Wäldern bei N.-Podhrad.

Camptothecium lutescens (Huds.) Br. eur. Gemein auf buschigen Stellen; fruchtend in dumetis ad Haluzice, 18. IV. 1899 (!)

C. nitens (Schreb.) Schimp. An Quellen der Bošácer Rodungen.

Brachythecium Mildeanum (Schpr.) Schimp. N.-Podhrad; Haluzice.

B. salebrosum (Hoffm.) Br. eur. Feuchte Gebüsche im Bošácer-Thale.

— *var. pratense* Klinggr. Haluzice.

— *var. cylindricum* Schpr. Auf alten Weidenbäumen bei N.-Podhrad.

B. campestre (Bruch) Br. eur. Haluzice.

B. populeum (Hedw.) Br. eur. Wald Kameničné.

B. velutinum (L.) Br. eur. Wälder, gemein.

— *var. intricatum* (Hedw.) Br. eur. Berg Lopeník.

B. rutabulum (L.) Br. eur. An Bächen, auf Steinen in Brunnen.

B. reflexum (St.) Br. eur. Berg Inovec unterhalb Trentschin.

B. glareosum (Bruch) Br. eur. N.-Podhrad.

B. albicans (Neck.) Br. eur. N.-Podhrad; Halusice.

B. rivulare Br. eur. An Bächen überall.

Scleropodium purum (L.) Limpr. Grasplätze.

Eurhynchium strigosum (Hoffm.) Br. eur. In Wäldern.

E. striatum (Schreb.) Schimp. Ebenda.

E. striatulum (Spr.) Br. eur. Ebenda.

E. piliferum (Schreb.) Br. eur. In Grasgärten.

E. praelongum (L.) Br. eur. Auf der Erde in Obstgärten.

E. Schleicheri (Hedw. fil.) Lor. Wald Jarolinka bei N.-Podhrad.

Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. Trentschiner Burg (legit Bäumler).

Rhynchostegium murale (Neck.) Br. eur. Wälder.

— var. *julaceum* Br. eur. N.-Podhrad.

R. rusciforme (Neck.) Br. eur. An Bächen, in Brunnen auf Steinen.

Thamnium alopecurum (L.) Br. eur. Auf feuchten Felsen bei Kis-Podhrad.

Plagiothecium silvaticum (Huds.) Br. eur. Wälder und an Wegen.

P. Roeseanum (Hpe.) Br. eur. Wald Jarolinka bei N.-Podhrad.

P. denticulatum (L.) Br. eur. Wald Javorina (im Neitraer Comitate).

— var. *tenellum* Br. eur. Wald Lopeník.

P. silesiacum (Sel.) Br. eur. Ebenda.

Amblystegium subtile (Hedw.) Br. eur. Am Grunde alter Baumstämme.

A. filicinum (Hypnum L.) de Not. An Quellen gemein.

A. fluviatile (Sw.) Br. eur. Waag-Arm bei Štvrtek.

A. serpens (L.) Br. eur. Häufig am Grunde alter Baumstämme.

A. radicale (P. B.) Mitten. N.-Podhrad; Bošácer-Rodungen.

A. Juratzkanum Schimp. Ebenda.

A. riparium (L.) Br. eur. Am Bachufer im Bošácer-Thale.
— Trentschin (legit? im Reichenberger Gymnasialherbare).

A. leptophyllum Schpr. Einmal bei N.-Podhrad.

A. Kochii Br. eur. Bošác und Rešetárovec bei N.-Podhrad;
Štvrteker-Sumpf.

Hypnum Sommerfeltii Myr. Auf Steinen in Gebüsch.

H. chrysophyllum Brid. In Wäldern gemein.

H. stellatum Schreb. Feuchte Gebüsch z. B. bei N.-Podhrad
(hier in der var. *tenue*).

H. uncinatum Hedw. Inovec.

H. Sendtneri Schimp. (= *Amblystegium* S. de Not.)
Štvrteker-Sumpf.

H. Wilsoni Schimp. Ebenda.

H. aduncum Hedw. Thal Chúmy bei Bošác; Štvrteker-
Sumpf.

H. commutatum Hedw. Kalktuffabsetzende Quellen im
Bošácer-Thale gemein.

H. molluscum Hedw. Gemein in Wäldern.

H. incurvatum Schrad. Wald Kameničné.

H. reptile Rich. Wälder bei N.-Podhrad.

H. Vaucheri Lesqu. An einer Quelle im Walde Rešetárovec.

H. cupressiforme L. Gemein.

— var. *filiforme* Brid. Auf Buchen.

H. resupinatum Wils. Bei Kálnica; nächst Bošác.

H. Lindbergii (Lindb.) Mitten. Bošácer-Rodungen.

H. Haldanianum Grev. Gebüsch bei Nemes-Podhrad.

H. palustre Huds. An Waldbächen.

— var. *hamulosum* Br. eur. Wald Rešetárovec.

Acrocladium cuspidatum (*Hypnum* L.) Lindbg. An feuchten
Stellen und Quellen häufig.

Hylocomium splendens (Dill.) Br. eur. Gemein.

H. Schreberi (Willd.) de Not. In Gebüsch.

H. triquetrum (L.) Br. eur. Gemein.

H. squarrosum (L.) Br. eur. Häufig auf feuchten Gras-
plätzen am Kamme des Lopeník.

H. rugosum (*Hypnum* Ehrh.) de Not. Nadelwald beim
Haluzicer Sauerbrunnen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [NF_13](#)

Autor(en)/Author(s): Matouschek Franz

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Kenntniss der Laubmoose aus dem Süden des Trentschiner Comitates 43-52](#)