

Floristisches aus der Umgebung des Neusiedler Sees*

Von Dr. K. H. Rechinger fil. (Wien).

Im nachfolgenden gebe ich eine Aufzählung aller von meinem Vater und mir in den Jahren 1922—1932 gemachten Pflanzenfunde aus dem nördlichen Burgenlande. Einige wenige Funde meines Vaters aus früherer Zeit und eine geringe Anzahl Funde befreundeter Botaniker — besonders von Dr. J. Scheffer (Bratislava) — wurden ohne besondere Kennzeichnung mit aufgenommen, da sie zumeist von gemeinsamen Exkursionen stammen. Belege für fast alle Angaben befinden sich in der Sammlung meines Vaters.

Diese Aufzählung ist als Grundlage gedacht für eine künftige Flora dieses Gebietes und für Arealkarten einzelner Arten; in pflanzengeographischer Hinsicht ist ja die weitere Umgebung des Neusiedler Sees von besonderem Interesse, da eine große Zahl pannonicischer Arten hier ihre Westgrenze findet. Eine vorläufige Zusammenfassung des Florenbestandes dieser Gegend scheint aber auch deshalb dringend geboten, weil sich die Feldkulturen von Jahr zu Jahr mehr ausbreiten, der Weidebetrieb auf kleinere Flächen beschränkt aber immer intensiver und die ursprüngliche Flora so auf immer engere, oft nur mehr inselartige Flecken eingeengt wird. Dies gilt besonders für die flachen fruchtbaren Gebietsteile im Nordosten.

Landschaftlich und pflanzengeographisch gliedert sich das Gebiet um den Neusiedler See in mehrere Teile, die teils allmählich ineinander übergehen, teils sich recht scharf von einander abheben. Sie sollen hier kurz charakterisiert werden.

Der Südwesten des Gebietes ist erfüllt vom Rosaliengebirge und seinen Vorbergen als Ausläufer der Zentralalpen; es erreicht keine bedeutenden Höhen mehr (Heuberg, 746 m) steht aber klimatisch immerhin noch stark unter dem Einfluß der Alpen, ist also niederschlagsreicher, hat weniger starke Temperaturschwankungen und ein niedrigeres Jahrestemperaturmittel als die übrigen Teile des Gebietes. Das Gebirge ist reich bewaldet. Die Wälder haben stark mitteleuropäischen Flo-

* Diese Arbeit wurde anlässlich des Preisausschreibens des Heil- und Naturwissenschaftlichen Vereines, Bratislava-Pressburg, der naturwissenschaftlichen Sektion preisgekrönt.

download www.zobodat.at

rencharakter, auch vereinzelte präalpine Elemente treten auf. Daneben finden sich aber in niederen Lagen an günstigen Stellen wärmeliebende Arten. Wir haben auf unseren Exkursionen das Rosaliengebirge nur flüchtig berührt.

Vom Rosaliengebirge durch die Ebenfurter Senkung getrennt, schließt sich, von Südwesten nach Nordosten streichend der lange und breit hingelagerte Zug des Leithagebirges an. Es gipfelt im Sonnenberg 480 m, und ist klimatisch von den Alpen schon viel unabhängiger, also trockener und wärmer. Sein geologischer Aufbau ist kompliziert; es genügt hier seinen kristallinischen, aus Graniten bestehenden Kern, an den sich beiderseits mächtige Kalkbänke (Leithakalk) anlehnen, zu erwähnen. Auch im Leithagebirge finden sich geschlossene Wälder in größter Ausdehnung. Sie bestehen aber vorwiegend aus Eichen und ihr Unterwuchs und die Flora der Lichtungen trägt stark pannonischen Charakter. Auf der südöstlichen Abdachung wurden die Wälder durch den Weinbau stark zurückgedrängt. -- Ein niedriger, vom Rosalien- und Leithagebirge durch die Niederung des Vulkabaches fast ganz losgelöster Hügelrücken streicht nord-südlich entlang dem Westufer des Sees. Er ist weithin von Weingärten bedeckt; die Raine beherbergen aber noch reiche pannonische Florenreste, daneben spielen Wcisßdorn-, Rosen- und Brombeergebüsche eine bedeutende Rolle; auch Eichenwaldreste sind noch vorhanden.

Im Nordwesten geht das Leithagebirge in eine flache, terrassenartige Bodenschwelle über, die zu den Hainburger Bergen überleitet und die Leitha zum Ausbiegen nach Norden zwingt. Sie besteht aus Löß, fällt gegen Süden und Osten als ziemlich steile Stufe ab und begünstigt hier die Anlage von Weinbergen. Ihre Oberfläche trägt teilweise steppenartigen Charakter (z. B. Parndorfer und Zurndorfer Heide); teilweise treten Ausläufer der Eichenwälder des Leithagebirges auf. Heute steht freilich der weitaus größte Teil der Fläche in Kultur.

Die besprochene Lößschwelle leitet über zum „Seewinkel“, einem ganz flachen, sich wenig über das Seeniveau (113 m) erhebenden Landstrich im Osten des Sees. Als Bucht der kleinen ungarischen Tiefebene ist er durch stark kontinentales Klima ausgezeichnet und der Wirkung der Nord- und Ostwinde voll ausgesetzt. Zwei auffallende Züge kennzeichnen das

Bild dieser Landschaft. Der ~~ad erste~~ ist der vollständige Mangel an ursprünglichem Baumwuchs, der das Gebiet als echte Steppe erscheinen lässt. Floristisch stimmt diese im allgemeinen mit der oben erwähnten Lößschwelle überein. Auch hier werden die dem Ackerbau günstigeren Flächen von Jahr zu Jahr mehr in Kultur genommen, während die restlichen einer intensiven Beweidung unterliegen. Als neues Element in der Landschaft treten hier in nunmehr durch Weinbau schon stark beschränkter Ausdehnung Sanddünen hinzu, die einige charakteristische Pflanzenarten beherbergen. Der zweite auffallende Zug in der Landschaft ist das Vorkommen von seichten, aber oft sehr ausgedehnten Wasseransammlungen ohne Zu- und Abfluß „Lacken“ genannt. Der Wasserstand dieser Lacken unterliegt entsprechend den Jahreszeiten rhythmischen Schwankungen und ist im Winter am höchsten, während im Sommer die kleineren und seichteren Lacken oft vollkommen austrocknen und sich mit einer weißen Kruste von Salzen überziehen. Hier finden Halophyten ihre geeigneten Lebensbedingungen. Im Süden findet der Seewinkel seinen Abschluß durch den Hansag, einem ausgedehnten, jetzt zum großen Teil entwässerten Sumpfgebiet, das ich leider nicht aus eigener Anschauung kenne.

Der Neusiedler See ist im Vergleich zu seiner großen Fläche sehr seicht und bekanntlich starken Wasserstandsschwankungen unterworfen. Sein einziger bedeutender oberirdischer Zufluß ist der obengenannte, im Rosaliengebirge entspringende Vulkabach. Ursprünglich abflußlos, steht der See heute durch den Eirserkanal mit dem Flußgebiet der Raab in Verbindung. Die Wasserfläche wird von einem breiten, hochwüchsigen Schilfgürtel umsäumt, der an vielen Orten den Ausblick auf den See selbst verhindert und einer reichen Vogelwelt Unterkunft gewährt. Auch mitten im See gibt es noch einige Schilfinseln. Die Phanerogamenflora des Sees selbst ist auffallend artenarm.

*

In der Nomenklatur und systematischen Anordnung folge ich im allgemeinen der 3. Auflage (1922) von Fritsch, Exkursionsflora für Österreich und die ehemals österreichischen Nachbargebiete. — Ich möchte auch hier allen denjenigen bestens danken, die uns durch Bestimmung oder Revision einzelner kritischer Gattungen unterstützt haben; ihr Name ist jeweils in der Aufzählung genannt.

Erklärung der geographischen Bezeichnungen:

(siehe die Blätter: Wien Nr. 4757, Hainburg—Pressburg Nr. 4758, Wiener Neustadt Nr. 4856, Eisenstadt Nr. 4857, Ungar. Altenburg Nr. 4858, Neunkirchen—Aspang Nr. 4956, Oedenburg Nr. 4957, Kapuvar Nr. 4958 der Spezialkarte 1:75000). Die mit * bezeichneten Fundorte liegen in Niederösterreich.

Apetlon im „Seewinkel“	Mühlendorf bei Eisenstadt
Breitenbrunn am NW Ufer	Neudorf NO von Parndorf
Bruck an der Leitha*	Neusiedl am N Ufer
Donnerskirchen am W Ufer	Oggau am W Ufer
Eisenstadt am S Rand des Leithagebirges	Oslopp bei Gschies
Forchtenau im Rosaliengebirge	Pachfurt an der Leitha
Forchtenstein im Rosaliengebirge	Pamhagen im „Seewinkel“
Frauenkirchen im „Seewinkel“	Parndorf NO vom See
Gols im „Seewinkel“	Purbach am W Ufer
Gschies (Schützen am Gebirge)	Podersdorf am O Ufer im „Seewinkel“
am Vulkabach	Rehrau an der Leitha
Haglersberg (Hackelsberg) 317 m bei Jois	Russt am W Ufer
Halbthurn im „Seewinkel“	Sarasderf an der Leitha*
Höflein bei Eisenstadt	Sauerbrunn am Rosaliengebirge
Hölzelstein 154 m bei Gschies	Siegendorf an einem Zufluss des Vul-
Ilmitz im „Seewinkel“	kabaches
Jois (Gois) N Ufer	Sommerein am Leithagebirge*
Jungerberg 216 m bei Jois	St. Andrä im „Seewinkel“
Kaisersteinbruch 200 m im Leithagebirge	St. Margareten am W Hang des Russ-
Katzelsdorf an der Leitha bei Wiener Neustadt*	ter Hügelrückens
Königsschüssel, Hügel 212 m bei	Steinkogel 637 m, Rosaliengebirge*
Siegendorf	Waller im „Seewinkel“
Kobel, Hügel bei Winden	Wampeisdorf bei Wimpassing*
Loretto im Leithagebirge	Weiden am NO Ufer
Mannersdorf am Leithagebirge*	Wiesen-Siegle im Rosaliengebirge
Mönchhof am Rand des „Seewinkels“	Wilfleinsdorf an der Leitha bei Bruck*
	Wimpassing an der Leitha, W Rand des Leithagebirges*
	Winden N Ufer
	Zeilerberg 300 m bei Winden
	Zurndorf NO vom See

Filicinae

Polyodiaceae. *Polypodium vulgare* L.: Kobel. — *Asplenium ruta muraria* L.: Hölzelstein. — *Asplenium trichomanes* L.: Zeilerberg. — *Polystichum lobatum* (Huds.) Presl: Forchtenau. — *Nephrodium austriacum* (Jacqu.) Fritsch: Sauerbrunn. — *Nephrodium spinulosum* (Mill.) Stremmel: Sauerbrunn.

Equisetinae

Equisetaceae. *Equisetum arvense* L.: Weiden. — *Equisetum palustre* L.: Neusiedl. — *Equisetum ramosissimum* Desf.: Podersdorf, Weiden, Gschieß; f. *gracile* (A. Br.): Illmitz.

Coniferae

Pinaceae. *Pinus nigra* Arn.: Steinkogel.

Cupressaceae. *Juniperus communis* L.: Wimpassing, Königsschüssel, Zeilerberg.

Angiospermae - Dicotyledones

Betulaceae. *Betula pubescens* Ehrh.: Mannersdorf-Purbach. — *Alnus glutinosa* (L.) Gärtn.: Pachfurt. — *Alnus viridis* (Chaix) Lam. & DC.: Forchtenau. — *Carpinus betulus* L.: Wimpassing. — *Corylus avellana* L.: Zeilerberg.

Fagaceae. *Quercus cerris* L.: Bruck, Wimpassing. — *Quercus lanuginosa* Lam.: Rußt, Breitenbrunn, Zeilerberg, Hagersberg, Bruck. — *Quercus robur* L.: Kobel, Neusiedl, Bruck, Kaisersteinbruch. — *Quercus lanuginosa* x *robur*: Neusiedl, Bruck, Eisenstadt. — *Quercus sessiliflora* Salisb.: Bruck. — *Quercus lanuginosa* x *sessiliflora*: Eisenstadt, Bruck. — *Quercus robur* x *sessiliflora*: Bruck.

Salicaceae. *Salix alba* L. var. *caerulea* (Sm.) Koch f. *latifolia* Toepff.: Jois-Neusiedl. — *Salix aurita* L.: Forchtenau, Mannersdorf-Purbach. — *Salix caprea* L.: Neusiedl, Mannersdorf-Purbach, Kaisersteinbruch. — *Salix aurita* x *caprea*: Mannersdorf-Purbach. — *Salix cinerea* L.: Neusiedl, Purbach-Dönnerskirchen, Weiden, Bruck-Wilfleinsdorf, Gschieß, Forchtenau; var. *augustifolia* Döll: Bruck-Wilfleinsdorf. — *Salix aurita* x *cineraria*: Neusiedl-Jois. — *Salix fragilis* L. var. *angustifolia* Wim.: Wiesen; var. *discolor* Neirl.: Bruck-Wilfleinsdorf. — *Salix alba* x *fragilis*: St. Andrä, Neusiedl, Bruck-Wilfleinsdorf. — *Salix purpurea* L.: Neusiedl, Bruck; f. *gracilis* Wimm.: Neu-

siedl.-Jois. — *Salix triandra* L. var. *viridis* Spenn.: Gschieß, Neusiedl; f. *angustifolia* Ser.: Bruck-Wilfleinsdorf; f. *parvijolia* Schatz: Bruck-Wilfleinsdorf. — *Salix viminalis* L.: Bruck-Wilfleinsdorf.

Ulmaceae. *Ulmus suberosa* Mnch.: (= *U. glabra* Mill. = *U. campestris* auct.): Wimpassing, Haglersberg, Kaisersteinbruch, Bruck, Rußt-St. Margareten; var. *suberosa*: Haglersberg, Jois, Rußt-St. Margareten.

Urticaceae: *Urtica dioica* L.: Sauerbrunn. — *Parietaria officinalis* L.: Bruck-Rohrau.

Santalaceae. *Chesum Dollinerii* Murb.: Illmitz, St. Andrä, Apetlon-Wallern. — *Chesum ramosum* Hayne: Illmitz, Hölzelstein, Weiden-Podersdorf, St. Andrä, Haglersberg, Junggerberg.

Aristolochiaceae. *Asarum europaeum* L.: Mannersdorf-Purbach.

Polygonaceae. *Rumex acetosa* L.: Forchtenau, St. Andrä, Donnerskirchen-Gschieß. — *Rumex acetosella* L.: Jois, Gols, Gschieß-Oggau; ssp. *angiocarpus* Murb.: Sauerbrunn. — *Rumex conglomeratus* Murr.: Wimpassing, Jois, Weiden, Illmitz, Rohrau, Neusiedl. — *Rumex crispus* L.: Neusiedl-Jois, Bruck, Gols, Weiden, Illmitz, Podersdorf, Wilfleinsdorf-Kaisersteinbruch, Parndorf; var. *lingulatus* Schur: Illmitz. — *Rumex conglomeratus* x *crispus*: Illmitz, Winden, Weiden, Neusiedl. — *Rumex hydrolapathum* Huds.: Pachfurt. — *Rumex maritimus* L.: Pachfurt. — *Rumex obtusifolius* L. ssp. *agrestis* (Fr.): Sauerbrunn; f. *trigranis* Danser: Pachfurt; ssp. *silvester* (Wallr.): Sauerbrunn, Mannersdorf-Purbach; ssp. *transiens* (Simk.): Bruck-Parndorf. — *Rumex conglomeratus* x *obtusifolius* ssp. *silvester*: Weiden, Bruck-Rohrau. — *Rumex crispus* x *obtusifolius* ssp. *agrestis*: Sauerbrunn; *R. crispus* x *obtusifolius* ssp. *silvester*: Bruck-Rohrau. — *Rumex paluster* Sm.: Jois, Weiden, Gols, Pamhagen. — *Rumex conglomeratus* x *paluster*: Weiden. — *Rumex crispus* x *paluster*: Weiden, Jois, Gols. — *Rumex Patientia* L. ssp. *eu-Patientia* Rech. fil.: Eisenstadt, Podersdorf, Weiden, Gols, Jois, Haglersberg, Neusiedl, St. Andrä, Bruck-Parndorf. — *Rumex crispus* x *Patientia*: Eisenstadt-Höflein, St. Andrä, Illmitz, Weiden, Jois, Podersdorf, Neusiedl. — *Rumex obtusifolius* x *Patientia*: Parndorf. — *Rumex paluster* x *Patientia*: Weiden.

— *Rumex sanguineus* L.: Sauerbrunn. — *Rumex crispus x sanguineus*: Sauerbrunn. — *Rumex stenophyllus* Ledeb.: Podersdorf, Winden, Weiden, Gols, Illmitz, St. Andrä, Apetlon, Neusiedl, Jois. — *Rumex crispus x stenophyllus*: Gols, Jois. — *Rumex thyrsiflorus* Fingerh.: Wiesen, Eisenstadt-Siegendorf, Podersdorf-Weiden, Haglersberg. — *Polygonum amphibium* L. f. *terrestre*: Bruck-Rohrau. — *Polygonum aviculare* L.: Apetlon, Jois, Weiden, Neusiedl. — *Polygonum Brittingeri* Opiz: Gols. — *Polygonum Kitaibelianum* Sadl.: Apetlon, Podersdorf, Gols, Weiden-Neusiedl. — *Polygonum lapathifolium* L.: Gols.

Chenopodiaceae. *Chenopodium album* L.: Apetlon, Podersdorf, Weiden, Sauerbrunn. — *Chenopodium ficifolium* Sm.: Pachfurt. — *Chenopodium glaucum* L. var. *pseudo-rubrum* Aellen: Apetlon. — *Chenopodium murale* L.: Apetlon. — *Chenopodium opulifolium* Schrad.: Haglersberg, Weiden-Gols. — *Chenopodium vulvaria* L.: Bruck, Bruck-Rohrau.

Atriplex hastatum L.: Apetlon, Podersdorf; var. *succulentum* (W. K.): Apetlon; var. *microspermum* (W. K.): Apetlon, Podersdorf, Weiden-Neusiedl — *Atriplex litorale* L.: Apetlon, Podersdorf. — *Atriplex nitens* Schk.: Pachfurt. — *Atriplex oblongifolium* W. K.: Weiden, Weiden-Gols. — *Atriplex tataricum* L.: Apetlon, Weiden-Gols, St. Andrä; var. *incisum* (M. B.): Illmitz.

Campborosma oratum W. K.: Apetlon, St. Andrä, Podersdorf, Frauenkirchen-Podersdorf.

Sueda maritima (L.) Dum.: Podersdorf. — *Sueda pannonica* Beck: Apetlon, Podersdorf. — *Sueda salsa* (L.) Pall.: Apetlon, Podersdorf.

Salicornia herbacea L.: Apetlon, Podersdorf.

Salsola kali L.: Podersdorf, Mönchhof-Zurndorf, Weiden-Gols, Jois.

Amarantaceae. *Amarantus retroflexus* L. var. *Delilei* Richter & Lor.: Weiden. — *Amarantus silvester* Desf.: Weiden.

Portulacaceae. *Portulaca oleracea* L.: Jois, Bruck.

Caryophyllaceae. *Spergularia marginata* (DC.) Kittel: Apetlon, Illmitz, St. Andrä, Frauenkirchen, Neusiedl. — *Spergularia rubra* (L.) Presl: Apetlon, Weiden-Neusiedl, Gols, Münnersdorf.

Stellaria apetala Ucria: Weiden-Neusiedl. — *Stellaria media* (L.) Vill.: Rußt-St. Margareten. — *Stellaria neglecta* Wh.: Winden. — *Stellaria nemorum* L.: Mannersdorf-Purbach. —

Cerastium anomalum L.: St. Andrä, Illmitz. — *Cerastium arvense* L.: Purbach. — *Cerastium brachypetalum* Desp.: Rußt-Margareten, Oslopp-Oggau. — *Cerastium caespitosum* Gilib.: St. Andrä, Frauenkirchen-Podersdorf, Winden, Purbach. — *Cerastium glutinosum*: Fr.: Rußt-St. Margareten, Hölzelstein, Haglersberg, Mannersdorf. — *Cerastium pumilum* Curt.: St. Andrä, Illmitz, Mönchhof-Zurndorf, Mannersdorf. — *Cerastium semi-decandrum* L.: Rußt-St. Margareten; f. *genuinum* Rouy & Fouc.: Haglersberg, Podersdorf, Weiden-Podersdorf; f. *stenophyllum* Beck: Rußt-St. Margareten. — *Cerastium subtetrandrum* (Lge.) Murb.: St. Andrä, Frauenkirchen-Podersdorf, Weiden-Podersdorf, Weiden-Neusiedl, Neusiedl-Jois, Purbach. — *Cerastium viscosum* L.: Mannersdorf-Purbach.

Holosteum umbellatum L.: Frauenkirchen-Podersdorf. — *Minuartia fasciculata* (L.) Hiern.: Hölzelstein, Weiden, Gols. — *M. setacea* (Thuill.) Hay.: Weiden-Gols.

Arenaria leptoclados Guss.: Frauenkirchen-Podersdorf. — *A. serphylliolia* L.: St. Andrä, Podersdorf, Illmitz, Zeilerberg; var. *viscida* Lois.: Gols, Haglersberg, Gschieß.

Scleranthus annuus L.: Gols, St. Andrä. — *S. polycarpus* L.: Mönchhof-Zurndorf, Parndorf.

Agrostemma githago L.: Frauenkirchen-Podersdorf, Gschieß.

Silene conica L.: Illmitz, Podersdorf. — *S. multiflora* (Erh.) Pers.: Wallern, Illmitz, Podersdorf, Podersdorf-Weiden. — *S. nutans* L. Zeilerberg. — *S. otites* (L.) Wib.: Illmitz, Illmitz-Podersdorf, Apetlon, Podersdorf-Weiden, Weiden-Gols, Gols, Breitenbrunn-Winden. — *S. vulgaris* (Mnch.) Garcke: Podersdorf-Weiden, Kaisersteinbruch.

Lychnis flos cuculi L.: Purbach.

Viscaria vulgaris Röhl.: Kobel.

Melandryum album (Mill.) Garcke: Haglersberg. — *M. viscosum* (L.) Čelak.: St. Andrä, Illmitz, Weiden-Podersdorf, Parndorf, St. Margareten.

Kohlrauschia prolifera (L.) Kth.: St. Andrä, Haglersberg, Oggau-Oslopp, Weiden-Neusiedl.

Cucubalus baccifer L.: Podersdorf, Bruck-Rohrau.

download www.biodat.at

Dianthus armeria L.: Sauerbrunn. — *D. carthusianorum* L. ssp. *humilis* (Grisselich): Haglersberg. — *D. Pontederae* Kern.: Königschüssel, Illmitz, Illmitz-Podersdorf, Podersdorf-Weiden, Zeilerberg, Mannersdorf-Purbach, Purbach, St. Margareten.

Tunica saxifraga (L.) Scop.: Illmitz, Weiden-Gols, Podersdorf.

Vaccaria grandiflora (Fisch.) Jaub. & Spach.: Parndorf.

Berberidaceae. *Berberis vulgaris* L.: Rußt-St. Margareten

Mahonia aquifolium Nutt.: Halbthurn (Rand des Schloßgartens, verwildert).

Ranunculaceae. *Caltha cornuta* Sch. N. K.: Weiden-Podersdorf.

Nigella arvensis L.: Gols.

Isopyrum thalictroides L. f. *pilosum* Gáyer: Zeilerberg-Bruck.

Delphinium consolida L.: Gschieß.

Anemone grandis (Wender) Kern: Jungerberg, Zeilerberg, Haglersberg, St. Margareten. — *A. nigricans* (Störk) Fritsch: Gols, Weiden-Gols, Jungerberg, Zeilerberg, Wimpassing. — *A. grandis* x *nigricans*: Jungerberg, Zeilerberg. — *A. silvestris* L.: Zeilerberg.

Ranunculus acer L.: Weiden-Neusiedl, Purbach, Donnerskirchen-Oggau. — *R. arvensis* L.: St. Andrä; var. *tuberculatus* Koch: Sarasdorf - Kaisersteinbruch, Purbach Donnerskirchen, Gschieß. — *R. auricomus* L.: Mannersdorf-Purbach: — *R. bulbosus* L.: St. Andrä, Mannersdorf, Purbach, Winden. — *R. calthaefolius* (Rchb.) Bl. N. Sch.: Parndorf. — *R. circinatus* Sibth.: Weiden-Neusiedl, Weiden-Podersdorf. — *R. illyricus* L.: St. Andrä, Hölzelstein, Haglersberg, Purbach-Breitenbrunn. — *R. lateriflorus* W. K.: Parndorf-Neusiedl (1895). — *R. nemorosus* DC: Zeilerberg. — *R. polyanthemus* L.: St. Andrä, Weiden-Podersdorf, Wampersdorf. — *R. repens* L.: Mannersdorf-Purbach, Winden, Weiden-Neusiedl. — *R. sardous* L.: St. Andrä, Podersdorf. — *R. sceleratus* L.: St. Andrä, Podersdorf-Weiden, Weiden-Neusiedl. — *R. trichophyllum* Chaix: St. Andrä, Weiden-Neusiedl.

Myosurus minimus L.: St. Andrä.

Thalictrum galionoides Nestl.: St. Andrä, Illmitz. — *T. minus* L.: St. Andrä, Gols, Forchtenstein.

Adonis aestivalis L.: Winden, Purbach-Donnerskirchen. — *A. vernalis* L.: Zeilerberg, Mönchhof-Zurndorf, Parndorf-Jois.

Papaveraceae. *Papaver dubium* L.: Haglersberg, Oggau-Oslopp. — *P. rhoeas* L.: Haglersberg, Oggau-Oslopp. — *P. somniferum* L.: Jois (verwildert).

Corydalis pumila (Host) Reichb.: Jungerberg.

Fumaria officinalis L. var. *densiflora* Parl.: Purbach.

Cruciferae. *Lepidium campestre* (L.) R. Br.: Zeilerberg, Kobel. — *L. crassifolium* W K.: St. Andrä, Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf, Podersdorf. — *L. draba* L.: Gchieß, Winden. — *L. perfoliatum* L.: St. Andrä. — *L. ruderale* L.: St. Andrä, Frauenkirchen-Podersdorf.

Thlaspi arvense L.: Purbach-Donnerskirchen. — *T. perfoliatum* L.: Haglersberg, Weiden-Neusiedl.

Alliaria officinalis Andrz.: Rußt-St. Margareten, Zeilerberg-Bruck.

Sisymbrium Loeselii L.: Haglersberg, St. Margareten, Frauenkirchen-Podersdorf. — *S. orientale* L.: St. Andrä. — *S. sophia* L.: Frauenkirchen-Podersdorf. — *S. strictissimum* L.: Sauerbrunn.

Myagrum perfoliatum L.: Illmitz.

Diplotaxis muralis (L.) DC: St. Andrä, Jois. — *D. tenuifolia* (L.) DC: Frauenkirchen-Podersdorf.

Brassica nigra (L.) Koch: Siegendorf-Eisenstadt.

Barbarea vulgaris R. Br.: Gschieß-Oggau, Purbach-Breitenbrunn.

Roripa amphibia (L.) Bess.: Podersdorf, Illmitz. — *R. austriaca* (Cr.) Bess.: Donnerskirchen-Oggau. — *R. amphibia* x *austriaca*: Purbach, Donnerskirchen-Oggau. — *R. austriaca* x *silvestris*: Gschieß.

Armoracia lapathifolia Gilib.: Purbach (verwildert).

Cardamine bulbifera (L.) Cr.: Mannersdorf-Purbach.

Hutschinsia petraea (L.) R. Br.: Haglersberg.

Capsella bursa pastoris (L.) Med.: Rußt-St. Margareten.

Camelina microcarpa Andrz.: Gschieß, Breitenbrunn, St. Margareten.

Draba) majuscula* (Jord.) Rouy & Fouc.: Weiden-Podersdorf. — *D. oblongata* (Jord.) Wib.: Haglersberg. — *D. praecox* Stev.: Zeilerberg. — *D. spathulata* L.: Haglersberg, Zeilerberg. — *D. stenocarpa* (Jord.) Hay & Wib.: Haglersberg. — *D. subnitens* (Jord.) Rouy & Fouc.: Podersdorf.

Arabidopsis Thaliana (L.) Heynh.: Haglersberg, Mannersdorf-Purbach, Wimpassing.

Arabis auriculata Lam.: Zeilerberg, Purbach-Breitenbrunn, Weiden-Podersdorf.

Erysimum canescens Roth: Frauenkirchen-Podersdorf, Podersdorf, Weiden-Podersdorf, Weiden-Gols; f. *latifolium* Boiss: Haglersberg — *E. erysimoides* (L.) Fritsch: Loretto, St. Margareten. — *E. hieracifolium* L. Mühlendorf. — *E. repandum* L.: Frauenkirchen-Podersdorf, Mönchhof-Halbthurn.

Alyssum alyssoides L.: Illmitz, Hölzelstein, Jungerberg, Weiden-Neusiedl, Gols. — *A. montanum* L.: Jungerberg, Zeilerberg, Bruck, St. Margareten, Wimpassing.

Berteroa incana (L.) DC: Weiden-Podersdorf; var. *Baumgartneri* Boros: Gols, Podersdorf.

Hesperis tristis L.: Hölzelstein, Mönchhof-Zurndorf, Haglersberg, Zeilerberg, Purbach-Breitenbrunn, Rußt-St. Margareten.

Resedaceae. Reseda lutea L.: Eisenstadt, St. Margareten, Wallern; var. *crispia* I. Müller: St. Margareten. — *R. luteola* L.: Illmitz, Siegendorf-Eisenstadt.

Crassulaceae. Sedum acre L.: Königsschüssel, Haglersberg. — *S. boloniense* Lois.: Königsschüssel, Illmitz, Podersdorf. — *S. maximum* (L.) Krock: Rußt-St. Margareten.

Sempervivum tectorum L.: Haglersberg.

Saxifragaceae. Saxifraga bulbifera L.: Rußt-St. Margareten, Mannersdorf-Purbach. — *S. tridactylites* L.: Illmitz, Podersdorf, Haglersberg.

Rosaceae. Aruncus silvester Kostel.: Sauerbrunn.

Rubus) bifrons* Vest. f. *genuinus* Sudre: Jungerberg. — *R. ideaus* L. f. *inermis* Lej. & Court.: Eisenstadt. — *R. Laschii* Focke: Jungerberg; ssp. *eu-Laschii* Focke: Oggau-Oslopp. — *R. canescens* Borkh. f. *erroneus* Sudre: Oggau-Oslopp; var. *ca-*

Bestimmt von E. Wibral, Graz.

Bestimmt von Dr. J. Hruba, Brünn.

nescens DC. f. *cinereus* Rchb.: Haglersberg.; f. *genuinus* Sudre: Haglersberg; f. *ferocior* Hrubby: Oggau-Oslopp; var. *typicus* Sudre f. *arviculus* Sudre: Oggau-Oslopp; *R. caesius* x *tomentosus* f. *pseudoarvalis* Hrubby: Oggau-Oslopp.

Fragaria collina Ehrh.: Zeilerberg. — *F. elatior* (Thuill.) Ehrh.: Mönchhof-Zurndorf, Mannersdorf-Purbach, Rußt-St. Margareten. — *F. vesca* L.: Zeilerberg, Mannersdorf-Purbach. — *F. elatior* x *vesca*: Mannersdorf-Purbach.

Potentilla alba L.: Mannersdorf-Purbach, Rußt-St. Margareten. — *P. anserina* L.: Weiden-Podersdorf; var. *sericea* Hayne: Weiden-Podersdorf, Mannersdorf-Purbach. — *P. arenaria* Borkh.: St. Andrä, Hölzelstein, Illmitz, Mönchhof-Zurndorf, Podersdorf, Weiden-Gols, Haglersberg, Kobel, Parndorf, Rußt-St. Marg. — *P. argentea* L. St. Andrä, Illmitz, Gschieß-Oggau, Weiden-Podersdorf, Haglersberg, Gols, St. Margareten; var. *incanescens* Op.: Gschieß-Oggau, Haglersberg. — *P. leucopolitana* I. P. Müll.: St. Andrä, Mönchhof-Zurndorf., — *P. opaca* L.: Halbthurn. — *P. recta* L.: Oggau-Oslopp, Haglersberg; ssp. *crassa* Tausch: Podersdorf-Weiden, Haglersberg; ssp. *leucotricha* Borb.: Podersdorf-Weiden, Haglersberg. — *P. reptans* L.: Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf. — *P. rubens* Cr.: Mannersdorf-Purbach, Rußt-St. Margareten, Wimpassing. — *P. rupestris* L.: Mannersdorf-Purbach, Wimpassing. — *P. supina* L.: Podersdorf, Neusiedl, Neusiedl-Jois.

Filipendula hexapetala Gilib: St. Andrä, Königsschüssel, Podersdorf-Illmitz, Purbach. — *F. ulmaria* (L.) Maxim. var. *nivea* (Wallr.) Schinz & Keller: Sauerbrunn.

Sanguisorba minor Scop.: Hölzelstein, Illmitz, Weiden-Podersdorf, Weiden-Gols, Zeilerberg. — *S. officinalis* L. Gschieß-Oggau.

*Rosa**) *austriaca* Cr.: Oggau-Oslopp; var. *haplodonta* Borb. Oggau-Oslopp; var. *pannonica* Wierzb.: Oggau-Oslopp. — *R. Braunii* I. B. Keller: Haglersberg. — *R. Genevensis* Puget: Haglersberg. — *R. innocua* Rip.: Oggau-Oslopp. — *R. Jundzilli* Besser: Oggau-Oslopp; var. *heteracantha* Christ.: Oggau-Oslopp; var. *leioclada* Borb.: Oggau-Oslopp. — *R. Mareyana* Boullu f. *Joisensis* Deg. & Rech.: Haglersberg (a typo differt *receptaculis glabris*). — *R. pimpinellifolia* L.: Zeilerberg; var.

spinossissima (L.: Weiden-Gols, Podersdorf-Weiden. — *R. rubiginosa* L. Weiden, Weiden-Gols. — *R. Zalana* Wierzb. f. *Piersiana* Borb.: Haglersberg.

Cotoneaster integerrima Med.: Kobel.

Cydonia oblonga Mill. Oggau (verwildert).

Pirus nivalis Jacqu.: Zeilerberg. — *P. piraster* (L.) Borkh.: Zeilerberg.

Sorbus aria Cr.: Steinkogel; var. *lutescens* Koch: Wimpassing. — *S. cretica* (Lindl.) Fritsch: Mannersdorf, Wimpassing. — *S. domestica* L.: Zeilerberg. — *S. torminalis* (L.) Cr. var. *perincisa* Borb. & Fek.: Kaisersteinbruch. — *S. cretica* x *torminalis* Sommerein-Mannersdorf.

Crataegus monogyna Jacqu.: Rußt-St. Margareten, Wimpassing. — *C. oxyacantha* L.: Zeilerberg, Wimpassing; var. *laciniata* (Wallr.): Zeilerberg. — *C. monogyna* x *oxyacantha*: Wimpassing.

Prunus avium L.: Mannersdorf-Purbach. — *P. domestica* L.: Wimpassing. — *P. fruticosa* Pall.: Haglersberg, Mönchhof-Zurndorf, Oggau-Oslopp., — *P. cerasus* x *fruticosa*: Oggau-Oslopp, Zeilerberg, St. Margareten, Rußt-St. Margareten, Loretto, Wimpassing. — *P. nana* (L.) Stokes: Halbthurn, Mönchhof-Zurndorf, Spitalberg-Bruck. — *P. Padus* L.: Halbthurn. — *P. spinosa* L.: Rußt-St. Margareten; var. *dasyphylla* Schur: Zeilerberg.

Leguminosae. *Lupinus polyphyllus* Lindl.: Sauerbrunn, in Föhrenwäldern zur Bodenverbesserung kultiviert.

Genista germanica L.: Mannersdorf-Purbach. — *G. pilosa* L.: Mannersdorf, Mannersdorf-Purbach, Rußt-St. Margareten, Zeilerberg.

Laburnum anagyroides Med.: Zeilerberg, Sommerein-Breitenbrunn, Mannersdorf-Purbach.

Cytisus austriacus L.: Gols, Weiden-Gols, Jois, Neusiedl, Spitalberg bei Bruck. — *C. capitatus* Scop.: Zeilerberg. — *C. hirsutus* L.: St. Andrä, Mannersdorf-Purbach, Zeilerberg. — *C. nigricans* L.: Zeilerberg, Mannersdorf-Purbach. — *C. ratisbonensis* Schaeff.: Hölzelstein, Oggau-Oslopp, Mönchhof-Zurndorf, Rußt-St. Margareten, St. Margareten, Zeilerberg, Wimpassing. — *C. supinus* L.: Rußt-St. Margareten, Sauerbrunn.

Ononis hircina Jacqu.: Hölzelstein, Königsschüssel, Gschieß, Sauerbrunn. — *O. spinosa* L.: Apetlon, Illmitz, Podersdorf, Weiden, Rohrau.

Trigonella monspeliaca L.: St. Andrä-Illmitz, Illmitz, Podersdorf, Gols.

Medicago falcata L.: Illmitz, Gols, Pachfurt, Königsschüssel-Siegendorf. — *M. lupulina* L.: Illmitz. — *M. minima* (L.) Desr.: Illmitz, Gols, St. Andrä, Haglersberg. — *M. sativa* L.: Siegendorf-Eisenstadt. — *M. falcata* x *sativa*: St. Andrä, Podersdorf, Weiden-Gols, Königsschüssel-Siegendorf.

Melilotus albus Desr.: Podersdorf. — *M. altissimus* Thuill.: St. Andrä, Podersdorf-Illmitz, Jois-Neusiedl. — *M. dentatus* (W K.) Pers.: Sauerbrunn.

Trifolium alpestre L.: Podersdorf-Illmitz. — *T. arvense* L.: St. Andrä, Apetlon. — *T. campestre* Schreb.: Illmitz, Podersdorf, Frauenkirchen-Podersdorf, Gols, St. Andrä, Purbach-Breitenbrunn, Haglersberg, Donnerskirchen-Gschieß, Rußt-St. Margareten. — *T. incarnatum* L.: Oggau-Oslopp, Katzelsdorf. — *T. montanum* L.: Podersdorf-Illmitz. — *T. ochroleucum* L.: Zeilerberg. — *T. parviflorum* Ehrh.: Parndorf, St. Andrä. — *T. pratense* L.: Illmitz, Podersdorf-Illmitz, Weiden-Podersdorf. — *T. repens* L.: Illmitz. — *T. rubens* L.: Zeilerberg. — *T. strepens* Cr.: Sauerbrunn, Forchtenau. — *T. striatum* L.: St. Andrä, Parndorf.

Anthyllis polyphylla W K.: St. Andrä, Illmitz, Illmitz-Podersdorf, Weiden-Podersdorf, Weiden-Neusiedl, Purbach, Königsschüssel.

Dorycnium germanicum (Greml) Rouy: Zeilerberg, Haglersberg, Forchtenau.

Lotus corniculatus L.: Illmitz, Weiden-Podersdorf, Haglersberg, Mannersdorf-Purbach; f. *ciliatus* Koch: St. Andrä; var. *hispidus* Koch: Podersdorf-Illmitz, Podersdorf-Weiden, Mönchhof-Zurndorf, Zeilerberg, Mannersdorf. — *L. siliquosus* L.: Illmitz, Weiden-Podersdorf, Weiden-Neusiedl, St. Andrä. — *L. tenuisilius* W. K.: St. Andrä, Illmitz, Gols, Neusiedl-Jois.

Robinia pseudacacia L.: vielfach zur Holzgewinnung kultiviert, im Seewinkel auch reihenweise als Windschutz.

Culutea arborescens L.: Weiden, Jois, Haglersberg, Junggerberg.

Astragalus asper Wulf.: Illmitz-Podersdorf-Weiden, Jois-Kaisersteinbruch. — *A. austriacus* Jacqu.: St. Andrä, Illmitz, Gols, Weiden-Podersdorf, Königsschüssel-Siegendorf. — *A. cicer* L.: Siegendorf-Eisenstadt. — *A. corniculatus* L.: St. Andrä. — *A. escapus* L.: Illmitz-Podersdorf-Weiden, Königsschüssel. — *A. onobrychis* L.: Illmitz, Weiden-Gols, Königsschüssel-Siegendorf. — *A. sulcatus* L.: Illmitz-Podersdorf-Weiden, Apetlon.

Oxytropis pilosa DC. var. *hungarica* Borb.: Podersdorf.

Coronilla varia L.: Illmitz, Weiden-Podersdorf.

Onobrychis arenaria Ser.: Gols. — *O. viciaefolia* Scop.: Frauenkirchen - Podersdorf - Weiden - Neusiedl, Siegendorf Eisenstadt.

Vicia cassubica L.: Oggau-Oslopp, Rußt-St. Margareten. — *V. dumetorum* L.: Sauerbrunn. — *V. hirsuta* (L.) Gray: Gschieß-Oggau. — *V. lathyroides* L.: Oggau-Oslopp. — *V. pannonica* Jacqu. Purbach-Donnerskirchen, Purbach, Gschieß, Zeilerberg, Haglersberg. — *V. pisiformis* L.: St. Margareten-Rußt. — *V. sativa* L.: Weiden-Podersdorf, Weiden. — *V. segetalis* (Thuill.) Koch: Purbach-Donnerskirchen, Siegendorf-Eisenstadt, Haglersberg. — *V. sepium* L.: Mannersdorf-Purbach. — *V. tenuifolia* Roth: Forchtenau. — *V. villosa* Roth: Gschieß, Purbach-Donnerskirchen.

Lathyrus megalanthus Steud.: Sauerbrunn.

Geraniceae. *Geranium phaeum* L.: Wampersdorf. — *G. pusillum* Burm.: Haglersberg, Frauenkirchen-Podersdorf, Breitenbrunn-Winden. — *G. Robertianum* L.: Hölzelstein, Zeilerberg, Rußt-St. Margareten. — *G. rotundifolium* L.: Haglersberg. — *G. sanguineum* L.: Zeilerberg. — *G. sibiricum* L.: Pachfurt.

Erodium cicutarium (L.) L'Herit.: St. Andrä, Frauenkirchen-Podersdorf.

Balsaminaceae. *Impatiens noli tangere* L.: Sauerbrunn. — *I. parviflora* DC.: Bruck-Rohrau.

Linaceae. *Linum austriacum* L.: Illmitz, St. Andrä, Gols-Weiden-Neusiedl, Mönchhof-Halbthurn, Jois. — *L. catharticum* L.: Frauenkirchen-Podersdorf. — *L. hirsutum* L.: Rußt, Gols.

Rutaceae. *Dictamnus albus* L.: Kaisersteinbruch, Jungerberg, Steinkogel.

Aceraceae. *Acer campestre* L.: Rußt-St. Margareten, Rohrau.

F o l y g a l a c e a e . *Polygala amara* L.: Forchtenau. — *P amarella* Cr. ssp. *austriaca* (Cr.) Wimpassing. — *P. comosa* L.: Illmitz, Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Purbach-Breitenbrunn. — *P. maior* Jacq.: Zeilerberg. — *P. vulgaris* L.: Illmitz.

E u p h o r b i a c e a e . *Mercurialis annua* L.: Gschieß.

Euphorbia amygdaloides L.: Mannersdorf-Purbach. — *E. angulata* Jacq.: Mannersdorf-Purbach, Zeilerberg, Rußt-St. Margareten, Königsschüssel, Wimpassing. — *E. cyparissias* L.: Illmitz, Breitenbrunn, Zeilerberg-Bruck, Rußt-St. Margareten. — *E. esula* L.: Frauenkirchen-Podersdorf, Zeilerberg-Bruck, Donnerskirchen-Gschieß. — *E. cyparissias x esula*: Breitenbrunn-Winden. — *E. falcata* L.: St. Andrä-Illmitz, Wimpassing. — *E. Gerardiana* Jacq.: St. Andrä, Illmitz, Gols, Podersdorf, Weiden, Mönchhof-Zurndorf, Königsschüssel, Zeilerberg. — *E. helioscopia* L.: Frauenkirchen-Podersdorf. — *E. pannonica* Host: St. Andrä. — *E. Gerardiana x pannonica*: St. Andrä. — *E. polychroma* Kern: Sommerein-Breitenbrunn, Zeilerberg-Bruck. — *E. salicifolia* Host: Illmitz, Breitenbrunn, Jois, Winden. — *E. cyparissias x salicifolia*: Breitenbrunn. — *E. virgata* W K.: Weiden-Podersdorf, Mönchhof-Zurndorf, Gschieß. — *E. cyparissias x virgata*: Zeilerberg. — *E. salicifolia x virgata*: Winden, Jois.

C e l a s t r a c e a e . *Evonymus verrucosus* L.: Zeilerberg, Wimpassing.

S t a p h y l e a c e a e . *Staphylea pinnata* L.: Zeilerberg, Mannersdorf-Purbach.

R h a m n a c e a e . *Rhamnus cathartica* L.: Zeilerberg, Stein-kogel. — *R. saxatilis* Jacq.: Hölzelstein, Zeilerberg. — *R. tinctoria* W K.: Zeilerberg. — *R. saxatilis x tinctoria* Zeilerberg.

T i l i a c e a e . *Tilia cordata* Mill.: Sauerbrunn.

M a l v a c e a e . *Althaea officinalis* L.: Podersdorf, Bruck-Rohrau, Pamhagen.

Malva neglecta Wallr.: Frauenkirchen-Podersdorf, Neusiedl-Weiden. — *M. pusilla* With.: Apetlon, Weiden, Neusiedl. — *M. silvestris* L. var. *bispida* Beck: St. Margareten.

Hibiscus trionum L.: Apetlon.

Lavatera thuringiaca L.: Haglersberg, Sauerbrunn.

G u t t i f e r a e . *Hypericum acutum* Mnch.: Bruck-Rohrau. *H. montanum* L.: Sauerbrunn. — *H. perforatum* L. ssp. *veronense* (Schrk.) Beck: St. Margareten, Rußt, Weiden, Gols, Illmitz.

Cistaceae. *Helianthemum obconum* (L.) Baumg.: Zeilerberg, Mannersdorf, Rußt-St. Margareten. — *H. ovatum* (Viv.) Dun. Zeileroerg, Haglersberg, Königsschüssel, Purbach, Breitenbrunn, Hölzelstein.

Violaceae. *Viola**) *alba* Bess.: Zeilerberg-Bruck. — *V. ambigua* W K.: Podersdorf-Weiden, Kobel, Mönchhof-Zurdorf. — *V. arenaria* DC.: Zeilerberg. — *V. arvensis* Murr.: Forchternau; var. *segetalis* (Jord.): St. Andrä; var. *parviflora*: St Andrä. — *V. arvensis*-*Kitaibeliana*: Purbach. — *V. canina* L. Podersdorf, Rußt-St. Margareten. — *V. collina* Bess.: Haglersberg, Jungerberg, Kobel, Königsschüssel. — *V. cyanea* Čelak.: Parndorf-Jois, Jungerberg. — *V. alba* × *cyanea*: Parndorf-Jois. — *V. elatior* Fr.: Podersdorf. — *V. hirta* L.: Mannersdorf, Purbach, Weiden-Podersdorf, Parndorf-Jois, Königsschüssel. — *V. alba* × *hirta*: Mannersdorf-Purbach. — *V. ambigua* × *hirta*: Kobel, Weiden-Podersdorf. — *V. cyanea* × *hirta*: Kobel, Jungerberg. — *V. Kitaibelana* R. & Sch.: St. Andrä, Haglersberg. — *V. mirabilis* L.: Zeilerberg-Bruck, Mannersdorf-Purbach, Kobel, Kaisersteinbruch, Wimpassing. — *V. odorata* L.: Zeilerberg. — *V. alba* × *odorata*: Parndorf-Jois. — *V. cyanea* × *odorata*: Jungerberg, Kobel. — *V. hirta* × *odorata*: Parndorf-Jois, Kobel. — *V. Rixiniana* Rchb.: Mannersdorf-Purbach. — *V. mirabilis* × *Rixiniana*: Kobel. — *V. mirabilis* × *silvestris*: Mannersdorf-Purbach.

Cucurbitaceae. *Bryonia dioica* Jacqu.: Haglersberg, Königsschüssel.

Thymelaeaceae. *Daphne cneorum* L.: Wimpassing.

Lythraceae. *Lythrum hyssopifolia* L.: Parndorf-Neudorf, Neusiedl-Weiden.

Oenotheraceae. *Epilobium adnatum* Griseb.: Weiden. *E. hirsutum* L.: Weiden, Wimpassing. — *E. Lamyi* Schltz.: Weiden, Sauerbrunn. — *E. montanum* L.: Sauerbrunn. — *E. obscurum* Schreb.: Sauerbrunn. — *E. palustre* L.: Weiden. — *E. parviflorum* Schreb.: Weiden. — *E. palustre* × *parviflorum*: Weiden.

Circaea lutetiana L.: Bruck-Rohrau.

Araliaceae. *Hedera helix* L.: Mannersdorf-Purbach.

Umbelliferae. *Eryngium campestre* L. Illmitz, Weiden-Gols, Rußt-St. Margareten.

Chaerophyllum bulbosum L.: Sauerbrunn.

Anthriscus scandix (Scop.) Beck: St. Andrä, Frauenkirchen-Podersdorf. — *A. trichospermus* Schult.: Halbthurn, Purbach, Haglersberg, Wampersdorf, Rußt.

Bifora radians M. B.: Sarasdorf, Wilfleinsdorf, Kaisersteinbruch.

Conium maculatum L.: Weiden.

Bupleurum falcatum L.: Weiden-Gols, Sauerbrunn. — *B. rotundifolium* L.: Jois, Gschieß. — *B. tenuissimum* L.: Weiden-Neusiedl.

Corilis anthriscus (L.) Gmel.: Sauerbrunn.

Apium repens (Jacqu.) Reichb.: Weiden.

Trinia glauca (L.) Dum.: Gols, Mönchhof-Zurndorf, Podersdorf-Illmitz, Mannersdorf.

Falcaria vulgaris Bernh.: Bruck-Rohrau.

Pimpinella saxifraga L.: Sauerbrunn; f. *nigra* (Mill.): Weiden-Gols.

Sium latifolium L.: Pachfurt.

Seseli devenyiense Simk.: Weiden-Gols, Zeilerberg. — *S. hippomarathrum* L.: Weiden-Gols.

Libanotis montana Cr.: Bruck-Rohrau.

Aethusa cynapium L.: Bruck-Rohrau.

Angelica verticillaris L.: Sauerbrunn.

Peucedanum officinale L.: Podersdorf, Weiden-Podersdorf. — *P. oreoselinum* Mnch.: Weiden-Gols, Sauerbrunn.

Pastinaca sativa L.: Podersdorf-Illmitz.

Hercleum spondylium L. ssp. *chloranthum* (Borb.): Sauerbrunn, Pachfurt, Jois-Winden.

Cordylium maximum L.: Haglersberg.

Cornaceae. *Cornus mas* L.: Zeilerberg, Bruck-Rohrau.

Primulaceae. *Primula pannonica* Kern.: Zeilerberg, Haglersberg, Königsschüssel, Rußt-St. Margareten.

Androsace elongata L.: Mönchhof-Halbthurn, Haglersberg. — *A. maxima* L.: Gschieß, Zeilerberg.

Samolus Valerandi L.: Illmitz, Podersdorf, Weiden.

Oleaceae. *Ligustrum vulgare* L.: Königsschüssel.

Fraxinus ornus L.: Wimpassing, Illmitz, Podersdorf (kultiviert).

Gentianaceae. *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce: Podersdorf, Neusiedl. — *C. uliginosum* (W. K.) Beck: St. Andrä, Illmitz, Podersdorf, Weiden-Neusiedl. — *C. umbellatum* Gilib.: Sauerbrunn.

Blackstonia serotina (Koch) Beck: Podersdorf.

Gentiana austriaca Kern.: Weiden, Weiden-Podersdorf.

Apocynaceae. *Vinca minor* L.: Sauerbrunn, Mannersdorf-Purbach.

Asclepiadaceae. *Cynanchum laxum* Bartl.: Steinkogel, Hölzelstein.

Convolvulaceae. *Cuscuta epithymum* (L.) Murr.: Weiden-Neusiedl. — *C. europaea* L.: Haglersberg.

Boraginaceae. *Cynoglossum hungaricum* Simk.: Haglersberg. — *C. officinale* L.: Haglersberg, Jois, Oggau-Oslopp, St. Margareten, Königsschüssel, Bruck-Rohrau, Weiden-Podersdorf.

Asperugo procumbens L.: Weiden-Neusiedl.

Symphytum Leonhardtianum Pugsley in Journ. of Bot. 1931, 35 (= *S. tuberosum* der mitteleurop. Autoren, nicht L.): Rußt-St. Margareten. — *S. officinale* L.: Gschieß; f. *inundatum* (Menyh.): Jois.

Anchusa azurea Mill.: Parndorf-Neudorf. — *A. officinalis* L.: Weiden-Podersdorf, Jois, Siegendorf-Eisenstadt.

Pulmonaria augustifolia L.: Rußt-St. Margareten. — *P. officinalis* L.: Mannersdorf-Purbach.

Nonnea pulla (L.) DC: Podersdorf-Illmitz, Mönchhof-Zurndorf, Breitenbrunn.

*Myosostis**) *arvensis* (L.) Hill.: St. Andrä; var. *dumetorum* Rouy: Haglersberg. — *M. collina* Hoffm.: Frauenkirchen-Podersdorf, Weiden-Podersdorf, Kobel, Haglersberg, Hölzelstein, Purbach, Rußt-St. Margareten. — *M. micrantha* Pall.: Frauenkirchen-Illmitz, Haglersberg. — *M. scorpioides* L. var. *strigulosa* (Rchb.): Donnerskirchen-Oggau. — *M. sparsiflora* L.: Purbach-Mannersdorf, Purbach. — *M. versicolor* (Pers.) Sm.: Forchterrau.

Lythospermum arvense L.: Weiden-Neusiedl, Mönchhof-Zurndorf. — *L. purpureocaeruleum* L.: Haglersberg.

Oncosma arenarium W. K.: Haglersberg, Gols, Zeilerberg.
Echium altissimum Jacqu.: Oggau (leg. Korb). — *E. vul-*
gare L.: St. Andrä.

Cerinthe minor L.: Gschieß.

Verbenaceae. Verbena officinalis L.: Bruck-Rohrau.

Labiatae. Ajuga genevensis L.: St. Andrä, Mönchhof-Zurndorf, Zeilerberg, Mannersdorf-Purbach, Breitenbrunn, Gschieß-Oggau, Rußt-St. Margareten. — *A. reptans* L.: Mannersdorf-Purbach. — *A. genevensis* x *reptans*: Mannersdorf-Purbach, Heiligenkreuzerwald (Leithagebirge), Spitalwald bei Bruck.

Teucrium chamaedrys L.: Illmitz, Podersdorf, Weiden-Gols, Haglersberg; var. *glanduliferum* Hsskn.: Weiden-Gols, Haglersberg. — *T. montanum* L. Zeilerberg. — *T. scordium* L.: Neusiedl-Jois.

Scutellaria galericulata L.: Bruck-Rohrau.

Nepata cataria L.: Jois. — *N. pannonica* L.: Parndorf-Neusiedl.

Marrubium peregrinum L.: Apetlon, Frauenkirchen-Podersdorf, Winden. — *M. vulgare* L.: Weiden. — *M. peregrinum* x *vulgare*: Frauenkirchen-Podersdorf.

Prunella vulgaris L.: Illmitz. — *P. laciniata* x *vulgaris*: Zeilerberg.

Glechoma hederacea L.: Rußt-St. Margareten. — *G. hirsuta* W. K.: Zeilerberg-Bruck, Mannersdorf-Purbach.

Phlomis tuberosa L.: Mönchhof-Zurndorf.

Melittis meslliophyllum L.: Zeilerberg.

Lamium amplexicaule L.: St. Andrä, Frauenkirchen-Podersdorf, Weiden-Neusiedl. — *L. purpureum* L.: Rußt-St. Margareten.

Lechnurus marrubiastrum L.: Apetlon, Winden.

Balotta nigra L.: Frauenkirchen-Podersdorf.

Stachys recta L.: Gols, Hölgelstein.

Salvia aethiopis L.: Purbach-Breitenbrunn, Weiden-Gols, Karlswald bei Nickelsdorf. — *S. austriaca* Jacqu.: St. Andrä, Illmitz, Mönchhof-Zurndorf, Winden, Purbach-Breitenbrunn, Jungerberg. — *S. nemorosa* L.: Illmitz, Weiden-Gols, Gschieß, Königsschüssel-Siegendorf-Eisenstadt. — *S. pratensis* L.: Illmitz, Illmitz-Podersdorf, Zeilerberg. — *S. nemorosa* x *pratensis*: Wiesen-Siegle, Sarasdorf, Siegendorf-Eisenstadt, Oggau-Oslopp.

Satureia acinos (L.) ^{dor.} Scheele: ^{bod.} Haglersberg, Königsschüssel, Gschieß.

Hyssopus officinalis L.: Weiden-Gols, in Hohlwegen zwischen Weingärten.

Thymus) austriacus* Bernh.: Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf, Podersdorf, Weiden-Gols, Weiden-Podersdorf, Haglersberg, Breitenbrunn, Parndorf, Wimpassing; var. *senilis* (Dichtl) Ronn.: St. Andrä, Illmitz. — *T. austriacus-praecox*: Zeilerberg. — *T. badensis* H. Br. Haglersberg, Purbach. — *T. glabrescens* W. Weiden-Podersdorf, Königsschüssel, Mönchhof-Zurndorf; var. *Lövyanus* (Op.) Ronn.: St. Andrä, Wiesen-Siegles, var. *stenophyllus* Ronn. St. Andrä, Frauenkirchen, Breitenbrunn; *T. glabrescens-Marschallianus*: St. Margareten, Gschieß. — *T. glabrescens-praecox*: Zeilerberg. — *T. Hackelianus* Op.: Parndorf, Gols, Oggau-Oslopp, Haglersberg. — *T. Kosteleyanus* Op.: Gols, Neusiedl. — *T. Marschallianus* M. B.: Illmitz, Weiden-Podersdorf, Gols, Haglersberg, Parndorf, Gschieß, St. Margareten, Oggau-Oslopp, Siegendorf-Eisenstadt; var. *auctus* (Lyka) Ronn.: Purbach; var. *calvifrons* (Borb. & Br.) Ronn.: St. Andrä, Illmitz, Podersdorf, Neusiedl-Jois; var. *leptoclados* Ronn. St. Andrä; var. *Wondraschekianus* (Op.) Ronn.: St. Margareten, Gschieß. — *T. Marschallianus-praecox*: Zeilerberg. — *T. praecox* Op.: Zeilerberg, Königsschüssel, Hölzelstein, St. Margareten-Rußt; var. *pusio* Dichtl: Katzelsdorf; var. *spathulatus* (Op.) Ronn.: Haglersberg, Zeilerberg.

Lycopus europaeus L.: Weiden.

Mentha aquatica L.: Podersdorf, Weiden, Neusiedl-Weiden. — *M. arvensis* L.: Podersdorf. — *M. aquatica x arvensis*: Weiden. — *M. longifolia* (L.) Huds.: Pachfurt. — *M. mollissima* Borkh. ssp. *Wierzbickiana* (Op.) Jois-Winden. — *M. mosoniensis* H. Br.: Jois, Winden, Neusiedl. — *M. Ortmanniana* Op.: Neusiedl-Weiden. — *M. pulegium* L.: Apetlon, Weiden, Rohrau.

Solanaceae. *Lycium halimifolium* Mill.: Neusiedl-Jois, Wimpassing.

Hyoscyamus niger L.: Podersdorf-Illmitz.

Solanum lycopersicum L.: Neusiedl (verwildert). — *S. nigrum* L.: Wallern-Apetlon.

Datura stramonium L.: Bruck-Rohrau.

Nicotiana rustica L.: Weiden (verwildert).

Scrophulariaceae. *Verbascum austriacum* Schott: Haglersberg, Rußt-St. Margareten. — *V. blattaria* L.: St. Andrä. — *V. phlomoides* L.: Weiden-Gols. — *V. phoeniceum* L.: St. Andrä, Illmitz, Haglersberg, Zeilerberg, Karlswald bei Nickelsdorf, Bruck. — *V. speciosum* Schrad.: Haglersberg, Purbach, Spitalberg bei Bruck. — *V. austriacum* x *speciosum*: Haglersberg. — *V. lychnitis* x *speciosum*: Haglersberg. — *V. phlomoides* x *speciosum*: Haglersberg, Zeilerberg-Winden.

Kickxia elatine (L.) Dum.: Weiden-Neusiedl.

Linaria genistifolia L.: Eisenstadt-Höflein, Haglersberg, Weiden-Gols; ssp. *augustifolia* (Schur): Illmitz, Podersdorf, Haglersberg, St. Margareten.

Scrophularia alata Gilib.: Pachfurt.

Veronica anagallis L.: Weiden; f. *anagallidiformis* (Bor.) St. Andrä, Podersdorf. — *V. anagalloides* Guss.: Podersdorf, Weiden, Gols, Jois. — *V. aquatica* Bernh.: St. Andä, Illmitz, Podersdorf, Gols, Weiden, Jois, Donnerskirchen-Oggau. — *V. arvensis* L.: Frauenkirchen, Podersdorf, Purbach, Winden. — *V. chamaedrys* L.: Mannersdorf-Purbach, Rußt-St. Margareten, Wimpassing. — *V. hederifolia* L.: Weiden, Neusiedl, Purbach-Donnerskirchen, Winden, Wimpassing; ssp. *triloba* (Op.): Weiden-Neusiedl, Wimpassing. — *V. officinalis* L.: Königsschüssel. — *V. polita* Fr.: Wimpassing. — *V. prostrata* L.: St. Andrä, Illmitz, Mönchhof-Zurndorf, Podersdorf, Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Mannersdorf-Purbach, Rußt-St. Margareten. — *V. dentata* x *prostrata*: St. Andrä, Mannersdorf-Purbach. — *V. serpyllifolia* L.: Sommerrein-Breitenbrunn. — *V. spicata* L.: Weiden, Gols. — *V. triphyllum* L.: Haglersberg. — *V. Velenovskyi* Uechtr.: Weiden, Podersdorf. — *V. verna* L.: Haglersberg-Jois.

Melampyrum arvense L.: Gschieß, Haglersberg, Zeilerberg-Winden; ssp. *pseudobarbatum* (Schur): Haglersberg. — *M. barbatum* W K.: Gols, Zeilerberg, Purbach-Breitenberg, Gschieß. — *M. nemorosum* L. var. *virens* Klatt & Richt.: Kaisersteinbruch. — *M. vulgaratum* Pers. f. *concolor* Schönh.: Forchtenau-Katzeldorf.

Euphrasia Kernerii Wettst.: Weiden. — *E. montana* Jord.: Purbach.

Odontites rubra Gilib.: Weiden-Gols.

Orthantha lutea (L.) Kern.: Weiden-Gols.

Alectorolophus crista galli (L.) M. B.: St. Andrä, Jois-Neusiedl, Parndorf. — *A. hirsutus* (Lam.) All. ssp. *arvensis* (Seml.): Wiesen-Siegle. — *A. major* (Ehrh.) Rchb.: Illmitz-Podersdorf; vergens ad *A. Borbasii* Dörfl.: Illmitz, Podersdorf, Weiden, Purbach-Donnerskirchen.

Pedicularis palustris L.: Podersdorf-Illmitz.

Lentibulariaceae. Pinguicula vulgaris L.: Weiden.

Orobanchaceae. Orobanche alba Steph.: Weiden-Podersdorf. — *O. gracilis* Sm.: Königsschüssel. — *O. lutea* Bmg.: Weiden-Podersdorf, Haglersberg, Forchtenau-Katzelsdorf. — *O. vulgaris* Poir. Zeilerberg.

Globulariaceae. Globularia Willkommii Nym.: Illmitz-Podersdorf, Weiden, Mönchhof-Zurndorf, Mannersdorf.

Plantaginaceae. Plantago indica L.: Gols. — *P. lanceolata* L.: Weiden-Podersdorf, Gols, Donnerskirchen-Gschieß; f. *sphaerostachys* (W K.): Illmitz. — *P. major* L. var. *salina* Wirtg.: Podersdorf, Weiden. — *P. maritima* L.: St. Andrä, Podersdorf, Weiden. — *P. media* L.: Zeilerberg. — *P. tenuiflora* W K. St. Andrä, Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf.

Rubiaceae. Asperula cynanchica L.: Illmitz, Podersdorf-Gols-Weiden. — *A. glauca* (L.) Bess.: Illmitz-Podersdorf-Weiden, Haglersberg-Jungerberg. — *A. odorata* L.: Mannersdorf-Purbach.

Galium aparine L.: Haglersberg, Kobel, Gschieß, Rußt-St. Margareten. — *G. austriacum* Jacqu.: Forchtenau. — *G. cruciata* (L.) Scop.: Weiden, Weiden-Neusiedl. — *G. lucidum* All.: Steinkogel. — *G. mollugo* L.: St. Andrä, Gschieß-Oggau; ssp. *pubescens* (Schrad.): Oggau-Oslopp, Mühlendorf. — *G. palustre* L.: Purbach. — *G. pedemontanum* All.: Mannersdorf-Purbach, Kobel, Haglersberg. — *G. rotundifolium* L.: Forchtenau. — *G. Schultesii* Vest: Sauerbrunn, Eisenstadt. — *G. spurium* L. f. *Vaillantii* (DC): Gschieß. — *G. tricorne* Stokes: Gschieß. — *G. vernum* Scop.: Mannersdorf-Purbach, Sommerein-Breitenbrunn. — *G. verum* L. Illmitz, St. Andrä, Podersdorf-Weiden-Gols, Parndorf, Rußt-St. Margareten; ssp. *Wirtgenii* (Schltr.): Forchtenau, Gschieß, Neusiedl. — *G. mollugo* x *verum*: Illmitz, Parndorf; *G. mollugo* ssp. *pubescens* x *verum*: Pürscherwald u. Spitalberg bei Bruck. — *G. mollugo* x *verum* ssp. *Wirtgenii* (Schltr.): Illmitz.

download www.zobodat.at

Caprifoliaceae. *Sambucus ebulus* L.: Jois. — *S. racemosa* L.: Sauerbrunn.

Viburnum lantana L.: Haglersberg.

Valerianaceae. *Valeriana augustifolia* Tausch: Königsschüssel. — *V. dioica* L.: Weiden-Neusiedl, Purbach.

Valerianella rimosa Bast.: Haglersberg.

Dipsacaceae. *Cephalaria trenssilvanica* (L.) Schrad.: Neusiedl, Weiden-Gols.

Dipsacus laciniatus L.: Neusiedl-Weiden. — *D. pilosus* L.: Bruck-Rohrau.

Knautia arvensis (L.) Coul.: St. Andrä, Illmitz-Podersdorf-Weiden, Neusiedl, Donnerskirchen-Gschieß, Siegendorf. — *K. drymeia* Heuff. Forchtenau, Kaisersteinbruch.

Scabiosa canescens W K.: Weiden-Gols. — *S. ochroleuca* L.: Weiden-Gols, Podersdorf.

Campanulaceae. *Campanula bononiensis* L.: Haglersberg, Sauerbrunn, Wimpassing. — *C. cervicaria* L.: Sauerbrunn.

— *C. persicifolia* L. Königsschüssel. — *C. rapunculoides* L.: Haglersberg, Wimpassing. — *C. sibirica* L.: Podersdorf, Podersdorf-Weiden, Breitenbrunn-Winden, Purbach.

Phyteuma orbiculare L.: Steinkogel.

Compositae. *Bellis perennis* L.: Weiden-Neusiedl.

Aster linosyris (L.) Bernh.: Weiden-Gols. — *A. pannonicus* Jacqu.: St. Andrä, Illmitz, Apetlon, Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Frauenkirchen-Podersdorf.

Erigeron acer L.: Gschieß-Oggau. — *E. annuus* (L.) Pers.: Bruck-Rohrau, Sauerbrunn.

Filago arvensis L.: St. Andrä-Illmitz, Podersdorf, Haglersberg, Sauerbrunn.

Gnaphalium luteo-album L.: Sauerbrunn.

Inula britannica L.: Podersdorf-Weiden. — *I. ensifolia* L.: Weiden-Podersdorf. — *I. germanica* L.: Oggau-Oslopp. — *I. hirta* L.: Oggau-Oslopp. — *I. oculus Christi* L.: Gols, Haglersberg.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.: Neusiedl. — *P. vulgaris* Gaertn.: Rohrau.

Xanthium strumarium L. Bruck-Rohrau.

Helianthus tuberosus L.: Frauenkirchen-Podersdorf (verwildert).

Bidens cernuus L.: Weiden. — *B. tripartitus* L.: Weiden.
Anthemis austriaca Jacq.: St. Andrä-Illmitz, Breitenbrunn-Winder, St. Margareten. — *A. cotula* L.: Hölzelstein, Rohrau. — *A. ruthenica* M. B.: Gols. — *A. tinctoria* L.: Haglersberg.

Achillea asplenifolia Vent.: Podersdorf-Weiden. — *A. collina* Becker: St. Andrä, Illmitz, Podersdorf-Weiden-Gols, Apetlon, Höflein-Mühlendorf. — *A. millefolium* L.: Mühlendorf-Höflein. — *A. nobilis* L. ssp. *Neilreichii* (Kern.): St. Margareten. — *A. pannonica* Scheele: Mönchhof-Zurndorf, Parndorf. — *A. setacea* W. K.: Illmitz-Podersdorf-Weiden, Königsschüssel.

Matricaria chamomilla L.: St. Andrä, Frauenkirchen-Podersdorf.

Chrysanthemum leucanthemum L.: St. Andrä, Breitenbrunn.

Artemisia absinthium L.: Neusiedl-Weiden, Podersdorf.
A. austriaca Jacq.: Haglersberg, Weiden, Gols. — *A. campestris* L.: Illmitz, Podersdorf, Weiden-Gols. — *A. monogyna* W. K.: Gols.

Senecio campester (Retz) DC.: Podersdorf-Weiden. — *S. erraticus* Bert.: Gols, Sauerbrunn. — *S. jacobaea* L.: Podersdorf-Weiden, Gols, Rohrau. — *S. visosus* L.: Sauerbrunn. — *S. vulgaris* L.: St. Andrä, Weiden-Neusiedl.

Calendula officinalis L.: Weiden.

Xeranthemum annuum L.: Weiden-Gols, Gols, Jois.

Arctium lappa L.: Bruck-Rohrau. — *A. minus* (Hill.) Bernh.: Bruck-Rohrau. — *A. nemorosum* Lej. & Court.: Bruck-Rohrau. — *A. minus* x *tomentosum*: Bruck-Rohrau.

Jurinea mollis (L.) Rchb.: Podersdorf-Weiden, Zeilerberg, Mönchhof-Zurndorf.

Carduus nutans L.: Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf.

Cirsium brachycephalum Jur.: Illmitz. — *C. canum* (L.) M. B.: Podersdorf-Weiden, Neusiedl. — *C. eriophorum* (L.) Scop.: Zeilerberg-Bruck.

Serratula tinctoria L.: St. Margareten-Rußt.

Centaurea augustifolia Schrk.: Apetlon, Podersdorf, Jois.
C. cyanus L.: Purbach, Gschieß. — *C. rhenana* Bor.: Illmitz-Podersdorf-Gols-Weiden, St. Andrä., — *C. scabiosa* L.: Podersdorf, Weiden-Gols, Weiden, Kaisersteinbruch, Donnerskirchen. — *C. Triumfetti* Fl.: Purbach-Breitenbrunn, Winden.

Cichoriaum intybus L.: Pachfurt.

Hypochoeris radicata L.: Sauerbrunn.

Leontodon danubialis Jacq.: Weiden-Podersdorf, Gschieß, Sauerbrunn. — *L. hispidus* L.: Illmitz, Sauerbrunn. — *L. incanus* (L.) Schrk.: Forchtenau.

Scorzonera austriaca Willd.: Zeilerberg. — *S. hispanica* L.: Zeilerberg. — *S. Jacquiniana* (Koch) Čel.: St. Andrä-Illmitz-Podersdorf-Frauenkirchen, Apetlon, Weiden-Neusiedl, Winden. — *S. parviflora* Jacq.: St. Andrä, Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf-Weiden-Neusiedl-Jois, Gschieß.

Chondrilla juncea L.: Jois.

Caraxacum bessarabicum (Horn.) H.-M.: Wallern-Apetlon, Frauenkirchen-Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Jois. — *C. laevigatum* (Willd.) DC: Mönchhof-Zurndorf, Podersdorf-Weiden, Jungerberg. — *C. officinale* Web.: Weiden-Gols. — *C. paludosum* (Scop.) Crep.: Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Illmitz. — *C. serotinum* (W K.) Poir.: Mönchhof-Zurndorf.

Sonchus arvensis L.: Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf. — *S. oleraceus* L.: Sauerbrunn.

Lactuca saligna L.: Jois.

Crepis capillaris (L.) Wallr.: Sauerbrunn. — *C. praemorsa* (L.) Tausch: Mannersdorf-Purbach. — *C. rhoeadifolia* M. B.: St. Andrä. — *C. tectorum* L.: Frauenkirchen-Podersdorf, Königsschüssel.

*Hieracium**) *auricula* (L.) Lam. & DC. ssp. *eu-auricula* Z. a) *genuinum* 1. *epilosum* N. P.: Forchtenau. — *H. Bauhini* Besser ssp. *cymanthum* N. P.: Königsschüssel, St. Margareten; ssp. *bispidissimum* Rehm. 2. *calvicaule* N. P.: Königsschüssel. Zeilerberg. — *H. cymosum* L. ssp. *cymigerum* Rb. f. a) *genuinum* 1. *calvipedunculatum* N. P.: Kobel; ssp. *cymosum* f. *setosum* N. P.: Mannersdorf-Purbach; a) *genuinum* 4. *angustifolium* N. P.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *sabinum* Seb. & M. var. *latisquamum* N. P.: Haglersberg. — *H. fallax* ssp. *granense* N. P. Haglersberg. — *H. florentinum* All. ssp. *alethes* N. P.: Weiden-Podersdorf; ssp. *obscurum* Rb. f.: Weiden-Podersdorf; 2. *subfloccosum* N. P.: Podersdorf; ssp. *parcifloccum* N. P.: Weiden-Podersdorf; f. *pilosiceps* N. P.: Weiden-Podersdorf; ssp. *pseudovistulinum*: Ob. & Z.: Katzelsdorf. — *H. Hoppeanum* Schult. ssp. *leucolepioides* Degen & Z.: Zeilerberg; ssp. *testi-*

Bestimmt von Prof. H. Zahn, Karlsruhe.

moniale N. P.: Zeilerberg; f. *incutitorum* N. P.: Königsschüssel; f. *miroriceps* Z.: Haglersberg; a) *genuinum* 1. *acutiusculum* Z.: Königsschüssel. — *H. Lachenalii* Gmel. ssp. *pinnatifidum* Loennr.: Forchtenau. — *H. Laschii* Gebr. Schltz. ssp. *canum* N. P. a) *genuinum* 1. *pilosus* N. P.: Kobel; 2. *calvius* Z.: Kobel; ssp. *cymosella* Z. f. *latum* Z.: Goldberg bei Breitenbrunn; a) *genuinum* 1. *angustius* b. *striatum* N. P.: Zeilerberg. — *H. maculatum* Sm. ssp. *asperatum* Jord.: Goldberg b. Breitenbrunn. — *H. murorum* L. ssp. *cardiophyllum* Jord.: Sommerein-Breitenbrunn; ssp. *exotericum* Jord.: Forchtenau-Katzelsdorf; var. *pseudograndidentatiforme* Tout.: Sommerein-Breitenbrunn; ssp. *gentile* Jord.: Wiesen-Siegles; ssp. *hemigrypotes* Z.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *integratum* Dst.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *nemorense* Jord.: Sommerein - Breitenbrunn; ssp. *sericellipes* Z.: Wimpassing; b) *subsericellipes* Z.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *silvularum* Jord.: Sommerein-Breitenbrunn; ssp. *subbasalticiforme* Z.: Mannersdorf-Purbach, Sommerein-Breitenbrunn. — *H. Pilosella* L.: Illmitz; *amauron* N. P.: 1. *normale* N. P.: Zeilerberg; sub-*pilosum* Z.: Gschieß, Zeilerberg; ssp. *brachytrichum* N. P. Mannersdorf, Purbach, Zeilerberg; ssp. *brennense* N. P. 1. *brevipilum* N. P.: Breitenbrunn; ssp. *minuticeps* N. P.: Illmitz; ssp. *pilosella* a) *genuinum* N. P.: Podersdorf; ssp. *sculptum* N. P. Forchtenau; ssp. *stenomacrum* N. P.: Breitenbrunn; ssp. *trichadenium* N. P.: b) *leucotrichum* N. P.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *tricholepium* N. P.: Weiden-Podersdorf, Haglersberg; a) *genuinum* N. P.: Wimpassing; ssp. *trichophorum* N. P. a) *genuinum* N. P.: Kobel; 2. *brevipilosum* N. P.: Weiden-Podersdorf, Frauenkirchen, Zeilerberg, Goldberg bei Breitenbrunn, Hölzelstein; ssp. *trichoscapum* N. P.: b) *orientale* 2. *latifolium* N. P.: Kobel; ssp. *vulgare* Tausch a) *genuinum* 1. *subpilosum* N. P.: Podersdorf, Forchtenau; 2. *setosum* N. P.: Königsschüssel; b) *subvulgare* N. P.: Forchtenau-Katzelsdorf; — *H. staticiforme* All.: Forchtenstein. — *H. subgermaniciforme* Z. ssp. *purbachense* Rech. & Z.: Purbach. — *H. subramosum* Z. ssp. *rubrum* Z. var. *xanthostylum* DC.: Purbach. — *H. Causchii* Z. ssp. *acrosciadium* N. P.: Königsschüssel; f. *brevipilum* N. P.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *amauron* N. P. 2. *subpilosum* N. P.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *Budaianum* Z.: Zeilerberg; ssp. *budense* N. P.: Haglersberg; ssp. *cymosiforme* N. P.: Zeilerberg, Haglersberg, Goldberg bei Breitenbrunn, Mannersdorf-Purbach;

ssp. *eu-unibelliferum* Z.: Podersdorf-Illmitz, Forchtenau; b) *sub-umbelliferum* Z.: Mannersdorf-Purbach; ssp. *manothyrsum* Z.: Zeilerberg; ssp. *suebophilum* Z.: Wallern-Apetlon, Königs-schüssel; ssp. *setulosum* N. P.: Haglersberg.

Monocotyledones.

Potamogetonaceae. *Potamogeton pectinatus* L.: St. Andrä, Illmitz, Podersdorf.

Zanichellia maritima Nolte: Illmitz, Illmitz-Podersdorf. — *Z. palustris* L.: Illmitz-Podersdorf.

Alismataceae. *Alisma gramineum* Gmelin: St. Andrä. — *A. stenophyllum* (A. Gr.) Sam.: Podersdorf-Weiden, Jois, Pachfurt, St. Georgen bei Eisenstadt.

Juncaginaceae. *Triglochin maritimum* L.: St. Andrä-Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf-Weiden, Neusiedl. — *T. pa-lustre* L.: Illmitz-Podersdorf-Weiden, Purbach-Donnerskirchen.

Butomaceae. *Butomus umbellatus* L.: Sarasdorf.

Sparganiaceae. *Sparganium erectum* L.: Neusiedl-Wei-den. — *Sp. simplex* Huds.: Weiden-Podersdorf.

Typhaceae. *Cypera angustifolia* L.: Neusiedl-Jois.

Araceae. *Acorus calamus* L.: Pachfurt.

Lemnaceae. *Lemna minor* L.: Podersdorf-Weiden.

Gramineae. *Sesleria uliginosa* Op.: Weiden-Podersdorf.

— *S. varia* (Jacq.) Wettst.: Steinkogel.

Phragmites communis Trin.: Illmitz, Purbach; f. *flavescens* Cöster: Apetlon, Podersdorf, Winden, Purbach; var. *pumila* G. F. W. Meyer: Podersdorf.

Koeleria gracilis Pers.: St. Andrä. — *K. pseudocristata* Domin: Parndorf, Purbach, Podersdorf-Weiden.

Melica transsilvanica Schur: Haglersberg, Oggau-Oslopp, Gols, Kaisersteinbruch. — *M. uniflora* Retz.: Mannersdorf-Purbach.

Briza media L.: Purbach.

Dactylis glomerata L.: St. Andrä, Rußt-St. Margareten; var. *abbreviata* Drej.: St. Andrä, Illmitz, Weiden-Podersdorf; var. *ciliata* Peterm.: Siegendorf-Eisenstadt; var. *pendula* Dum.: Kai-sersteinbruch.

Sclerochloa dura (L.) Beauv.: Purbach, Jois, Neusiedl, Parn-dorf.

Poa angustifolia L.: St. Andrä, Frauenkirchen, Purbach. — *P. annua* L.: Weiden-Podersdorf, Donnerskirchen-Oggau. — *P. badensis* Hnk.: Forchtenstein. — *P. bulbosa* L.: St. Andrä, Illmitz, Weiden, Podersdorf-Purbach, Hölzelstein, Rußt-St. Margareten, Haglersberg; var. *pseudococcina* Schur: St. Andrä; var. *verticillata* Coss. & Germ.: St. Andrä. — *P. nemoralis* L.: Sauerbrunn. — *P. palustris* L.: Winden. — *P. pratensis* L.: Purbach, Donnerskirchen, Oggau. — *P. trivialis* L.: Sarasdorf, Donnerskirchen-Gschieß, Mannersdorf-Purbach, St. Andrä; var. *glabra* Döll: St. Andrä.

Atropis distans (L.) Gris.: St. Andrä, Frauenkirchen, Wallern-Apetlon, Neusiedl. — *A. Peisonis* Beck: St. Andrä-Illmitz, Frauenkirchen, Jois-Neusiedl.

Glyceria aquatica (L.) Wahlb.: Sarasdorf, Bruck-Rohrau. — *G. fluitans* (L.) R. Br. Illmitz-Podersdorf-Frauenkirchen, Neusiedl-Weiden, Sauerbrunn. — *G. plicata* Fr.: Podersdorf-Illmitz, Jois.

*Festuca**; *elatior* L.: Donnerskirchen-Oggau. — *F. heterophylla* Lam. Kaisersteinbruch. — *F. ovina* L. var. *vulgaris* Koch subvar. *firma* Hack. Forchtenstein. — *F. pseudovina* Hack.: St. Andrä, Podersdorf-Illmitz; a) *angustifolia* Hack.: St. Andrä; ad *F. sulcata* vergens: St. Andrä; b) *typica* Hack.: St. Andrä, Illmitz-Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Parndorf, Hölzelstein. — *F. pseudovina* x *rubra*: Frauenkirchen-Podersdorf.

Bromus asper Murr.: Sauerbrunn. — *B. hordeaceus* L.: Frauenkirchen, Parndorf, Haglersberg, Donnerskirchen-Gschieß. — *B. racemosus* L.: St. Andrä., — *B. secalinus* L.: Neusiedl-Jois, Gschieß. — *B. tectorum* L.: Illmitz, Gschieß-Oggau.

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv: Pachfurt, Rohrau.

Lolium multiflorum Lam.: Siegendorf-Eisenstadt. — *L. perenne* L.: Frauenkirchen-Podersdorf.

Lepturus pannonicus (Host) Kunth: Illmitz (leg. Jul. Baumgartner.)

Agropyrum intermedium (Host.) Beauv.: Haglersberg. — *A. caninum* (L.) R. & Sch.: Pachfurt — *A. repens* L.: St. Andrä, Jois-Neusiedl. — *A. intermedium* x *repens*: Gols.

Hordeum murinum L.: Siegendorf-Eisenstadt, Frauenkirchen-Podersdorf.

Cynodon dactylon (L.) Pers.: Illmitz, Podersdorf, Weiden,
Siegentorf-Eisenstadt.

Holcus lanatus L.: Siegendorf-Eisenstadt.

Arena fatua L.: Weiden-Neusiedl-Jois.

Avenastrum pratense (L.) Jess.: Podersdorf-Illmitz, Hölzelstein. — *A. pubescens* (Huds.) Jess.: Illmitz-Podersdorf-Frauenkirchen-Weiden, Gschieß, Hölzelstein.

Arrhenatherum elatius (L.) M. & K.: Purbach-Donnerskirchen.

Stipa capillata L.: Weiden-Gols. — *S. pennata* L.: Zeilerberg. — *S. pulcherrima* C. Koch: Weiden-Podersdorf.

Oryzopsis virescens (Trin.) Beck: Zeilerberg.

Heleochoea schoenoides (L.) Host: Podersdorf.

Phleum phleoides (L.) Simk.: St. Andrä, St. Margareten, Königsschlüssel.

Crypsis aculeata (L.) Ait.: Podersdorf, Apetlon.

Alopecurus aequalis Sobol.: Purbach. — *A. pratensis* L.: Donnerskirchen-Oggau.

Agrostis alba L. (z. T. var. *prorepens* Koch): Illmitz, St. Andrä, Podersdorf, Neusiedl-Jois.

Apera interrupta (L.) Beauv.: Frauenkirchen-Podersdorf.

Digitaria filiformis Koel.: Weiden-Neusiedl.

Echinochloa crus galli (L.) R. & Sch.: Podersdorf.

Setaria verticillata (L.) R. & Sch.: var. *robusta* A. Br.: Weiden.

Andropogon ischaemum L.: Haglersberg, Weiden-Gols.

Juncaceae. *Juncus articulatus* L.: Illmitz, Podersdorf. — *J. bojunius* L.: Neusiedl-Jois; var. *ranarius* (Perr. & Song.): Podersdorf. — *J. compressus* Jacqu.: Illmitz. — *J. conglomeratus* L.: Sauerbrunn, Illmitz. — *J. effusus* L.: Sauerbrunn. — *J. Gerardi* Lois.: St. Andrä, Illmitz, Podersdorf, Neusiedl-Jois, Frauenkirchen, Gschieß, Donnerskirchen-Oggau, Parndorf; zumeist in der var. *atrifuscus* Rupr. — *J. subnodulosus* Schrk.: Weiden.

Luzula campestris (L.) DC: Rußt-St. Margareten. *L. multiflora* (Ehrh.) Lej.: Mannersdorf-Purbach. — *L. nemorosa* (Poll.) E. Mey.: Mannersdorf-Purbach, Forchtenstein. — *L. pilosa* (L.) Willd.: Mannersdorf-Purbach.

Cyperaceae. *Pyreus*^{var.} *flavescens* (L.) Rchb.: Weiden. — *Cyperus fuscus* L.: Podersdorf. — *Acorellus pannonicus* (Jacq.) Palla: Weiden, Podersdorf.

Eriophorum angustifolium Roth: Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Purbach. — *E. latifolium* Hoppe: Purbach.

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla: Illmitz, Podersdorf; var. *monostachys* Sond.: Podersdorf, Illmitz. — *Schoenoplectus Cabernaemontani* (Gmel.) Palla: Illmitz-Podersdorf-Weiden, St. Andrä, Frauenkirchen, Purbach-Donnerskirchen.

Bolbochoenus maritimus (L.) Palla: St. Andrä, Illmitz, Frauenkirchen, Pachfurt.

Blysmus compressus (L.) Panz.: Illmitz.

Holoschoenus vulgaris Lk.: Illmitz, Podersdorf.

Heleocharis palustris (L.) R. Br.: St. Andrä, Jois-Neusiedl, — *H. uniglumis* (L.) Schult.: St. Andrä, Podersdorf.

Schoenus nigricans L.: Podersdorf-Weiden, Neusiedl-Jois.

Carex acutiformis Ehrh.: Weiden, Weiden-Podersdorf. — *C. caryophyllacea* Latour.: Mönchhof-Zurndorf. — *C. Davalliana* Sm.: Podersdorf-Weiden-Neusiedl. — *C. distans* L.: St. Andrä, Illmitz, Frauenkirchen-Podersdorf-Weiden, Neusiedl-Jois, Parndorf, Purbach. — *C. disticha* Huds.: Podersdorf-Weiden, Donnerskirchen-Oggau, Purbach. — *C. divisa* Huds.: St. Andrä, Illmitz, Podersdorf. — *C. elata* All.: Podersdorf-Weiden, Podersdorf. — *C. flacca* L.: Podersdorf, Podersdorf-Weiden, Neusiedl-Jois. — *C. glauca* L.: Weiden. — *C. gracilis* Curt.: Gschieß-Seemühle. — *C. hirta* L.: Weiden, Weiden-Podersdorf. — *C. hordeistichos* Vill.: Parndorf. — *C. humilis* Leyss.: Mönchhof-Zurndorf, Jungerberg. — *C. nemorosa* Rebent.: Weiden, St. Andrä, Parndorf, Wilfleinsdorf-Kaisersteinbruch, Donnerskirchen-Oggau. — *C. nitida* Host: Illmitz, Podersdorf, Purbach. — — *C. nutans* Host: Donnerskirchen-Oggau. — *C. Oederi* Retz: Illmitz, Podersdorf-Weiden, Jois-Neusiedl; f. *canaliculata* Callmé (det. Küenthal): Gschieß. — *C. panicea* L.: Podersdorf, Weiden-Podersdorf, Neusiedl-Jois, Gschieß. — *C. paniculata* L.: Weiden, Purbach, Donnerskirchen-Oggau, Purbach. — *C. pendula* Huds.: Sauerbrunn, Forchtenau-Katzelsdorf. — *C. pilosa* L.: Mannersdorf-Purbach. — *C. Pairei* F. Schlitz.: Forchtenau-Katzelsdorf. — *C. praecox* Schreb.: Weiden, Zeilerberg, Höltzel-

stein. — *C. pseudocyperus* L.: Purbach, Gschieß, Gschieß-Semmühle. — *C. riparia* Curt.: Weiden-Podersdorf, Purbach, Donnerskirchen-Oggau, Königsschüssel-Siegendorf. — *C. secalina* Wahlenbg.: St. Andrä, Podersdorf-Weiden, Weiden, Neusiedl-Jois, Jois. — *C. stenophylla* Wahlenbg.: St. Andrä-Illmitz, Podersdorf-Weiden-Neusiedl, Frauenkirchen-Podersdorf, Rußt-St. Margareten. — *C. supina* Wahlenbg.: Haglersberg. — *C. tomentosa*. L.: Weiden-Podersdorf.,

Liliaceae. *Colchicum autumnale* L.: Podersdorf-Weiden.

Gagea arvensis (Pers.) Dum.: Jungerberg. — *G. bohemica* (Zausch.) R. & Sch.: Jungerberg. — *G. pusilla* (Schm.) R. & Sch.: Jungerberg.

Allium rotundum L.: Haglersberg, Eisenstadt-Höflein. — *A. sphaerocephalum* L.: Haglersberg.

Scilla bifolia L. Zeilerberg.

Ornithogalum Boucheanum (Kth.) Aschers.: Oggau-Oslopp. *O. comosum* L.: Weiden-Podersdorf, Haglersberg, Breitenbrunn. — *O. tenuifolium* Guss.: Zeilerberg, Purbach, Gschieß. — *O. umbellatum* L.: Weiden, Oggau-Oslopp.

Muscari comosum (L.) Mill.: Gschieß, Königsschüssel. — *M. racemosum* (L.) Lam. & DC: Neusiedl, Haglersberg. — *M. tenuiflorum* Tausch: Weiden-Podersdorf, Gschieß.

Polygonatum latifolium (Jacqu.) Desf.: Halbthurn, Zeilerberg, Wimpassing. — *P. multiflorum* (L.) All.: Halbthurn, Wimpassing. — *P. officinale* All.: Wimpassing, Zeilerberg.

Asparagus officinalis L.: Mönchhof-Zurndorf, Weiden-Podersdorf.

Convallaria majalis L.: Zeilerberg, Mannersdorf-Purbach, Wimpassing.

Iridaceae. *Iris germanica* L.: Zeilerberg. — *I. pseudacorus* L.: Purbach-Donnerskirchen. — *I. pumila* L.: Mönchhof-Zurndorf, Weiden-Podersdorf, Haglersberg, Zeilerberg. — *I. sibirica* L.: Weiden-Podersdorf. — *I. variegata* L.: Spitalwald bei Bruck.

Orchidaceae. *Ophrys aranifera* Huds. f. *fucifera* Curt. Weiden-Podersdorf.

Orchis incarnata L.: Weiden-Podersdorf, Purbach, Gschieß. — *O. militaris* L.: Weiden-Podersdorf. — *O. morio* L.: Weiden-

Podersdorf, Purbach, Rußt-St. Margareten. — *O. palustris* Jacqu.
St. Andrä, Weiden-Podersdorf, Neusiedl, Purbach. — *O. purpurea*
Huds.: Zeilerberg, Wimpassing. — *O. tridentata* Scop.: Weiden-
Podersdorf. — *O. ustulata* L.: Purbach.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.: Spitalberg-Bruck.

Cephalanthera longijolia (L.) Fritsch: Mannersdorf-Purbach.

Epipactis palustris (L.) Cr.: Neusiedl, Neusiedl-Jois.

Neottia nidus avis (L.) Rich.: Mannersdorf-Purbach.

Listera ovata (L.) R. Br.: Siegendorf-Königsschüssel.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des Vereine für Naturkunde zu Presburg](#)

Jahr/Year: 1933

Band/Volume: [NF_26](#)

Autor(en)/Author(s): Rechinger Karl Heinz

Artikel/Article: [Floristisches aus der Umgebung des Neusiedler Sees 51-83](#)