

Aufzählung

der

oberösterreichischen Cyperaceen.

Von

Engelbert Ritzberger.



Wenn ich vorliegende Arbeit der Oeffentlichkeit übergebe, so will ich durchaus kein hervorragendes Werk geschrieben, sondern nur eine kurze Aufzählung der in Oberösterreich vorkommenden Cyperaceen dargelegt haben. Da ich ohnedies mit einer allgemeinen Aufzählung aller in Oberösterreich gefundenen Pflanzen beschäftigt bin, so führte ich auch die Fundorte der einzelnen Species nur kurz an. Oberösterreich, sehr reich an Seggen, dürfte noch manche Seltenheit bergen; darum verdanken auch folgende Zeilen diesem Umstande ihre Entstehung. Die Eintheilung ist nach *Thomes* „Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz“. In Betreff der Varietäten-Begriffe folgte ich den Ansichten der neueren Botaniker.

Ich kann nicht umhin, auch den Förderern meiner Arbeit, insbesondere der löblichen *Leitung des Vereines für Naturkunde*, in dessen Schriften diese Zeilen ehrende Aufnahme gefunden, ferner dem Herrn k. k. Statthaltereirathe *Dr. Schiedermayr*, Herrn kais. Rathe *Saxinger*, Herrn Schulleiter *Topitz* in St. Nicola, Hochw. Herrn Pfarrer *Haselberger* in Arbing, Herrn *Dörfler* in Wien, als auch meinem einstigen hochverehrten Lehrer *Prof. Vierhapper* meinen wärmsten Dank auszusprechen.

An alle Freunde der heimischen Floristik richte ich die Bitte, mir ihre Funde anzuzeigen, um so eine möglichst getreue Standortsangabe zu erlangen.

Werke wurden folgende benützt: *Thome*: Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz; *Duftschnid*: Flora von Oberösterreich; *Vierhapper*: Flora des Innkreises; *Brittlinger*: Flora von Oberösterreich; *Bayer*: Excursionsbuch; *Mick*: Flora von Freistadt; *P. Guppenberger*: Flora von Kremsmünster und die Manuscripte von den Herren *Dr. Dürnberger*, *P. Schwab* in Kremsmünster, *Haselberger* in Arbing und viele kleinere Aufsätze.

Mögen diese Blätter ihre Wege ziehen und milde Richter finden.

Cyperaceae Db. Cypergräser.

1. Carex L. Segge.

I. Monostachyae, Einährige.

1. *Carex dioica* L. Zweihäusige Segge. *C. Linneana* Host., *C. laevis* Hoppe. Auf Moor und Sumpfwiesen zerstreut. Um Linz bei Kirchschlag, in der Kunöd, um Kleinmünchen. Im Mühlkreise noch um Baumgartenberg, Waldhausen, Weissenbach a. W. u. s. w. Um Wels, Lambach, Wimsbach, Windischgarsten, Mondsee, Zell am Moos, im Ibmermoose und um Reichersberg. April—Juni.
 β . *isogyne* Fries. Unter der Stammform bei Kirchschlag. Selten (Ritzb.).
2. *Carex pulicaris* L. Flohsegge. *C. psyllophora* Ehrh. Selten. Um Kirchschlag, in der Föhrau, um Reichenau (v. Mor). Im Innkreise auf nassen Wiesen um Reichersberg (Reuss) und im Waidmoos bei Steinwag (V.). Um Gmunden beim Laudachsee, bei Zell am Moos. Bei Neustift (Oberleitner), um Weyer (Breitenlohner). Nasse Wiesen in Hinterstoder (Dr. Dürrenberger). Mai—Juni.
3. *Carex Davalliana* Sm. Davalls Segge. *C. dioica* Host. *C. scabra* Hoppe. *C. spicata* Sprengl. *Vignea Davalliana* Rehb. Auf nassen Wiesen, Sumpf- und Moorgründen durch das ganze Gebiet gemein. April—Mai.
 β . *Sieberiana* Opiz. Im Innkreise am Lohnsburger Hochkuchel, beim Hochholz und bei Niederbrunn nächst Ried (V. Ritzb.).
4. *Carex pauciflora* Lightf. Wenig blütige Segge. *C. patula* Huds. *C. leucoglochin* Ehrh. Torfmoore. Selten. Am österreichischen Blöckensteinfilz, um Weissenbach a. W., Burgsteiner Torfmoor (Kerner), Torfmoore in der Rosenau, um Windischgarsten, Weyer (Breitenlohner). Im Innkreise im Ibmer- und Waidmoos an mehreren Stellen, z. B. Steinwag, Kellermoor (V.). Mai—Juni.

II. Hyparrhenae, Untenmännige.

5. *Carex brizoides* L. Zittergrasartige Segge. *Vignea brizoides* L. Gemein in Wäldern, Hainen, Holzschlägen und feuchten, buschigen Stellen, oft massenhaft und tonangebend. Mai—Juni.
6. *Carex praecox* Schreb. Frühblühende Segge. *C. Schreberi* Schruk. An sonnigen Abhängen, trockenen Hügeln, lichten Waldungen zerstreut. Dammweg nächst der Urfahrkirche, Mauern in Katzbach, um Plesching (*Ritzb.*) auf der Heide, bei Schwertberg und um Windhag. Um Windischgarsten, Steyr, Hall, Kremsmünster, Kirchdorf. Im Innkreise bei der Hohenzellerbrücke nächst Ried (*V.*), bei Aspach (*Ritzb.*). Mai—Juni.
 β . *curvata* Knaff. (*C. pallida* Lang.) Um Plesching selten. (*Ritz.*)
7. *Carex cyperoides* L. Cypergrasähnliche Segge. *C. bohémica* Schreb. *Schelhammeria cyperoides* exs. *Schelh. capitata* Mönch. An Teichen und Sümpfen sehr selten. Soll um Sandl und Liebenau im Mühlkreise vorgekommen sein (*Pr. Mayr*). Juni—September.
8. *Carex leporina* L. Hasenpfotensegge. *C. ovalis* Good. *Vignea leporina* Rehb. Auf feuchten, moorigen und sandigen Triften, Waldlichtungen u. s. w. durch das ganze Gebiet gemein. Mai—Juni.
9. *Carex remota* L. Entferntährige Segge. *Vignea remota* Rehb. An schattigen, feuchten Orten gemein. Mai—Juni.
10. *Carex echinata* Murr. Igelfrüchtige Segge. *C. stellulata* Good. *Vignea stellulata* Rehb. Feuchte, sumpfige Stellen durch das ganze Gebiet. Mai.
11. *Carex Vierhapperi* Beck. Vierhappers Segge. *C. echinata remota* Vierh. Aeusserst selten. Im Hochholz bei Ried (*Vierh.*). Mai—Juni.
12. *Carex canescens* L. Weissgraue Segge. *C. curta* Good. *C. cinerea* Wilh. *C. tenella* Erh. *C. elongata* Leers. *Vignea tenella* Erh. *V. canescens* Rehb. Auf sumpfigen Wiesen zerstreut. Haselgraben (*v. Mor*), Pfenningberg, Föhrau (*Dr. Rauscher*), Kirchschlag. Am Pyrh bei Spital (*Brittinger*). Um Aigen (*Simmerl*). Im Innkreise bei Ried, Wippenham, Aurolzmünster, Hausruck bei Marienkirchen und Eberschwang, um Magetsham, im Ibmer- und Waidmoose (*V.*). Mai—Juni.
 β . *subloliacea* Asch. Hochholz bei Ried (*V.*).
13. *Carex elongata* L. Langährige Segge. Sumpfige Wiesen, feuchte Waldstellen zerstreut. Haselgraben, Heide bei Linz, Luftenberg, Pulgarn, um Baumgartenberg, Lichtenegg bei Wels, Geyersberg,

Ried, Aurolzmünster, Andorf (*Haselberger*), Wildshut (V.), Ibmermoos, Reichersberg u. s. w. Mai—Juni.

β. *heterostachya* Wimm. Gräben bei Wiesbaden nächst Ried. (*Vierh.*)

14. *Carex Heleonastes* Ehrh. Torfsegge. Sehr selten. Ibmermoos bei Dorf Ib in im Kellermoose. (*Vierh.*) Mai—Juni.

III. *Acrarrhenae*, Obenmännige.

15. *Carex chorrorrhiza* Ehrh. Fadenförmige Segge. *C. funiformis* Clairv. Im Ibmermoose (V.). Mai—Juni.
 16. *Carex stenophylla* Whlb. Schmalblättrige Segge. *C. juncifolia* Host. Sehr selten. Um Mattighofen (*P. Schwab*). April—Mai.
 17. *Carex vulpina* L. Fuchsrothe Segge. *Vigna vulpina* Rehb. Gemein durch das Gebiet. Mai—Juni.

β. *nemorosa* Rebeu. Um Linz, Wels, Lambach, Steyr, Neustift, Ischl, Mondsee, Reichersberg u. s. w.

18. *Carex paradoxa* W. Abweichende Segge. *C. canescens* Host. *Vigna paradoxa* Rehb. Sümpfe, Moorgründe; sehr selten. Um Mondsee (*Hinterhuber*). Sümpfe um Zell am Moos, Ibmermoos bei Eggelsberg, am Häretingersee, Seeleitnersee, bei Dorf Ib und Franking (V.). Wörzing bei Kirchberg, um Mattighofen. (*P. Schwab*). Mai—Juni.
 19. *Carex paniculata* L. Rispige Segge. *Vigna paniculata* Rehb. Moore und Sümpfe verbreitet. Mai—Juni.
 20. *Carex teretiuscula* Good. Rundliche Segge. *C. diandra* Rth. *Vigna teretiuscula* Rehb. Auf Sumpf- und Moorgründen; selten. Am Eingange des Haselgrabens bei Linz, Diessenleithen (*Hübner*). Um Windhaag, Königswiesen (*Dittelbacher*). Um Steyr, Windischgarsten, Reichersberg, Moosleithen bei Andorf (*Haselberger*). Ibmer- und Waidmoos (V.). Mai—Juni.
 21. *Carex muricata* L. Sperrfrüchtige Segge. *C. contigua* Hoppe. Mauern, Wiesen und Wälder durch das ganze Gebiet. Mai—Juni.
 22. *Carex virens* Lam. Unterbrochenährige Segge. *C. divulsa* Good. In Wiesen und Wäldern. Zerstreut. Freinberg bei Linz (*Ritzb.*). Im Innkreise bei Ranshofen (V.). Um Aspach (*Ritzb.*). Mai—Juni.

β. *Pairaei* F. Schultz. Diese *Carex* species wurde im Gebiete wahrscheinlich vielfach übersehen. Ich fand sie um Ried an mehreren Stellen, um Plesching, am Freinberg und bei Ottensheim. Alle von mir gesammelten Exemplare stimmen vollkommen mit Original-Exemplaren von F. Schultz überein.

23. *Carex curvula* All. Gekrümmtblättrige Segge. Auf steinigem Alpenrändern. Selten. Am kleinen Priel (*Dürrenberger*), an der Klinerscharte, am Lahnafeldwege zur Speikwiese (*Saxinger*). Juli—August.

IV. Heterostachyae, Verschiedenährige.

24. *Carex microstachya* Ehrh. Kleinährige Segge. Auf Torf- und Moorzweiden; selten. Auf einer Wiese am Wege von Kirchschlag gegen Zwettl. Juni.
25. *Carex mucronata* Gaud. Dolchspitzige Segge. Auf dünnen Abhängen der Alpen und Voralpen. Selten. Am Birdstein in Rosenau bei Windischgarsten. Am Hohenock (*Engel*). An der Klinerscharte. Am Kasberge (*v. Mor*). Am Traunstein (*Sturm*). Juli—August.
26. *Carex disticha* Huds. Zweizeilige Segge. *C. intermedia* Good. *C. spicata* Poll. *Vignea intermedia* Rehb. Auf sandigen, feuchten Wiesen verbreitet. Mai—Juni.
27. *Carex sempervirens* Vill. Immergrüne Segge. An trockenen Orten der Alpen. Almkogel bei Weyer, um Windischgarsten (*Oberleitner*). Auf sämtlichen Stoderalpen und Voralpen. Teufelsmauer bei Micheldorf. Um Traunkirchen (*Dörfler*). An den Ufern der Steyer bei Klaus (*Schiedermayr*). Juni—Juli.
28. *Carex hirta* L. Kurzhaarige Segge. Auf feuchtem, sandigem Boden häufig. Mai—Juni.
- β. *hirtae formis* Pecs. Auen der Donau bei Ottensheim, Linz, an der Traun bei Wels. Um Aistersheim (*Keck*). Bei Dachsberg (*Dr. Dürrenberger*), Gahberg bei Schörfling (*Haselberger*). Um Andorf (*Haselberger*), bei Mehrnbach (*Ritzb.*).
29. *Carex ferruginea* L. Rostrote Segge. *C. Scopolii* Gaud. *C. Mielichhoferi* Schkuhr. Auf moorigen und steinigem Wiesen der Alpen und Voralpen. Almkogel bei Weyer, am Schoberstein. An der Steyer bei Klaus, am kleinen Priel, am Dachsteingebirge (*Kerner*). Griesaim bei Steinbach am Attersee, Saarstein bei Hallstatt (*Haselberger*). Juni—Juli.
30. *Carex filiformis* L. Fädliche Segge. *C. splendida* W. *C. lasiocarpa* Ehrh. In Torfsümpfen sehr selten. Um Gschwendt, um Steyr (*Brittinger*). Im Ibmermoos am Höllerer-, Häretinger- und Seeleithnersee. (V.) Mai—Juni.
31. *Carex Pseudo-Cyperus* L. Cypergrasähnliche Segge. In Sümpfen, an Ufern selten. Um Steyr, im Gleinkerteich (*Brittinger*). Um

Ried im Innkreise (v. Glanz). Um Aurolzmünster, Wiesbaden (V.), bei der Teglmühle (Dörfler, Ritzb.). Um Niederbrunn (Dörfler). Um Andorf (Haselberger), Ibmermoos (V.). Juni.

β. minor Hampe. Um Aurolzmünster (V.), bei Niederbrunn (Ritzb.).

32. *Carex rostrata* Willh. Geschnäbelte Segge. *C. vesicaria* var. β. L. *C. obtusangula* Ehrh. *C. ampulacea* Good. Auf moorigen Wiesen, in Sümpfen, an Gräben, Bächen verbreitet. Mai—Juni.
33. *Carex riparia* Curt. Ufersegge. *C. crassa* Ehrh. *C. vesicaria* Leers. An Teichen, Gräben, Flussufern u. s. w. verbreitet. Um Linz in den Auen, an der Traun bei Ebelsberg, Pucking, Wels, Lambach (Ritzb.). An den Ufern der Enns, Steyr. Am Mondsee. Im Innkreise bei Ried, um Minning (V.). Mai—Juni.
34. *Carex vesicaria* L. Blasensegge. *C. inflata* Hoffm. An feuchten Orten häufig. Mai—Juni.
35. *Carex acutiformis* Ehrh. Sumpfssegge. *C. paludosa* Good. *C. acuta* Curt. Auf feuchten Wiesen, an Gräben und Teichrändern u. s. w. häufig. Mai.
36. *Carex Kochiana* Db. Kochs Segge. *C. spadicea* Roth. An der Traun zwischen Ebelsberg und Ansfelden, beim Teiche nächst dem Bahnhofe zu Neuhofen (Dr. Dürrnberger). Bei Plesching (Ritzb.). Mai.
37. *Carex distans* L. Entferntährige Segge. Auf feuchten Wiesen. Um Kremsmünster, Hall, Steyr, Windischgarsten, bei Almegg. Um Mondsee und Zell am Moos. Im Innkreise selten. Ibmer, und Waidmoos (V.), Andorf (Haselberger), Niederbrunn (Dörfler), St. Marienkirchen, Pramet. Aspach (Ritzb.). Mai—Juni.
38. *Carex Hornschuchiana* Hoppe. Hornschuchs Segge. *C. biformis* β *sterilis*. (F. Schultz). Auf Torfwiesen zerstreut. Um Linz bei Kleinmünchen und Ebelsberg, bei der Giselowarte, in den Koglerauenen, um Reichenau. Sumpfwiesen am Pfenningberg (Ritzb.). Um Lest, Königswiesen (Dittelbacher); bei Waldhausen, Arbing (Haselberger). Um Windischgarsten (Oberleitner). Am Lahnafeld. Wiesen bei Dachsberg in Hinterstoder (Dr. Dürrnberger); bei Steyr (Bayer), Ibmer- und Waidmoos (V.). Mai—Juni.
39. *Carex flava* z *Hornschuchiana* Wimm. *C. fulva* Good. *C. biformis* α *sterilis* (F. Schultz). Sehr selten. Voralpen bei Mondsee. Pfenningberg bei Linz (Ritzb.), Kremsmünster bei der Grubmühle (P. Schwab). Mai—Juni.
40. *Carex fuliginosa* Schkr. Russfarbige Segge. *C. frigida* Whbg. *C. spadicea* Schkr. Auf feuchten Gras- und Kiesplätzen der

- Alpen. Im Gerölle der höchsten Kalkalpen um Spital, am grossen Pyrgas, auf der Speikwiese (*Brittinger*, *Oberleitner*, *Saxinger*). Juli—August.
41. *Carex silvatica* Huds. Waldsegge. *C. Drymeja* Ehrh. *C. capillaris* Leers. *C. patula* Scop. An feuchten Waldplätzen häufig. Juni.
 42. *Carex frigida* All. Kälteliebende Segge. *C. fuliginosa* Whlbg. *C. geniculata* Host. Am kleinen Priel (*Brittinger*), am Warschenegg (*Saxinger*). Juli—August.
 43. *Carex Michelii* Host. Michelis Segge. In Gehölzen, Holzschlägen, Felsabhängen. Um Linz am Pöstlingberg, an den Urfahrsteinwänden. In Wäldchen der Heide bei Neubau, Wels, Lambach. Um Reichersberg. Mai—Juni.
 44. *Carex tenuis* Host. Dünne Segge. *C. brachystachys* Schruk. *C. linearis* Clairv. In den Alpen. Am Schoberstein, bei Windischgarsten, am Pieslingursprung, am Steyersteg (*Oberleitner*). Am Traunstein. Am Dachstein (*Kerner*). Juni—Juli.
 45. *Carex lepidocarpa* Tausch. Schuppenfrüchtige Segge. *C. lipsiensis* Peterm. Auf Torf- und Moorzweiden selten. Ueberackern (*Haselberger*), am Hausruck bei Eberschwang und im Moore zwischen Zell am Pettenfürst und Burghausen (*V.*). Mai—Juni.
 46. *Carex flava* L. Gelbe Segge. Auf sumpfigen, besonders torfigen Wiesen gemein. Mai—Juni.
 47. *Carex Oederi* Ehrh. Oeders Segge. Auf sumpfigen, torfigen Wiesen zerstreut. Um Linz in der Kunöd, um Kirchschlag, Schauerwald, Föhrau, um Traberg, Rainbach, Helfenberg, Schlägl. Auf Sumpfwiesen um Steyr, Weyer, Micheldorf, Pyrgas, Warschenegg, Lahnafeld, Schafberg u. s. w. Im Innkreise in Ibmer- und Waidmoos, um Wildshut (*V.*), um Mattsee (*P. Schwab*). Mai—August.
 48. *Carex firma* Host. Steifblättrige Segge. Auf Kalkfelsen der Alpentäler, Voralpen gemein. Juni—Juli.

V. Heterostachyae, Verschiedenährige.

49. *Carex caespitosa* L. Rasenbildende Segge. *C. pacifica* Drej. *C. Drejeri* Lang. *C. neglecta* Peterm. *C. spreta* Steudel. Moorzweiden, Sumpfwiesen zerstreut. Um Kirchschlag, Kunöd, Lest, Weissenbach a. W. Auf Mooren und Sümpfen der Alpenkette, um Weyer (*Brittinger*). Im Gjaid (*Kerner*), um Mondsee u. s. w.

Im Innkreise, am Hausruck bei Marienkirchen und im Ibmermoos (V.). Mai—Juni.

β. *turfosa* Fr. Bei Marienkirchen am Hausruck (Ritzb.).

50. *Carex stricta* Good. Steife Segge. *Vignea stricta* Rehb. An stehenden Gewässern, in sumpfigen und torfigen Wiesen zerstreut. Um Linz an mehreren Stellen, an der Michl bei Neufelden (Dr. Dürrnberger), Wiesen längs der Traun. Um Weyer. Zwischen Lauterbach und Kirchdorf, bei Windischgarsten. Im Innkreis bei Minning (V.), bei Basling (Haselberger), bei Ranshofen, Braunau, Rottenbach und im Ibmermoos (V.). April—Mai.
51. *Carex rigida* Good. Starre Segge. Auf steinigten, sumpfigen Orten der Alpen. Selten. Am Saarstein bei Hallstatt (Haselberger). Juni—August.
52. *Carex Buckii* Wimmer. *C. banatica* Heufl. An der Aist bei der Mühle unter Schloss Haus (Dr. Dürrnberger).
53. *Carex acuta* L. Scharfe Segge. *C. gracilis* Curt. *C. tricosata* Fr. An Gräben, Teichrändern, Flussufern gemein. Mai. Formenreiche Pflanze.

α. *corynophora* Peterm. Donauauen bei Linz (Ritzb.).

β. *fluviatilis* Hartm. Bei Ranshofen, Ostermiething, Simling, Braunau, Minning (V.).

γ. *strictifolia* Opiz. Sümpfe bei Aurolzmünster (V.).

δ. *tricosata* Fr. Bei Peterskirchen, Andrichsfurt, Aurolzmünster (V.).

ε. *chlorostachya* Rehb. Bei Niederbrunn (Ritzb.).

54. *Carex Goodenoughii* Gay. Goodenoughs Segge. *C. acuta* var. *nigra* L. *C. vulgaris* Fr. *C. caespitosus* aut non L. *C. stolonifera* Hoppe, *Carex polyandra* Schk. Auf nassen Wiesen, an Gräben u. dgl. gemein. April—Juni. Sehr veränderliche Art.

α. *melaena* Wimm. Im Ibmer- und Waidmoos (V.) u. s. w.

β. *juncella* Fr. Am Hausruck, bei Wippenham, im Ibmermoose (V.) am Pfenningberg und im Kirnbergerforst bei Linz (Ritzb.).

γ. *turfosa* Fr. Verbreitet, z. B. im Ibmermoose (V.). Andorf (Haselberger), um Steyregg (Ritzb.).

δ. *chlorostachya* Rehb. Bei Ried im Innkreis, ferner um Mehrnbach, Andrichsfurt (V.), um Lambach (Ritzb.).

55. *Carex pallescens* L. Blasse Segge. Auf feuchten Wiesen und nassen Waldplätzen durch das ganze Gebiet. Mai—Juni.
56. *Carex maxima* Scopoli. Grösste Segge. *C. pendula* Erh. *C. agastachys* Erh. Auf feuchten Waldplätzen zerstreut. Um Linz am Pfenningberg (Ritzb.), bei Kirchdorf (Dr. Schiedermayr), bei Steyr (Brittinger), bei Weyer. Schluchten der Rana bei Kappel. Stein-

- wald bei Reichenthal im Mühlkreise (*Dr. Dürrenberger*). Am Grünberg bei Gmunden (*Dörfler*). Im Innkreise um Ried, Peterskirchen, Hausruck bei Eberschwang (*V.*), bei Haag (*Dörfler*). Um Andorf (*Haselberger*). Um Kirchberg (*P. Schwab*). Mai—Juni.
57. *Carex capillaris* L. Haarstielige Segge. Felsige Orte der Alpen. Am Hohennock, am Ochsenwalde bei Spital, am Lahnafelde und der Speikwiese des Warscheneggs (*Oberleitner*), am grossen und kleinen Pyrgas, am hohen Priel und am Kirchtag. Auf der Brennerin bei Steinbach am Attersee (*Haselberger*). Juni—Juli.
58. *Carex alba* Scop. Weisse Segge. *C. nemorosa* Schk. An feuchten Orten der Gebirgswälder. Durch das ganze Gebiet stellenweise. April—Mai.
59. *Carex nitida* Host. Glänzende Segge. Sehr selten. Früher an der Traun bei St. Peter und Marchtrenk. Im Stoder? Auf Kies der Enns bei Enns (*Ritzberger*). April—Mai.
60. *Carex pilosa* Scop. Wimperblättrige Segge. In Laubwäldern zerstreut. Um Linz im Zauberalth, Buchenau, Plesching (*Ritzb.*) und bei St. Magdalena u. s. w. Ferners bei Wels, Lambach, Wimsbach, Gmunden (*Dörfler*). In Wäldern um Weyer, Neustift, Molln, Steyr, im Stoderthale. Um Kirchdorf. Bei Passau (*Sendtner*). April—Mai.
61. *Carex panicea* L. Fennigfrüchtige Segge. Auf nassen, sumpfigen Wiesen durch das ganze Gebiet gemein. Mai—Juni.
62. *Carex flacca* Schreb. Blaugrüne Segge. *C. glauca* Scop. *C. recurva* Huds. *C. limosa* Leers. An feuchten, sumpfigen Orten gemein. April—Mai.
- β. *erythrostachys* Hoppe. Waldränder zwischen Minning und Hagenau (*V.*), Pfenningsberg und Waldränder bei Buchenau nächst Linz (*Ritzb.*).
63. *Carex Buxbaumii* Whlbg. Sehr Selten. Um Andorf (*Haselberger*). Um Egelsee bei Kirchberg (*P. Schwab*).
64. *Carex atrata* L. Schwärzliche Segge. Stoderalpen, Warschenegg, am grossen Pyrgas, am Dachsteingebirge, Kranabitsattel, Schafberg. Juni—August.
65. *Carex nigra* All. Schwarze Segge. Am Hohennock (*Engel*), am grossen und kleinen Priel, grossen und kleinen Pyrgas, am Lahnafeld und der Speikwiese des Warscheneggs, am Kasberg, am Dachsteingebirge (*Kerner*), am Schafberg. Juli.
66. *Carex limosa* L. Schlammsegge. In Sümpfen selten. Um Kremsmünster im Schacher (*Hochstetter*). Am Traunfall (*Brittinger*). In Sümpfen zwischrn Seewalchen und Zell am Moos. Im Inn-

- kreise im Ibmer- und Waidmoos (V.), Rödльмоos, Rudersberg bei Kirchberg, um Michelbeuern (P. Schwab). Mai—Juni.
67. *Carex supina* Willbg. Niedrige Segge. *C. obtusata* Lilj. *C. campestris* Host. *C. glomerata* Lehr. Auf sonnigen Abhängen. Um Linz auf der Heide(?), um Kirchschlag, bei Reichenau (Ritzb.). Am Pfaffenstein bei Weyer (Breitenlohner). Im Veilchenthale bei Windischgarsten (Oberleitner). April—Mai.
68. *Carex gynobasis* Vill. Bodenblütige Segge. *C. alpestris* All. *C. diversiflora* Host. In den Alpen zerstreut. Um Neustift, Windischgarsten (Oberleitner). In der Feichtau bis zur Krummholzregion des Hohennock (Engel). Am Wege von Innerstoder zum Skracken (Saxinger). Am Pyrh n bei Spital (Brittinger).
69. *Carex humilis* Leyss. Niedrige Segge. *C. clandestina* Good. Auf trockenen Abhängen zerstreut. Um Neustift, Windischgarsten, bei Altpernstein, am Pröller und Georgenberg bei Micheldorf. Am Traunstein bei Gmunden (Dörfler). Auf Hügeln um Steyr, bei Kremsmünster (Hofstetter). Auf Alluvium der Heide bei Wels, um Lambach (Ritzb.). März—April.
70. *Carex Dürnbergeri* Ritz. Dürnbergers Segge. *Carex humilis* $\times$ *alba* Dürn. Sehr selten. Unter den Stammeltern am Kreuzberge bei Weyer (Dr. Dürnberger).
71. *Carex ornithopoda* W. Vogelklauenährige Segge. In lichten Waldungen durch das Gebiet zerstreut. Um Linz am Pfenningberg (Ritzb. R.), Kirnbergerwald, Ebelsberg, Heidewäldchen bei Marchtrenk (Ritzb.), Wels, Lambach. Um Kremsmünster, Weyer, Steyr, Klaus, Windischgarsten u. s. w. Im Salzkammergute. Im Innkreise in der Salzachau bei Wildshut und bei der Ruine Ibm (V.), um Kirchberg (P. Schwab), am Inn bei Wernstein (Haselberger). April—Mai.
72. *Carex digitata* L. Fingerährige Segge. In schattigen Wäldern durchs ganze Gebiet häufig. April—Mai.
73. *Carex montana* L. Bergsegge. In lichten Wäldern, auf trockenen Heiden, mit Ausnahme des Innkreises häufig. Im Innkreise im Wildshuter Bezirke bei Ibm (V.). Bei Pramet (Ritzb.). April—Mai.
74. *Carex montana* $\times$ *ericetorum* Ritz. Sehr selten. Beim Weingartshof nächst Linz unter den Stammeltern (Ritzb.). Mai.
75. *Carex ericetorum* Poll. Heidesegge. *C. ciliata* W. *C. montano* Leers. Auf Heiden, Sandboden, Waldrändern u. dgl. zerstreut. Auf der Heide bei Linz, Marchtrenk, Wels (Ritzb.). Bei Rading

an der Salza und um Windischgarsten. Im Innkreise um Geretsberg (V.) und um Passau (Sendtner). April—Mai.

76. *Carex verna* Vill. Frühlingssegge. *C. praecox* Icyn. *C. filiformis* Leers. *C. stolonifera* Ehrh. *C. mollis* Host. An trockenen Triften, Rainen, in Wäldern häufig. März—April.
77. *Carex longifolia* Host. Langblättrige Segge. *C. polyorhiza* Whlbg. *C. umbrosa* Hoppe. In schattigen Laubwäldern sehr zerstreut. Pöstlingberg, Pfenningberg, Kirnberg bei Linz. Am Wege von Frieseneck nach Allharting. Um Steyr, in Stoder. Im Innkreise um Passau (Sendtner), an der Salzachleithen bei Eiferding nächst Wildshut (V.), bei Kirchberg (P. Schwab). Mai.
78. *Carex pilulifera* L. Pillentragende Segge. *C. filiformis* Poll. *C. decumbens* Ehrh. Auf Heiden, Waldlichtungen durchs ganze Gebiet verbreitet. April—Mai.
79. *Carex tomentosa* L. Filzfrüchtige Segge. *C. sphaerocarpa* Ehrh. Auf Moorzweiden, schattigen Waldstellen sehr zerstreut. Um Linz im Kirnbergerwalde, am Traunauflusse bei Zizlau (Dr. Dürrenberger), am Pfenningberge (Ritzb.). Zahlreich um Kremsmünster (Hofstetter), Hall, Steyr u. s. w. Im Innkreise bei Eberschwang und im Ibmermoose (V.). Mai—Juni.

2. *Elyna* Schrad. Nacktrietgras.

80. *Elyna spicata* Schrad. Aehrentragendes Nacktrietgras. *Kobresia scirpina* W. *Carex myosuroides* Vill. *C. Bellardi* All. *C. hermaphrodita* Gmel. *C. Dufourii* Lepeyr. Hochalpenpflanze. Am grossen Priel (Langeder), am Dachsteingebirge (Kerner). Juni—August.

3. *Kobresia* W. Schuppenriet.

81. *Kobresia caricina* W. Seggenartige Kobresia. *Elyna caricina* Dfl. *Schoenus monoicus* Engl. *Carex mirabilis* Host. *C. hybrida* Schkr. *C. tripartita* All. Hochalpenpflanze. Am grossen Pyrgas (Brittinger). Auf dem Lahnafelde, der Speikwiese und dem Warschenegg (Oberleitner), Klinserscharte am hohen Priel (Dr. Dürrenberger). Juli—August.

4. *Cyperus* Tournefort. Cypergras.

82. *Cyperus flavescens* L. Gelbliches Cypergras. *Picreus flavescens* Rehb. Auf nassem Sand-, Lehm- und Torfboden zerstreut. Um Linz am Leistenhof, Donauauen bei der Schiffswerfte und Steyregg.

Um Baumgartenberg, Waldhausen. Häufig bei Windischgarsten, um Kirchdorf, Kremsmünster, Mondsee u. s. w. Im Innkreise bei Wildshut, im Waidmoos (V.) bei Eberschwang (Ritzb.), Ibmermoos beim Weichsee (Haselberger), bei Mattsee. (P. Schwab). August—September.

83. *Cyperus fuscus* L. Schwärzliches Cypergras. Auf nassem, sumpfigem Boden sehr zerstreut. Aufräben und Wiesen längs der Donau. Um Enns, Baumgartenberg, Traunauen bei Kleinmünchen, Wels, Lambach. In Locheu, um Aistersheim (Keck). Um Kremsmünster, Steyr, Windischgarsten, Mondsee u. s. w. Im Innkreise bei Wildshut (V.), Eiferding (V. j.), im Waidmoos (V.), um Kirchberg (P. Schwab). Um Andorf (Haselberger); bei Niederbrunn nächst Ried (Dörfler). August—September.

β. *virescens* Hoffm. Donauauen bei Linz, Traunauen, Mondsee, Windischgarsten, im Stoder (Dr. Dürrenberger), Niederbrunn bei Ried (Ritzb.), bei Wildshut (V.) und Andorf (Haselberger).

5. *Schoenus* L. Kopfried.

84. *Schoenus ferrugineus* L. Rostbraunes Kopfried. *Chaetophora ferruginea* Rehb. *Streblidia ferruginea* Link. Torfwiesen. Selten. Um Klaus (Brittinger), bei Windischgarsten (Oberleitner). Bei Mondsee, Ibmer- und Waidmoos (V.). April—Mai.
85. *Schoenus nigricans* L. Schwärzliches Kopfried. *Chaetophora nigricans* Kunth. Torfwiesen sehr selten. In der Grünau (Brittinger). Im Ibmermoos am Häretingersee (V.). Um Mattsee (P. Schwab). April—Mai.

6. *Cladium* Patz Browne. Sumpfried.

86. *Cladium Mariscus* R. Br. Deutsches Sumpfried. *Schoenus Mariscus* L. *Cladium germanicum* Schrad. An Seeufern. Selten. Am Ufer des Höllerer-, Häretinger-, Seeleithner- und Holzösterersee im Bezirke Wildshut (V.), Grabensee bei Mattsee. (P. Schwab). Juli—August.

7. *Rhynchospora* Vahl. Moorsimse.

87. *Rhynchospora alba* Vahl. Weisse Moorsimse. *Schoenus albus* L. Torfbildende Pflanze. Massenhaft in allen Mooren des Gebietes, z. B. bei Kirchschlag, Hellmonsödt, Zell am Moos, Windischgarsten, Ibmermoos (V.), um Mattsee (P. Schwab) u. s. w. Juni—August.
88. *Rhynchospora fusca* R. S. Braune Moorsimse. *Schoenus fuscus* L. Sehr selten. Im Waidmoos gegen Moosdorf (V.). Juni—Juli.

8. *Eriophorum* L. Wollgras.

89. *Eriophorum gracile* Koch. Schlankes Wollgras. *E. triquetrum* Hoppe. *E. polystachyum* var. α L. Selten. Torfmoore um Kirchschlag, in der Föhrau, am Luftenberg (Oberleitner), Pfenningberg (Ritzb.). Bei Königswiesen (Dittlbacher). Um Windischgarsten (Oberleitner). Am Stodereck im Stoder (Dr. Dürrenberger), bei Spital. Am Hausruck bei Marienkirchen, im Moore zwischen Zell am Pettenfürst und Buchkirchen, im Ibmer- und Waidmoos (V.), um Andorf (Haselberger), um Kirchberg und Mattsee (P. Schwab). April—Mai.
90. *Eriophorum latifolium* Hoppe. Breitblättriges Wollgras. *Er. polystachyum* var. β . L. *E. vulgare* Pers. *E. pubescens* Sm. Auf Sumpf- und Moorboden durch das ganze Gebiet. April—Mai.
 β . *congestum* Necht. Hausruck und bei Buchkirchen (V.), bei Leonding (Ritzb.).
91. *Eriophorum angusti folium* Roth. Schmalblättriges Wollgras. *Er. polystachyum* L. *E. gracile* E. B. An denselben Standorten wie das vorige durch das ganze Gebiet. April—Mai.
92. *Eriophorum vaginatum* L. Scheidiges Wollgras. Auf Torfboden. Zerstreut. Um Kirchschlag, in der Kunöd, Föhrau bei Hellmonsödt. Bei Weissenbach a. W. Um Windischgarsten. Ibmermoos (V.), Waidmoos (V.), Moorböden zwischen Stadl und Hauchsteinspitze (Haselberger). Um Kirchberg und Mattsee (P. Schwab). April—Mai.
93. *Eriophorum Scheuchzeri* Hoppe. Scheuchzers Wollgras. *E. capitatum* Host. Torfpflanze höherer Alpen. Sehr selten. Um Mondsee (Brittinger). Im kleinen Sumpfe nächst den Gjaidseennhütten zwischen Krippen- und Gjaidstein (Kerner). Juni—August.
94. *Eriophorum alpinum* L. Gebirgswollgras. *Trichophorum alpinum* Pers. Torfwiesen, Moorgründe des Mühlkreises und der ganzen Alpenkette, z. B. Kirchschlag, Föhrau, Aigen, Windischgarsten (Oberleitner), Gmunden (Dörfler), Ibmermoos (V.), Buchkirchen (V.), Kirchberg, Mattsee (P. Schwab), Andorf (Haselberger). April—Mai.

9. *Scirpus* L. Simse.

I. *Scirpidium* Nees. Zartsimse.

95. *Scirpus acicularis* L. Nadelsimse, *Heleocharis acicularis* R. Br. *Joocypis acicularis* Schld. *Scirpidium aciculare* Nees. Auf feuchtem,

sandigen Boden zerstreut, doch an den einzelnen Stellen in Massen vorkommend. An der Donau bei Linz, Steyregg (*Ritzb.*). Auen bei Enns. An der Traun ober Wels (*Stubenvoll*), bei Vöcklabruck (*Ritzb.*). Um Steyr (*Sauter*). Bei Aschach (*Haselberger*). An den Ufern der Salzach, des Inn und der Donau, im Innkreise (*V.*). Juni—September.

III. *Heleocharis* R. Br. Sumpfried.

96. *Scirpus lacustris* L. Sumpfsimse. *Heleocharis polustris* R. Br. In Sümpfen, Gräben, Teichen gemein. Juni—August.
97. *Scirpus uniglumis* L. Einspelzige Simse. *Heleocharis uniglumis* Link. An sumpfigen, torfigen Orten. Selten. Um Windischgarsten, Mondsee. Um Ried (*v. Glanz*). Ibmermoos (*V.*), um Andorf (*Haselberger*). Juni—August.
98. *Scirpus ovatus* Roth. Eiförmige Simse. *Heleocharis ovata* R. Br. An stehenden Gewässern zerstreut. Um Linz bei der Schiffswerfte, Plesching (*Ritzb.*), am Luftenberg, Teichränder bei Freistadt. Um Steyr (*Brittinger*). Bei Kammer am Attersee. Um Aistersheim (*Keck*). Graben der Wildshuterau (*V.*). Altschwend bei Raab: Schwarzberg (*Haselberger*). Juli—August.

IV. *Limnochloë* P. d. B. Phulsimse.

99. *Scirpus caespitosus* L. Rasensimse. *Limnochloë caespitosa* Rchb. *Bacothryon caespitosum* Nees. *Heleocharis caespitosa* Lk. *Scirpus Bacothryon* Timm. In Torfmooren und Moorbrüchen. In den Alpen und Voralpen, z.B. bei Spital am Pyhrn (*Brittinger*); am Dachsteingebirge (*Kerner*), am Blöckensteinfilze (*Sendtner*), um Leonfelden (*Ritzb.*), um Ibmermoos in zahlreichen Rasen (*V.*). Mai—Juni.
100. *Scirpus pauciflorus* Ligthf. Armblüthige Simse. *Limnochloë pauciflora* Wimm. *Scirpus Bacothryon* Erh. *Bacothryon Halleri* N. v. L. In Sümpfen zerstreut. Um Kirchschlag (*Ritzb.*). Bei Wels. Um Windischgarsten. An nassen Orten an der Muethling (*Oberleitner*). Am Schmiedbache in der Rossleiten im Hinterstoder (*Dr. Dürrenberger*). Im Ibmermoore (*V.*). Juni—Juli.

V. *Blysmus* Panzer Quellriet.

101. *Scirpus compressus* Pers. Zusammengedrückte Simse. *Scirpus caricis* Retz. *Schoenus compressus* L. *Carex uliginosa* L., *Blysmus compressus* Panzer. Auf Sumpfwiesen durch das ganze Gebiet. Juni—Juli.

VI. *Isolepis* R. Br. (z. Th.) Zartriet.

102. *Scirpus setaceus* L. Borstenförmige Simse. *Isolepis setacea* R. Br. An Ufern, Gräben u. s. w., Donauauen bei Linz, Auen bei Enns. Bei Wels (*Schiedermayr*). Um Lambach (*Ritzb.*). Bei Wildshut (V.). Juli—August.

VII. *Scirpis* Nees. Echte Simse.

103. *Scirpus lacustris* L. In stehenden und fließenden Gewässern gemein. Juni—Juli.
104. *Scirpus Tabernae montani* Gmel. *Tabernaemontanus* Simse. *S. glaucus* Sm. Selten. Bei Ebelsberg (v. Mor); um Wels, bei Engelszell. Juni—August.
105. *Scirpus triquetus* Auct. Dreikantige Simse. *S. Pollichii* Godr. et Greu. *S. mucronatus* Poll. *Sc. trigonus* Roth. *Helcogiton triquetrum* Rehb. An Ufern, Gräben, Sümpfen u. dgl., durch das ganze Gebiet, mit Ausnahme des Innkreises. Juli—September.
106. *Scirpus Duvalii* Hoppe. An den Donauufern. Selten.

VIII. *Bulboschoenus* Arch. Knollensimse.

107. *Scirpus maritimus* L. Im Gebiete zerstreut. Um Kremsmünster (*Hofstetter*), Steyr, Windischgarsten, Ried im Innkreis (V.). Juli—August.

IX. *Taphrocyton* Rehb. Grabensimse.

108. *Scirpus radicans* Schkr. Wurzelnde Simse. In den Auen bei Linz. Im Ibmermoos (V.). Juni—Juli.
109. *Scirpus silvaticus* L. Waldsimse. Waldwiesen, Auen u. dgl. gemein. Juni—Juli.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte des Vereins für Naturkunde in Österreich ob der Enns zu Linz](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [0020](#)

Autor(en)/Author(s): Ritzberger Engelbert

Artikel/Article: [Aufzählung der oberösterreichischen Cyperaceen 1-17](#)