

Verzeichnis

der um Kirchdorf im Kremsthal in Oberösterreich

gesammelten

Microlepidopteren.



I.

Pyralidina, Zünsler.

II.

Tortricina, Wickler.

III.


Tineina und Pterophorina, Motten und Federmotten.

(Folgen als Fortsetzung.)

Von

Franz Hauder

Lehrer in Kirchdorf.



Das Sammelgebiet erstreckt sich von Schlierbach in südlicher Richtung bis Stoder und Windischgarsten und von Scharnstein und Almsee in östlicher Richtung über Molln, Innerbreitenau bis in den Bodinggraben. Diesem Gebiete gehören Theile der Flussläufe der Steyr, Krems und Alm mit ihren Nebenbächen an; in ihm sind fast alle Stufen der Bodenerhebungen vorhanden: von den kleinen Ebenen im theilweise sehr sumpfigen Kremsthale bis zu den hochragenden Gebirgen im südlichen Theile unseres schönen Landes (Falkenmauer 1599 *m*, Sengsengebirge 1961 *m*, Priel 2500 *m*). Leider konnte ich diese höchsten Lagen des Sammelgebietes nicht in den Bereich der lebhafteren Sammelthätigkeit, die sich vorherrschend auf die Täler und Vorberge der hiesigen Alpen erstreckt, einbeziehen, und deshalb wird so manche Art, die sicher dort zu treffen sein würde, in diesem Verzeichnisse fehlen. Ich hoffe aber, dass dieses trotzdem manchem Freunde der Lepidopteren aus dem Grunde willkommen sein wird, weil es, nach meinem Wissen, das erste etwas umfassendere über die Microlepidopteren Oberösterreichs sein dürfte.

Innerhalb des bezeichneten Gebietes durchsuchte ich besonders die nähere Umgebung von Kirchdorf und Micheldorf; sehr reich erwiesen sich die Berglehnen um Herndl und Frauenstein, sowie die Umgebung der Gradenalm und die Feuchtau auf dem Sengsengebirge. Das Ergebnis meiner 10jährigen Sammelthätigkeit weist fast 1300 Arten nebst Abarten und Varietäten auf, wovon nahezu die Hälfte auf die sogenannten Kleinschmetterlinge entfallen. Eine weitere intensive Sammelthätigkeit wird dieses Verzeichnis noch bedeutend zu erweitern imstande sein. In dieses sind auch einige Arten aufgenommen worden, die von dem eifrigen Sammler Herrn Fachlehrer *Karl Mitterberger* in Steyr in der Umgebung dieser Stadt gefangen wurden und die ich im hiesigen Gebiete, wo deren Vorkommen mit Recht vermuthet, beziehungsweise angenommen werden darf, noch nicht nachweisen konnte.

Als Bestimmungs-, beziehungsweise Hilfswerke benütze ich:
1. *Ochsenheimer* und *Treitschke*: »Die Schmetterlinge Europas«,
2. *v. Heinemann*: »Die Kleinschmetterlinge«, 3. *Sorhagen*: »Die
Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg«.

Der erste Wegweiser auf dem reichen und interessanten Gebiete der Kleinschmetterlinge war mir die Sammlung im Stifte Kremsmünster, die mir durch die Liebenswürdigkeit des hochw. Herrn Professors *P. Anselm Pfeiffer* zugänglich war. Die Herren *Rogenhofer* und *Rebel* in Wien und Herr *A. Brade* in Forst (Lausitz) hatten die Güte, eine Anzahl Stücke zu bestimmen; die meisten aber liess ich bei Dr. *Staudinger* in Blasewitz bei Dresden bestimmen, beziehungsweise überprüfen.

Das Verzeichnis der Tineinen oder Motten und der Pterophorinen oder Federmotten erscheint später als Fortsetzung.

Kirchdorf im Kremsthale, am 20. März 1896.

Franz Hauder.

I. Pyralidina.

Pyralididae.

Cledeobia Dp.

Brunnealis Tr.*) Sehr selten, 1 Stück beim Cederbauern bei Altpernstein; Juli.

Angustalis Schiff. Nicht selten, kommt zum Lichte; Juli, August.

Aglossa Latr.

Pinguinalis L. Ueberall häufig, besonders in Häusern; Mai bis Juli. Die Raupe in Abfällen verschiedener Art in einer seidenen Röhre.

Asopia Tr.

Farinalis L. Häufig, besonders in Ställen; Sommer. Die Raupen in Abfällen in seidenen Röhren.

Scoparia Hw.

Ambigualis Tr. Nicht selten, ruht an Zäunen und Baumstämmen; Mai, Juni. Die Raupe unter Moos und Flechten an Eichen und Buchen.

Dubitalis Hb. Häufig, an Zäunen, Stämmen etc.; Sommer. Die Raupe ebenfalls unter Moos und Flechten.

Manifestella H. S. Selten; im Juli an Felsen der Falkenmauer.

Petrophila Stdf. Selten, Gradenalm; Juli.

Sudetica Z. Nicht selten, im Thale und auf Bergen; Juli, August.

Truncicolella St. Häufig, in Gebüsch und Wäldern, an Stämmen und Steinen sitzend; Mai bis Juli. Die Raupe unter Moos auf Steinen.

Crataegella Hb. Seltener, an denselben Orten wie die vorige Art; Mai, Juni. Die Raupe unter Baummoos.

Threnodes Gn.

Pollinalis Schiff. Nicht selten, auf sonnigen Berglehnen, Georgenberg, Herndl u. a. O.; Mai.

*) Nach einem abgeriebenen Stücke bestimmt.

Eurrhypara H.

Urticata L. Häufig; Juni bis August um Nesseln. Die Raupe zwischen Nesselblättern.

Botys Tr.

Nigralis Fab. Selten, auf Berglehnen bei Herndl, Klaus; Juli.

Octomaculata F. Nicht selten, auf sonnigen Berglehnen, Buchenhain, Pröllner, Herndl etc.; Juni.

Nigrata Sc. Seltener, Scherleiten, Weinzirl, Georgenberg, Herndl; April, Mai und August.

Cingulata L. Häufig, im ganzen Gebiete; Mai, August.

Porphyralis Schiff. Seltener, auf Bergwiesen, Pröllner, Wienerweg, Herndl; Juni.

Aurata Sc. Nicht häufig, auf Berglehnen, Scherleiten, Pröllner etc.; Juni.

Falcatalis Gn. Nicht selten, auf sonnigen Berglehnen, im Jahre 1892 bei Herndl zahlreich; Juni, Juli.

Purpuralis L. Häufig, an sonnigen Plätzen; Mai, Juni, September.

Cespitalis Schiff. Die häufigste Art dieses Genus, auf Wiesen im Thale und auf Bergen; Ende April bis Herbst.

Alpinalis Schiff. Nicht selten, Feuchtau im Sengsengebirge, Falkenmauer; Juli, August.

Nebulalis Hb. Nicht selten, auf Wiesen im Thale; Juni bis August.

Flavalis Schiff. Ueberall zahlreich, besonders Kremsursprung, Herndl etc.; Juli, August.

Hyalinalis Hb. Nicht selten, um Nesseln, in deren zusammengesponnenen Blättern die Raupe lebt; Juli.

Fuscalis Schiff. Nicht selten, auf Wiesen, Buchenhain, Weinzirl; Mai bis August.

Terrealis Tr. An denselben Orten wie die vorige Art; Juli.

Crocealis Hb. Nicht selten, meist aus Gebüsch gezeichnet, Buchenhain, Georgenberg; Juni.

Sambucalis Schiff. Nicht selten, Buchenhain, Weinzirl; Juni, Juli.

Verbascalis Schiff. Seltener, Hausmanning, Schlierbach; Juni, Juli.

Rubiginalis Hb. Selten, bei Neupernstein; Ende Juni.

Ferrugalis Hb. Seltener, am Saume des Buchenhaines, Georgenberg; Mai, August und Herbst.

Prunalis Schiff. Seltener, Wiese am Buchenhaine, Weinzirl;
Juni, Juli.

Pandalis Hb. Häufig, auf Wiesen; Mai bis Juli.

Ruralis Sc. Nicht selten, um Hecken und Nessel; Juni bis
August.

Eurycreon Ld.

Sticticalis L. Selten, 1 Stück fieng Baron Henniger bei Atzels-
dorf anfangs Juli.

Turbidalis Tr. Selten, Georgenberg (Hinterburg); Ende Juni.

Verticalis L. Nicht selten, Berglehnen in der Nähe des Krems-
ursprunges, Herndl; Juli.

Nomophila H.

Noctuella Schiff. Häufig, auf Wiesen und Brachfeldern; Juli bis
September.

Pionea Gn.

Forficalis L. Nicht selten, in Gebüsch, auch in Gartenhecken;
Juni bis August.

Orobena Gn.

Straminialis Hb. Nicht selten, auf bebuschten Berglehnen,
Wienerweg, Herndl etc.; Juli.

Sophialis F. Nicht selten, auf Berglehnen an Steinen und Stämmen,
Herndl, Klaus; Juli.

Perinephele H.

Lancealis Schiff. Selten, 1 Stück bei Herndl im Juli gefangen.

Diasemia Gn.

Litterata Sc. Sehr häufig, im ganzen Gebiete; Mai, Juli, August.

Agrotera Schrk.

Nemoralis Sc. Selten, 1 Stück an einer Laterne gefangen; Juni.

Hydrocampa Gn.

Nymphaeata L. Nicht selten, auf nassen Wiesen, um stehende
Gewässer; Juni bis August.

Cataclysta H.

Lemnata L. Häufig, an stehenden Gewässern; Juni bis August.
Die Sackraupe an der Wasserlinse.

Acentropidae.

(Fehlt.)

Chilonidae.

(Bisher noch keine Art gefunden.)

Crambidae.

Crambus F.

Pascuellus L. Ueberall auf Wiesen; Juni, Juli.

Sivellus Hb. Auf Wiesen an der Krems; Juli, August.

Ericellus Hb. Mehrere Stücke fieng ich am 9. Juni 1895 bei
Frauenstein an einem Waldsaume.

Pratellus L. Auf allen Wiesen häufig; Mai bis Juli.

Dumetellus Hb. So häufig wie die vorige Art und an denselben
Orten. Variiert; Juni und Juli.

Hortellus Hb. Zahlreich im ganzen Gebiete; Juni, Juli.

„ *var. cespitellus Hb.* Nicht selten, mehr in höheren Lagen.

Chrysonuchellus Sc. Nicht selten, auf Bergwiesen, Georgenberg,
Herndl, Gradenalm etc.; Mai, Juni.

Falsellus Schiff. Selten, Buchenhainwiese, Georgenberg; Juli,
August.

Conchellus Schiff. Seltener, auf Bergen, Gradenalm, Feuchtau; Juli.

Myellus Hb. Nicht selten, in höheren Lagen öfter, Hirschwald-
stein, Herrentisch etc.; Juni, Juli.

Margaritellus Hb. Seltener, auf Berglehnen, Lugerbauer etc.; Juli.

Pyramidellus Tr. Nicht selten, in höheren Lagen, Falkenmauer,
Feuchtau; Juli, August.

Combinellus Schiff. In höheren Lagen nicht selten, auf der
Gradenalm häufig; Juli, August.

Culmellus L. Im ganzen Gebiete nirgends selten; Juni, Juli.

Inquinatellus Schiff. Zahlreich auf Wiesen und Hutweiden, auch
in höheren Lagen; Juli, August.

Tristellus F. Häufig und sehr variabel; Ende Juni bis September.

Selasellus Hb. Selten, 1 Stück oberhalb Weinzirl gefangen; Juli.

Lithargyrellus Hb. Nicht selten, Kremsursprung, Wienerweg, Herndl etc.; August.

Perlellus Sc. Häufig, auf Bergwiesen besonders zahlreich; Juli, August.

Phycideae.

Dioryctria Z.

Abietella Zk. Selten, 1 Stück im Buchenhaine Ende Juni, ein abgeriebenes anfangs Juli in Herndl gefangen.

Pempelia H.

Semirubella Sc. Nicht selten, auf Bergwiesen; Juli.

„ *var. sanguinella* Hb. An denselben Orten und häufiger.

Obductella F. R. Nicht selten, auf Bergen in Schlägen, Herndl, Klaus etc.; Juli, August.

Adornatella Tr. Seltener, auf sonnigen, höheren Lagen, Hirschwaldstein, Pröllner; Juli.

Subornatella Dup. Selten, 1 Stück bei Steyrling anfangs Juli gefangen.

Ornatella Schiff. Seltener, auf Berglehnen, Herndl, Wienerweg etc.; Juli.

Catastia H.

Marginea Schiff. In höheren Lagen nicht selten, Gradenalm, Feuchtau etc.; Juli. Die Uebergänge zu

Marginea var. auriciliella Schiff, sowie diese selbst am 19. Juli 1895 auf dem Herrentische gefangen.

Hypochoalcia H.

Melanella Tr. Auf Berglehnen um Gesträuche, auch auf Wiesen an der Krems nicht selten; Mai, Juni.

Ahenella Z. Nicht selten, an denselben Orten und zur gleichen Zeit wie die vorige Art.

Acrobasis Z.

Rubrotibiella F. R. Sehr selten, 1 Stück am Saume des Buchenhaines gefangen; Juli.

Myelois Z.

Advenella Zk. Selten, 1 Stück aus einer in einem weissen Röhrengespinnste an Weissdorn lebenden Raupe gezogen; 28. Juni 1895.

Ceratoniae Z. 1 Stück am 4. August 1895 im Vorhause gefangen. Diese südeuropäische Art wurde mit Südfrüchten eingeschleppt.

Euzophera Z.

Terebrella Z. Selten, in Nadelwäldern; Juni. Die Raupe in abgefallenen grünen Zapfen.

Homoeosoma Curt.

Nebulella Hb. Selten, auf Berglehnen, Krohleiten, Herndl etc.; Juni, Juli.

Ephestia Gn.

Elutella Hb. Häufig, in Gebäuden; Mai bis August. Die Raupe an verschiedenen Abfällen, Obst, Brot und dergl.

Interpunctella Hb. Selten, 1 Stück im Juni in einem Vorhause (Samuel) gefangen. Die Raupe wurde mit den Früchten der Pinie eingeschleppt, lebt auch an anderen getrockneten Früchten.

Galleriae.

Galleria F.

Mellonella L. Nicht selten, in Bienenständen; Frühjahr und Sommer. Die Raupe in Wachs.

Aphomia H.

Sociella L. Nicht selten, an Mauern und Zäunen; Juni bis September. Die Raupe lebt in Hummel- und Wespennestern.

II. Tortricina.

Rhadocia Hb.

Caudana F. Selten, um Weiden an der Krems, worauf die Raupe zwischen versponnenen Blättern lebt; Juli, August.

Caudana var. *emargana* F. Sehr selten.

Teras Tr.

Christana F. Die Stammart noch nicht gefangen.

„ ab. *ruficostana* Curt. Sehr selten, Georgenberg; anfangs September.

Hastiana L. Selten, Buchenhain, Weinzirl; September. Die Raupe an Salix-Arten.

- Hastiana ab. buringerana* Hb. Selten.
 „ „ *byringerana* Hb. „
 „ „ *leprosana* Fr. „
 „ „ *scabrana* Hb. „
 „ „ *combustana* Hb. „
Variiegana Schiff. Nicht selten, um Prunus-Spalier; August, September. Die Raupe zwischen Blättern an Prunus u. a.
Variiegana var. aspersana F. Seltener.
Lipsiana Schiff. Selten, Steyr (Herr Mitterberger); Mai.
Sponsana F. Mehrere Stücke am Saume des Buchenhaines und bei Atzelsdorf gefangen; im Herbst.
Schalleriana L. Selten, Georgenberg; Ende August.
Aspersana Hb. Selten, Leonstein; Juli.
Ferrugana Tr. Nicht oft getroffen, an bewaldeten Abhängen, Krohleiten, Georgenberg, Hochhaus; September.
Ferrugana var. tripunctana H. Seltener, Buchenhain, Kochland.
Lithargyrana Hb. Seltener, Krémsursprung; Juni, Juli.
Holmiana L. Nicht selten, um Gesträuche, auch in Gärten; Juni, Juli.
Contaminana Hb. Häufig auf Berglehnen; September.
 „ *var. ciliana* Hb. Ebenso häufig mit der Stammart.

Tortrix Tr.

- Piceana* L. Selten, in Kiefern- und Fichtenwäldern, Calvarienberg; Juni.
Podana Sc. Nicht selten, um Laubholz und in Gärten; Juni. Die Raupe in versponnenen Endtrieben verschiedener Laubhölzer.
Crataegana Hb. Nicht selten, um Gesträuche; Juni. Die Raupe gleichfalls an verschiedenen Laubhölzern und mehreren Obstbäumen.
Xylosteana L. Seltener, Buchenhain; Juni, Juli.
Rosana L. Nicht selten, um Gesträuche; Juni. Die Raupe an vielen Laubhölzern, auch in Gärten.
Sorbiana Hb. Nicht häufig, Herndl, Georgenberg; Juni, Juli.
Semialbana Gn. Selten, Hausmanning; Juni.
Corylana F. Nicht selten, um Gesträuche; Juni, Juli. Die Raupe an vielen Laubhölzern.
Ribeana Hb. Seltener, Buchenhain, Georgenberg, Herndl; Juni, Juli. Die Raupe ebenfalls polyphag.

Cinnamomeana Tr. Selten, Georgenberg, Wienerweg, Herndl; Juni.
Heparana Schiff. Nicht selten, in Gebüsch; Juni, Juli. Die
 Raupe auf Laubholz.

Dumetana Tr. Selten, Park, Georgenberg; Juli.

Lecheana L. Eine der häufigsten Arten dieses Genus, in Laub-
 hölzern und Gärten; Juni. Die Raupe in versponnenen
 Blättern vieler Laubhölzer.

Aeriferana H. S. Herr Mitterberger fieng diese Art anfangs Juli
 bei Steyr.

Histrionana Froel. Selten, Buchenhain, Georgenberg; Juni, Juli.

Musculana Hb. Nicht selten, um Gesträuche; Juni, Juli.

Diversana Hb. Seltener, Herndl, Georgenberg; Juni.

Ministrana L. Nicht selten, um Gesträuche; Mai, Juni. Die
 Raupe an Birken, Erlen, Linden, Rosen u. a.

Bifasciana Hb. Sehr selten, Buchenhainsaum, aus niederen
 Hainbuchen gescheucht; Juni.

Conwayana F. Nicht selten, Buchenhain, Weinzirl etc.; Juni, Juli.

Bergmanniana L. Nicht selten, um Rosen; Juni. Die Raupe
 zwischen versponnenen Gipfelblättern.

Loeflingiana L. Häufig, um Gebüsch, Georgenberg etc.; Ende
 Mai bis anfangs Juli. Die Raupe in einer Rolle an Eichen-
 blättern.

Loeflingiana var. *ectypana* H. Nicht selten.

Viridana L. Häufig, um Eichen; Juni, Juli. Die Raupe in Blatt-
 rollen an Eichen, nach Sorhagen auch »an allem Laubholz,
 auch an Sambucus und Loniceren«.

Viburniana F. Nicht selten, Wienerweg, Herndl; Juli.

Paleana Hb. Seltener, Herndl; Juli.

Steineriana var. *dohrniana* H. S. Selten, Buchenhain; Juli.

Rusticana Tr. Zahlreich, auf Berglehnen; Mai.

Pilleriana Schiff. Selten, 1 Stück in Herndl im Juli gefangen.

Gnomana Cl. Selten, Buchenhain; Juli.

Rubicundana H. S. Selten, Neupernstein; Juli.

Geringana Schiff. Nicht selten, auf Bergwiesen, Pröllner, Georgen-
 berg, Herndl etc.; Juli, August.

Favillaceana H. Selten, Buchenhain, Herndl; Mai.

Sciaphila Tr.

Osseana Sc. Nicht selten, Gradenalm; Juli, August.

Argentana Cl. Häufig, auf allen Bergwiesen; Juni, Juli.

Wahlbomiana L. Häufig, im ganzen Gebiete; Juni, Juli. Die Raupe an niederen Pflanzen.

Wahlbomiana var. *alticolana* H. S. Nicht selten.

„ „ *virgaureana* Tr. „ „

„ „ *minorana* H. S. „ „

„ „ *communana* H. S. „ „

Nubilana Hb. Nicht selten, wie die vorige Art an Stämmen und Zäunen sitzend; Juni.

Cheimatophila Stph.

Tortricella Hb. Seltener, im Gebüsch am Kochland und Buchenhaine; Herbst und Frühjahr.

Exapate H.

Congelatella Cl. Seltener, Weinzirl, Gärten; October, November.

Olindia Gn.

Hybridana var. *albulana* Tr. Selten, Buchenhain; Juni.

Ulmana Hb. Selten, Buchenhain; Juni, Juli.

Cochylis Tr.

Hamana L. Auf Bergwiesen nicht selten; Juni, Juli.

Zoegana L. „ „ „ „ „ „

Cruentana Froel. Selten, Falkenmauer; Juli.

Hartmanniana Cl. Nicht selten, Buchenhain, Pröller etc.; Mai, Juni.

Decimana Schiff. Selten, Falkenmauer; Juli.

Aleella Schulze. Nicht selten, an denselben Orten wie Hartmanniana; Mai, Juni.

Badiana Hb. Selten, auf Bergwiesen, Pröller, Herndl; Juni, Juli.

Ciliella Hb. Selten, Weinzirl; Mai.

Epilinana Z. Selten, Georgenberg, Herndl; Juni.

Roseana Hw. Nicht selten, auf Bergwiesen, Pröller, Georgenberg etc.; Mai, August.

Musschliana Tr. Nicht selten, auf Bergwiesen; Mai.

Posterana Z. Selten, auf Berglehnen, Herndl, Georgenberg; Mai, August.

Dubitana Hb. Nicht selten, ebenfalls auf Bergwiesen; Mai, Juni.

Retinia Gn.

Turionana Hb. Selten, 1 Stück in der Nähe des Calvarienberges gefangen; Mai.

Buoliana Schiff. Nicht oft getroffen, Pröller, Herndl; Juni, Juli.
Resinella L. Nur wenige Stücke getroffen, Pröller; Mai, Juni.

Penthina Tr.

- Profundana F.* Nicht selten, um Gesträuche; Juli. Die Raupe in versponnenen Eichenblättern.
- Schreberiana L.* Selten, 1 Stück an der Kreams gefangen; Juni.
- Salicella L.* Häufig, um Weiden und Pappeln; Mai, Juni. Die Raupe zwischen versponnenen Weiden- und Pappelblättern.
- Scriptana Hb.* Nicht selten, um alte Weiden; Juni, Juli. Die Raupe zwischen versponnenen Blättern.
- Capreana Hb.* Selten, 1 Stück bei der Kirchenmühle gefangen; Juni, Juli.
- Corticana Hb.* Sehr selten, 1 Stück bei Blumau gefangen; Juni.
- Variiegana Hb.* Häufig, in Hecken und Gärten, sitzt an Zäunen und Stämmen; Juni. Die Raupe an verschiedenen Laubhölzern und Obstbäumen.
- Pruniana Hb.* Häufig, in Gärten, ruht wie die vorige Art an Zäunen etc.; Juni. Die Raupe zwischen Prunusblättern.
- Oblongana Hb.* Seltener, auf Wiesen und Rainen, Neuperstein, Georgenberg, Herndl etc.; Juni.
- Oblongana var. nigra.* An denselben Orten. Von Herrn Rebel in Wien bestimmt.
- Sellana Hb.* Nicht selten, Buchenhain, Kremsursprung; Mai.
- Gentiana Hb.* Selten, Kremsursprung; Juli.
- Nigrocostana Hw.* Selten, Buchenhainsaum, Krohleiten, Herndl; Juni.
- Fuligana Hb.* Seltener, Buchenhain; Juli, August.
- Postremana Z.* Selten, Weinzirl; Juni.
- Rufana Sc.* Nicht selten, auf Bergwiesen; Juni.
- Strianta Schiff.* Nicht selten, auf allen Wiesen; Mai, Juni.
- Siderana Tr.* Selten, Schlierbach, Herndl; Juni, Juli.
- Metallicana Hb.* Mehrere Stücke auf der Gradenalm gefangen; Juli.
- Stibiana Gn.* Nicht selten, Buchenhain, Georgenberg, Herndl etc.; Juni.
- Metalliferana H. S.* Nicht selten, Kremsursprung, Gradenalm; Juli, August.
- Olivana Tr.* Nicht selten, Berglehnen, Stoder etc.; Juli, August.
- Arcuella Cl.* Häufig, sitzt gern auf *Carpinus* und *Corylus*; Mai, Juni.
- Rivulana Sc.* Häufig oberhalb Weinzirl; Mai, August.

Umbrosana Frr. Nicht selten, auf Wiesen, Weinzirl, Kremsursprung etc.; Juni, Juli.

Urticana Hb. Häufig, im ganzen Gebiete; Juni, Juli.

Lacunana Dup. Häufig, Wiesen und Gärten; Mai, Juni, August.

Rupestrana Dup. Selten, Hausmanning; Mai.

Lucivagana Z. Seltener, Herndl, Kremsursprung; Juni, Juli.

Cespitana Hb. Selten, Herndl, Pröller; Mai, August.

Flavipalpata H. S. Nicht selten, Georgenberg, Herndl etc.; Juli, August.

Bipunctana F. Nicht selten, Buchenhain, Herndl etc.; Juni, Juli.

Charpentierana Hb. Seltener, Gradenalm; Juli, August.

Hercyniana Tr. Selten, Pröller. Herr Mitterberger fieng diese Art bei Steyr; Juni.

Achatana F. Nicht selten, sitzt oft an Zäunen; Juni, Juli.

Trifoliana H. S. Seltener, Buchenhain, Kremsursprung; Juni, Juli.

Antiquana Hb. Seltener, Buchenhain; Juni, Juli.

Aspis Tr.

Uddmanniana L. Seltener, an Zäunen und Stämmen; Mai bis Juli.

Aphelia Stph.

Lanceolana Hb. Häufiger, auf Sumpfwiesen an der Krems; Mai bis August.

Eudemis H.

Artemisiana Z. Selten, 1 Stück am Saume des Schöngruberwaldes gefangen; Juni.

Lobesia Gn.

Permixtana Hb. Selten, Buchenhain, Herndl etc.; Mai, Juni.

Eccopsis Z.

Latifasciana Hw. Selten, Buchenhain, Georgenberg etc.; Juni.

Grapholitha Tr.

Expallidana Hw. Sehr selten, 1 Stück an der Krems gefangen; Mai.

Hohenwartiana Tr. Nicht oft getroffen, Bergwiesen; Mai, Juli, August.

Hohenwartiana var. jaceana H. S. Unter der Stammart.

Hepaticana Tr. Nicht selten, Berglehnen; Juni.

Graphana Tr. Nicht selten, Schlierbach, Georgenberg, Herndl; Juni, Juli.

Kochiana H. S. Sehr selten, Park; Juni.

Tedella Cl. Häufig, Nadelwälder; Juni.

- Proximana* H. S. Seltener, an denselben Orten wie die vorige Art; Juni.
- Demarniana* F. R. Seltener, auf sonnigen Berglehnen, Pröller, Herndl; Juni, Juli.
- Subocellana* Don. Nicht selten, Buchenhain u. a. O.; Juli.
- Penkleriana* F. R. Ueberall zu treffen, sehr variabel; Juni, Juli.
- Solandriana* L. Seltener, Georgenberg, Leonstein; Juli, August.
„ *var. trapezana* F. Nicht selten.
- Sordidana* Hb. Seltener, Georgenberg, Herndl; Juli, August.
- Tetraquetrana* Hw. Nicht selten, Schlierbach, Park; Mai. Die Raupe an Birken und Erlen.
- Immundana* Hw. Nicht selten, Pröller, Herndl; Mai.
- Suffusana* Z. Nicht selten, Buchenhain etc.; Juni, Juli.
- Tripunctana* F. Seltener, Georgenberg, Herndl; Mai.
- Cynobana* F. Nicht selten, Gärten, Hecken; Juni, Juli.
- Asseclana* Hb. Nicht selten, Pröller, Georgenberg; Mai, Juni.
- Pflugiana* Hw. Nicht selten, Berglehnen, Gradenalm; Mai, Juli.
- Cirsiana* Z. Seltener, Falkenmauer; Juli.
- Sublimana* H. S. Selten, Pröller; Juli.
- Brunnichiana* Froel. Nicht selten, Krohleiten; Mai, Juni.
- Citrana* Hb. Nicht selten, auf Bergwiesen; Mai bis Juli.
- Aspidiscana* Hb. Nicht selten, Buchenhain, Pröller, Herndl; Juni, Juli.
- Hypericana* Hb. Seltener als die vorige Art, Berglehnen; Juni, Juli.
- Tenebrosana* Dup. Selten, auf Feldrainen bei Weinzirl; Juli.
- Funebrana* Tr. Nicht selten, sitzt an Zäunen und Stämmen; Mai, Juli. Die Raupe in Pflaumen und anderem Steinobst.
- Succedana* Froel. Selten, Buchenhain, Herndl; Juni.
- Coniferana* Rtz. Sehr selten, Stampfhub; Juni.
- Woeberiana* Schiff. Nicht selten, an Gartenzäunen etc.; Mai, Juni. Die Raupe in der Rinde mehrerer Obstbäume.
- Compositella* F. Häufig, auf allen Wiesen; Mai, August.
- Discretana* Wk. Selten, Buchenhainsaum; Juni.
- Leguminana* Z. Sehr selten, Georgenberg; Juni.
- Dorsana* F. Selten, Buchenhainsaum, Georgenberg, Herndl; Mai, Juni. Die Raupe in Erbsen.
- Coronillana* Z. Sehr selten, Weinzirl; Juni.
- Aurana* F. Auf den Kremswiesen nicht selten; Juni, Juli.
„ *var. aurantiana* Koll. Selten, unter der Stammart.

Carpocapsa Tr.

- Pomonella L.* Nicht selten, Häuser, Gärten; Mai bis Juli. Die Raupe in Äpfeln, soll auch in Birnen vorkommen.
- Grossana Hw.* Sehr selten, Buchenhain; Juni. Die Raupe in Buchnüssen.
- Splendana Hb.* Selten, Krohleiten, Georgenberg; Juni. Die Raupe in Eicheln.

Coptoloma Led.

- Janthinana Dup.* Sehr selten, Buchenhainsaum, Pröller; Juni.

Phthoroblastis Led.

- Plumbatana Z.* Selten, Buchenhain; Ende April.
- Populana F.* Selten, Buchenhain, Kremswiesen, Gradenalm; Juli.
- Regiana Z.* Selten, Calvarienberg; Mai.
- Trauniana Schiff.* Selten, Buchenhain, Georgenberg; Mai.
- Rhediella Cl.* Seltener, sitzt an Gartenzäunen, Stämmen; April, Mai.

Tmetocera Led.

- Ocellana F.* Nicht selten, Laubwälder, Gärten; Mai bis Juli.

Steganoptycha H. S.

- Incarnana Hw.* Nicht selten, um Gesträuche, an Zäunen etc., Park, Herndl; Juni.
- Corticana Hb.* Seltener, Buchenhain; Juli.
- Rufimitrana H. S.* Diese Art fieng Herr Mitterberger bei Steyr im Juli.
- Fractifasciana Hw.* Selten, Pröller, Steyr (Herr Mitterberger); Juni.
- Pygmaeana Hb.* Nicht selten, in Nadelhölzern, Pröller, Herndl; April.
- Abiegana Dup.* Seltener, fand Herr Mitterberger bei Steyr; April, Mai.
- Angustana Hb.* Seltener, meist in höheren Lagen, Gradenalm; August.
- Rubiginosana H. S.* Selten, fand Herr Mitterberger bei Steyr; Juni.
- Trimaculana Don.* Selten, Herndl; Juni.
- Minutana Hb.* Seltener, Schiessstätte, um Pappeln; Juni.

Phoxopteryx Tr.

- Mitterbachiana* Schiff. Selten, Kremsursprung; Ende Juni.
Laetana F. Selten, Buchenhain, Weinzirl; Ende April bis Juni.
Biarcuana Stph. Selten, Georgenberg, Herndl; Juni.
Diminutana Hw. Selten, Buchenhain, Weinzirl; Juni.
Uncana Hb. Selten, Gradenalm; Juli.
Unguicella L. Seltener, Humusbüchel; Juni.
Siculana Hb. Nicht selten, Buchenhain, Georgenberg etc.; Mai bis Juli.
Comptana Froel. Nicht selten, Georgenberg, Herndl, Feldrainen, Gradenalm u. a. O.; Mai, Juni.
Lundana F. Seltener, bei Altpernstern, Wienerweg; Juni.
Myrtillana Tr. Selten, Krohleitern, Hirschwaldstein; Mai.

Rhopobota Led.

- Naevana* Hb. In Gärten und Laubhölzern häufig, an Stämmen und Zäunen sitzend; Juni.
Naevana var. *geminana* Stph. Seltener.

Dichrorampha Gn.

- Petiverella* L. Nicht selten, Berglehnen; Mai, Juli, August.
Alpinana Tr. Selten, Schiessstätte, Hirschwaldstein; Juli.
Plumbagana Tr. Selten, Georgenberg, Steyr (Herr Mitterberger); Mai, Juni.
Acuminatana Z. Seltener, Berglehnen und Wiesen; Mai, Juni.
Plumbana Sc. Häufig im ganzen Gebiete; Ende April bis anfangs Juni.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresberichte des Vereins für Naturkunde in Österreich ob der Enns zu Linz](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [0025](#)

Autor(en)/Author(s): Hauder Franz

Artikel/Article: [Verzeichnis der um Kirchdorf im Kremstale in Oberösterreich gesammelten Microlepidopteren 1-18](#)